



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>









•

•

•

•

•

•

# TABLES GÉNÉRALES

ALPHABÉTIQUES ET ANALYTIQUES

des trois premières séries

DES ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE  
DE FRANCE



1832 — 1860

212

5.





# TABLES GÉNÉRALES

ALPHABÉTIQUES ET ANALYTIQUES

DIVISÉES

PAR ORDRES D'ANIMAUX

de toutes les matières contenues dans les trois premières séries

DES

**ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE**

SUIVIES DE LA

**Table des auteurs de ces matières**

---

**1832 — 1860**

---

**Par M. Aug.-Sim. PARIS,**

Membre de la Société entomologique de France,

Membre correspondant de l'Académie de Reims.

**PARIS**

**AU BUREAU DU TRÉSORIER DE LA SOCIÉTÉ,**

**M. LUCIEN BUQUET,**

rue Neuve-Saint-Placide, 50 (Faub. S'-Germain).

---

**1867**



124834

YAROLI  
ROBAL. GORBATZ GMA. DU  
YTEREVNU

## PRÉFACE

Depuis longtemps les entomologistes sentaient le besoin d'une Table générale des Annales publiées par la Société entomologique de France. Cette Table, en effet, devait rendre leurs recherches plus faciles et leur éviter la perte de temps souvent considérable que ces recherches exigeaient. Déjà plusieurs fois la Société elle-même avait manifesté le vif désir de voir réaliser le projet de cette Table, et elle avait accepté avec empressement et reconnaissance l'offre toute désintéressée que, dès l'année 1856, M. Arias Teijeiro, l'un de ses membres, lui avait transmise, de se charger de la rédaction de cette Table, pour les deux premières séries des Annales, dont il s'occupait depuis longtemps. Elle avait donc engagé M. Arias Teijeiro à communiquer à la Commission de publication le plan qu'il avait adopté et le commencement de son travail. Celui-ci avait alors adressé à M. le Président de la Société une note dans laquelle il exposait son plan et ses divisions : il demandait en même temps que la Société voulût bien examiner les parties rédigées de son travail et lui indiquer les changements, corrections et suppressions qui lui paraîtraient nécessaires. Il estimait que cette Table des deux premières séries seulement occuperait deux volumes, mais que son étendue pourrait être restreinte par la suppression de quelques articles.

La Société, voulant agir avec maturité, décida, le 14 juin 1857, que la note de M. Arias Teijeiro serait lue une seconde fois dans la séance ordinaire suivante. Cette seconde lecture eut lieu, en effet, le 24 du même mois de juin 1857 ; et la Société, appréciant le long



et important travail de M. Arias Teijeiro, chargea son Secrétaire de lui adresser les remerciements de ses collègues, et décida qu'une Commission, composée de MM. Berce, Doué, Fairmaire, Reiche et Sichel, serait chargée d'étudier ce travail et d'indiquer les moyens de publication qui lui paraîtraient les plus convenables.

Les exigences et les difficultés d'une pareille tâche en retardèrent longtemps l'exécution. Cependant, après s'en être entendu avec l'auteur, et sur le rapport de la Commission, on arrêta, dans la séance extraordinaire du 10 avril 1861, les dispositions suivantes :

« 1<sup>o</sup> La Société décide qu'elle publiera une Table générale alphabétique des trois premières séries des Annales (1832-1860); »

« 2<sup>o</sup> Elle ouvre immédiatement une souscription facultative, au minimum de 20 fr., pour couvrir les frais de cette impression ; »

« 3<sup>o</sup> La Société confie la confection de cette Table à M. Arias Teijeiro, qui, avec un désintéressement et un zèle au-dessus de tout éloge, a offert spontanément de se charger de cette difficile tâche, qu'il a déjà, en grande partie, accomplie, et de la terminer d'après un plan à concerter entre lui et la Commission. »

Comme on le voit, ce plan n'était pas encore arrêté ; et, d'un autre côté, le travail offert par M. Arias Teijeiro ne s'étendait encore qu'aux deux premières séries des Annales. Il fallait donc y ajouter et y fondre la troisième série, et cela exigeait beaucoup de temps. Enfin M. Arias Teijeiro avait compté, pour la réalisation de son projet, sur des loisirs et sur la continuation de sa bonne santé, deux choses qui lui firent également défaut. Les événements politiques qui, depuis longtemps, le tenaient éloigné de sa patrie, lui ayant permis d'y rentrer, il y trouva fort compromis ses intérêts, qui réclamèrent dès lors tous ses moments et tous ses soins. Bientôt le dérangement de sa santé vint lui créer de nouveaux obstacles. Il se vit donc obligé de renoncer à l'espoir de terminer son travail, qu'il promit toutefois de mettre à la disposition de la Société dans l'état où il se trouvait.

La Société regretta vivement la nécessité où se trouvait M. Arias de renoncer à son travail encore inachevé ; mais elle ne perdit pas

pour cela l'espoir d'arriver à la réalisation du projet des Tables. Le désir qu'elle en avait fut encore excité par l'offre généreuse de plusieurs de ses membres (MM. Aubé, Grenier, Sichel et Signoret) de contribuer, en sus de leurs souscriptions primitives, et dans une très-large proportion, au paiement des frais d'impression. En conséquence, elle adjoignit aux cinq premiers Commissaires sept nouveaux membres, MM. Buquet, Desmarest, Grenier, Laboulbène, Lucas, Paris et Signoret, et chargea la Commission, ainsi composée de douze membres, de mettre ce projet à exécution.

C'est dans ces circonstances que je crus pouvoir offrir à la Société le travail que j'avais dressé pour mon usage personnel et qui comprenait la totalité des trois premières séries de ses Annales. Soumises à la Commission, ces Tables furent agréées par elle, sauf un changement dans la disposition que j'avais adoptée. N'ayant jamais eu l'intention de publier ces Tables, je leur avais donné la forme de tableaux avec colonnes, forme qui m'avait paru plus agréable à l'œil et présentant plus de facilités pour les recherches. Mais ces Tables, ainsi disposées, devaient presque doubler les frais d'impression, et la Commission, dirigée par un sage motif d'économie, décida que la forme de mon travail serait modifiée avant d'être soumise à l'impression. Je m'empressai de me réunir à cet avis, et je m'occupai aussitôt de réaliser la transformation que cette modification devait entraîner.

C'est ce travail ainsi transformé que j'offre en ce moment au public, sous le patronage de la Société entomologique de France, et à l'aide des souscriptions d'un grand nombre de ses membres.

Après avoir fait en quelque sorte l'historique de ce travail, qui ne peut être et n'est en effet qu'une œuvre de patience, je crois utile de donner quelques explications sur la marche que j'ai suivie et sur les divisions que j'ai adoptées.

Pour éviter toute confusion et faciliter les recherches, j'ai divisé les matières en autant de chapitres qu'il y a d'ordres d'insectes ou d'animaux dont il soit question dans nos Annales. Ainsi le 1<sup>er</sup> chapitre comprend tout ce qui se rapporte aux Coléoptères, le 2<sup>e</sup> comprend les Orthoptères, le 3<sup>e</sup> les Hémiptères, le 4<sup>e</sup> les Névroptères,

le 5<sup>e</sup> les Hyménoptères, le 6<sup>e</sup> les Lépidoptères, les 7<sup>e</sup> les Rhipiptères, le 8<sup>e</sup> les Diptères, les 9<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup>, 11<sup>e</sup>, 12<sup>e</sup>, 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup> et 15<sup>e</sup> les Aptères, les Aranéides, les Myriapodes, les Crustacés, les Annélides, les Vers et les Infusoires. Enfin j'ai réuni dans un 16<sup>e</sup> chapitre, et sous le titre d'ARTICLES GÉNÉRAUX ET OBJETS DIVERS, tous les articles qui, ne s'appliquant pas particulièrement à une famille, à un genre ou à une espèce d'animal, n'avaient pu trouver place dans aucun des chapitres précédents. J'ai fait suivre d'ailleurs chacun de ces chapitres, ceux du moins qui en étaient susceptibles, d'une espèce d'appendice, comprenant les articles généraux se rattachant à l'ordre qui fait l'objet de ce chapitre.

Chaque alinéa a pour titre le nom de la famille, de la tribu ou du genre dont il s'occupe, et qui se trouve classé par ordre alphabétique; ce titre est imprimé en caractères gras; il comprend tous les articles devant être placés sous la rubrique de cet alinéa. Le nom générique est le plus ordinairement suivi, en caractères italiques, de celui de l'espèce à laquelle l'article est consacré. Vient ensuite le nom de l'auteur, en caractères minuscules; puis, en caractères ordinaires, le titre ou la courte analyse de la matière faisant l'objet de l'article lui-même, qui se termine par les chiffres de l'année et de la page du volume des Annales auquel on renvoie. Ces chiffres sont en caractères arabes, à l'exception de ceux de la page du Bulletin, qui sont en chiffres romains, comme dans le texte des Annales. Enfin, les différents articles du même alinéa sont séparés par un trait horizontal.

Lorsque, dans le même alinéa ou §, le nom d'un auteur se reproduit plusieurs fois, je ne répète ce nom qu'autant qu'entre les articles du même alinéa se rencontre le nom d'un autre auteur. J'en fais de même à l'égard du libellé de l'article lui-même.

Les Tables générales des matières sont suivies de celles de tous les auteurs des mémoires, notes et communications contenus dans nos Annales. La confection de cette Table rentrait dans mon plan primitif; mais lors de l'adoption de mon travail par la Société, je n'avais pu encore me décider à l'entreprendre. Cette adoption m'en a fait un devoir, et cette dernière Table, qui sera très-prochainement

terminée, composera à elle seule la 4<sup>e</sup> et dernière livraison du volume, qui, pour l'impression et la publication, sera partagé en quatre parties ou livraisons, dont la première comprendra les Coléoptères seulement; la deuxième les Orthoptères, les Hémiptères, les Névroptères et les Hyménoptères; la troisième les Lépidoptères, les Rhipiptères, les Diptères, les autres ordres et les articles généraux et objets divers; enfin, la quatrième comprendra la Table des auteurs.

Par un traité signé entre l'imprimeur et moi, le premier s'est engagé, avec clause pénale en cas d'inexécution, à livrer la 1<sup>re</sup> partie le 15 novembre 1866, et les trois autres successivement les 15 février, 15 mai et 15 août 1867.

Le besoin de réduire, autant que possible, les frais d'impression et de resserrer tout l'ouvrage dans un seul volume, m'a fait une nécessité de recourir à un grand nombre d'abréviations. J'espère cependant ne l'avoir fait que dans des limites convenables et de manière à éviter tout embarras et toute incertitude. On trouvera ci-après la liste de toutes les abréviations employées dans le cours du volume.

Je ne finirai pas cette préface sans adresser de bien vifs remerciements à nos honorables et savants collègues MM. Grenier, L. Brisout de Barneville, Signoret, Sichel, Berce, Desmarest, Lucas et Jacques Bigot, pour l'extrême complaisance et le zèle éclairé qu'ils ont apportés dans l'examen et la correction des parties de mon travail traitant des matières qui font l'objet spécial de leurs études, et dont ils ont bien voulu se charger. M. le docteur Grenier surtout m'a puissamment aidé pour le long chapitre des Coléoptères. Je lui dois de nombreuses corrections et d'importantes améliorations. M. Desmarest, de son côté, veut bien revoir et corriger avec moi toutes les épreuves. Malgré ces puissants secours, je suis loin de croire ce travail exempt d'erreurs. Ce serait, de ma part, un acte de présomption tout à fait déplacé. Dans une œuvre de cette nature, où l'aridité du sujet ne peut exciter ni soutenir l'intérêt, je ne crois pas qu'il soit possible, même après des vérifications réitérées, d'en éviter un assez grand nombre. Ce que je puis dire, c'est que

j'ai apporté dans la confection et les vérifications de ce long et fastidieux travail, et dans les limites du possible, l'attention la plus soutenue et une patience à toute épreuve, bien persuadé que le mérite d'un pareil travail ne pouvait consister que dans l'exactitude des indications. Mais c'est surtout après les secours et les encouragements que j'ai reçus des excellents collègues que je viens de nommer que j'ai pu prendre quelque confiance et espérer que, toutes défectueuses qu'elles soient, mes Tables n'en auront pas moins le degré d'utilité que les souscripteurs et tous les entomologistes sont en droit d'en attendre. C'est la seule récompense que je puisse ambitionner.

A.-S. PARIS

# LISTE ALPHABÉTIQUE

DE

**Messieurs les souscripteurs aux Tables des Annales.**



MM.

1. ANDRÉ (Ernest), à Gray.
2. ARIAS-TEIJEIRO, Espagne.
3. AUBÉ, à Paris.
4. BAKEWELL (Robert), à Londres.
5. BAZIN (Stéphane), au Mesnil-Saint-Firmin.
6. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, à Paris.
7. BERCE, à Fontainebleau.
8. BIANCONI, à Bologne (Italie).
9. BIGOT (Jacques), à Paris.
10. BIGOT (Just), à Paris.
11. BOISGIRAUD, à Gemozac.
12. BONVOULOIR (le vicomte H. de), à Paris.
13. BRUCK (Emile vom), à Crefeld.
14. BRUN aîné, à Lyon.
15. BUGNION, à Lausanne.
16. BUQUET, à Paris.
17. CHAUDOIR (le baron de), à Bruxelles.
18. CHEVROLAT, à Paris.
19. COLBEAU, à Bruxelles.
20. CONSTANT fils, à Autun.
21. COSTA DE BEAUREGARD (le comte), à Chambéry.
22. CROTCH, à Cambridge.
23. DAVAINÉ (Camille), à Paris.
24. DELAMAIN (Henri), à Jarnac.

MM.

25. DEPUSET, à Paris.
26. DESMAREST (Eugène), à Paris.
27. DEYROLLE (Achille), à Paris.
28. DOUÉ, à Paris.
29. DUFOUR (Léon), à Saint-Sever.
30. DUVERGER, à Dax.
31. FAIRMAIRE (Léon), à Paris.
32. FALLOU (J.), à Paris.
33. FÉLIX (Eugène), à Leipzig.
34. FITCH (Asa), à Salem.
35. GÉHIN, à Metz.
36. GERMINY (le comte), à Rouen.
37. GERVAIS (Paul), à Paris.
38. GIRARD (Maurice), à Paris.
39. GOOSSENS, à Paris.
40. GRAELLS, à Madrid (Espagne).
41. GRASLIN (de), à Château-du-Loir.
42. GRENIER, à Paris.
43. GRUBE (Edouard), à Breslau.
44. GUÉRIN-MÉNEVILLE, à Paris.
45. HARTOG (Heys van de Lier), à Delft.
46. HEWITSON, à Londres.
47. HEYDEN (von), à Francfort-sur-le-Mein.
48. JANSON (Edward), à Londres.
49. JAVET, à Paris.
50. JEKEL, à Paris.

MM.

51. KOECHLIN (Oscar), à Dornach.
52. KRAATZ, à Berlin.
53. LABOULBÈNE (Alexandre), à Paris.
54. LACERDA (Antonio de), à Bahia.
55. LACORDAIRE (Th.), à Liège.
56. LAFERTÉ-SÉNECTÈRE (le marquis de), à Tours.
57. LE CONTE (S.-L.), à Philadelphie.
58. LEPRIEUR (C.-E.), à Colmar.
59. LETHIERRY (Lucien), à Saint-Maurice-lès-Lille.
60. MANUEL (le comte Alfred), à Albertville.
61. MARMOTTAN, à Paris.
62. MARSEUL (l'abbé de), à Paris.
63. MARTIN (Emmanuel), à Paris.
64. MILLIÈRE (Pierre), à Lyon.
65. MNISZECH (le comte G. de), à Paris.
66. MOCQUERYS (Émile), à Évreux.
67. MORS (Louis), à Bruxelles.
68. MOUFFLET, à Rochefort.
69. NIETO (José - Apolinario), à Cordova.
70. OGIER DE BAULNY (Fernand), à Coulommiers.
71. OLIVIER-DELAMARCHE (G.), à Bone.
72. PELLET, à Perpignan.
73. PERAGALLO (Al.), à Nice.
74. PEREZ-ARCAS (don Loreano), à Madrid.

MM.

75. PERRIS (Édouard), à Mont-de-Marsan.
76. PEYRON (Edmond), à Marseille.
77. POUPILLIER, à Alger.
78. RADOSCHKOVSKI (Octave), à Saint-Petersbourg.
79. RAYMOND (E.), à Fréjus.
80. REICHE (Louis), à Paris.
81. ROBIN (Charles), à Paris.
82. ROMANS (Fernand de), à Angers.
83. ROUGET (Auguste), à Dijon.
84. SALLÉ (Auguste), à Paris.
85. SAUNDERS (Sidney-Smith), à Corfou.
86. SAUNDERS (Williams-Wilson), à Londres.
87. SAUSSURE (Henri de), à Genève.
88. SELYS-LONGCHAMPS (Ed. de), à Liège.
89. SENNEVILLE (Gaston de), à Paris.
90. SICHEL, à Paris.
91. SIGNORET, à Paris.
92. STANTON, à Londres.
93. STÅL (Charles), à Stockholm.
94. STAUDINGER (Otto), à Dresde.
95. TARNIER (Frédéric), à Dijon.
96. THOMSON (James), à Paris.
97. TOURNIER (H.), à Genève.
98. VALDAN (de), à Constantine.
99. VUILLEFROY-CASSINI (Félix de), à Paris.
100. WESTWOOD, à Oxford.



# LISTE

DES

## PRINCIPALES ABBRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LE COURS DE CES TABLES.

Acad. — Académie.  
Amér. — Amérique.  
Amér. ou Am. bor. — Amérique boréale.  
Amér. ou Am. mér. — Amérique méridionale.  
ant. — antennes.  
apt. — aptère.  
Cat. — Catalogue.  
classif. — classification.  
Col. — Coléoptère.  
coll. — collection.  
Comm. — Commission.  
communic. — communication.  
descr. — description.  
diff. — différence, différent.  
Dipt. — Diptère.  
distrib. ou distr. — distribution.  
div. — divers ou division.  
entom. — entomologie, entomologique.  
env. — environs.  
esp. — espèce.  
Eur. — Europe.  
fam. — famille.

fig. — figure.  
Fr. — France.  
Glan. entom. — Glanures entomologiques.  
Hémipt. ou Hém. — Hémiptère.  
Héter. — Hétéroptère.  
Hist. — Histoire.  
Homopt. — Homoptères.  
Hymén. — Hyménoptères.  
Icon. — Iconographie, iconographique.  
indiv. — individu.  
Ins. — Insecte.  
Lamell. ou Lam. — Lamellicornes.  
Lamell. mélit. — Lamellicornes mélitophiles.  
Lépid. — Lépidoptère.  
liv. — livraison.  
loc. cit. — loco citato.  
Long. — Longicornes.  
Madag. — Madagascar.  
mém. — mémoire.  
mér. — méridional.  
métam. — métamorphose.  
Microl. — Microlépidoptères.



**Miscell. entom.** — **Miscellanea entomologica.**

**Monog.** — **Monographie.**

**Névropt.** — **Névroptères.**

**nouv.** — **nouveau, nouvelle.**

**obs.** — **observation.**

**occ.** — **occidental.**

**or.** — **oriental.**

**Orthopt.** — **Orthoptères.**

**path.** — **pathologique.**

**pl.** — **planche.**

**plus.** — **plusieurs.**

**public.** — **publication.**

**Pyr.** — **Pyrénées.**

**qqes ou qques.** — **quelques.**

**rap.** — **rapport.**

**rech.** — **recherches.**

**récl.** — **réclamation.**

**rectif.** — **rectification.**

**rem.** — **remarque.**

**rép.** — **réponse.**

**s.-g.** — **sous-genre.**

**spécif.** — **spécifique.**

**suppl.** — **supplément.**

**syn.** — **synonyme, synonymie, synonymique.**

**trib. ou tr.** — **tribu.**

**trim.** — **trimestre.**

**var. ou v.** — **variété.**



## ERRATA.

- Page 7. 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> lignes, effacez : *id.*, *Coquerel*, *note pour servir à son histoire et description de sa larve*, 1850, 529, comme faisant double emploi.
- 8. Avant-dernière ligne, après : env. de Paris, ajoutez : 1851, xvii.
  - 9. 6<sup>e</sup> ligne, 1<sup>er</sup> millésime, lisez : 1859, au lieu de : 1839.
  - 11. 7<sup>e</sup> ligne, après AUD.-SERVILLE, ajoutez : Longicornes.  
4<sup>e</sup> ligne du § *Altica*, 1<sup>er</sup> n<sup>o</sup> de page, lisez : 796, au lieu de 787.  
8<sup>e</sup> ligne du même §, après l'article de M. Laboulbène sur les Colzas, ajoutez : 1857, 796.
  - 12. 18<sup>e</sup> ligne, au lieu d'entomologico, lisez : entomologica.
  - 16. Dernière ligne du § *Anisotoma*, lisez : 1857, au lieu de : 1859.
  - 17. 5<sup>e</sup> ligne, lisez : 1859, au lieu de : 1819.  
§ *Anommatus*, au lieu de : GÉNÉE, des env. de Montpellier, lisez : AUDOUIN, esp. privée d'yeux.  
7<sup>e</sup> ligne du § *Anophthalmus*, après GHILIANI, ajoutez : *Miscellanea entomologica*.
  - 18. 18<sup>e</sup> ligne du § *Anthaxia*, après : Dessins, ajoutez : 1857, LXXXIX.
  - 19. 25<sup>e</sup> ligne du § *Anthicus*, lisez : pris, au lieu de : prise.
  - 24. 1<sup>re</sup> ligne du § *Aplasta*, lisez : *dichroa*, et non : *dichrora*.
  - 26. 1<sup>re</sup> ligne du § *Arescus*, lisez pour le millésime : 1849, et non : 1851.
  - 29. 6<sup>e</sup> ligne du § *Attagenus*, lisez : *maritimus*, et non : *mar timus*.
  - 31. 2<sup>e</sup> ligne du § *Barynotus*, lisez pour le millésime : 1859, au lieu de : 559.
  - 32. 5<sup>e</sup> ligne du § *Bembidium*, lisez pour le millésime : 1851, et non : 1856.  
6<sup>e</sup> ligne du même §, lisez : 1851, et non : 1856.
-



# TABLES DES ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE.

---

1832 — 1860

---

## COLÉOPTÈRES

### A.

**Abacetus parallelus**, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur J.-R. Roth, 1852, 96.

**Abax caledonicus**, MONTROUZIER, Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 239. — *excavata*, GHILIANI, Mém. sur la station de qqes Col. en Piémont, 1847, 135. — *grandicollis*, FAIRMAIRE, envoyé des Pyrénées orientales par M. Bigot, 1856, LXXXI. — *oblongus*, 1847, 89. — *ovalis*, 1847, 141.

**Abiga Cerisyi**, 1859, CXC. — *humilis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. de qqes esp. d'Algérie, 1859, CLXXXIX.

**Abreus**, DE MARSEUL, Essai monographique sur la fam. des Histérides, 1856, 577. — *atomarius*, AUBÉ, Note sur qqes Coléopt. nouv., 1842, 231. — *cæsoïdes*, *cæsus*, CHEVROLAT, trouvés à Fontainebleau, 1833, 470. — *consobrinus*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 323. — *curtulus*, DE MARSEUL, 1856, 591. — *cyclonotus*, 1856, 584. — *exilis*, 1856, 594. — *globosus*, 1856, 588. — *globulus*, 1856, 587. — *id.*, PEYRON, Col. des environs de Tarsous, 1858, 412. — *granulum*, DE MARSEUL, 1856, 589. — *monilis*, 1856, 593. — *paria*, 1856, 585. — *parvulus*, AUBÉ, 1842, 232. — *id.*, DE MARSEUL, 1856, 590. — *punctum*, AUBÉ, 1842, 232 et 1850, 324. — *rhombophorus*, Descr. de deux Col. nouv., 1843, 75. — *id.*, ROUZET,

Note sur deux esp. de Col. de la faune parisienne, 1848. XIII. — *rugicollis*, DE MARSEUL, 1856, 583. — *setulosus*, 1856, 592. — *sphæricus*, 1856, 586.

**Abrobapta serrata**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 251.

**Acalles Bellieri**, *denticollis*, var. *minute squamosus*, REICHE, Descr. des esp. nouv. recueillies en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 733. — *Diocletianus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 733. — *hypocrita*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 113. — *Navieresæ*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *pictus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 904. — *punctaticollis*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 62. — *unicolor*, MONTROUZIER, 1860, 905.

**Acalyptus rufipennis**, KIESENWETTER, Énumération des Coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne, 1851, 643.

**Acanthocinus ædilis**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473.

**Acanthoderes**, AUDINET-SERVILLE, Nouv. classificat. des Longicornes, 1835, 29. — *araneiformis*, 1835, 30. — *Daviesii*, 1835, 29. — *griseus*, 1835, 30. — *Kreperi*, KRAATZ, communic. de cette esp. de Grèce, 1860, LXII. — *septem-maculatus*, BUQUET, Mém. sur deux genres nouv. de la fam. des Longicornes, 1859, 635. — *varius*, AUD.-SERVILLE, 1835, 30.

**Acanthogenius**, REICHE, Recherches sur les Helluonides, 1842, 334. — *biguttatus*, *bisignatus*, *cruciatus*, *distactus*, *dorsalis*, *grandis*, *impictus*, *labrosus*, *scapularis*, REICHE, 1842, 335. — *scapularis*, 1842, 343.

**Acanthophorus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 152. — *maculatus*, *serraticornis*, 1832, 153. — *serraticornis*, LUCAS, Note sur la larve et la nymphe, 1854, XLVII.

**Acanthopus caraboides**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 105. — *id.*, AZAMBRE, trouvé à Civita-Vecchia, 1856, XIII.

**Acanthopygus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 869. — *albopunctatus*, 1860, 872. — *cinctus*, 1860, 870. — *griseus*, 1860, 870. — *metallicus*, 1860, 869. — *rubricollis*, 1860, 871.

**Acanthoscellis**, SOLIER, Observations sur le genre *Ditomus*, 1834, 669.

**Acanthosternus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 289. — *Halorageos*, 1860, 290.

**Acerus davus**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 9.

**Achenium depressum**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 429. —

*depressum*, *jejunum*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 422. — *striatum*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 630. — *tenellum*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Ques observations sur les Col. des env. de Montpellier, 1852, 723.

**Acheta** *monstrosa*, AUD.-SERVILLE, Observations sur une lettre de M. Westermann, 1833, 491.

**Achryson** *circumflexum*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 572. — *lineolatum*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 506.

**Acinopus** *cylindraceus*, FAIRMAIRE, Note sur qqes Ins. de Barbarie, 1859, LI. — *grassator*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 760. — *lævipennis*, FAIRMAIRE, 1859, LI. — *megacephalus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 759. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *id.*, major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV. — *megacephalus*, *tenebrioides*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1838, 379.

**Aemæodera**, SOLIER, Essai sur les Buprestides, 1833, 274. — *id.*, SPINOLA, Essai sur les espèces de ce genre, 1838, 303. — *id.*, REICHE, Remarque sur la soudure des élytres, 1856, LXXI. — *acuminipennis*, SPINOLA, 1838, 389. — *adspersula*, 1838, 356. — *alternans*, 1838, 377. — *Boryi*, 1838, 354. — *Cadabæ*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur J.-R. Roth, 1852, 96. — *Chevrolati*, SPINOLA, Essai sur les esp. de ce genre, 1838, 380. — *id. Chiliensis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 739. — *congener*, SPINOLA, 1838, 350. — *cruenta*, 1838, 362. — *cuprifera*, 1838, 352. — *cuprina*, 1838, 367. — *cylindrica*, 1838, 355. — *dermestoides*, SOLIER, 1833, 275. — *discoidea*, SPINOLA, 1838, 392. — *dorsalis*, 1838, 392. — *elevata*, 1838, 342. — *id.*, SOLIER, Essai sur les Buprestides, 1833, 275. — *farinosa*, REICHE et DE SAULCY, Esp. nouv. ou peu connues, recueillies par M. de Saulcy, dans son voyage en Orient 1856, 410. — *fasciata*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur J.-R. Roth, 1852, 96. — *Fcisthameli*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 139. — *flavomarginata*, SPINOLA, 1838, 360. — *Foudrasii*, 1838, 346. — *id.*, SOLIER, 1833, 276. — *gibbosa*, SPINOLA, 1838, 344. — *id.*, SOLIER, 1833, 275. — *lateralis*, SPINOLA, 1838, 361. — *Lepricuri*, 1838, 341. — *mutabilis*, 1838, 372. — *nigrita*, SOLIER, 1833, 275. — *ornata*, SPINOLA, 1838, 365. — *ottomana*, 1838, 377. — *pedemontana*, GHILIANI, 1847, 103. — *pictipennis*, *Pilosellæ*, SPINOLA, 1838, 379, 391. — *id.*, SOLIER, 1833, 275. — *id.*, GHILIANI, 1847, 103. — *polita*, SPINOLA, 1838, 347. — *id.* SOLIER, 1833, 275. — *postverta*, BUQUET, Descr. de plus. Col. nouv., 1840, 394. — *id.*, Rectification,

1841, XXII. — *Prunerii*, SPINOLA, 1838, 375. — *puberula*, SOLIER, 1833, 276. — *repercussa*, SPINOLA, 1838, 345. — *rubronotata*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 739. — *saxicola*, SPINOLA, 1838, 371. — *6-pustulata*, SOLIER, 1833, 275. — *stellaris*, SPINOLA, 1838, 364. — *stictica*, 1838, 348. — *stictipennis*, 1838, 351. — *tæniata*, SPINOLA, 1838, 358. — *id.*, SOLIER, 1833, 275. — *tubulus*, SPINOLA, 1838, 383. — *Vaillant*, 1838, 370. — *varians*, 1838, 386. — *viridissima*, 1838, 369. — *volvulus*, SOLIER, 1833, 275. — *xanthosticta*, SPINOLA, 1838, 363. — *xanthotænia*, 1838, 382.

**Aconepterus** *cristatipennis*, *lævipennis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 515, 516.

**Aeritus**, DE MARSEUL, Histérides, 1856, 595. — *acaroides*, 1856, 618. — *aciculatus*, 1856, 603. — *acupictus*, 1856, 618. — *analisis*, 1856, 628. — *atomarius*, 1856, 611. — *atomus*, 1856, 628. — *basalis*, 1856, 626. — *brevisternus*, 1856, 609. — *conformis*, 1856, 627. — *consobrinus*, 1856, 625. — *cribripennis*, 1856, 605. — *discus*, 1856, 627. — *exiguus*, 1856, 603. — *fmctarius*, 1856, 615. — *fulvus*, 1856, 607. — *Gulliver*, 1856, 623. — *læviusculus*, 1856, 622. — *lateralis*, 1856, 621. — *maritimus*, 1836, 626. — *minutus*, 1856, 614. — *Natchez*, 1856, 604. — *nigricornis*, 1856, 612. — *obliquus*, 1856, 626. — *politus*, 1856, 610. — *punctum*, 1856, 607. — *rugulosus*, 1856, 617. — *semminulum*, 1856, 624. — *simplex*, 1856, 620. — *simpliculus*, 1856, 616. — *strigosus*, 1856, 619. — *substriatus*, 1836, 602. — *tenuis*, 1836, 606.

**Acroclaus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 16. — *longimanus*, 1835, 17. — *id.*, MARCO A ROJAS, Observ. sur qqes Col. de Venezuela, 1857, 334.

**Acrognathus** *mandibularis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 433.

**Acupalpus** *ephippium*, *flavicollis*, *meridianus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 381.

**Acylophorus** *ciliatus*, REICHE, Col. d'Abyssinie du docteur Roth, 1852, 96. — *glabricornis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 418. — *id.* PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 428. — *picipennis*, REICHE, 1852, 96. — *Wagenschieberi*, KIESENWETTER, 1851, 419.

**Adalbus**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 490. — *crassicornis*, 1859, 490. — *dimidiatipennis*, 1859, 492. — *flavipennis*, 1859, 491.

**Adellum austro-caledonicum**, *exul*, *triste*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 301, 302.

**Adelocera Chabanii**, *fusca*, *marmorata*, LATREILLE, Distribution méthodique et naturelle des diverses espèces de Serricornes, 1834, 144.

**Adelops asperulus**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 731. — *Bonvouloirii*, pris par M. Delarouzée dans les grottes de Villefranche près de Prades, 1860, XLVIII. — *Delarouzei*, *galloprovincialis*, Diagnoses de nouv. esp. de Col., 1860, 631. — *grandis*, Miscellanea entomologica, 1856, 525. — *lucidulus*, DELAROUZÉE, Descript. de deux nouv. esp. de Col. des cavernes, 1860, XXVII. — *meridionalis*, JACQ. DU VAL, trouvé en France par M. Ph. Lareynie, 1854, XIX. — *id.*, Phrases diagnostiques, 1854, XXXVI. — *pyrenæus*, FAIRMAIRE, 1859, 31. — *id.*, pris en grand nombre dans les grottes de l'Ariège, 1859, CXXXIX. — *speluncarum*, DELAROUZÉE, Descr. diagnostiques, 1857, XCIII. — *id.*, FAIRMAIRE, pris par M. Linder dans la caverne de Bétharrham, 1858, CLIX, et 1859, CXL.

**Adelostoma**, SOLIER, Collaptérides, 1837, 164. — *carinatum*, *cordatum*, 1837, 168, 169. — *parvum*, *rugosum*, 1837, 170. — *sulcatum*, 1837, 167.

**ADELOSTOMIDES**, SOLIER, Collaptérides, 1857, 151.

**Adelphus Guerinii**, COQUEREL, Obs. sur div. Ins. recueillis à Madagascar, 1852, 381.

**Adesmia**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 522. — *id.*, sous-genre *Oteroscelis*, 1835, 546. — *id.*, de Benguela, DOUÉ, communic. d'une espèce voisine de *candidipennis*, 1857, LXXXIX. — *affinis*, SOLIER, 1835, 535. — *antiqua*, 1835, 531. — *arca*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 222. — *Athalia*, REICHE, trouvée en Palestine, 1856, XLVI. — *Audouini*, SOLIER, 1835, 550. — *Biskrensis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvée en l'oasis d'Ouargla (Algérie), 1859, CXCI. — *carinata*, SOLIER, 1835, 547. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 226. — *clathrata*, SOLIER, 1835, 541. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 226. — *Coucyi*, LUCAS, reçue de l'Algérie, sa descr., 1850, XI. — *dubia*, SOLIER, 1835, 527. — *elevata*, 1835, 549. — *Faldermanni*, FISCHER DE WALDHEIM, Extrait du Bull. de la Soc. imp. de Moscou, 1836, VI. — *Gorgyi*, SOLIER, 1835, 544. — *Karelini*, FISCHER DE WALDHEIM, 1836, V. — *Klugii*, SOLIER, 1835, 539. — *Langii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Détails sur une nouvelle espèce de Col., 1843, XLVII. — *Latreillei*, SOLIER, 1835, 540. — *Lefebrii*, FISCHER DE WALDHEIM, 1836, VI. — *macropus*, SOLIER, 1835, 542. — *Maillei*, 1835, 530. — *metallica*,



1835, 551. — *microcephala*, 1835, 533. — *Olivieri*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 224. — *ovata*, SOLIER, 1835, 545. — *Panderi*, FISCHER DE WALDHEIM, 1839, v. — *Pariseti*, SOLIER, 1835, 552. — *porcata*, 1835, 534. — *pulcherrima*, 1835, 546. — *id.*, FISCHER DE WALDHEIM, 1836, vi. — *Ramburi*, SOLIER, 1835, 529. — *reticulata*, 1835, 528. — *Servillei*, 1835, 538. — *tenebrosa*, 1835, 536.

**Adimonia** *aptera*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 98. — *brevipennis*, 1847, 112. — *gibbosa*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 40. — *interrupta*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *marginata*, Miscellanea entomologica, 1859, 64. — *monticola*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 655. — *orientalis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 40. — *Sicana*, REICHE, Descr. des espèces nouv. recueillies en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 737. — *Tanaceti*, KIESENWETTER, 1851, 655.

**Adoretus** *Gandolphi*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Descr. de qqes espèces de l'Algérie, 1859, CLXXXVI.

**Adrastus** *laccetosus*, *limbatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 587. — *id.*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 158.

**Æacus**, DE LA FERTÉ-SENECTÈRE, Division de la Tribu des Patellimanes, 1851, 254. — *carbonarius*, *stygius*, 1851, 255.

**Ædilis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 32. — *grisea*, PERRIS, Hist. des Ins. du Pin maritime, 1856, 463. — *grisco-fasciata*, *montana*, AUD.-SERVILLE, 1835, 33. — *id.*, PERRIS, 1856, 459. — *signata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 33.

**Ægialia** *arcnaria*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1862, 684.

**Ægops** *curvicornis*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 18.

**Ægonoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes 1832, 162. — *affine*, 1832, 163. — *ferrugineum*, REICHE, nom restitué à l'*Æg. scabricorne*, 1854, 81. — *scabricorne* F., AUD.-SERVILLE, 1832, 163. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472. — *id.*, Larves trouvées à Fontainebleau, dans le bois de Hêtre, 1844, LXXIV. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *id.*, FAIRMAIRE, Larve trouvée récemment à Saint-Germain-en-Laye, 1850, xxxi.

**Ægus** *acuminatus*, REICHE, esp. bien distincte de *cicatricosus*, 1853, 82. — *cicatricosus*, c'est le *reticulatus* Westw.. 1853, 82. — *obtusatus*, bien différent du *cervicornis*, 1853, 81.

**Ambidius**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 157. — *gigas* 1834, 158.

**Enigma Iris**, REICHE, Heliuonides, 1842, 332.

**Aepus**, LABOULBÈNE, Études sur ce genre et descr. d'une nouv. espèce française, 1849, 23. — *id.*, COQUEREL, Note pour servir à son hist., et descr. de sa larve, 1850, 529. — *fulvescens*, LABOULBÈNE, 1849, 34. — *id.*, JAVET, Présentation d'une larve rapportée à cette esp., 1851, LXIII. — *Robinii*, LABOULBÈNE, 1849, 35. — *id.*, COQUEREL, 1850, 529.

**~~Ethiessa~~ Ethiessa** *Ethiopica*, SCHAUM, Obs. critiques sur la fam. des Lamellicornes Méliophiles, 1844, 377. — *bagdadensis*, 1844, 378. — *barbara*, 1844, 376. — *elongata*, 1844, 377. — *feralis*, 1849, 271. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 450. — *floralis*, SCHAUM, 1844, 376. — *id.*, 1849, 268. — *inhumata*, *leucospila*, *mesopotamica*, 1844, 377. — *squamosa*, 1849, 269. — *id.*, 1844, 377.

**Agabus agilis**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 785. — *binotatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *bipunctatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 401. — *bipustulatus*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *brunneus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 785. — *chalconotus*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *id.*, LEPRIEUR, Col. des env. de Bède, 1853, LIX. — *conspersus*, PEYRON, 1858, 401. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 785. — *dilatatus*, Gory, PEYRON, 1858, 402. — *guttatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 390. — *maculatus*, PEYRON, 1858, 401. — *marginicollis*, FAIRMAIRE, Diagnoses de nouv. esp. de Col., 1860, 631. — *melas*, KIESENWETTER, 1851, 390. — *id.*, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies dans un voyage à Prades, 1850, XXIV. — *id.*, PEYRON, 1858, 402. — *nigricollis*, 1858, 401. — *pyrenæus*, GAUBIL, espèce nouvelle, 1852, VII. — *id.*, REICHE et LABOULBÈNE, n'est qu'une var. étroite de l'*Ag. congener*, 1852, XXXVI. — *rufulus*, FAIRMAIRE, Descr. d'espèces nouv., 1859, 272. — *sexualis*, REICHE, Descr. d'Ins. provenant de l'expédition aux mers Arctiques, 1857, IX. — *subnebulosus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *id.*, LEPRIEUR, 1853, LIX.

**Agacephala**, *Duponti*, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 404. — *Goryi*, 1832, 405. — *Mannerheimii*, 1832, 404.

**Agapanthia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 35. — *id.*, RAMBUR, Larve vivante, après deux mois de séjour dans des boîtes, 1838, VII. — *Asphodeli*, AUD.-SERVILLE, 1835, 36. — *bicornis*, 1835, 37. —

*Cardui*, 1835, 36. — *cornuta*, 1835, 37. — *irrorata*, 1835, 36. — *Lais*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 21. — *marginella*, GÜRRIN-MÉNEVILLE, Détails sur ses mœurs, 1845, LXVI. — *8-maculata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 37. — *Osmanlis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 19. — *suturalis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 36.

**Agaricophagus**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, pris dans le bois de Meudon, 1855, LXXVI.

**Agathidium** *globus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *lævigatum*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 725. — *id.*, JACQ. DU VAL, Rectifications, c'est le *Phantacomerus æneiceps*, 1854, XXXVIII. — *seminulum*, PERRIS, Quelques mots sur les métam. de Col. Mycétophages, 1851, 44.

**Agelastica** *dilutiventris*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 42.

**Agenius** *clavus*, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles, 1844, 422.

**Agestrata** *Chinensis*, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles, 1849, 259. — *nigrita*, 1844, 366.

**Agnus**, REICHE, grand abus de faire d'un nom spécifique un nom générique, 1853, 84.

**Agonum** *laticolle*, *longipenne*, *spinipenne*, *spinosum*, DE CHAUDOIR, Monog. du G. Colpodes, 1859, 360. — *thoracicum*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur J.-R. Roth, 1852, 96.

**Agra**, THOMSON, Commun. de 65 esp. de ce genre, 1858, xx. — *brunnipennis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 185. — *Buqueti*, 1833, 184. — *Chevrolati*, 1833, 186. — *Cynthia*, BUQUET, Descr. de qqes Col. nouv. de la fam. des Carabiques, 1835, 608. — *Fristhamelii*, 1835, 607. — *Leprieuri*, 1835, 609. — *Lycisca*, 1835, 610. — *Mexicana*, 1835, 606.

**Agrius**, SOLIER, Buprestides, 1833, 300. — *æneicollis*, 1833, 302. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90. — *amethystinus*, SOLIER, 1833, 304. — *angustula*, *armata*, *auricollis*, *biguttata*, 1833, 305. — *biguttatus*, GOUREAU, Note pour servir à l'hist. de cette espèce, 1843, 23. — *id.*, Réponse à M. L. Dufour, 1843, 257. — *cyanea*, SOLIER, 1833, 305. — *cyanescens*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *cylindrica*, *clata*, 1833, 302. — *exilis*, REICHE, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 96. — *falcipes*, 1852, 96. — *Guerini*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *id.*, SICHEL, trouvé aux env. de Paris. — *Hyperici*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 726. — *laticornis*, *margi-*

*nicollis*, SOLIER, 1833, 305. — *metallica*, 1833, 302. — *modicus*, 1833, 304. — *4-fossulatus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 740. — *rubi*, SOLIER, 1833, 302. — *ruficollis*, 1833, 305. — *Salzmanni*, 1833, 303. — *sexguttata, sinuata*, 1833, 305. — *subauratus*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1839, CXXXI. — *sulcicollis*, SOLIER, 1833, 305. — *sulcipennis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 741. — *thoracicus*, 1858, 740. — *undata*, SOLIER, 1833, 302. — *undatus*, FAIRMAIRE, trouvé à Saint-Germain-en-Laye en 1846, LV, 1851, LXXXVII. — *id.*, DOUË, pris dans la forêt de Compiègne, 1853, XLVII. — *viridis*, SOLIER, 1833, 305. — *id.*, AUBÉ, Note sur ses premiers états, 1837, 189.

*Agriotes obscurus, segetis*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 160. — *rufipalpis*, DELAROUZÉE, Col. des env. d'Hyères, 1858, cv.

*Agrius*, CHEVROLAT, Nouv. genre de Carabiques, 1854, 665. — *fallaciosus*, 1854, 666. — *id.*, SCHAU, appartient aux Cicindélides, 1857, LXXIX. — *id.*, THOMSON, Réclamation d'antériorité sur la place qu'il doit occuper, 1857, CIII.

*Agrypnus atomarius*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 143. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 103. — *id.*, LUCAS, De la larve de cette esp., 1852, 268. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 728. — *id.*, PERRIS, Hist. des Ins. du Pin maritime, 1854, 140. — *farinosus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 255. — *fasciatus*, LATREILLE, 1834, 143. — *id.*, GHILIANI, 1847, 137. — *fuscipes*, LATREILLE, 1834, 143. — *judaicus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 418. — *Montravelii* et sa larve, MONTROUZIER, 1860, 253, 254. — *murinus, 4-maculatus, senegalensis, varius*, LATREILLE, 1834, 143. — *varius*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *id.*, LEPRIEUR, Détails sur les Col. des env. de Dieuse, 1845, xcv. — *id.*, BLISSON, Descr. de la larve, 1846, 67. — *id.*, GHILIANI, 1847, 137.

*Agyrtes castaneus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 100. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 413.

*Akis*, SOLIER, Collaptérides, 1836, 651. — *acuminata*, 1836, 657. — *id.*, FOUREAU DE BEAUREGARD, prise à Grenade le 15 novembre 1851, encore vivante le 14 janvier 1852, 1852, iv. — *algeriana*, SOLIER, 1836, 663. — *barbara*, 1836, 673. — *Bayardi*, 1836, 670. — *carinata*, 1836, 674. — *discoidea*, 1836, 661. — *elevata*, 1836, 671. — *elongata*, 1836, 659. — *Genei*, 1836, 668. — *Goryi*, 1836, 676. —

*id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé en l'oasis d'Ouargla (Algérie), 1859, CXCI. — *granulifera*, SOLIER, 1836, 672. — *hispanica*, 1836, 667. — *italica*, 1836, 674. — *Latreillei*, 1836, 675. — *lusitanica*, 1836, 670. — *nitida*, 1836, 666. — *Olivieri*, 1836, 665. — *planicollis*, 1836, 664. — *punctata*, 1836, 655. — *id.*, MULSANT, Obser. sur les larves, 1844, LVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Indication d'un mém. inédit de M. Mulsant sur les mœurs de cette esp., 1846, CII. — *reflexa*, SOLIER, 1836, 658. — *Salzei*, 1836, 662. — *Sansi*, 1836, 660. — *spinosa*, 1836, 668. — *subterranea*, 1836, 656. — *tingitana*, LUCAS, Deux esp. nouv. de Mélanosomes du nord de l'Afrique, 1859, CXIV.

**AKISITES**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 635.

**Alaus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 141. — *myops*, 1834, 142. — *nobilis*, SALLÉ, Descr. de dix esp. nouv. de Col. de la Répub. dominicaine, 1855, 263. — *oculatus*, LATREILLE, 1834, 142.

**Aleides**? *trichocerus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 914.

**Alecton** *discoidalis*, DE LAPORTE, Essai d'une révis. du genre *Lampyris*, 1833, 135.

**Aleochara** *bipunctata*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 411. — *bipunctata*, *bisignata*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 420. — *cuniculorum*, KRAATZ, Description de qqes nouv. esp. de Col., 1858, CLXXXVIII. — *decorata*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 311. — *fuscipes*, PEYRON, 1858, 420. — *Grenieri*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 38. — *hæmatoptera*, KRAATZ, 1858, CXC. — *inconspicua*, AUBÉ, 1850, 312. — *inquinula*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *lævigata*, PEYRON, 1858, 420. — *leucopyga*, KRAATZ, 1858, CLXXXIX. — *lugubris*, AUBÉ, 1850, 313. — *major*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 737. — *morosa*, PEYRON, 1858, 420. — *nidicola*, FAIRMAIRE, Lettre à M. le docteur Aubé, 1852, 681, 688. — *id.*, BOIELDIEU, trouvée dans des nids d'hirondelles de rivage, 1855, LXVII. — *nigripes*, JACQ. DU VAL, Remarques et notes diverses, 1857, 98. — *nitida*, KIESENWETTER, 1851, 411. — *id.*, PEYRON, 1858, 420. — *obs curella*, KIESENWETTER, 1851, 412. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 681. — *pulla*, BOIELDIEU, C'est à cette espèce qu'il faut réunir son *Al. nidicola*, 1855, LXVII. — *rufipennis*, KIESENWETTER, 1851, 401. — *rufipes*, PEYRON, 1858, 420. — *rufitarsis*, KIESENWETTER, 1851, 412. — *scutellaris*, PEYRON, 1858, 420.

**Aleptocerus**, DE LA FERTÉ-SENECTÈRE, Patellimanes, 1851, 236.

**Alexia pilifera**, *pilosa*, AUBÉ et REICHE, trouvées à Compiègne, 1852, XXXII.

**Allecula morio**, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 470. — *id.*, SOLIER, Prodrôme de la fam. des *Xystropides*, 1835, 237. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 106.

**Alloccerus**, AUD.-SERVILLE, 1832, 180. — *dilaticornis*, GORY, Trois esp. de Col. nouv., 1832, 384. — *Spencii*, AUD.-SERVILLE, 1832, 181.

**Allorhina Lansbergei**, SALLÉ, Descr. d'une Gymnétide des env. de Santa-fé-de-Bogota, 1857, 617. — *id.*, Commun. d'une note et d'une planche de M. Wapler, 1857, xxxv. — *scabriuscula*, MARCO A ROJAS, Études entomologiques, 1857, 336.

**Alophus corticalis**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 885. — *nictitans*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 674.

**Alphitobius mauritanicus**, LUCAS, Présentation d'une planche représentant ses métamorphoses, 1855, xviii. — *id.*, Note sur ses métamorphoses, 1857, 71.

**Altica**, AUBÉ, Note sur qqes esp. confondues sous le nom d'*oleracea*, 1843, 5. — *Anchusæ*, LUCAS, Note sur les mœurs de cette esp., 1858, LXXX. — *brassicæ*, *chrysocephala*, LABOULBÈNE, observées sur les Colzas, 1857, 787. — *Erucæ*, AUBÉ, 1843, 9. — *Hippophæes*, 1843, 8. — *Hyosciami*, Réflexions sur un mém. de M. Focillon, 1852, LXXXIV. — *id.*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 473. — *Lythri*, AUBÉ, 1843, 8. — *Napi*, BRULLÉ, Obs. extraite de l'Horticulteur belge, 1835, viii. — *id.*, LABOULBÈNE, observée sur les Colzas. — *nemorum*, AUBÉ, Réflexions sur un mémoire de M. Focillon, 1852, LXXXIV. — *id.*, LABOULBÈNE, 1857, 796. — *nigripes*, AUBÉ, 1852, LXXXIV. — *nigroænea*, LABOULBÈNE, 1857, 796. — *id.*, AUBÉ, prétendue nouv. esp. très-commune, 1852, LXXXIV. — *oleracea*, DAUBE, dégâts causés dans les Vignes des environs de Montpellier, 1836, XLVI. — *id.*, Lettre sur le même sujet, 1837, XLIX. — *id.*, AUBÉ, 1843, 8. — *id.*, abbé BOURDIN, Lettre à M. J. Cordier sur les ravages causés aux Colzas, 1845, xv. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Détails sur les mœurs de cette espèce, 1845, LXVII. — *id.*, MACQUART, Qques mots sur les dégâts qu'elle cause à l'agriculture, 1847, XLIV.

**ALTICIDES**, AUBÉ, Obs. sur les esp. admises par MM. Foudras et Allard, 1860, c. — *id.*, CHEVROLAT, Remarques sur qqes espèces de ce groupe, 1860, cii.

- Altise**, MACQUART, Larves nuisibles à l'agriculture dans le nord de la France, 1847, XLIV.
- Altises d'Europe**, E. ALLARD, Tableau de concordance entre les travaux de MM. Allard et Foudras, 1860, 141.
- ALTITARSES**, E. ALLARD, Essai monogr. sur les Altises d'Europe, 1860, 796.
- Alurnus cyaneus**, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 312. — *Lansbergei*, SALLÉ, Col. nouv. de l'Amérique, 1849, 432. — *undatus*, DE BRÈME, 1844, 311.
- Amara**, PAUL LAMBERT, Entozoaire extrait du corps d'une *Amara*, 1851, LXXXIII. — *acuminata*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 378. — *Barnevillei*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 521. — *communis*, AUBÉ et REICHE, trouvée à Compiègne, 1852, xxxi. — *id.*, PEYRON, 1858, 378. — *consularis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *Cottyi*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 777. — *familiaris*, FAIRMAIRE, 1852, 679. — *servida*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 776. — *ingenua*, PEYRON, 1858, 378. — *interstitialis*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 523. — *monticola*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 126. — *montivaga*, PEYRON, 1858, 378. — *obsoleta*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 776. — *Reichei*, 1858, 775. — *ruficornis*, *rufipes*, PEYRON, 1853, 378. — *similata*, DAVAINÉ, Note sur un *Mermis* contenu dans son corps, 1851, cxiii. — *solata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 778. — *spretta*, *strenua*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *striato-punctata*, PEYRON, 1858, 378. — *tricuspidata*, FAIRMAIRE, 1852, 679. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 628. — *trivialis*, CHEVROLAT, Ses habitudes herbivores; discussion, 1837, LIV. — *id.*, PEYRON, 1858, 378. — *valida*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 21.
- Amaurodes Passerinii**, SCHAU, Lamellicornes méliophiles, 1849, 243.
- Amaurops**, FAIRMAIRE, Ques Col. nouv. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 74. — *Aubei*, 1852, 76. — *id.*, Rectific. et descr. d'esp. nouv. de la faune méditerranéenne, 1855, 309. — *gallicus*, DELAROUZÉE, Descr. d'une nouv. esp., 1859, 68.
- Amaurorhinus Bonnairii**, FAIRMAIRE, Diagnoses de nouv. esp. de Col., 1860, 629.
- Amblychella**, REICHE, Note sur ce genre et description d'une nouv. esp., 1839, 557. — *cylindriiformis*, THOMSON, 4 indiv. dans la coll. de M. le docteur Le Conte, 1858, CCXVII. — *Piccolomini*, REICHE, 1839, 560.

- Amblygenius**, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, *Patellimanes*, 1851, 263. — *chlaznioides*, 1851, 263.
- Amblygnathus niger**, GORY, *Centurie de Carabiques nouv.*, 1833, 236.
- Amblystomus mauritanicus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, *Col. de Barbarie*, 1858, 764. — *metallescens*, PEYRON, *Col. des env. de Tarsous*, 1858, 380.
- Amerhinus hispidus**, MONTROUZIER, *Faune de la Nouv.-Calédonie*, 1860, 893. — *pumilus*, 1860, 885.
- Ametrocephala monstrosa**, FAIRMAIRE et GERMAIN, *Col. du Chili*, 1859, 503.
- Ammecius Levaillanti**, REICHE, c'est l'*Amm. rugifrons* Aubé, 1852, XLIX. — *rugifrons*, AUBÉ, *Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie*, 1850, 335.
- Ammidium ciliatum**, REICHE, *Note sur ce genre et sur l'esp. typique*, 1855, CXII.
- Ammophorus**, SOLIER, *Essai sur les Collaptérides*, 1838, 39. — *costatus*, 1838, 43. — *peruvianus*, 1838, 41. — *rubripes*, 1838, 42. — *Spinolæ*, 1838, 44.
- Anomphus Cottyi**, LUCAS, *Présentation et descr. d'un Curculionite nouveau*, 1857, CXXIV.
- Ampedus**, GUÉRIN-MÈNEVILLE, *Communic. d'une magnifique espèce de France et crue inédite*, 1846, CV. — *crocatus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, *Col. des env. de Montpellier*, 1852, 728. — *id.* GHILIANI, *Col. du Piémont*, 1847, 103. — *ephippium*, *præustus*, 1847, 103. — *sanguineus*, GAUBIL, *pris dans les env. de Phalsbourg (Meurthe)*, 1847, XIV.
- Amphicoma Goudotii**, REICHE, *trouvée dans le midi de l'Espagne par M. Tarnier*, 1854, XXX. — *id.*, TRUQUI, *Il rappelle que dans sa monographie du genre il a déjà donné l'Espagne méridionale comme patrie de cette espèce*, 1855, XVII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, *Col. de Barbarie*, 1860, 445. — *Meles*, 1860, 445. — *romana*, DUPONCHEL, *Descr. d'une nouv. esp.* 1832, 254.
- Amphidesmus**, AUD.-SERVILLE, *Longicornes*, 1834, 65. — *quadridens*, 1834, 66.
- Amphion**, REICHE, *Note sur la fam. des Longicornes et descr. d'un genre nouv.*, 1839, 564. — *vittatum*, 1839, 566.
- Amphionycha spectabilis**, CHEVROLAT, *Note sur la synonymie de qqes Col.*, 1856, CV.



**Amphistoros impressus, varians**, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles, 1847, 283.

**Amydetes**, DE LAPORTE, Révision du genre *Lampyris*, 1833, 127. — *apicalis, fastigiata, plumicornis, Vigorsii*, 1833, 128.

**Anacamptorhina ignipes**, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles, 1849, 287.

**Anacanthus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 165. — *costatus*, 1832, 166.

**Anacolus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 199. — *id.*, BUQUET, Notice sur ce genre et descr. de trois nouv. esp., 1840, 379. — *bimaculatus*, 1840, 379. — *lividus*, 1840, 380. — *lugubris*, AUD.-SERVILLE, 1832, 200. — *id.*, BUQUET, 1840, 379. — *Menetriesii*, 1840, 381. — *nigricollis*, 1840, 380. — *præustus*, 1840, 380. — *pygmaeus*, 1840, 383. — *4-maculatus, 4-notatus, sanguineus*, 1840, 380. — *sanguineus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 200. — *scapularis*, BUQUET, 1840, 382.

**Anætia Muhlfeldii**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 120.

**Anaspis flora, frontalis**, BLISSON, écloses dans des galles habitées par des chenilles de *Sesia* et des larves de *Cynips*, 1849, xxxvi. — *maculata*, PERRIS, Notes pour servir à son histoire, 1847, 29. — *Pyrenæus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 54.

**Anatista**, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 305. — *Lafertei*, 1844, 306.

**Anatolica**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 379. — *abbreviata*, 1835, 392. — *angustata*, 1835, 384. — *Audouini*, 1835, 385. — *Besseri*, 1835, 390. — *eremita*, 1835, 389. — *gibbosa*, 1835, 382. — *impressa*, 1835, 391. — *lata*, 1835, 387. — *Maillei*, 1835, 386. — *subquadrata*, 1835, 383. — *tristis*, 1835, 388.

**Anatona alboguttata**, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles, 1844, 384. — *flavoguttata*, 1849, 267.

**Anchomenus Algiricus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 781. — *antennatus*, GAUTIER DES COTTES, Descr. de trois Col. nouv. d'Europe, 1859, ccx. — *id.*, TOURNIER, ne doit pas être séparé de l'*Anch. pallipes*, 1860, xlvi. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Notes en réponse aux obs. de M. Tournier, 1860, xlvii. — *approximatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 604. — *atratus*, FAIRMAIRE, Protestation contre la reconstruction de cet Ins. par M. Schaum, 1860, xlv. — *atratus, austriacus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 370. — *cayennensis*, BUQUET, Descr. de qqes Col. nouv. de la fam.

des Carabiques, 1835, 619. — *fulgidicollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 781. — *infuscatus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 600. — *lucidus*, PEYRON, 1858, 390. — *Memnonius*, LEPRIEUR, trouvé à Bourbonne, 1845, xcv. — *novæ-zelandiæ*, FAIRMAIRE, Descr. de trois nouv. esp. de Col. de l'Océanie, 1843, 12. — *numidicus*, *prasinus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 781. — *id.*, PEYRON, 1858, 370. — *ruficollis*, GAUTIER DES COTTES, Descr. de deux esp. de Col. nouv., 1857, cxxxv.

**Anechonus** *cribricollis*, COQUEREL, Descr. de deux Curculionites nouv. de la Martinique, 1849, 448.

**Ancistronycha** *abdominalis*, *consobrinus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 589. — *violaceus*, 1851, 590.

**Ancistresoma** *farinosum*, SALLÉ, Col. nouv. de l'Amérique, 1849, 300.

**Ancistrotus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 135. — *hamaticollis*, 1832, 137. — *Servillei*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 484. — *uncinatus*, BUQUET, Descr. d'un Longicorne nouv., 1852, xc. — *id.*, BUQUET, Descr. de cette nouv. esp. de Prionien, 1853, 41. — *id.*, Le nom d'*uncinatus*, employé par Klug, doit être remplacé par celui d'*aduncus*, 1853, xxiv.

**Ancylocera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 107. — *cardinalis*, 1834, 108.

**Ancylocheila** *flavo-maculata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 140. — *id.*, PERRIS, Hist. des Ins. du Pin maritime, 1854, 110. — *8-guttata*, GHILIANI, 1847, 140. — *id.*, PERRIS, 1854, 115.

**Ancylodonta** *tristis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1857, 510.

**Ancylosternus** *scutellaris*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 49.

**Anelastes** *Druryi*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 165. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Revue critique de la fam. des Eucnémides, 1843, 177.

**Anillus**, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1852, 220. — *cæcus*, découvert près de Bordeaux, diagnose, 1851, lxxii. — *id.*, LESPÈS, trouvé aux env. de Toulouse, 1854, lxv.

**Anisocerus** *scapifer*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 79.

**Anisodactylus** *binotatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 386. — *Dejeanii*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 759. — *id.*, REICHE, Notes entomologiques sur div. Col., 1859, 639. — *Heros*, DE BARAN,

trouvé à Nice, 1852, xxx. — *intermedius*, PEYRON, 1858, 386. — *pseudo-eneus*, GAUBIL, pris aux env. de Phalsbourg, 1847, xiv.

**Anisoplia floricola**, FAIRMAIRE, Monstruosité dans le chaperon, 1849, lx. — *theicola*, WAGA, Descr. d'un Ins. de Chine trouvé dans du thé du commerce, 1842, 273.

**Anisopus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 30. — *arachnoides*, 1835, 31.

**Anisorrhina natalensis**, SCHAUUM, Lamellicornes mélitophiles, 1844, 356.

**Anisosticta M.-nigrum**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 139.

**Anisotoma calcarata**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *distinguenda*, Miscellanea entomologica, 1856, 525. — *ferruginea*, Baie de la Somme, 1852, 682. — *humeralis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 131. — *lucens*, FAIRMAIRE, courte descr., 1855, lxxvi. — *obscura*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 792. — *ornata*, FAIRMAIRE, diagnose de cette esp. trouvée au bois de Boulogne, 1855, xxx. — *picea*, présent. de qqes indiv. de cette esp., 1855, xxx. — *silesiaca*, Miscellanea entomologica, 1859, 31. — *Triepki*, JACQ. DU VAL, Remarq. et notes diverses, 1859, 98.

**Anobium**, AMYOT, pains de Lapons perforés, 1851, cxv. — *Abietis*, ROUZET, Histoire de ses métam., 1849, 305. — *id.*, LABOULBÈNE, Détails anatom. sur sa larve, 1849, 311. — *id.*, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 339. — *id.*, PERRIS, Hist. des Ins. du Pin maritime, 1854, 628. — *longicorne*, 1854, 629. — *molle*, 1854, 622. — *pertinax*, 1854, 630. — *id.*, LUCAS, planche de Peuplier creusée de galeries profondes, 1854, xxxiv. — *id.*, Note sur cette esp., 1860, xxx. — *striatum*, ROUZET, Hist. de ses métam., 1849, 311. — *id.*, LABOULBÈNE, Détails anatomiques sur sa larve, 1849, 311. — *tessellatum*, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 339. — *id.*, Détails anatomiques, 1851, xlvii.

**Anochilia cingulata**, SCHAUUM, Lamellicornes mélitophiles, 1849, 283. — *republicana*, COQUEREL, Note sur une Schizorrhinide nouv., 1848, 277. — *id.*, Obs. sur div. Ins. de Madag., 1852, 379.

**Anodesis**, SOLIER, Essai d'une monographie des Collaptérides, 1834, 594. — *Cleryi*, 1834, 595. — *giganteus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 187.

**Anogeodes ustulata**, FAIRMAIRE, prise dans la forêt de Sénart, 1848, xlv.

**Anomala**, DOUÉ, Indiv. ayant deux teintes tranchées sur les élytres, 1853, IX. — *devota*, PERROUD, prise aux environs de Fréjus; Détails de mœurs, 1852, LXX. — *rugatipennis*, GRAELLS, Descrip. de qqes Col. nouv. de la Faune centrale de l'Espagne, 1854, 13. — *rugosula*, FAIRMAIRE, Descrip. d'esp. nouv., 1849, 276. — *tingitana*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 445.

**Anomalacera** *Parii*, SCHAUM, Lamellicornes mélitophiles, 1844, 351.

**Anomolopus** *nigricans*, REICHE, sous le nom d'*Ontharis oblongus*, dans la coll. Dejean, 1853, 426.

**Anommatus** *terricola*, GÉNÉ, des env. de Montpellier, 1836, XI.

**Anomocerus** *Coquereli*, *Lucasi*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 898, 899.

**Anophthalmus** *crypticola*, FAIRMAIRE, Chasse de M. Linder dans les grottes des Pyrénées, 1859, CXXXIX. — *id.*, LINDER, Descrip. de trois nouv. esp., 1859, 71. — *Coriæ*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 25. — *gallicus*, DELAROUZÉE, Descrip. diagnostique, 1857, XCIII. — *id.*, LINDER, pris dans la grotte de Bétharram, 1858, CLVIII. — *id.*, FAIRMAIRE, pris par M. Linder dans la caverne de Bétharram, 1859, CXL. — *Ghilianii*, 1859, 26. — *Minos*, LINDER, Descr. d'une nouv. esp. française, 1859, CCLVIII. — *orcinus*, FAIRMAIRE, Chasses de M. Linder dans les grottes des Pyrénées, 1859, CXXXIX. — *Pandellei*, LINDER, 1859, 72, CXL. — *id.*, FAIRMAIRE, pris par M. Linder dans les grottes de Bétharram, 1859, CXL. — *Raymondi*, AUBÉ, trouvé dans le midi de la France, et à Toulon dans une cave abandonnée, 1860, L, LI. — *Rhadamanthus*, LINDER, Descr. de deux nouv. Col. pyrénéens, 1860, 611.

**Anoplistes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 570. — *cphippium*, 1833, 571. — *oblongo-maculata*, REICHE, trouvée en Kabylie, 1860, XCVII. — *sellatus*, AUD.-SERVILLE, 1833, 571.

**Anoplochilus** *cicatricosus*, SCHAUM, Lamellicornes mélitophiles, 1844, 384. — *Germari*, *terrosus*, 1849, 268.

**Anoplocnemus** *bicolor*, REICHE, Réunion d'esp. hétérogènes en une seule, 1854, 73. — *id.*, Ses trois types, 1853, 74. — *castanopterus*, très-distincte de *Baladeva*, 1853, 74.

**Anoplognatha** *analis*, LUCAS, Cas pathologique curieux, 1854, 111.

**Anoplognatus** *analis*, DOUÉ, Élytres présentant des dissemblances remarquables, 1848, xv.

**Anoplomerus** *angusticollis*, BUQUET, Descrip. de qqes Longicornes

NOUV., 1860, 627. — *globulicollis*, 1860, 625. — *4-guttatus*, 1860, 627. — *spinipennis*, 1860, 626.

**Anoxia**, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 407. — *africana*, 1832, 408. — *emarginata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 424. — *Lucasii*, 1860, 423. — *matutinalis*, *occidentalis*, *orientalis*, DE LAPORTE, 1832, 407. — *scutellaris*, PERROUD, prise aux env. de Fréjus, détails de mœurs, 1852, LXXII. — *villosa*, DE LAPORTE, 1832, 407.

**Anthaxia**, SOLIER, Essai sur les Buprestides, 1833, 297. — *angulosa*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 718. — *Ariasi*, ROBERT, Descr. d'un Buprestide nouv., 1859, CLXXIV. — *id.*, FAIRMAIRE, appartient au G. *Melanophila*, 1859, CLXXIV. — *auricolor*, SOLIER, 1833, 298. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 103. — *bella*, *candens*, *Cichorii*, SOLIER, 1833, 298. — *Cichorii*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Insectes rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *concinna*, SOLIER, 1833, 298. — *id.*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1860, 718. — *corinthia*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 414. — *cupriceps*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 717. — *cyanicornis*, GHILIANI, 1847, 103. — *denticulata*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *divina*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 415. — *hypomelaena*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 727. — *inculta*, SOLIER, 1833, 298. — *id.*, LUCAS, Note sur plus. Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXIV. — *id.*, SIGNORET, larves recueillies en janvier 1842 et écloses en juillet 1854, 1854, LII. — *lata*, *maculicollis*, *manca*, SOLIER, 1833, 298. — *manca*, LABOULBÈNE, l'auteur l'a disséquée, dessins. — *marginicollis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 717. — *morio*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 123. — *nitida*, *nitidula*, SOLIER, 1833, 298. — *Passerinii*, PECCHIOLI, Descr. de deux Col. nouv. d'Italie, 1837, 466. — *4-punctata*, *quercata*, *salicis*, SOLIER, 1833, 298. — *scutellaris*, FAIRMAIRE, prise à Arcachon, 1859, CXXIX. — *signaticollis*, SOLIER, 1833, 298. — *Spinolæ*, GHILIANI, 1847, 103. — *umbellatarum*, *viminalis*, SOLIER, 1833, 298.

**Anthia**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, il constate l'existence de 39 esp. de ce G., 1845, CIX. — *alveolata*, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 293. — *costata*, GORY, Descr. de deux Col. nouv., 1836, 210. — *dimidiata*, *Ferreti*, *Galinieri*, *leucomelana*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *6-maculata*, LUCAS, recueillie dans le Djebel-Amour par M. le colonel Levailant, 1847, CIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé en l'oasis d'Ouargla (Algérie), 1859,

CXCL. — *Melly*, DE BRÈME, 1844, 292. — *tetrastigma*, REICHE, 1852, 96. — *renator*, DOUÉ, envoyé d'Algérie, 1850, LXVI.

**ANTHICITES**, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, Lecture des préliminaires d'une monogr., 1847, CI. — *id.*, REICHE, Examen de la Monogr. de M. de la Ferté, 1852, 257.

**Anthicus**, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, Notice des esp. recueillies aux env. de Perpignan, 1842, 247. — *id.* et genres voisins, REICHE, Examen de la Monogr. de M. le marquis de la Ferté-Sénectère, 1852, 257. — *id.*, AZAMBRE, nouv. esp. prise à Rome, 1856, XVII. — *affinis*, *antherinus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 248, 257. — *antherinus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *Antonix*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 249. — *basalis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 95. — *bimaculatus*, FAIRMAIRE, 1852, 685. — *Bremei*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 252. — *brunneus*, 1842, 249. — *fasciatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 625. — *floralis*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 258. — *gracilis*, 1842, 251, 258. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730. — *guttatus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 248. — *hirtellus*, 1842, 258. — *humilis*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 730. — *instabilis*, SOLIER, Remarques sur cet Ins., 1834, LXVII. — *id.*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 258. — *melanophthalmus*, 242, 255. — *minutus*, 1842, 255. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *pædestris*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 256. — *plumbeus*, 1842, 250. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *pulchellus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 256. — *4-guttatus*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *4-pustulatus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 258. — *Rodriguei*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *rufipes*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 258. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé aux env. d'Orléans, 1851, XLIII. — *salinarius*, LEPRIEUR, prise sur les bords des marais salants de Dieuze, 1846, CV. — *sellatus*, FAIRMAIRE, trouvé aux env. d'Orléans, 1851, XLIII. — *tenellus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1842, 251. — *tenellus*, *tristis*, KIESENWETTER, 1851, 625.

**Anthipna abdominalis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 95. — *Carcelii*, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 411.

**Anthobium adustum**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 438. — *angustum*, 1851, 436. — *genistorum*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 164. — *impressicollis*, KIESENWETTER, 1851, 437. — *longulum*, FAIRMAIRE, Baie de la

Somme, 1852, 682. — *luteipenne*, KIESENWETTER, 1851, 439. — *maculicollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 164. — *minutum*, FAIRMAIRE, 1852, 682. — *minutum*, *scutellare*, AUBÉ et REICHE, trouvés à Compiègne, 1852, xxxii. — *scutellare*, KIESENWETTER, 1851, 436. — *Umbellatarum*, 1851, 439.

**Anthoboscus**, CHEVROLAT, Descr. d'esp. de Clytes propres au Mexique, 1860, 455.

**Anthocomus** *amictus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 618. — *citrinoguttatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 181. — *jocosus*, KIESENWETTER, 1851, 618. — *lateralis*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 592. — *pictus*, KIESENWETTER, 1851, 618.

**Anthonomus** *lateralis*, JACQ. DU VAL, trouvé sur le quai de la Rapée, 1853, XLVI. — *ornatus*, REICHE, Descr. des esp. nouv. recueillies en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 732. — *Pomorum*, GOUREAU, Ravages causés aux Pommiers par la larve, 1852, LXXIX. — *Roberti*, WENCKER, Descr. de plusieurs Col. nouv., 1858, CCXXXVI. — *rubi*, LUCAS, Ravages causés aux Figuiers, 1851, CXIV. — *spilotus*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXII.

**Anthophagus** *alpinus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 433. — *Hybncr*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *muticus*, KIESENWETTER, 1851, 433.

**Anthracophora** *rusticola*, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles, 1849, 286.

**Anthrenes**, BRULLÉ, Différences entre les deux sexes, 1837, LXXX. — *id.*, AUBÉ, Communic. de ses recherches sur le même sujet, 1838, LV. — *id.*, DEJEAN, Œufs se conservant un temps illimité sans éclore. 1837, LXXX.

**Anthrenus**, ACBÉ, Recherches sur la structure des antennes, 1838, LV. — *id.*, DESMAREST, Perforation d'un mur en calcaire grossier, 1844, XXXIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, les larves périssent promptement dans le sulfure de carbone, 1839, CCXLIX. — *id.*, BUQUET, ce composé a le grand inconvénient de noircir les couleurs des Insectes, 1859, CCXLIX. — *albidus*, PEYRON, Descrip. de Col. nouv. et obs. div., 1857, 722. — *claviger*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 579. — *delicatulus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 725. — *delicatus*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *fuscus*, *glabratus*, REICHE, Note sur ce G. et détermin. synonym. des esp., 1843, XXVIII.

— *molitor*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 335. — *muscorum*, *Pimpinellæ*, REICHE, 1843, XXVIII. — *Pimpinellæ*, major BLANCHARD, Dégâts causés par les larves sur une botte en écaille fondue, 1851, xv. — *Scrophulariæ*, REICHE, 1843, XXVIII. — *trifasciatus*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *varius*, REICHE, 1843, XXVIII. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *Verbasci*, REICHE, 1843, XXXVIII.

***Anthrribus albinus***, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Saint-Germain, 1849, LX. — *latirostris*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288.

***Antodon***, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 301. — *Burmeisteri*, 1844, 302.

***Apalus binotatus***, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 110.

***Apalochrus***, *Erichsonii*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96.

***Apate***, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. classific. du groupe des Bostrichides, 1845, XVI. — *bispinosa*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 106. — *capucina*, DESMAREST, Clichés typographiques percés par cet Ins., 1844, XXIV. — *id.*, PERRIS, Mœurs et métamorph., 1850, 555. — *Dufourii*, 1850, 563. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472. — *elongata*, HERM.-ASMUS, notice sur cet Ins., 1836, 625. — *francisca*, LUCAS, sortie d'une branche d'arbre rapportée d'Afrique depuis quatre ans, 1846, LIV. — *id.*, Branche de Mûrier perforée par cet Ins., 1853, LVII. — *humeralis*, Note sur plusieurs Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXV. — *minuta*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur qqes Col. trouvés dans la racine de Squine, 1845, XVI. — *nigriventris*, LUCAS, retrouvé à Paris, 1843, XXV. — *id.*, sortie d'une branche d'arbre rapportée d'Afrique depuis quatre ans, 1846, LIV. — *id.*, pris à Paris dans l'Entrepôt des vins par M. Lafont, 1851, LXXVII. — *id.*, FAIRMAIRE, prise à la Teste, mêlée avec des *A. capucina*, 1853, XLVI. — *rufiventris*, LUCAS, Note sur plusieurs Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXV. — *6-dentata*, PERRIS, 1850, 559. — *sinuata*, 1850, 562. — *substriata*, HERM.-ASMUS, Notice sur cet Ins., 1836, 625.

***Apateum calceatum***, SPINOLA, Lettre sur un groupe de Buprestides, 1837, 120.

***Aphanisticus***, SOLIER, Essai sur les Buprestides, 1833, 315. — *angustatus*, pris à Aix par M. le docteur Grenier, 1859, CCXXXVII. — *elongatus*, AUBÉ, pris dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, 1849, LIII.



— *emarginatus, pusillus*, SOLIER, 1844, 316. — *pygmaeus*, FAIRMAIRE, trouvé à Toulon par le capitaine Martin, 1859, CCXXXVIII.

**Aphanobius infuscatus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 157.

**Aphelorrhina simillima**, SCHAUM, Lamellicornes mélitophiles, 1849, 243.

**Aphodius**, DE HAROLD, Indicat. des diagnoses de six nouv. esp., 1860,

LXIII. — *anachoreta, armatus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 99. — *barbarus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 171. — *Bonvouloirii, Bostrichoides*, DE HAROLD, Diagnoses de nouv. esp. d'*Aphodius*, 1860, 615. — *brevis*, SOUVERBIE, pris sur la plage de la Teste et aux envir. de Bordeaux, 1852, LXVII. — *carpetanus*, GRAELLS, Descr. de cinq esp. nouv. de Col. d'Espagne, 1847, 306. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 129. — *cognatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 172. — *coloratus*, REICHE, 1852, 99. — *conjugatus, conspurcatus*, SOUVERBIE, 1852, LXVII. — *cribrarius*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 401. — *cylindricus*, 1856, 396. — *deplanatus*, REICHE, 1852, 99. — *dilatatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1856, 399. — *dimidiatus*, REICHE, 1852, 99. — *ferrugineus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, LXVII. — *fimbriolatus*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 397. — *fimicola*, 1856, 402. — *id.*, REICHE, retrouvé en Palestine, 1836, XLVII. — *flavocinctus*, DE HAROLD, 1860, 614. — *fætidus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *goniocephalus, hæmorrhoidalis*, 1852, 684. — *hepaticus, humilis, impurus, lateritius*, REICHE, 1852, 99. — *linearis*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 394. — *lividus*, REICHE, 1852, 99. — *longitarsis*, DE HAROLD, 1860, 615. — *luridus*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *macropterus, maculicollis*, REICHE, 1852, 99. — *maculicollis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 268. — *marginellus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Bocal envoyé de Cuba et en contenant plus de 20,000, 1837, VI. — *monticola*, GHILIANI, 1847, 129. — *nanus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 172. — *nivalis, obliterated, obscurus*, GHILIANI, 1847, 129. — *palustris*, MONTROUZIER, 1860, 268. — *parallelus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 171. — *pictus*, GHILIANI, 1847, 129. — *plagiatus*, et var. *niger*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *pulcherrimus*, REICHE, 1852, 99. — *4-maculatus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470. — *quisquilius, rhinoceros*, REICHE, 1852, 99. — *rubens*, GHILIANI, 1847, 129. — *rufus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 726. — *id.*, SOUVERBIE, 1852, LXVII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 172. — *sagittarius*, DE HAROLD, 1860, 615. — *scrutator*, GHILIANI, 1847, 329. — *scutellaris, senegalensis*.

REICHE, 1852, 99. — *sericatus*, GHILIANI, 1847, 129. — *sinuatus*, DE HAROLD, 1860, 614. — *strigilatus*, REICHE, 1852, 99. — *suarius*, REICHE et DE SAULCY, 1846, 392. — *tersus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 172. — *teter*, REICHE, 1852, 99. — *Zenkeri*, CH. BR. DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII.

**Aptona**, E. ALLARD, Essai monogr. sur les Altises d'Europe, 1860, 387. — *abdominalis*, 1860, 390. — *atrátula*, Diagnoses de qqes Altises nouv., 1859, CI. — *id.*, Altises d'Europe, 1860, 405. — *atrocærulea*, 1860, 398. — *atrovirens*, 1860, 406. — *cærulea*, 1860, 397. — *Cyparissæ*, 1860, 392. — *delicatula*, 1860, 404. — *depressa*, Diagnoses de qqes Altises nouv., 1859, CI. — *id.*, Altises d'Europe, 1860, 402. — *Erichsoni*, 1860, 408. — *Euphorbiæ*, 1860, 400. — *flaviceps*, Diagnoses de qqes Altises nouv., 1859, CI. — *id.*, Altises d'Europe, 1860, 392. — *fossulata*, Diagnoses de qqes Altises nouv., 1859, CI. — *herbigrada*, Altises d'Europe, 1860, 409. — *hilaris*, 1860, 399. — *lacertosa*, 1860, 408. — *lævigata*, 1860, 393. — *lutescens*, 1860, 394. — *nigriceps*, 1860, 395. — *nigriventris*, 1860, 390. — *ovata*, 1860, 404. — *pallida*, 1860, 391. — *Poupillieri*, 1860, 401. — *semicyanea*, Diagnoses de qqes Altises nouv., 1859, CI. — *id.*, Altises d'Europe, 1860, 396. — *sublævis*, 1860, 400. — *subovata*, Diagnoses de qqes Altises nouv., 1859, CI. — *id.*, Altises d'Europe, 1860, 407. — *variolosa*, 1860, 394. — *violacea*, 1860, 403.

**Apion**, GOREAU, Note sur les Ins. qui attaquent les graines de l'Ajonc, 1845, LXXIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Jolie espèce vivant dans les jeunes pousses d'un *Cistus*, 1846, CIV. — *id.*, Galeries percées dans des tiges d'*Altea rosea*, 1831, CI. — *id.*, WENCKER, L'auteur annonce qu'il va faire une revue de ce genre, 1857, CLVII. — *æneum*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 628. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 651. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *æthiops*, KIESENWETTER, 1851, 629. — *ascr*, FAIRMAIRE, trouvé aux environs de Vernon, 1855, XLVII. — *angustatum*, KIESENWETTER, 1851, 629. — *apricans*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Notice sur ses métam. et sur ses parasites, 1843, 65. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *arrogans*, WENCKER, Descrip. de trois nouv. esp., 1858, CVI. — *Astragali*, KIESENWETTER, 1851, 629. — *atomarium*, 1851, 628. — *burdigalense*, WENCKER, Descrip. de plusieurs Col. nouv., 1858, CCXXXVII. — *Capiomonti*, Descrip. de trois nouv. esp. du G. *Apion*, 1858, CV. — *Caullei*, Descrip. de trois nouv. esp. de ce genre. 1858, XXI. — *id.*, GOUGELET, trouvé près de Brunoy, env. d'Eu, 1858, CLVIII. — *Chevrolatii*, FAIRMAIRE, trouvé

à Saint-Germain-en-Laye, 1851, LXXXVIII. — *curvirostre*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 655. — *elongatum*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune franç., 1859, CXXXII. — *fuscirostre*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *Galactidis*, WENCKER, 1858, XXII. — *Genistæ*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *Germari*, CHEVROLAT, vit sur le *Solanum nigrum*, 1859 CXXX. — *id.*, Note sur l'habitat de cette esp., 1860, XXXIII. — *hæmatodes*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *herbarum*, AUBÉ, Descript. de qqes Coléoptères d'Europe et d'Algérie, 1850, 338. — *leptocephalum*, 1850, 339. — *id.*, trouvé en immense quantité sur un petit Pommier, 1844, XLVIII. — *Limonii*, FAIRMAIRE, trouvé aux env. de la Teste, 1853, XLII. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730. — *Linderi*, WENCKER, 1858, XXIII. — *Loti*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *Malvæ*, 1851, 629. — *id.*, major BLANCHARD, pris dans la province d'Oran, 1850, VIII. — *Marqueti*, WENCKER, Descr. de plusieurs Col. nouv., 1858, CCXXXVII. — *Melitoti*, FAIRMAIRE, trouvé aux env. de Vernon, 1855, XLVII. — *Onopordi*, REICHE et DE SAULCY, 1857, XLVII. — *penetrans*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *Perrisii*, WENCKER, 1858, CCXXXVIII. — *Piscidiæ*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 874. — *Pisi*, KIESENWETTER, 1851, 629. — *id.*, GIRARD, trouvé en grand nombre sur des Oseilles, 1859, CXXI. — *Pomonæ*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *radiolus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 651. — *Rougeti*, WENCKER, Descr. de trois nouv. esp. du G. *Apion*, 1858, CVI. — *rufescens*, *rufirostre*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *Sedi*, AUBÉ, rencontré aux env. de Paris sur le *Sedum reflexum*, 1854, XLII. — *seniculus*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *Spencei*, 1851, 629. — *squamigerum*, WENCKER, identique avec l'*A. squamulatum* Schn., 1858, LXXXIX. — *subulatum*, *Tamarisci*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *Truquii*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 651. — *tubiferum*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 730. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *ulicicola*, PERRIS, Obs. sur les Ins. qui habitent les galles de l'*Ulex nanus* et du *Papaver dubius*, 1840, 90. — *Ulicis*, GOUREAU, Note pour servir à l'Hist. des Ins. qui vivent dans les gousses du Genêt épineux, 1847, 250. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 628. — *varipes*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *virens*, *vorax*, KIESENWETTER, 1851, 629. — *Waltonii*, JAVET, trouvé à Conflans, près Paris, 1847, CVI.

**Aplasta** *dichrora*, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles. 1844, 411. et 1849, 268. — *tutulenta*, 1844, 412 et 1849, 268.

**Aplotherax** *Burchelii*, DOUË, communic. des deux sexes, 1859, XLII.

**Apobletes**, DE MARSEUL, Supp. à la Monog. des Histérides, 1860, 852. — *errans*, 1860, 853, 865. — *foliaceus*, 1860, 852, 857. — *Migneauxi*, 1860, 852, 855. — *Montrouzieri*, 1860, 853, 860. — *Owas*, 1860, 853, 864. — *parensis*, 1860, 853, 863. — *ridens*, 1860, 853, 861. — *Schaumei*, 1860, 853, 857. — *striatellus*, 1860, 863, 864. — *taciturnus*, 1860, 852, 855. — *tener*, 1860, 853, 859.

**Apoderus morio**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 96.

**Apomecyna alboguttata**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 77. — *dorcadoides*, *scalaris*, 1835, 78. — *varia*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 526.

**Apotomus**, SOLIER, Obs. sur le G. *Ditomus*, 1834, 669. — *id.* JACQ. DU VAL, Ce genre doit former un groupe avec les *Loricera*, 1854, LXVI. — *rufithorax*, PECCHIOLO, Descrip. de deux Col. nouv. d'Italie, 1837, 445. — *id.*, LEPRIEUR, trouvé aux env. de Bone, 1855, x. — *rufithorax*, *rufus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 387. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 756.

**Apriona**, BUQUET, Mém. sur deux G. nouv. de la fam. des Longicornes, 1859, 630. — *gracilicornis*, 1859, 632. — *tomentosa*, 1859, 633.

**Apteranillus Dohrnii**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 150.

**Apteropeda**, E. ALLARD, Essai monog. sur les Galérucides anisopodes, 1860, 574. — *Caricis*, Diagnoses de qqes Altises de France, 1859, cv. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *ciliata*, 1860, 575. — *globosa*, 1860, 577. — *ovoides*, E. ALLARD, 1859, cv. — *ovulum*, FAIRMAIRE, 1860, 576. — *splendida*, 1860, 577.

**Aptinus**, SOLIER, Obs. sur les genres *Aptinus* et *Brachinus*, 1833, 460. — *id.*, Nouv. obs. sur les genres *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 655. — *alpinus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 115. — *andalusiacus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 751. — *angustatus*, 1858, 750. — *atratus*, *ballista*, SOLIER, 1833, 461. — *ballista*, 1834, 655. — *bæticus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 751. — *longicornis*, 1858, 750. — *mutilatus*, SOLIER, Obs. sur les genres *Aptinus* et *Brachinus*, 1833, 461. — *id.*, Nouv. obs. sur les genres *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 655. — *pygmæus*, FAIRMAIRE, Col. provenant de Tanger, 1851, XXI. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 751. — *pyrenæus*, SOLIER, Obs. sur les G. *Aptinus* et *Brachinus*, 1833, 461. — *id.*, Nouv. obs. sur les G. *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 655. — *id.*, FAIRMAIRE, envoyé

- par M. Bigot, des Pyrénées orient., 1856, LXXXI. — *variegatus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 95.
- Arachnobas alboguttatus**, Jekeli, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 896, 897.
- Arachnosphærus**, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 329. — *megacephalus*, 1856, 329.
- Aræocerus coffeæ**, LEPRIEUR, trouvé dans des graines de Café de Cayenne, 1847, LXXIV.
- Arescus caudatus**, SALLÉ, Col. nouv. d'Amérique, 1851, 483. — *id.*, CHEVROLAT, même esp. que le *4-maculatus*, 1851, XXI. — *id.*, MARCO A ROJAS, Remarq. sur cette esp., 1858, 61. — *coniatu*s, CHEVROLAT, Lecture d'une notice de M. Rojas sur trois var. de cette esp., 1855, XXXVII. — *4-maculatus*, SALLÉ, 1851, 435. — *id.*, CHEVROLAT, identique avec le *caudatus*, 1851, XXI.
- Aretharea**, LACORDAIRE, Say a décrit sous ce nom un genre de la div. des *Bembidium*, 1849, LXXXIII.
- Argopus**, E. ALLARD, Essai monogr. sur les Altises d'Europe, 1860, 410. — *bicolor*, 1860, 411. — *brevis*, Diagnoses de quatre nouv. Altises, 1859, CCLX. — *id.*, 1860, 414. — *hemisphæricus*, 1860, 413. — *nigritarsis*, 1860, 412.
- Argutor apenninus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 112. — *aquila*, REICHE, Notes entom. sur divers Col., 1859, 639. — *discolor*, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *modica, rubicunda*, Notes entom. sur div. Col., 1859, 639. — *spadiceus*, GAUBIL, pris dans les env. de Phalsbourg, 1847, XIV.
- Arhopalus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 77. — *fulminans, liciatus, mixtus, rusticus, sericeus, undatus*, 1834, 78.
- Aristus**, SOLIER, Obs. sur le G. *Ditonus*, 1834, 660. — *capito, nitidulus, obscurus*, SOLIER, 1834, 661. — *nitidulus, obscurus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 389. — *opacus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 755. — *perforatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 589. — *sphærocephalus, sulcatus*, SOLIER, 1834, 660, 661.
- Aromia**. AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 559. — *ambrosiaca, moschata*, 1833, 560.
- Arpedium myops**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 435.

**Arrhaphus Olivetorum**, KRAATZ, communic. de cette esp. de Grèce, 1860, LXII.

**Arrhenodes exsertus**, LUCAS, individu envahi dans toutes ses parties par un Acarien, 1849, XXXIV. — *Reichei*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. nouv. 1859, CLXIV.

**Artractocerus**, WESTWOOD, Larve se nourrissant de celle du *Lymexylon navale*, 1850, LIX.

**Artrodeis**, SOLIER, Collaptérides, 1834, 513. — *cruciatus*, 1834, 517. — *globosus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 186. — *obliteratus*, SOLIER, 1834, 513. — *rotundatus*, 1834, 517.

**Artia carthaginensis**, RAMBUR, Monogr. des *Elaphocera*, 1843, 332.

**Articerus armatus**, AUBÉ, Obs. sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 511. — *armatus*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 155. — *Fortnumi*, 1844, 156.

**Asemum striatum**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 79. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127. — *id.*, JACQ. DU VAL, Larves prises sous des écorces de Pin, près de Vincennes, 1854, XIX.

**Asida**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 408. — *asperata*, 1836, 450. — *auriculata*, 1836, 451. — *Bayardi*, 1836, 423. — *bigorrensis*, 1836, 430. — *brevicosta*, 1836, 449. — *carinata*, 1836, 426. — *cariosicollis*, 1836, 446. — *Chauveneti*, 1836, 440. — *corsica*, 1836, 436. — *costulata*, 1836, 455. — *Dejeanii*, 1836, 420. — *depressa*, 1836, 466. — *elongata*, 1836, 463. — *Genei*, 1836, 435. — *Gorgi*, 1836, 424. — *Goudoti*, 1836, 457. — *granifera*, 1836, 460. — *grisea*, 1836, 415. — *grossa*, 1836, 453. — *helvetica*, 1836, 418. — *hispanica*, 1836, 461. — *inæqualis*, 1836, 428. — *Jurinei*, 1836, 429. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124. — *lævis*, SOLIER, 1836, 464. — *longicollis*, 1836, 425. — *lutosa*, 1836, 422. — *parallela*, 1836, 459. — *porcata*, 1836, 448. — *puncticollis*, 1836, 439. — *Ramburi*, 1836, 438. — *reticulata*, 1836, 419. — *ruficornis*, 1836, 421. — *sericea*, 1836, 431. — *Servillei*, 1836, 443. — *sibirica*, 1836, 462. — *sicula*, 1836, 454. — *silphoides*, 1836, 442. — *sinuaticollis*, 1836, 433. — *Solieri*, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. de Sardaigne, 1836, IV. — *subcostata*, SOLIER, 1836, 446. — *Tangeriana*, 1836, 456. — *ventricosa*, 1836, 458. — *vicina*, 1836, 417.

**ASIDITES**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 403.

**Aspidimorphus quadrivernis**, LUCAS, Présentation et descr. de deux indiv. vivants, 1849, LII.

- Aspidiphorus**, JACQ. DU VAL, Ce genre parait voisin des *Dorcatoma*, 1857, 103. — *orbiculatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 131. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469.
- Aspisoma candellaria**, GOUREAU, Note sur cette esp., 1845, 345. — *id.*, REICHE, Descr. de cette esp., 1845, 353.
- Aspongopus affinis, marginatus**, COSTA, Diagnoses de deux esp. de Java, 1847, XXVII.
- Asporinus**, DE LA FERTÉ-SENECTÈRE, Révision de la tribu des Patellimanes, 1851, 259. — *id.*, Obs. et corrections, 1851, 291. — *anthracinus, licinoides*, 1851, 260.
- Astigis Salzmanni**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 764.
- Astynomus ædilis**, CHEVROLAT, Larves trouvées dans le Pin maritime, 1846, LXXV. — *ædilis, atomarius*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137. — *Edmondi*, FAIRMAIRE, Diagnose d'une nouv. esp. trouvée en Sicile, 1852, LXII. — *id.*, Rectific. et descr. d'esp. nouv. de Col. de la Faune méditerranéenne, 1855, 321. — *griseus*, GHILIANI, 1847, 137. — *obliquatus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 511.
- ATEUCHIDES**, REICHE, Classif. des Coprophages, 1841, 63.
- Ateuchus**, REICHE, Recherches sur le caractère sexuel des esp. de ce genre, 1842, X. — *laticollis*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *id.*, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies dans un voyage à Prades, 1850, XXIV. — *pius*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 109. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 725. — *semipunctatus*, DUPONCHEL, 1834, 287. — *id.*, LUCAS, de la faune parisienne, 1856, LIX. — *variolosus*, Note sur plusieurs Col. algériens, 1856, IV.
- Athous atomarius**, LABOULBÈNE, trouvé aux env. d'Agen, 1849, XLIX. — *ferrugineus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 256. — *hæmorrhoidalis, longicollis*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 161. — *puberosus*, MONTROUZIER, 1860, 259. — *rhombus*, BUQUET, Lecture d'une note de M. J. Curtis sur ses métam., 1853, XXVII. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 146. — *rufus*, 1854, 143. — *undulatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137. — *vittatus*, LATREILLE, 1834, 161.
- Atomaria linearis**, MACQUART, dévore les Betteraves des env. de Lille, 1847, I. — *id.*, LUCAS, Note sur cet Ins., 1854, XXXIX. — *id.*, CUSSAC, il attaque les feuilles de Betteraves, 1857, LXXIII.

**Atopa** (voyez *Dascillus*) *cervina*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1851, 131.  
 — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, très-abondante dans les Alpes, 1855, LXXXIII. — *cinerea*, GHILIANI, 1851, 131. — *cærulea*, JAVET et DOUË, prise à Compiègne, 1852, XXXI. — *fuscata*, *linearis*, *nana*, *terminata*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683.

**ATOPTES**, DE LAPORTE, Monogr. du groupe des Rhipicérites, 1834, 237.

**Attagenus** *æneus*, *cinnamomeus*, *dichrous*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *dispar*, PEYRON, Description de qqes Col. nouv., 1857, 721. — *fallax*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 546. — *fallax*, *isabellinus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 170. — *macellarius*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *maritimus*, PEYRON, 1857, 720. — *obtus*, 1857, 721. — *Redtenbacheri*, 1857, 720. — *trifasciatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 109. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 579. — *undatus*, GHILIANI, 1847, 131. — *id.*, AZAMBRE, Sur les mœurs et les métam. de cet Ins., 1857, XVII. — *unifasciatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 168. — *uniformis*, 1860, 169. — *20-guttatus*, GHILIANI, 1847, 131.

**Attalus** *Dalmatinus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851 618.

**ATTELABIDES**, DEBAY, Détails sur les mœurs de div. esp., 1853, LIII.

**Attelabus**, LHERMINIER, Dégâts qu'ils causent à la Guadeloupe, 1837, 504. — *curculionoides*, GOUREAU, Note pour servir à son hist., 1841, 21. — *Ilcis*, JACQ. DU VAL, identique à l'*Apoderus intermedius*, 1857, 94. — *versicolor*, n'est autre que le *Rhynchites auratus*, 1857, 94.

**Aubeonymus** *Pictetii*, TOURNIER, Diagnoses de deux nouv. esp. de Col. européens, 1860, LXXXI.

**Auchenia** *melanocephala*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124.

**Aulacium**, REICHE, Coprophages, 1842, 65. — *carinatum*, 1842, 68.

**Aulacopus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 144. — *Feisthamelii*, BEQUET, Descr. de qqes Longicor. nouv., 1860, 617. — *reticulatus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 145.

**Aulacosternus**, DE MARSEUL, Histicérides, 1853, 234. — *Edwardsii*, 1853, 237. — *Zelandicus*, 1853, 236.



**Auladera**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 331. — *andicola*, 1836, 334. — *id.*, LACORDAIRE, Note rectificative de l'habitat de qqes Mélasomes, 1837, 253. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Lacordaire, 1837, 253. — *crenicosta*, Collaptérides, 1836, 333.

**Auletes cisticola**, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. nouv., 1859, CLXIII. — *maculipennis*, LEPRIEUR, Série dont les élytres passent insensiblement du rouge sans lache au noir, 1860, XLVIII. — *pubescens, tubicen*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 627.

**Aulonium bicolor**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 610. — *sulcatum*, FAIRMAIRE, Bois de Marly, sous les écorces d'Ormes, 1854, XXXII.

**Aulonocnemis exarata, opatrina**, KLUG, Descr. de deux genres nouv. de Col. de Madagascar, 1837, LXXXIX.

**Aurigena chlorana**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 412. — *tarsata*, AUCAPITAINE, trouvé à Mont-le-Vic (Indre), 1851, CXVIII.

## B.

**Bacanius**, DE MARSEUL, Essai monogr. sur la famille des Histérides, 1856, 567. — *humicola*, 1856, 570. — *marginatus*, 1856, 576. — *misellus*, 1856, 573. — *punctiformis*, 1856, 574. — *rhombophorus*, 1856, 571. — *tantillus*, 1856, 575.

**Badister**, DE LA FERTÉ-SENECTÈRE, Révision de la tribu des Patellimanes, 1851, 285. — *id.*, Obs. et correct., 1851, 291. — *iridescens*, 1851, 286. — *seriopunctatus*, PEYRON, Catal. des esp. des env. de Tarsous, 1858, 359. — *unipustulatus*, 1858, 349. — *id.* FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 759.

**Bagous Aubei**, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 733. — *elegans*, FAIRMAIRE, Commun. de ce Col., 1855, LXXIII. — *frit*, Baie de la Somme, 1852, 686. — *petrosus*, SCHAUUM, Erratum : synonyme *latirostris*, au lieu de *laticollis*, 1843, LI. — *severopolinus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 744.

- Balaninus Cerasorum**, GODARD, sorti des noyaux du *Prunus spinosa*, 1850, LV. — *rufosignatus*, FAIRMAIRE, Reclif. et descr. d'esp. nouv. de la faune méditerranéenne, 1855, 318. — *villosus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *id.*, GOUREAU, éclos de la larve de la galle en pomme du Chêne., 1856, CIV.
- Balanomorphus**, E. ALLARD, Altises d'Europe, 1860, 547. — *Chrysanthami*, 1860, 550. — *impuncticollis*, 1860, 552. — *lutea*, Diagnoses de qqes Altises de France, 1859, CV. — *id.*, Altises d'Europe, 1860, 551. — *Matheusii*, 1860, 550. — *obesa*, 1860, 552. — *obtusata*, 1860, 549. — *rustica*, 1860, 548.
- Baridius Opiparis**, JACQ. DU VAL, Descr. de deux genres nouv. de la faune française, 1852, 715. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 733. — *id.*, FAIRMAIRE, deux indiv. pris à Béziers par M. Marquetti, 1856, XVII. — *squamosus*, MONTROUXIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 890. — *Tabaci*, SALLÉ, dix esp. nouv. de la République dominicaine, 1855, 269. — *T.-album*, FAIRMAIRE, Bale de la Somme. 1852, 686. — *virescens*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 12.
- Baripus aterrimus**, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 445.
- Baris analis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *cuprirostris*, *picipus*, L. DUFOUR, Note sur leurs métam. et leur genre de vie, 1845, 453.
- Barymorphus**, DE LA FERTÉ-SENECTÈRE, Patellimanes, 1851, 235. — *concinus*, *planicornis*, 1851, 236.
- Barynotus auronubilis**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 539. — *illæsirostris*, 559, 58. — *Mercurialis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 134. — *Schænherri*, *squamosus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 634. — *viridanus*, FAIRMAIRE, 1856, 538.
- Barypelithes rufipes**, JEKEL, Lettre à M. Jacq. du Val, 1855, XXVI. — *id.*, JACQ. DU VAL, Glanures entomologiques, 1857, 92.
- Basiloxus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 174. — *armatus*, Maillei, 1832, 175.
- Bathyscia**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 393. — *Aubei*, 1851, 394. — *byssina*, *montana*, *ovata*, 1851, 396. — *Schiodtei*, 1851, 394.

**Batocera rubus**, BLANCHARD, Présentation de la larve et de la nymphe, 1845, v. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Métam. déjà connues, 1845, v. — *id.*, COQUEREL, Indiv. pris à Sainte-Hélène, 1854, LV.

**Batrachus**, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 80. — *albionicus*, 1844, 83. — *id.*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 509. — *australis*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 86. — *Brullei*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 509. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *Buqueti*, *Delaportei*, AUBÉ, 1833, 509. — *Delaportei*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *id.*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 84. — *Dregii*, 1844, 82. — *formicarius*, 1844, 81. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *id.*, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 509. — *id.*, Révision de la même famille, 1844, 81. — *id.*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *Germari*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 81. — *lineatocollis*, 1844, 83. — *lineatocollis, oculatus*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 509. — *oculatus*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 86. — *riparius*, 1844, 83. — *Schaumii*, 1844, 84. — *testaceus, thoracicus*, 1844, 87. — *venustus*, 1844, 85. — *id.*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 509.

**Bellionota lineatopennis**, SOLIER, Buprestides, 1833, 306.

**Beliophorus mucronatus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 147.

**Belostoma**, LEPRIEUR, Communication de deux indiv., 1859, CCXXXIX.

**Bembidiis europæis (de)**, JACQ. DU VAL, Table alphabétique des esp., 1852, 229. — *id.*, Addenda et errata, 1852, 523.

**BEMBIDITES**, JACQ. DU VAL, Ques mots sur leur arrangement dans le Catalogue de Stettin, 1855, 661.

**Bembidium**, JACQ. DU VAL, Annonce d'un Essai monogr. sur ceux d'Europe et d'Algérie, 1849, LXXXI. — *id.*, Caractères et historique du genre, 1851, 452. — *id.*, Palpe monstrueux, 1850, 533. — *id.*, Table alphabétique des genres et esp., 1852, 229. — *id.*, de Bembidiis europæis, Détails sur ce travail, 1856, 441. — *id.*, Liste des auteurs cités, 1856, 445. — *id.*, SCHAUUM, Ques obs. sur le travail de M. Jacq. du Val, 1853, 61. — *id.*, JACQ. DU VAL, Larve différant peu de celle du *Cillenum laterale*, trouvée dans le bois de Vincennes, 1854, XIX. — *id.*, Notes supplémentaires, 1855, 647. — *id.*, Lecture d'une réponse à divers travaux publiés à l'occasion de la monogr. de l'au-

teur, 1855, LXIX. — *id.*, DOHRN, Lettre en réponse à MM. Schaum et Reiche, 1858, XXIV.

**Bembidium** *zereum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1852, 176. — *zereum*, 1851, 508. — *affine*, 1855, 656. — *agile*, de Bembidiis europæis, 1851, 511. — *albipes*, 1851, 551. — *algericum*, 1852, 204. — *ambiguum*, 1851, 496. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 784. — *Andrææ*, JACQ. DU VAL, 1852, 137. — *id.*, SCHAUM, Observ. sur le genre *Bembidium*, 1853, 66. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 369. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes supplémentaires, 1855, 654. — *angustatum*, de Bembidiis europæis, 1852, 200. — *argenteolum*, 1851, 475. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *id.*, JACQ. DU VAL, 1855, 653. — *artense*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 241. — *articulatum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 535. — *aspericollæ*, 1851, 516. — *assimile*, 1852, 168. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 679. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 666. — *Ataxense*, REICHE et LABOULBÈNE, c'est le *B. hypocrita* Dej.? 1852, XXXVI. — *aurichalccum*, GORY, Centurie de nouv. Col., 1833, 246. — *biguttatum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1852, 174. — *bipartitum*, Descr. de trois espèces nouv., 1857, 104. — *bipunctatum*, de Bembidiis europæis, 1831, 493. — *bisignatum*, 1852, 152. — *bistriatum*, 1852, 205. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *bisulcata* (*Leia*), JACQ. DU VAL, 1852, 218. — *brevicorne*, Descr. de trois esp. nouv., 1857, 105. — *brunnipes*, de Bembidiis europæis, 1851, 564. — *id.*, SCHAUM, le nom de *Sahlbergii* Dej. doit être préféré, 1853, 65. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 654. — *bruxellense*, de Bembidiis europæis 1852, 130. — *callosum*, 1851, 540. — *caraboides*, 1851, 469. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 664. — *castanipennis*, de Bembidiis europæis 1851, 575. — *causicum*, 1851, 513. — *Chaudoirii*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 670. — *Clarkii*, de Bembidiis europæis, 1852, 170. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 666. — *combustum*, de Bembidiis europæis, 1851, 572. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 666. — *concinnum*, 1852, 139. — *conforme*, 1852, 116. — *id.*, SCHAUM, n'a jamais été prise en Silésie, 1853, 65. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 654. — *cordicollæ*, 1851, 571. — *cribrum*, 1851, 549. — *cruciatum*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *cupreum*, GORY, 1833, 246. — *curtulum*, JACQ. DU VAL, 1851, 498. — *Dahlîi*, 1851, 548. — *id.*, FAIRMAIRE

et COQUEREL, 1858, 784. — *decorum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 568. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 658. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *dentellum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1852, 172. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 667. — *depressum*, de Bembidiis europæis 1852, 108. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 666. — *dimidiata*, de Bembidiis europæis, 1852, 219. — *distinguendum*, 1852, 128. — *Doris*, 1851, 529. — *dromioides*, 1852, 135. — *effluviorum*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 366. — *elegans*, SCHAUUM, c'est un *paludosum*, 1853, 64. — *elongutum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 546. — *ephippium*, 1852, 156. — *eques*, 1852, 119. — *Erichsonii*, 1852, 117. — *fasciolatum*, 1852, 109. — *id.*, SCHAUUM, rapporté à tort au *Car. ustulatus* Payk, 1853, 66. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 655, 657. — *fastidiosum*, de Bembidiis europæis, 1851, 563. — *Felmanni*, 1852, 106. — *femoratum*, 1852, 131. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 658. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *festivum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 467. — *flammulatum*, 1852, 163. — *flavipes*, 1851, 464. — *id.*, PEYRON, 1858, 364. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *flavoposticatum*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 669. — *fluvialile*, de Bembidiis europæis, 1852, 142. — *Fockii*, 1852, 189. — *id.*, trouvé sur le quai de la Rapée, 1853, XLVI. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 667. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *id.*, de MOTSCHULTSKY, diffère de l'*Elaphropus caraboides*, 1859, CCV. — *fulvicolle*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis Europæis, 1852, 208. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 667. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *fulvipes*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 557. — *fumigatum*, 1852, 166. — *gilvipes*, 1851, 520. — *glaciale*, 1851, 510. — *globulum*, 1852, 192. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *Grapii*, JACQ. DU VAL, 1852, 215. — *guttigerum*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient 1855, 633. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *guttula*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1852, 179. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 657. — *guttulatum*, 1855, 672. — *hæmorrhoidale*, de Bembidiis europæis, 1852, 193. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *hispanicum*, JACQ. DU VAL, 1852, 136. — *humerales*, 1851, 544. — *hypocrita*, 1851, 518. — *id.*, var. *orientale*, PEYRON, 1858, 364. — *impressum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 477. — *inserticeps*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 668. — *id.*, PEYRON, 1858, 364. — *inustum*, JACQ. DU VAL, Descr. de trois esp. nouv., 1857, 103. — *Kusteri*, de Bembi-

*diis europæis*, 1851, 489. — *lætum*, 1851, 491. — *Lafertei*, 1851, 574. — *lampsos*, 1851, 503. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 660. — *laterale*, de Bembidiis europæis, 1852, 213. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *laticolle*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis. 1852, 154. — *latum*, PEYRON, 1858, 364. — *littorale*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 658. — *Lucasii*, de Bembidiis europæis, 1852, 197. — *lunatum*, 1852, 148. — *luridipes*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 636. — *id.*, PEYRON, 1858, 364. — *luridus*, JACQ. DU VAL, 1852, 219. — *lusitanicum*, 1852, 141. — *maculatum*, 1851, 531. — *maritimum*, 1852, 216. — *Menc-triesii*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 669. — *metallicum*, PEYRON, Descr. de qqes coll. nouv., 1857, 715. — *Milleri*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 665. — *modestum*, de Bembidiis europæis, 1851, 555. — *monticolum*, 1851, 565. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 658. — *moschatum*, PEYRON, 1858, 367. — *nanum*, JACQ. DU VAL, 1852, 202. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *nebulosum*, JACQ. DU VAL, 1851, 471. — *id.*, SCHAUUM, le *nebulosum* Rossi est synonyme de *caraboides*, et le *nebulosum* Schaum l'est du *pallipes*, 1853, 64. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 664. — *nigricorne*, de Bembidiis europæis, 1851, 507. — *nigropiccum*, 1852, 211. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé à Dieppe par M. Racine, 1857, CIV. — *nitidulum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1851, 559. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *Nordmanni*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 671. — *Normannum*, de Bembidiis europæis, 1851, 522. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *id.*, SCHAUUM, ne paraît pas différer du *pusillum*, 1853, 65. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes supplémentaires, 1855, 653, 660, 665. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *obliquum*, JACQ. DU VAL, de Bembidiis europæis, 1852, 157. — *oblongum*, 1852, 127. — *obsoletum*, Deux obs. à propos de la Faune française de MM. Fairmaire et Laboulbène, 1855, 663. — *obtusum*, de Bembidiis europæis, 1852, 182. — *pallidipenne*, 1851, 487. — *pallipes*, 1851, 468. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 664. — *paludosum*, de Bembidiis europæis, 1851, 473. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 664. — *parvulum*, de Bembidiis europeis, 1852, 201. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 667. — *perplexum*, de Bembidiis europæis, 1851, 569. — *Pfciffi*, 1852, 101. — *planipenne*, 1852, 107. — *præustum*, 1851, 576. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *prasinum*, JACQ. DU VAL, 1852, 104. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 666. — *pulchellum*, de Bem-

*bidiiis europæis*, 1851, 497. — *pullum*, 1852, 199. — *punctulatum*, 1851, 483. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 664. — *pusillum*, de *Bembidiis europæis*, 1851, 525. — *id.*, Notes supplémentaires, 1855, 660. — *pygmæum*, de *Bembidiis europæis*, 1851, 501. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 664. — *pyrenæum*, de *Bembidiis europæis*, 1851, 512. — *4-guttatum*, 1851, 537. — *4-maculatum*, PEYRON, 1858, 366. — *id.*, JACQ. DU VAL, de *Bembidiis europæis*, 1851, 542. — *4-plagiatum*, 1851, 534. — *id.*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 665. — *id.*, de *Bembidiis europæis*, 1852, 216. — *4-pustulatum*, 1851, 541. — *4-signatum*, 1852, 195. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *5-striatum*, JACQ. DU VAL, 1852, 185. — *rectangulum*, 1852, 184. — *rufescens*, 1852, 187. — *ruficolle*, 1851, 486. — *rufipes*, 1851, 552. — *id.*, SCHAUM, ne doit pas être rapporté au *brunnipes*, 1853, 65. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 653, 656. — *rugicolle*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 635. — *id.*, PEYRON, 1858, 364. — *rupestre*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 657, 659. — *saxatile*, de *Bembidiis europæis*, 1852, 125. — *Schuppellii*, 1851, 519. — *scutellare*, 1852, 209. — *siculum*, 1851, 567. — *signatipenne*, 1852, 151. — *splendidum*, 1851, 500. — *striatum*, palpe monstrueux, 1850, 533. — *id.*, 1851, 479. — *Sturmii*, 1851, 532. — *id.* PEYRON, 1858, 366. — *subfasciatum*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 670. — *sulcifrons*, de *Bembidiis europæis*, 1851, 674. — *taciturnum*, GORY, 1833, 247. — *tarsicum*, PEYRON, 1858, 368. — *tenellum*, JACQ. DU VAL, de *Bembidiis europæis*, 1851, 527. — *id.*, PEYRON, 1858, 366. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 665. — *tibiale*, 1855, 657. — *id.*, Deux observ. à propos de la Faune française de MM. Fairmaire et Laboulbène, 1855, 663. — *transylvanicum*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 672. — *tricolor*, de *Bembidiis europæis*, 1852, 120. — *id.*, Notes supplémentaires, 1855, 656. — *unicolor*, Notes et descr. supplémentaires, 1855, 673. — *ustulatum*, de *Bembidiis europæis*, 1852, 143. — *id.*, SCHAUM, Observ. sur la monogr. de M. Jacq. du Val, 1853, 65. — *id.*, PEYRON, 1858, 369. — *id.*, JACQ. DU VAL, Notes supplémentaires, 1855, 654, 659. — *ustum*, de *Bembidiis europæis*, 1852, 150. — *varium*, 1852, 159. — *varium*, Var. A., Notes et descr. supplémentaires, 1855, 666. — *velox*, Notes supplémentaires, 1855, 661. — *versicolor*, de *Bembidiis europæis*, 1851, 515. — *vicinum*, 1852, 178.

**Berginus** *Tamarisci*, JACQ. DU VAL, pris à Montpellier, en été et en hiver, 1853, XLVI.

- Berosus**, SOLIER, Obs. sur la tribu des Hydrophilens, 1834, 316. — *ericps*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEL, Col. de Barbarie, 1858, 786. — *affinis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 404. — *bispina*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 356. — *dispar*, 1856, 355. — *id.*, PEYRON, 1858, 404. — *luridus*, *punctatissimus*, *signaticollis*, *spinosus*, SOLIER, 1834, 317. — *spinosus*, LEPRIEUR, se trouve dans les marais salants des env. de Dieuze, 1845, XCIV. — *id.* PEYRON, 1858, 404. — *sticticus*, SOLIER, 1834, 317.
- Biophilæus depressus**, CHEVROLAT, trouvé dans de l'Orge avariée, 1851, LXXXVII.
- Biphilus lunatus**, BUQUET, découvert à Nantes sur des troncs de Frêne et dans des Champignons, 1839, XIX.
- Biplanes crassiusculus**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 254. — *impresus*, 1857, 255. — *syriacus*, 1857, 257. — *viduus*, 1857, 256.
- Blas tetraphyllus**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 534. — *thoracicus*, rapporté de Savoie, 1856, LXXVII.
- Blaps**, DE BARAN, Fait tendant à prouver qu'ils sont carnassiers, 1857, XL. — *abbreviata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 252. — *acuminata*, 1857, 250. — *angulata*, 1857, 247. — *australis*, 1857, 252. — *Chevrolatii*, 1857, 250. — *convexa*, 1857, 243. — *crassa*, 1857, 245. — *cribrosa*, 1857, 245, 251. — *fatidica*, COSTA, Anomalie, 1847, LXXXVIII. — *id.*, PERRIS, Hist. de ses métam., 1852, 609. — *id.*, ROUZET, Note sur sa longévité, 1856, IV. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 251. — *gages*, 1857, 252. — *indagator*, 1857, 238. — *laticollis*, 1857, 247. — *lineata*, DOÛÉ, élytres présentant des dissemblances remarquables, 1848, XV. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 253. — *longula*, 1857, 234. — *mortisaga*, GERVAIS, deux vers intestinaux retirés de son corps, 1835, LXX. — *mucronata*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 251. — *multicostata*, 1857, 252. — *obtusa*, BOULARD, exemple de longévité, 1854, VII. — *ovata*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 251. — *producta*, PERRIS, Hist. de ses métamorph. 1852, 603. — *producta*, *reflexicollis*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 251. — *rotundicollis*, 1857, 240. — *similis*, *sinuatocollis*, 1857, 251. — *sodalis*, 1857, 249. — *sublineata*, 1857, 236. — *subterres*, 1857, 252. — *tibialis*, 1857, 241. — *vicina*, 1857, 252.
- Medius Antilope**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 431. — *arenarius*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *fossor*, KIESEN-



WETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 427. — *Sus*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 320. — *tricornis*, KIESENWETTER, 1851, 427. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 682. — *tristis*, AUBÉ, Note sur deux esp. nouv. de Brachélytres, 1843, 92. — *unicornis*, KIESENWETTER, 1851, 427. — *id.*, SOUVERBIE, pris sur la plage et aux env. de Bordeaux, 1852, LXVII. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 682. — *Verres*, KIESENWETTER, 1851, 427. — *Vitulus*, PEYRON, 1858, 431.

**Blemus fulvescens**, AUDOUIN, faculté qu'il a de vivre dans la mer, 1833, XIV.

**Blethisa multipunctata**, LEPRIEUR, Col. des marais salants de Dieuze, 1845, XCIV. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 133.

**Bolboceras æneus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 94. — *australis*, DOUBLIER, trouvé près de Draguignan, 1846, cv. — *Bocchus*, LUCAS, trouvé dans l'estomac d'un *Bufo pantherinus*, 1853, v. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 175. — *excavatus*, GAUTIER DES COTTES, Descrip. de cette esp. du Sénégal, 1860, CXII. — *mobilicornis*, AUBÉ, Note sur cet Ins., 1852, 659. — *id.*, ROUGET, Détails sur son habitat aux envir. de Dijon, 1853, xxv. — *id.*, DE BARAN, pris plusieurs fois le soir au vol, 1856, LIX.

**Boletobius distigma**, FAIRMAIRE, Qques Col. nouv. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 72. — *pygmæus*, Baie de la Somme, 1852, 681. — *id.*, LEPRIEUR, env. de Bône, 1853, LX.

**Bolctophagus spinosulus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470.

**Bolitochara elegans**, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 71. — *id.*, Rectif. et descr. d'esp. nouv. de la Faune méditerranéenne, 1855, 312. — *lævior*, Miscellanea entomologica, 1859, 35.

**Bolltophagus crenatus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 112.

**Bombodes ursus**, SCHAUM, Lamellicornes mélitophiles, 1849, 288.

**Boreaphilus**, KRAATZ, Genre ident. avec celui des *Chevriaria* de Heer, 1857, LIII. — *hennengianus*, GHILIANI, trouvé dans les Alpes maritimes, 1848, XLIII. — *velox*, AUBÉ, trouvé dans le midi de la France, 1860, L.

**BOSTRICHIDES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. classif. de ce groupe, 1845, XVI.

**Bostrichophorus**, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 331.

**Bostrichus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Bostrichides, 1845, xvii. — *cornutus*, CHEVROLAT, esp. inédite trouvée à Fontainebleau, 1850, xxxvii. — *dactyliperda*, LUCAS, noyaux de *Phœnix dactylifera*, attaquées par cet Ins., 1846, c. — *limbatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 113. — *nigriventris*, LUCAS, huit exemplaires trouvés à Paris, 1849, xxx. — *pityographus*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, lvi. — *sexdentatus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 2<sup>e</sup> mém. sur les Ins. qui attaquent l'Olivier, 1840, 107. — *Thorelii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur qqes Col. trouvés dans la racine du *Smilax Chine*, 1845, xvi. — *typographus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472.

**Bothrideres contractus**, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, lvi.

**Bothriopterus chalybicolor**, DE CHAUDOIR, Carabiques nouveaux, 1835, 447.

**BRACHÉLYTRES**, LATREILLE, Présentation d'une livraison des nouv. Annales du Muséum, contenant un mém. sur les Ins. de la tribu des *Dentri crures*, 1832, 234. — *id.*, LEFEBVRE, Annonce d'un travail de M. Gravenhorst, 1833, xxxv. — *id.*, Communication d'une lettre de M. Gravenhorst sur sa monogr., 1834, v.

**Brachinien de la Chine**, BUQUET, doit être le type d'un genre nouveau, 1854, xlii.

**Brachinus**, BRULLÉ, Examen des G. *Brachinus* et *Ditomus*, 1835, 621. — *id.*, SOLIER, Réponse à l'examen de M. Brullé, 1836, 691. — *africanus*, REICHE, Détails sur la crépitation de certains Ins., 1849, lx. — *atricornis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 394. — *Bayardi*, SOLIER, Obs. sur les deux G. *Brachinus* et *Aptinus*, 1833, 463. — *id.*, PEYRON, 1858, 396. — *berytensis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 582. — *bipustulatus*, PEYRON, 1858, 396. — *bombarda*, SOLIER, 1833, 462. — *id.*, Nouv. obs. sur les G. *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 656. — *id.*, PEYRON, 1858, 396. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 751. — *brasiliensis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 201. — *causticus*, SOLIER, Observ. sur les deux G. *Brachinus* et *Aptinus*, 1833, 462. — *cinctus*, GORY, 1833, 198. — *complanatus*, GHILIANI, Note sur ses mœurs, 1847, xxxviii. — *crepitans*, SOLIER, 1833, 462. — *id.*, Nouv. obs. sur les G. *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 657. — *id.*, ROUGET, envoi de cinq individus garnis de parasites, 1849, lv. — *id.*, Notice

sur une product. parasite observée sur cet Ins., 1850, 21. — *id.*, LABOULBÈNE, il n'y aurait pas de production cryptogamique sur les *Brachinus* de M. Rouget, 1849, LXIII. — *id.*, major DAUMONT, vit de cadavres dans les Hautes-Pyrénées, 1851, CII. — *id.*, PEYRON, 1858, 394. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 751. — *dorsalis*, SOLIER, Obs. sur les deux G. *Brachinus* et *Aptinus*, 1833, 463. — *exhalans*, 1833, 462. — *id.*, PEYRON, 1858, 396. — *id.*, major BLANCHARD, trouvé à Misserghin, 1849, LXV. — *explodens*, SOLIER, 1833, 462. — *id.*, PEYRON, 1858, 396. — *fumans*, SOLIER, 1833, 463. — *galamensis*, GORY, 1833, 200. — *glabratus*, SOLIER, 1833, 462. — *Gory*, GORY, 1833, 199. — *græcus*, SOLIER, 1833, 463. — *hebraicus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 583. — *id.*, SCHAU, sans doute même espèce que *B. caspicus*, 1857, LXXX. — *id.*, REICHE, cette esp. est différente du *Br. caspicus* Dej., 1857, CLXII. — *id.*, PEYRON, 1858, 396. — *hispanicus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 751. — *humeralis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 719. — *immaculicornis*, SOLIER, 1833, 462. — *italicus*, NOUV. obs. sur les G. *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 656. — *lateralis*, SOLIER, Obs. sur les G. *Brachinus* et *Aptinus*, 1833, 463. — *Leprieur*, GORY, 1833, 200. — *nigricornis*, SOLIER, 1833, 462. — *nitidulus*, LUCAS, communic. de cette esp. décrite par M. Mulsant, 1854, XXXI. — *id.*, PEYRON, 1858, 394. — *oblongus*, SOLIER, 1833, 463. — *opini-noctialis*, GORY, 1833, 202. — *pallipes*, SOLIER, 1833, 463. — *psophia*, PEYRON, 1858, 394. — *psophia, quadripennis*, SOLIER, 1833, 462. — *Riffaud*, GORY, 1833, 198. — *ruficeps*, SOLIER, 1833, 463. — *rufus*, REICHE, Rev. de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 95. — *sclopeta*, SOLIER, 1833, 462. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 751. — *6-maculatus*, SOLIER, 1833, 463. — *Sichemita*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 581. — *id.*, REICHE, retrouvé en Palestine par M. de Saulcy, 1856, XLVI. — *thermarum*, SOLIER, 1833, 463.

**Brachycaulus**, FAIRMAIRE, Descr. de trois nouv. esp. de l'Océanie, 1843, 12. — *ferrugineus*, 1843, 14.

**Brachycerus** *egyptiacus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 654, 662. — *algius*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 629. — *argillaceus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 654. — *barbarus*, 1857, 661. — *europæus*, 1857, 662. — *lulosus*. GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 96. — *mauritanicus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 662. — *nodulosus*, 1857, 659. — *orbipennis*, 1857, 656. — *ornatus*, 1857, 658. — *Pradierii*, FAIRMAIRE, Miscellanea

entomologica, 1856, 536. — *sinuatus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 654, 662. — *undatus*, KIESENWETTER, 1851, 629.

**Brachychilus** *lituratus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 518. — *scutellaris*, 1859, 517.

**Brachyderes** *lepidopterus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *lusitanicus*, L. DUFOUR, il a pour parasite la *Hyalomyia dispar*, 1851, 63. — *id.*, *pubescens*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 630.

**BRACHYGLOSSES**, SOLIER, Essai d'une monogr. des Collaptérides, 1834, 499.

**Brachygnathus**, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, Patellimanes, 1851, 215, 290. — *festivus*, *fulgidus*, *intermedius*, *minutus*, *nitidipennis*, 1851, 217.

**Brachypterus** *cinereus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 578. — *gravidus*, 1851, 577. — *pubescens*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *pubescens*, *urticæ*, *vestitus*, KIESENWETTER, 1851, 578.

**Brachys** *tessellata*, SOLIER, Essai sur les Bupestides, 1833, 312.

**Brachytarsus** *varius*, BELLEVOYE, Obs. sur les mœurs de cette esp., 1858, CXL.

**Bradybœus** *cayennensis*, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 395.

**Bradybatus**, *Creutzeri*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 106. — *id.*, MELLIE, rencontré à Saint-Germain sur des Aubépines, 1850, xxiv. — *id.*, CHEVROLAT, pris à Fontainebleau, mode d'accoupl., 1851, L.

**Bradycellus** *puncticollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 761.

. **Bradyseelis**, REICHE, Notes synonymiques, 1359, 7.

**Brenthes**, LHERMINIER, leurs habitudes à la Guadeloupe, 1837, 504.

**Brenthus** *Doüei*, MONTROUZIER, Fanne de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 874. — *italicus*, LUCCIANI, trouvé en Société avec la *Formica nigra*, 1845, CXII.

**Brius** *mercurialis*, BOUDIER, larves de Braconite sorties de deux indiv., 1833, LXXIII. — *id.*, Faits analogues cités par divers membres, 1833, LXXIV.

**Bromius**, *obscurus*, *vitis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 130.

**Brontes** *planatus*, PERRIS, Hist. des Ins. du Pin maritime, 1853, 621.

**BRONTIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 102.

**Brosocosoma** *baldense*, JAVET, deux Col. fort rares trouvés dans le Tyrol, 1847, CVI.

**Brosceus** *cephalotes*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679 — *nobilis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 386. — *politus*, LUCAS, Note sur une var., 1852, XIV.

**Bruchus**, LHERMINIER, leurs habitudes à la Guadeloupe, 1837, 504. — *id.*, COSTA, Obs. sur div. esp., 1847, LXXXVIII. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730, et 1854, XXXVIII. — *id.*, AZAMBRE, larve desséchée dans des siliques de *Mimosa* de Palestine, 1857, LVII. — *id.*, AUBÉ et CHEVROLAT, Remarq. critiques sur les résultats du voyage de M. Blanchard en Sicile, 1844, LXXXVI. — *albolineatus*, BLANCHARD, Résultats d'un voyage en Sicile, 1844, LXXXII. — *albopunctatus*, *basalis*, 1844, LXXXIII. — *biguttatus*, 1844, LXXXII. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 730. — *bimaculatus*, *calabrensis*, BLANCHARD, 1844, LXXXII. — *canus*, 1844, LXXXIII. — *cinerascens*, 1844, LXXXIV. — *Cisti*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 341, — *concolor*, *costatus*, BLANCHARD, 1844, LXXXIV. — *dispar*, 1844, LXXXII. — *flavimanus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 651. — *fulviventris*, *gracilis*, BLANCHARD, 1844, LXXXII. — *grandicornis*, 1844, LXXXIII. — *histrion*, 1844, LXXXI. — *Icamæ*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur une nouv. esp., parasite des semences de l'*Icama*, 1858, CCXXX. — *inspergatus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *laticornis*, *latus*, BLANCHARD, 1844, LXXXIII. — *lentis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans des graines de Légumineuse d'Alger, 1859, CXCH. — *longeserratus*, COSTA, Obs. sur div. esp., 1847, LXXXVIII. — *lutescens*, BLANCHARD, 1844, LXXXIV. — *Meleagrinus*, 1844, LXXXI. — *microdon*, 1844, LXXXII. — *minimus*, 1844, LXXXIV. — *nanus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 650. — *nubilus*, BLANCHARD, 1844, LXXXII. — *oblongus*, 1844, LXXXIV. — *obscuricornis*, 1844, LXXXII. — *obsoletus*, 1844, LXXXIII. — *ovalis*, 1844, LXXXIV. — *pallidicornis*, 1844, LXXXII. — *Pandani*, larve et nymphe de qqes esp. qui vont être publiées, BLANCHARD, 1845, IV. — *plagiatus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 649. — *pubescens*, *pusillus*, BLANCHARD, 1844, LXXXIII. — *rufimanus*, *rufipennis*, 1844, LXXXII. — *scutellaris*, COSTA, 1847, LXXXVIII. — *signaticornis*, BLANCHARD,

1844, LXXXII. — *taorminensis*, 1844, LXXXIII. — *variegatus*, BLANCHARD, 1844, LXXXII. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 730. — *varipes*, RICHE et DE SAULCY, 1857, 651.

**Bryaxis**, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 103. — *abdominalis*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 506. — *antennata*, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 118. — *Chevricri*, 1844, 114. — *clavata*, PEYRON, Col. des env. de Taroüs, 1858, 415. — *dentata*, AUBÉ, Révision de la famille des Psélaphiens, 1844, 112. — *depressa*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *cucera*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 120. — *fossulata*, 1844, 106. — *id.*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1853, 506. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *fulviventris*, TOURNIER, Diagnoses de trois Col. nouveaux, 1859, xcvii. — *id.*, DESMAREST, rectification : ces diagnoses sont de M. Tournier, et non de M. de Saussure, 1859, clxiii. — *furcata*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 112. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 795. — *id.*, MOTSCHULSKY, diffère de celui de Barbarie, 1859, ccvi. — *Goryi*, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 117. — *hæmatica*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 506. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 110. — *id.*, JACQ. DU VAL, prise près de Bondy, au milieu de *Myrmica rubra*, 1849, L. — *Helferi*, AUBÉ, 1844, 109. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du Midi et de Catalogne, 1851, 402. — *id.*, PEYRON, 1858, 416. — *hæmoptera*, AUBÉ, 1844, 108. — *heterocera*, 1844, 119. — *impressa*, 1844, 117. — *id.*, Notes sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 402. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *id.*, PEYRON, 1858, 416. — *Juncorum*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 113. — *id.*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, CHEVROLAT, 1833, 473. — *lævicollis*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 121. — *Lebasii*, 1844, 118. — *Lefeburei*, 1844, 108. — *id.*, CHEVROLAT, 1833, 473. — *id.*, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *limnophila*, PEYRON, 1858, 414. — *longicollis*, AUBÉ, 1833, 506. — *nigropygialis*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 735. — *Opuntia*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 115. — *paludosa*, PEYRON, 1858, 416. — *Reichei*, DE MOTSCHULSKY, diffère du *Bry. furcata*, de Barbarie, 1859, ccvi. — *rubra*, AUBÉ, 1844, 115. — *rubricunda*, 1844, 116. — *rubripennis*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *sanguinea*, 1833, 506. — *id.*, Révision de la fam. des Psé-

laphiens, 1844, 104. — *id.*, CHEVROLAT, 1833, 473. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 402. — *Schuppelii*, AUBÉ, 1844, 110. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722. — *tibialis*, AUBÉ, 1844, 106. — *tomentosa*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 113. — *xanthoptera*, 1844, 107. — *id.*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507.

**Bubas Bison**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 104. — *id.*, AZAMBRE, Col. recueillis en Italie, 1856, XII. — *Bubalus*, 1856, XII.

**Bupreste**, BOISDUVAL, larve qui a vécu vingt ans dans un meuble d'acajou, 1853, LXIV.

**Bupreste nouveau**, BARTHÉLEMY, envoyé d'Égypte, 1835, LXXII.

**BUPRESTIDÆ**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 709.

**BUPRESTIDES**, DESMAREST, Desc. de deux nouv. esp., 1843, 17. — *id.*, SOLIER, Buprestides, 1833, 261. — *id.*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 121. — *id.*, SOLIER, Rectification à l'essai sur les Buprestides, 1834, XCIX. — *id.*, SPINOLA, Lettre sur un groupe de cette famille, 1837, 101. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Lacordaire, 1837, 481. — *id.*, BLANCHARD, Rem. sur les métam. observées, 1843, 221. — *id.*, DUFOUR, Nouv. obs. sur la situation des stigmates thoraciques, 1844, 203. — *id.*, BLANCHARD, Proposition de rapprocher ce groupe de celui des Longicornes, 1845, CXVI.

**Buprestides du Chili**, FAIRMAIRE, envoi d'un mém. sur de nouv. esp. 1858, CCXIII.

**Buprestis**, SOLIER, Essai sur les Buprestides, 1833, 279. — *appendiculata*, 1833, 281. — *artensis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 250. — *austriaca*, SOLIER, 1833, 281. — *Bellemaræi*, LUCAS, Note sur cette esp., 1853, LXVII. — *berolinensis*, AUDOUIN, tronc de Hêtre sillonné par sa larve, 1836, XVII. — *blanda*, SOLIER, 1833, 281. — *carbunculus*, GORY, Descr. de deux Col. nouv., 1833, 68. — *Carolini*, LUCCIANI, trouvé en grand nombre sous des écorces de *Juniperus communis*, 1845, CXII. — *convexa*, MONTROUZIER, 1860, 250. — *Cupressi*, SOLIER, 1833, 280. — *decora*, *decostygma*, 1833, 281. — *erythrocephala*, MONTROUZIER, 1860, 249. — *festiva*, LUCCIOI, vit et se métam. dans les racines sèches du *Juniperus communis*, 1845, CXII. — *flavomaculata*, SOLIER, 1833, 280. — *gigantea*, LABOULBÈNE, Ques rem. anatomiques sur cette esp., 1857, CIV. — *lepida*, GORY, Trois esp. de Col. nouv., 1832, 383. — *lineata*, luteo-

*signata*, SOLIER, 1833, 281. — *Mariana*, LUCAS, Obs. pour servir à son hist., 1844, 315. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans des troncs de Pins, midi de la France, 1849, LXXXII. — *micans*, SOLIER, 1833, 281. — *nitens*, Fourcroy, JACQ. DU VAL, synonyme de *Carabus avatus*, 1857, 96. — *plebeja*, LUCAS, trouvés en immense quantité à Orléansville, 1856, XCVI. — *punctata*, *rustica*, SOLIER, 1833, 280. — *purpurascens* Fourcroy, var. A, JACQ. DU VAL, synonyme de *Carabus purpurascens*, var. B, synonyme de *Carabus catenulatus*, var. C, synonyme de *Carabus convexus*, 1857, 96. — *Solieri*, FAIRMAIRE, carnassier à l'état parfait, 1849, IV. — *tæniata*, LUCCIANI, en grand nombre sous les écorces du *Juniperus communis*, 1845, CXII. — *id.*, FAIRMAIRE, pris aux env. de Bordeaux, 1849, IV. — *tarda*, SOLIER, 1833, 281. — *undata*, LUCCIANI, 1845, CXII. — *Varennesi*, MONTROUZIER, 1860, 248.

**Byrrhus**, REICHENBACH, Note sur leur habitat et sur leurs mœurs, 1844, LIX. — *id.*, MULSANT, Certaines espèces se nourrissent d'herbe, 1844, LIX. — *æneus*, *arcuatus*, CHEVROLAT, trouvés à Fontainebleau, 1833, 470. — *arenarius*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93. — *aureomicans*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 582. — *bigorrensis*, 1851, 581. — *dorsalis*, CHEVROLAT, 1833, 470. — *fasciatus*, KIESENWETTER, 1851, 583. — *lobatus*, 1851, 580. — *murinus*, CHEVROLAT, 1833, 470. — *pilula*, KIESENWETTER, 1851, 583. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *pyreneus*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *setiger*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93. — *signatus*, GAUBIL, pris aux env. de Phalsbourg (Meurthe), 1847, XIV. — *sorresiacus*, FAIRMAIRE, Diagnose de nouv. esp. de Col., 1860, 338. — *Suffriani*, KIESENWETTER, 1851, 580. — *rarius*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683.

**Bythinus**, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 126. — *bulbifer*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 508. — *id.*, Révision de la Fam. des Psélaphiens, 1844, 133. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *Burellii*, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 136. — *Chevrolatii*, *clavicornis*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 508. — *clavicornis*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1834, 127. — *crassicornis*, 1844, 132. — *Curtisii*, CHEVROLAT, 1833, 473. — *id.*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *id.*, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 134. — *femoratus*, 1844, 132. — *glabricollis*, *globuli-*



*palpus*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 508. — *laticollis*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 735. — *laniger*, AUBÉ, 1833, 507. — *macropalpus*, 1833, 508. — *Mulsanti*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 402. — *nigriceps*, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 128. — *nigripennis*, 1844, 131. — *nodicornis*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 135. — *id.*, DELAROUZÉE, env. d'Hyères, 1858, cv. — *Pictetii*, TOURNIER, Diagnoses de trois Col. nouv., 1859, xcvi. — *id.*, DESMAREST, Ces diagnoses sont de M. Tournier et non de M. de Saussure, Erratum, 1859, CLXIII. — *puncticollis*, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 508. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 129. — *securiger*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 507. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 136. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *uncicornis*, AUBÉ, 1844, 137. — *validus*, 1844, 130.

## C.

**Cabirus minutissimus**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 253. — *id.*, REICHE, retrouvé en Palestine, 1856, XLVII.

**Cacicus**, SOLIER, Essai sur les Collaptérides, 1836, 639. — *americanus*, 1836, 641.

**Cacostola vagclincata**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 527.

**Cælorrhina simillima**, SCHAU, Lamellicornes mélitophiles 1844, 350.

**Callus xantholoma**, REICHE, Col. trouvés aux env. de Granville, 1858, CLXXII.

**Calamobius gracilis**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Rapport au Ministre sur cet insecte, 1847, xvii.

**Calandra aurofasciata**, DE BRÊME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 308. — *granaria*, MILNE-EDWARDS, Acide urique formé dans son corps, 1834, LXIV. — *id.*, LHERMINIER, Dégâts qu'elle cause à la Guadeloupe, 1837, 504. — *hemiptera*, FAIRMAIRE, Larves et nymphes de la Guadeloupe, 1856, LXXXV. — *Palmarum*, BUREAU, Larve trouvée

dans un Coco, 1853, XXVII. — *id.*, MARCO A. ROJAS, Études entomologiques, 1857, 336. — *securifera*, GAEDE, *Calandra securifera*, 1833, 458.

**Calathus** *fulvipes*, *fuscus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *gallicus*, env. de Paris, 1846, LV. — *græcus*, *latus*, *melanocephalus*, PETRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 370. — *ochropterus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *Solieri*, BASSI, Descr. de qqes nouv. esp. de Col. d'Italie, 1834, 466.

**Calceida** *ancipennis*, BUQUET, Descr. de qqes Carabiques nouv., 1835, 613. — *pallidipennis*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 437. — *plicaticollis*, BUQUET, Descr. de qqes Carabiques nouv., 1835, 614. — *rufula*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 188. — *splendida*, 1833, 189.

**Callia** *azurea*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 60.

**Calliœera** *ænea*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Saint-Germain, 1849, LX.

**Callichroma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 556. — *albitarsa*, 1833, 557. — *alpina*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, BARTHÉLEMY, reçue de Tunis, 1835, LXXII. — *chilensis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 487. — *festiva*, AUD.-SERVILLE, 1833, 558. — *sericea*, *suturalis*, *velutina*, *virens*, *vittata*, 1833, 557.

**Callienemis** *Latreillei*, FAIRMAIRE, recueilli à Arcachon, fin de juin, 1859, CXXIX. — *id.*, DELAROUZÉE, trouvé aux env. d'Ilyères, 1858, CV. — *id.*, AUBÉ, trouvé dans le midi de la France, 1860, L. — *truncatifrons*, L. DEFOUR, Note sur cet Insecte, 1850, LIV.

**Callidema** *Boussingaultii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Caractères de ce nouv. genre, 1843, IX.

**Callideriphus** *grossipes*, *lætus*, *testaceicornis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 505. — *tenuis*, 1859, 506.

**Callistes**, AUDOUIN, Plaque de plomb rongée par des larves, 1833, LXXVI.

**Callidium**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 74. — *id.*, CHEVROLAT, belle espèce découverte à Auteuil, 1855, CXI. — *abdominale*, GHI-  
LIANI, Col. en Piémont, 1847, 107. — *acuminatum*, CHEVROLAT, Note sur les Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 660. — *alni*, GHI-  
LIANI, 1847, 107. — *annulare*, CHEVROLAT, 1851, 660. — *bajulus*,

AUD.-SERVILLE, 1834, 77. — *barbatum*, *bifasciatum*, CHEVROLAT, 1851, 660. — *bigustatum*, SALLÉ, Descr. de dix nouv. esp. de Col. de la République dominicaine, 1856, 688. — *bimaculatum*, CHEVROLAT, 1851, 660. — *clavipes*, AUD.-SERVILLE, 1834, 75. — *compressum*, CHEVROLAT, 1851, 660. — *dilatatum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 76. — *id.*, GHILIANI, 1847, 107. — *femoratum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 76. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Saint-Germain, 1849, LX. — *ferum*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *glaucum*, Note sur les Longicornes de la collection de Bancks, 1851, 660. — *hirtum*, 1851, 658. — *humerales*, GHILIANI, 1847, 107. — *hungaricum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 76. — *insubricum*, GHILIANI, 1847, 124. — *lineatum*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *longipes*, 1851, 658. — *luridum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 75. — *minutum*, CHEVROLAT, 1851, 661. — *mucronatum*, 1851, 660. — *id.*, nouveau, pris à Auteuil, 1845, CXI. — *obscurum*, Note sur les Longicornes de la collection de Bancks, 1851, 660. — *rufipes*, AUD.-SERVILLE, 1834, 76. — *id.*, GHILIANI, 1847, 107. — *id.*, BOIELDIEU et FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Saint-Germain, 1851, LIII. — *sanguineum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 76. — *id.*, GOUREAU, Note pour servir à son histoire, 1843, 99. — *id.*, DESMAREST, Creusets en plomb percés par cet Ins., 1844, XXVI. — *id.*, GOUREAU, Son organisation céphalique, 1844, 437. — *id.*, Position de la première paire de stigmates, 1844, 441. — *id.*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1855, LXXXVIII. — *id.*, JACQ. DU VAL, Remarq. et notes div., 1857, 97. — *submetallicum*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 511. — *sulcatum*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *thoracicum*, ROUZET, pris en abondance dans un chantier de Paris, 1845, CXII. — *id.*, GHILIANI, 1847, 107. — *id.*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 547. — *undatum*, GHILIANI, 1847, 137. — *unifasciatum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 76. — *Id.*, GHILIANI, 1847, 107. — *variable*, AUD.-SERVILLE, 1834, 75. — *variegatum*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *violaceum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 75.

**Callipogon**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 140. — *barbatum*, 1832, 142.

**Callirhipis**, DE LAPORTE, Monographie du groupe des Rhipicérides, 1834, 241. — *bicolor*, 1834, 255. — *brunnea*, 1834, 251. — *Chil-dreni*, 1834, 254. — *chilensis*, 1834, 257. — *Dejcanii*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 169. — *id.*, DE LAPORTE, 1834, 244. — *Goryi*, 1834, 253. — *javanica*, 1834, 245. — *Lacordairei*, 1834, 249. —

- Latreillei*, 1834, 248. — *Lherminieri*, 1834, 250. — *orientalis*, 1834, 247. — *ruficornis*, 1834, 248. — *scapularis*, 1834, 256. — *vestita*, 1834, 252.
- Callisphyris** *apicicornis*, *asphaltinus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 497. — *macropus*, *semicaligatus*, 1859, 496.
- Callisthenes**, FISCHER DE WALDHEIM, Détails sur ce genre, 1842, XLIV. — *Fischeri*, *Motschultskii*, *Panderi*, 1842, XLIV. — *Reichei*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 4<sup>e</sup> espèce trouvée en Perse, 1842, XLIV.
- Callistus**, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, Patellimanes, 1851, 229. — *coarctatus*, *lunatus*, 1851, 229. — *lunatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 364. — *4-pustulatus*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 215. — *5-maculatus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1851, 229.
- Callyntra**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 335. — *multicostata*, 1836, 337. — *rufipes*, 1836, 340. — *Servillei*, 1836, 341. — *vicina*, 1836, 339.
- Calochromus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Monogr. de deux nouv. genres de Col., 1833, 158. — *glaucopterus*, 1833, 159.
- Calocomus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 194. — *hamatiferus*, 1832, 195.
- Calodera** *atricollis*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 303. — *colorata*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. européens, nouv., 1859, CLXXXIV. — *longitarsis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 404. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 417. — *longitarsis*, *nigricollis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *picina*, AUBÉ, 1850, 303. — *propinqua*, 1850, 302. — *rubicunda*, 1851, 404. — *rufescens*, CH. BR. DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la Faune franç., 1859, CXXX. — *sulcicollis*, AUBÉ, 1850, 302.
- Calopus** *serraticornis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127.
- Calosoma** *europunctatum*, DEMARY, Présentation d'un indiv. vivant, 1839, XLII. — *Helenæ*, DOUÉ, Commun. de cette esp., 1859, XLII. — *indagator*, BUQUET, Individu monst., 1846, XCI. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 109. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 750. — *inquisitor*, GHILIANI, 1847, 102. — *id.*, LUCAS, trouvé en Algérie, vallée de Medina, 1854, LXX. — *punctiventre*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 567. — *sycophanta*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvé en très-grand nombre dans le bois de Lardy, 1847, L. — *id.*, FAIRMAIRE, élytres ne recouvrant que la moitié de l'abdomen, 1849, IV. — *id.*, JACQ. DU VAL, belle aberration, 1849, LXXIII. — *id.*, COQUEREL, recueillis à Lisbonne sur les eaux du Tage après un orage, 1850, XLIV.

**Calosomes**, TROBERT, Dessins représentant qqes Ins. présumés nouv., 1848, xv.

**Calymmaphorus**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 245. — *cucullatus*, 1840, 246. — *ursinus*, 1840, 247.

**Calyptobium**, AUBÉ, Note sur ce genre, 1843, 241. — *caularum*, 1843, 244. — *Kunzei*, 1843, 245. — *id.*, COQUEREL, Note pour servir à l'histoire des *Calyptobium*, 1848, 181. — *nigrum*, AUBÉ, 1843, 246. — *nov. sp.*, CHEVROLAT, trouvé dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII. — *Villæ*, AUBÉ, 1843, 243. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, identique avec l'*Holoparamecus depressus*, 1844, v.

**Calyptocephalus fasciatus**, Goryi, *thoracicus*, DE LAPORTE, Essai d'une révision du genre Lampyre, 1833, 130.

**Calyptocerus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 177. — *Leboucherii*, 1843, 178.

**Calyptopsis**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 269. — *Emondi*, 1835, 271. — *Jeremias*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 197. — *Solieri*, 1857, 199.

**Camaragnathus**, LACORDAIRE, Ce genre avait été décrit précédemment, 1849, LXXVIII.

**Campsidia populnea**, LUCAS, occupant les gibbosités du *Populus tremulæ*, 1846, XLVII. — *id.*, REICHE, reçu cette esp. des États-Unis d'Amérique, 1846, XLVIII.

**Campsosternus fulgens**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 141.

**Camptodontus clivinoides**, DE LAPORTE, Mém., sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 393.

**Camptorhinus statua**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 110. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471.

**Camptorhynchus ambiguus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 894. — *artensis*, 1860, 895.

**Campylus denticollis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 162. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 586. — *linearis*, LATREILLE, 1834, 162. — *id.*, GHILIANI, 1847, 90. — *id.*, LEPAIGE, Note sur son accouplement avec le *C. mesomelas*, 1845, XIII. — *id.*, AUBÉ et REICHE, Confirm. de l'observ. de M. Lepaige, concl. à en tirer, 1845, XIII. — *id.*, GHILIANI, 1847, 90. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *mesomelas*, LATREILLE, 1834, 162. — *id.*,

- GHILIANI, 1847, 90. — *omalisinus*, trouvé dans les Alpes maritimes, 1848, XLIII. — *parallelcollis*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 336.
- Cantharis abdominalis**, GHILIANI, Col. en Piémont, 1847, 127. — *circumdata*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *clypeata*, GHILIANI, 1847, 114. — *femoralis*, 1847, 92. — *italica*, 1847, 114. — *janthina*, FAIRMAIRE, Diagnoses de nouv. esp. de Col., 1860, 338. — *lateralis*, GHILIANI, 1847, 114. — *nigricans*, 1847, 127. — *nigricornis*, 1847, 112. — *rubriventris*, FAIRMAIRE, 1860, 338. — *ruficollis*, *tristis*, GHILIANI, 1847, 127. — *vesicatoria*, DERT, var. trouvée aux env. de Montpellier par M. Caron, 1857, LXXIII. — *violacea*, GHILIANI, 1847, 127.
- Cantharocnemis spondylioides**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 132.
- Capnodis**, SOLIER. Essai sur les Buprestides, 1833, 282. — *cariosa*, *lencbricosa*, *tenebrionis*, 1833, 283. — *tenebrionis*, GHILIANI, 1847, 89. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Détails de mœurs, 1856, LXX.
- Carabique**, LUCAS, larve envahie par un Cryptogamme, 1849, XXXIX. — *id.*, CHEVROLAT, esp. très-curieuse du détroit de Magellan, 1854, LV.
- Carabiques**, BUQUET, Communic. d'une lettre de M. Leprieur sur ses chasses en Algérie, 1855, x. — *id.*, Communic. de la descr. de quatre esp. nouv., 1855, LXIV. — *id.*, SALLÉ, Communic. d'une lettre de M. le baron de Chaudoir annonçant divers mém. sur de nouv. esp., 1858, CCXXXV. — *id.*, A. DEYROLLE, Quantité considérable rejetées par la mer sur les côtes du Brésil, 1847, xcvi. — *id.*, DELAROUZÉE, Détails sur un genre voisin des *Anophthalmus*, 1858, cv.
- Carabus**, A. DEYROLLE, Note pour servir à l'hist. des esp. d'Espagne et de Portugal. 1852, 237. — *id.*, FAIRMAIRE, Présentation d'une esp. de Sicile, 1857, XXI. — *id.*, nouv. esp. découverte dans les Pyrénées, 1857, XXIV. — *id.*, BUQUET, Dépôt d'un mem. de M. Thomson sur des esp. nouv., 1856, XLI. — *id.*, DE CHAUDOIR, Communic. d'une esp. voisine du G. *Procrasticus* de White, 1859, CXXX. — *Adonis*, H. LUCAS, Note sur cet Ins., 1855, LXXII. — *id.*, THOMSON, Descr. de trois Carabes, 1856, 335. — *id.*, Communic. de deux indiv. des montagnes de la Grèce, 1856, xxx. — *alpinus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 125. — *alternans*, SOLIER, Descr. de qqes esp. nouv. de la fam des Carabiques, 1835, 118. — *antiquus*, A. DEYROLLE, 1852, 245. — *arvensis*, GHILIANI, 1847, 133. — *Aumontii*. LUCAS,

Communic. d'un Col. nouv. qu'il décrira sous ce nom, 1849, xcii. — *id.*; Note sur la femelle de cette esp., 1857, clvi. — *id.*; FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 747. — *id.*; GAUTIER DES COTTES, abondamment récolté dans le Maroc, 1860, lv. — *auratus*, DOUMERC, Note sur qqes monstruosités entomolog., 1834, 171. — *id.*, LUCAS, Plusieurs dépress. anorm. sur le thorax et les élytres, 1845, xxxvii. — *id.*; GHILIANI, 1847, 132. — *id.*, KRAATZ, pris dans les grottes de la Carniole, 1858, lxxxix. — *auronitens*, GHILIANI, 1847, 132. — *barbarus*, REICHE, Note sur div. Col., 1859, 637. — *basilicus*, CHEVROLAT, reçu de Porto-Rico, 1836, xlvii. — *Bayandi*, SOLIER, Description de qqes Carabiques nouv., 1835, 117. — *baticus*, A. DEYROLLE, 1852, 247. — *Bonelli*, GHILIANI, 1847, 134. — *brevis*, A. DEYROLLE, 1852, 246. — *id.*, DE LA FERTÉ-SÈNECTÈRE, Descr. de qqes Carabiques nouv. d'Espagne et de Portugal, 1847, 448. — *campestris*, FAIRMAIRE, trouvé devant Sébastopol, 1855, xxxi. — *cancelatus*, LEPRIEUR, larve rapportée à cette espèce, 1848, lxxxii. — *id.*, Carabes les plus communs à Bourbonne, 1845, xcv. — *id.*, PIERRET, individu monstrueux pris en Aragon, 1846, lxxxii. — *id.*, PIERRET père, espèces prises en Aragon, 1846, lxxxiii. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. sur l'indiv. monstrueux présenté par M. Pierret, 1846, lxxxv. — *id.*, REICHE, Note sur le même indiv., 1846, lxxxvii. — *id.*, GHILIANI, 1847, 139. — *id.*, LUCAS, Cas d'anatomie path. trouvé aux env. de Paris, 1849, lxi. — *cantabricus*, A. DEYROLLE, 1852, 243. — *castillanus*, 1852, 242. — *Carcel*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 211. — *catenulatus*, PIERRET père, 1846, lxxxiii. — *id.*, GHILIANI, 1847, 115. — *celtibericus*, A. DEYROLLE, 1852, 247. — *clathratus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 720. — — *cælestis*, STEUART, Descr. d'une nouv. esp. du nord de la Chine, 1855, 75. — *complanatus*, A. DEYROLLE, 1852, 246. — *convexus*, GHILIANI, 1847, 136. — *cordatus*, A. DEYROLLE, 1852, 252. — *Cristoforii*, SPENCE, Descr. d'une nouv. esp. de Carabe, 1833, 500. — *id.*, DE JOUSSELIN, hauteur à laquelle il se trouve, 1834, xl. — *cyaneus*, JAVET, indiv. ayant quatre pattes du côté gauche, 1846, lxxv. — *id.*, GHILIANI, 1847, 121. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *cychrocephalus*, FAIRMAIRE, Diagnose latine, 1857, clvi. — *id.*; décrit par Dejean sous le nom de *Calosoma asperatum*, 1859, cliv. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 748. — *id.*, REICHE, Note sur div. Ins., 1859, 638. — *cychropalpus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 356. — *depressus*, GHILIANI, 1847, 125. — *id.*, var. *Linderei*, TOURNIER, descr. de cette var., 1860, xxvi.

— *Deyrollei*, A. DEYROLLE, 1852, 241. — *Dufourii*, 1852, 238. — *Egyptii*, 1852, 243. — *id.*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1847, 450. — *Elysi*, THOMSON, 1856, 337. — *errans*, A. DEYROLLE, 1852, 239. — *Favieri*, FAIRMAIRE, c'est sous ce nom que doit être désigné le *C. Lucasii* Fairm., 1859, L. — *festivus*, DE BARAN, trouvé au Mont-Dore, par M. Delarouzée, 1856, LXXVI. — *fiduciarus*, THOMSON, 1856, 338. — *gallæcianus*, A. DEYROLLE, 1852, 251. — *gemmatus*, GHILIANI, 1847, 132. — *Ghilianii*, A. DEYROLLE, 1852, 252. — *id.*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1847, 447. — *glabratus*, GHILIANI, 1847, 121. — *glacialis*, GAUTIER DES COTTES, Descr. de 3 Col. nouv. d'Europe, 1859, CCX. — *id.*, TOURNIER, n'est qu'une var. du *C. depressus*, 1860, XXV. — *id.*, GAUTIER DES COTTES Réponse aux obs. de M. Tournier, 1860, XLVII. — *id.*, Nouv. descr., avec fig., 1860, LXXV. — *græcus*, PEYRON, 1858, 355. — *granulatus*, LEPRIEUR, 1845, XCV. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *guadarriamus*, DE LA FERTÉ-SÉNECTÈRE, 1847, 445. — *hellus*, A. DEYROLLE, 1852, 246. — *hispanus*, L. DUFUR, Note sur un nouv. habitat de cet Ins., 1856, XCV. — *id.*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 286. — *Honoratii*, BRUYAT, var. d'*auratus*, dont les élytres et les bords du corselet sont rugueux, 1847, XL. — *hortensis*, DE CASTELNAU, Commun. de sa larve, 1837, LV. — *id.*, PIERRET père, 1846, LXXXIII. — *id.*, GHILIANI, 1847, 136. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *italicus*, GHILIANI, 1847, 87. — *Lafossei*, FEISTHAMEL, Lettre sur cet Ins., 1844, LXXV. — *id.*, Descr. de cette nouv. esp. de la Chine, 1845, 103. — *Lasserei*, DODÉ, Commun. d'un indiv. pris aux env. de Tours, 1855, LXXXVI. — *lateralis*, A. DEYROLLE, 1852, 250. — *Latreillei*, GHILIANI, 1847, 136, 138. — *latus*, A. DEYROLLE, 1852, 246. — *Lefebvrei*, GÈNÈ, cet Ins. a été retrouvé dans la Calabre, 1833, XLIV. — *lineatus*, A. DEYROLLE, 1852, 249. — *lotharingus*, DUPONCHEL, 1834, 286. — *id.*, Note explicative de la fig. de la partie 2 de la pl. IV, 1841, 199. — *id.*, indiv. monstrueux, 1841, XX. — *id.*, LUCAS, Note sur une variété curieuse, 1859, VI. — *Lucasii*, A. DEYROLLE, 1852, 247. — *id.*, FAIRMAIRE, doit être désigné sous le nom de *Favieri*, 1859, L. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 748. — *Luczotii*, A. DEYROLLE, 1852, 252. — *id.*, DE LAPORTE, Mém. sur 50 espèces nouv. ou peu connues d'Ins., 1892, 393. — *lusitanicus*, A. DEYROLLE, 1852, 245. — *macrocephalus*, 1852, 242. — *Maillei*, SOLIER, 1835, 114. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 748. — *melancholicus*, JACQ. DU VAL, Observ.



recueillies dans un voyage à Prades, 1850, xxiv. — *id.*, LUCAS, Note au sujet de plusieurs indiv. des env. de Tanger, 1858, iv. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 749. — *monilis*, GHILIANI, 1847, 125. — *monticola*, 1847, 121. — *Mulsanti*, GAUBIL, présenté comme esp. nouv., 1852, vii. — *id.*, REICHE et LABOULBÈNE, C'est une des nombreuses var. du *C. catenulatus*, 1852, xxxvi. — *nitens*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *nodulosus*, GAUBIL, pris dans les env. de Phalsbourg, 1847, xiv. — *id.*, LUCAS, Note sur un cas de difformité, 1847, xxxix. — *id.*, Cas de monstruosité fort remarquable, 1848, xviii. — *numida*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 748. — *id.*, REICHE, Notes entomolog., 1859, 638 — *Olympiæ*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Diagnose par M. Sella, de Turin, 1855, lxxxvi. — *paphius*, PEYRON, 1858, 355. — *planatus* Chaud., FAIRMAIRE, il faut lui rapporter le *Thomsonii* Fairm., 1859, cliii. — *Prevost*, GORY, Centurie de Carabiques, 1833, 210. — *punctato-auratus*, LUCAS, Cas de tératologie curieux, 1849, lxxxvii. — *purpurascens*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *pyrenæus*, FAIRMAIRE, envoyé par M. Bigot, des Pyrénées-Orientales, 1856, lxxxi. — *Rossii*, GHILIANI, 1847, 102, 121. — *rugosus*, A. DEYROLLE, 1852, 247. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 747. — *rutilans*, JACQ. DU VAL, 1850, xxiv. — *id.*, FAIRMAIRE, envoyé par M. Bigot, des Pyrénées-Orientales, 1856, lxxxi. — *Servillei*, REICHE, 1859, 638. — *Solieri*, GHILIANI, 1847, 113. — *splendens*, PIERRET père, 1846, lxxxiii. — *id.*, BUQUET, indiv. monstrueux, 1846, xci. — *Stewarsii*, A. DEYROLLE, 1852, 240. — *sylvestris*, GHILIANI, 1847, 136. — *Thomsonii*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 726. — *id.*, doit être reporté au *C. planatus* Chaud., 1859, cliii. — *trabuccarius*, 1857, 727. — *Varvasi*, SOLIER, 1835, 115. — *Victor*, PEYRON, 1858, 355. — *vomax*, FAIRMAIRE, trouvé devant Sébastopol, 1855, xxxi. — *Withei*, A. DEYROLLE, 1852, 249.

**Carcinops**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 83. — *conjunctus*, 1855, 89. — *consors*, 1855, 88. — *corticalis*, Descr. d'un genre nouv. et de plus. esp. nouv., 1857, 426. — *delicatulus*, Species auctorum invisæ et oblitæ, 1857, 164. — *dominicanus*, Histérides, 1855, 97. — *madagascariensis*, 1855, 99. — *minimus*, 1855, 90. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 787. — *misellus*, 1855, 95. — *Opuntia*, 1855, 100. — *plebejus*, 1855, 98. — *pumilio*, 1855, 91. — *tantillus*, 1855, 93. — *tenellus*, 1855, 94. — *Troglodytes*, 1855, 92. — *viridicollis*, 1855, 96.

**Cardigenus**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 492. — *cicatricosus*, 1836, 494. — *laticollis*, 1836, 495.

**Cardiomera**, BASSI, Note sur le G. *Cardiomera*, 1834, 319. — *Genei*, 1834, 324. — *id.*, JACQ. DU VAL, pris au bord d'un torrent, 1855, LXXI. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 782.

**Cardiophorus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 152. — *abdominalis*; AUBÉ, Descr. de quelques Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 337. — *axillus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *biguttatus*, LATREILLE, 1834, 153. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 586. — *cinereus*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *cyanipennis*, LUCAS, Communic. de cette esp. décrite par M. Mulsant, 1854, xxxii. — *craratus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 728. — *maculicollis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 420. — *ruficollis*, *rufipes*, LATREILLE, 1834, 153. — *rufipes*, KIESENWETTER, 1851, 586. — *tenellus*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 421. — *thoracicus*, LATREILLE, 1834, 153.

**Cardiorhinus** *plagiatus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 145.

**Carpophilus** *searpustulatus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 593.

**Cartallum**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 94. — *ruficolle*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, AUD.-SERVILLE, 1834, 94. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734.

**Carterus**, *cribratus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 387. — *femoralis*, *microcephalus*, *rotundicollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 756. — *tomentosus*, 1858, 755.

**Caryoborus**, BOISDUVAL, Col. américain trouvé vivant dans une serre à Paris, 1857, xcii. — *id.*, FAIRMAIRE, Communic. de plus. indiv. trouvés dans des Cocos, 1860, LXXVII.

**Casnonia**, DE CASTELNAU, Obs. entomologiques, 1842, xiii. — *geniculata*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 180. — *ludoviciana*, SALLÉ, Col. nouv. de l'Amérique, 1849, 297. — *maculicornis*, GORY, 1833, 180. — *4-maculata*, 1833, 179. — *4-signata*, DE CASTELNAU, 1832, 387. — *transversalis*, 1832, 388.

**Cassida**, DOUË, Exemple de longévité remarquable, 1846, xci. — *Bohemanni*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de qqes Col. nouv., 1860, 346. — *Filaginis*, PERRIS, Signalement de sept Col. nouv. du

départ. des Landes, 1855, LXXIX. — *nebulosa*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Feuilles de Betteraves ravagées par ses larves, 1846, LXXI. — *nigriceps*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 92. — *palæstina*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 55. — *rotundicollis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 348. — *thoracica*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 98.

**Cassidarum monographia**, BUQUET, Compte rendu du 1<sup>er</sup> volume de l'ouvrage de M. Bohemann, 1851, LXXIII.

**Catadromus impressus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 240.

**Cataphronetis brunnea**, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 720.

**Cataplesis**, SOLIER, Mém. sur quatre genres de la fam. des Carnassiers terrestres, 1836, 595. — *nitida*, 1836, 597.

**Catascopus depressus**, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 441. — *Lafertei*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 238. — *madagascariensis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 205. — *4-signatus*, DE LAPORTE, 50 esp. d'Ins. nouv. ou peu connus, 1832, 392. — *rufipes*, GORY, 1833, 204.

**Cathartus**, REICHE, Obs. entomologiques, 1854, 77. — *cassia*, 1854, 78.

**Catognatha gracilis**, FAIRMAIRE et GERMAIN. Col. du Chili, 1859, 529.

**Catops agilis**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *colonoides*, trouvé près de Saint-Germain-en-Laye, 1857, XCII. — *coracinus*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la Faune française, 1859, CXXXI. — *meridionalis*, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 326. — *picipes*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LVI. — *quadraticollis*, AUBÉ, 1850, 326. — *scitulus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *silphoides*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *umbrinus*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LVI.

**Catopsimorphus**, TAPPES, esp. probablement nouv. trouvée dans le dép. du Cher, 1858, CCXIV. — *id.*, REICHE, C'est une var. de l'*arenarius*, 1858, CCXIV. — *id.*, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 324. — *arenarius*, ROUGET, Note sur son habitat et les différences sexuelles, 1857, 756. — *id.*, REICHE, cet Ins. avait déjà été trouvé dans des fourmilières par M. Peyron, 1857, CXXXI. — *id.*, DE BARAN, trouvé auprès de Valence par M. Berthoud, 1857, CIV. — *Fairmairei*, DELAROUZÉE, Note sur une nouv. esp., 1860, XXXII. — *Marqueti*,

**CH. BRISOUT DE BARNEVILLE**, trouvé à Collioure par M. Delarouzée, 1860, XLVIII. — *id.*, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1857, 729. — *orientalis*, AUBÉ, 1850, 325. — *pilosus*, JACQ. DU VAL, Rem. et notes diverses, 1857, 98. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé dans les env. de Dijon par M. Rouget, 1857, LII.

**Catorama** *Palmarum*, *Sallei*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, *Nouv. esp. du genre*, 1851, CXV.

**Catexantha**, SOLIER, *Buprestides*, 1833, 266. — *Boisduvalii*, 1833, 267. — *Lacordairei*, THOMSON, *Descr. d'une esp. nouv. de Buprestides*, 1859, CXII. — *opulenta*, SOLIER, 1833, 267.

**Caulestrophus**, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1859, 55. — *Delarouzei*, 1859, 55. — *ottomanus*, *Diagnoses de plusieurs esp. de Col. d'Europe*, 1859, CIV.

**Cebrio** GRAELLS, *Obs. sur la cause de leur apparition*, 1837, 93. — *id.*, COQUEREL, *Esp. recueillie sur les eaux du Tage, après un orage*, 1850, XLIV. — *id.*, DOUÉ, *Esp. nouv. des env. de Bouçada*, 1854, XLIII. — *Benedicti*, FAIRMAIRE, *Descr. de qqes Col. nouv. d'Europe et spécialement de France*, 1849, 420. — *Carrenoi*, GRAELLS, *Descr. de cinq esp. nouv. de Col. d'Espagne*, 1847, 306. — *id.*, *Descr. de Col. de la faune centrale d'Espagne*, 1851, 5. — *id.*, A. DEYROLLE, *Découv. de la femelle dans les environs de Madrid*, 1857, LXIII. — *fuscus*, LATREILLE, *Serricornes*, 1834, 164. — *Gandolphei*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, *Descr. de qqes esp. de Col. de l'Algérie*, 1859, CLXXXVI. — *gigas*, LATREILLE, 1834, 164. — *id.*, LEFEBVRE DE CERISY, *femelle trouvée dans la terre à un mètre de profondeur*, 1842, XVI. — *id.*, AUDOUIN, *Antenne gauche atrophiée*, 1834, VII. — *id.*, DUPONCHEL, *trouvé dans la Lozère*, 1834, 287. — *id.*, LUCCIANI, *Détails sur cet Ins.*, 1845, CXI. — *id.*, AUDOUIN, *Obs. sur son mode d'accouplement*, 1833, LXVI. — *id.*, DAUBE, *Mode d'accouplement de cet Ins.*, 1834, XX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, *Communic. d'un mémoire de M. de Cérisy, comprenant l'histoire de ses métamorph.*, 1853, V. — *Moyses*, FAIRMAIRE, *Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique*, 1852, 82. — *ruficollis*, LATREILLE, 1834, 164. — *rufifrons*, GRAELLS, 1851, 13.

**CÉBRIONITES**, LATREILLE, *Serricornes*, 1834, 163. — *id.*, DE LAPORTE, *Monogr. des Rhipicérides*, 1834, 226.

**Centrognathus** *subrugosus*, SCHAUUM, *Lamell. mélitoph.*, 1844, 395.

**Centrura** *armata*, COQUEREL, *Obs. sur div. Ins. recueillis à Madagascar*, 1852, 401. — *divaricata*, 1852, 402.

**Cephalodendron ramicornis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 166.

**Cephaloleia pulchella**, COQUEREL, Obs. sur div. Ins. de Madagascar, 1852, 404.

**Cephalostenus Dejeanii**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 184 et 186. — *elegans*, 1838, 187. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 234.

**Cephennium intermedium**, FAIRMAIRE, Diagnoses des qqes esp. nouv. de Col. européens et algériens, 1859, CCXXXV. — *Kiesenwetteri*, AUBÉ, Obs. sur celui pris dans les Pyrénées par M. Kiesenwetter, 1853, ix. — *laticolle*, *thoracicum*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 397.

**Ceracis**, MELLIÉ, Monogr. de l'ancien G. *Cis*, 1848, 375. — *castaneipennis*, 1848, 376. — *furcifer*, 1848, 379. — *militaris*, 1848, 378. — *Sallei*, 1848, 377. — *variabilis*, 1848, 380.

**Ceragenia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 32. — *bicornis*, 1834, 33.

**CÉRAMBICINS**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 528.

**Cerambix**, AUD.-SERVILLE. Longicornes, 1834, 13. — *Cerdo*, 1834, 14. — *festivus*, CHEVROLAT, Note sur les Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 658. — *fucatus*, *heros*, AUD.-SERVILLE, 1834, 14. — *Ileros*, LUCAS. Communic. d'un très-petit indiv. de cette esp., 1858, LXIX. — *Hystrix*, CHEVROLAT, 1851, 661. — *holosericeus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 14. — *id.*, CHEVROLAT, 1851, 658. — *lincola*, 1851, 659. — *longicornis*, 1851, 664. — *longipes*, *marginalis*, Coll. de Banks, 1851, 658. — *Miles*, AUD.-SERVILLE, 1834, 14. — *Mirbeckii*, REICHE, Obs. entom., 1854, 80. — *Nerii*, FAIRMAIRE, pris à Hyères sur le Laurier rose, 1859, CCXXXVII. — *nitens*, CHEVROLAT, 1851, 658. — *pedicornis*, 1851, 662. — *rusticus*, *semi-punctatus*, *spinicornis*, 1851, 659. — *testator*, 1851, 663. — *velutinus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 14. — *vittatus*, CHEVROLAT, 1851, 658. — *Wellensii*, REICHE, 1854, 80.

**Cerandria cornuta**, CHEVROLAT, trouvée dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII.

**Cerasphorus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 10. — *garganicus*, *hirticornis*, 1834, 11.

**Ceratites**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 34. — *jaspidea*, 1835, 35.

**Ceratophyus Fischéri**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 275.

**Cerathorina micans**, SCHAUM, Lamell. mélitoph., 1849, 242. — *Passerini*, 1844, 401.

**Cereus bipustulatus**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *flavicans*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 166. — *pedicularius*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 577.

**Cerreyon flavipes**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *Leachii*, *limbatum*, REICHE, Revue de l'ouvr. du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *littorale*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *melanocephalum*, *pygmæum*, *quisquilium*, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 406. — *Sturmii*, REICHE, 1852, 97.

**Cerocoma Schæfferi**, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470. — *Schreberi*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 95.

**Ceroctenus**, AUD.-SERVILLE, 1832, 196. — *abdominalis*, 1832, 197.

**CÉROPHYTIDES**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 133.

**Cerophytum clateroides**, LATREILLE. Serricornes, 1834, 137. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 103.

**Cerostena**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 325. — *deplanata*, 1836, 326. — *id.*, LACORDAIRE, Note tendant à rectifier l'habitat de qqes Mélasomes, 1837, 253. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Lacordaire, 1837, 486. — *vestita*, 1836, 328. — *id.*, LACORDAIRE, 1837, 253. — *id.*, SOLIER, 1837, 486.

**Cerosterna**, *flocosa*, BUQUET, Nouv. esp. venant de Chine, 1848, XLVIII. — *pollinosa*, BUQUET, Mémoire sur div. Col. de la fam. des Longicornes, 1859, 634.

**Cerylon deplanatum**, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *histeroides*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 616. — *terebrians*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472, — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, LVI.

**Cétolnes**, AUDOUIN, Remarque sur leur vol, 1839, XLVIII.

**Cetonia**, REICHE, Production cryptogamique sur la tête d'une esp. de Madagascar, 1849, LVI. — *id.*, COQUEREL, Ins. nouv. découverts sur les côtes de Madagascar, par M. Vesco, 1850, LXVI. — *id.*, GODART, Remarques sur les différences sexuelles, 1851, 665. — *id.*, ORMANCEY, Réclamation de priorité, 1852. III. — *adpersa*, SCHAUM, Lamell.

mélit., 1849, 274. — *ænea*, 1844, 381 et 1849, 275. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119. — *id.*, GODART, Différences spécifiques dans les organes ♂ chez les esp. françaises, 1851, 665. — *affinis*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, SCHAUUM, 1844, 382 et 1849, 276. — *id.*, GHILIANI, 1847, 119. — *afflicta*, 1844, 379. — *albopicta*, MOTSCHULSKY, Note en réponse à la réplique de M. Reiche, 1860, XCII. — *angustata*, DUPONCHEL, 1834, 288. — *id.*, SCHAUUM, 1844, 382. — *atra*, 1849, 286. — *atrocærulea*, 1844, 380. — *aurata*, 1849, 275. — *id.*, AMYOT, Analyse de deux notices sur l'emploi de cette esp. contre la rage, 1851, XLIV. — *id.*, GODART, 1851, 666. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note relative à son emploi comme remède contre l'hydrophobie, 1857, XCVII. — *Bremei*, SCHAUUM, 1844, 413. — *carbonaria*, 1849, 286. — *Cardui*, PICCIONI, Note sur la perforation de lames de plomb par cet Ins., 1844, XXXII. — *id.*, DESMAREST, Obs. sur l'objet de cette communic., 1844, XXXII. — *carneola*, SCHAUUM, 1849, 287. — *carnifex*, AUD.-SERVILLE, Obs. sur une lettre de M. Westermann, 1833, 491. — *cincticollis*, SCHAUUM, 1849, 287. — *cretosa*, *cupræa*, 1849, 286. — *exclamationis*, 1844, 381. — *fastuosa*, 1844, 382, et 1849, 276. — *id.*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 470. — *id.*, GHILIANI, 1847, 119. — *fictilis*, *fimbriata*, SCHAUUM, 1849, 286 et 287. — *flammula*, 1849, 288. — *funbris*, 1844, 379. — *funeraria*, GODART, 1851, 666. — *funesta*, SCHAUUM, 1844, 379. — *furfurosa*, 1849, 287. — *gariépina*, 1849, 286. — *glauca*, 1849, 287. — *histrion*, 1844, 414. — *ignipes*, 1849, 276. — *impressa*, 1849, 286. — *Libanii*, 1849, 271. — *lucidula*, DUPONCHEL, 1834, 288. — *marmorata*, SCHAUUM, 1849, 276. — *melæna*, 1849, 286. — *metallica*, DUPONCHEL, 1834, 288. — *id.*, SCHAUUM, 1844, 381, et 1849, 275. — *id.*, GODART, 1851, 665. — *morio*, DUPONCHEL, 1834, 288. — *id.*, SCHAUUM, 1844, 381, et 1849, 275. — *nitidula*, 1849, 286. — *numisma*, 1849, 287. — *opaca*, 1844, 381. — *id.*, LUCAS, trouvée aux environs de Paris, 1856, LIX. — *Orpheus*, GIRARD, du voyage de Péron, 1857, CLV. — *propinqua*, SCHAUUM, 1849, 267 et 286. — *puncticollis*, 1849, 277. — *purpurea*, 1849, 273. — *rubrocincta*, 1849, 287. — *sardea*, 1844, 379. — *Servillei*, 1844, 380, et 1849, 273. — *splendidula*, 1844, 382, et 1849, 276. — *Tonkæa*, *trilineata*, 1849, 286. — *trojana*, 1849, 274. — *vidua*, 1844, 379, et 1849, 273. — *viridis*, 1844, 380, et 1849, 274.

**Centocercus ovalis**, REICHE, envoyé par M. Mocquerys, 1855, LXXV.

**Centorhynchus**, LABOULBÈNE, annonce que M. Amblard a élevé l'Ins.

de la galle du *Draba verna*, 1853, xli. — *id.*, GOUGELET et H. BRISOUT DE BARNEVILLE, Syndonymie de qqes esp. de ce genre, 1860, 337. — *id.*, CHEVROLAT, Individu trouvé aux env. de Paris, sur des fleurs d'Ognon, 1854, lv. — *acalloides*, FAIRMAIRE, Col. nouv. recueillis pendant la session de Montpellier, 1857, 639. — *albohispidus*, 1857, 640. — *Aubei*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, xxxii. — *biscutellatus*, CHEVROLAT, Descr. de deux nouv. esp. de Curculionites, 1859, xx. — *chlorophanus*, ROUGET, Descr. de deux nouv. esp. des env. de Dijon, 1857, 752. — *Drabæ*, LABOULBÈNE, Hist. des métamorph. de cette esp. nouv., 1856, 145. — *id.*, Il montre plusieurs indiv., les coques et les galles de cet Ins., 1856, lxxxv. — *fulvitaris*, GOUGELET et H. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de nouv. esp. de Col., 1860, 336. — *Gougeleti*, 1860, 335. — *Grenieri*, 1860, 336. — *metallinus*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 90. — *mirabilis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *nasturtii*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472. — *pallidicornis*, GOUGELET et H. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 337. — *pollinarius*, *quercus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *Raphaelensis*, CHEVROLAT, Descr. de deux nouv. esp. de Curculionites, 1859, xix. — *id.*, LUCAS, Dégâts causés au *Glaucium flavum*, 1860, lxvi. — *Raphani*, CUSSAC, Notice sur les métamorph. de cet Ins., 1855, 241. — *sulcicollis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Observ. sur ses mœurs et sur ses métamorph., 1845, xxxiii. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 686. — *id.*, LABOULBÈNE, obtenu de galles trouvées sur le *Sinapis arvensis*, 1856, lxxxv. — *topiarius*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, cxxxii.

**Chalcas**, FAIRMAIRE, Descr. du genre *Chalcas*, 1849, 5. — *Bremei*, 1849, 13. — *cyaneus*, 1849, 9. — *fumatus*, 1849, 17. — *humeralis*, 1849, 15. — *lateralis*, 1849, 11. — *lineatocollis*, 1849, 10. — *lugubris*, 1849, 20. — *obsus*, 1849, 19. — *6-plagiatus*, 1849, 21. — *trabeatus*, 1849, 12. — *unicolor*, 1849, 14.

**Chalcodermus**, DOUÉ, Élytres présentant des dissemblances remarquables, 1848, xv.

**Chalcolepidius** *porcatus*, *striatus*, *sulcatus*, *virens*, LATREILLE, Serri-cornes, 1834, 141.

**Chalcophora**, SOLIER, Buprestides, 1833, 278. — *Mariana*, 1833, 279. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Il annonce l'envoi que vient de lui faire M. Pecchioli d'un mémoire sur cet Ins., 1843, ix. — *id.*, LUCAS,



Observ. pour servir à l'hist. de cet Ins., 1844, 315. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont 1847, 109. — *stigmatica*, *Virginienensis*, SOLIER, 1833, 279.

**Chalcosoma** *Atlas*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 18. •

**Chalcops** *bidentatus*, *gagates*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 8.  
— *hydrophiloides*, *picipes*, *planatus*, 1859, 7. — *rostratus*, 1859, 8.  
— *rugifrons*, *trachypygus*, 1859, 7.

**Chamærhipes** *ophthalmicus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 169.

**Charadronota** *Leprieurii*, SCHAU, Lamell. mélit., 1844, 393.

**Charançon** du Blé, HERPIN, Note indiquant un moyen d'en détruire les larves, 1849, XXVI. — *id.*, du Palmiste, LHERMINIER, ses habitudes à la Guadeloupe, 1837, 504.

**Charansonite**, LABOULBÈNE, Larve trouvée dans la galle du *Draba verna*, 1852, XXVII.

**Charica**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 197. — *cyanica*, 1832, 198.

**Charinotes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 39. — *fasciatus*, 1834, 40. •

**Charopus** *concolor*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 621. — *dispar*, FAIRMAIRE, Descr. des esp. nouv. récoltées en Corse, 1859, 277. — *docilis*, KIESENWETTER, 1851, 619.  
— *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 728. — *formicarius*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 182.  
— *grandicollis*, KIESENWETTER, 1851, 620. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 728. — *id.*, JACQ. DU VAL, Glanures entomolog., 1857, 93. — *nitidus*, *pallipes*, KIESENWETTER, 1851, 621. — *punctatus*, 1851, 622. — *rotundatus*, 1851, 619. — *saginat*, 1851, 621.

**Chasmatopterus** *hirtulus* et *villosulus*, PERRIS, Ce sont les deux sexes d'une même espèce, 1855, 273. — *id.*, REICHE, Remarques sur le mémoire de M. Perris, 1855, 285. — *id.*, PERRIS, adopte les idées de M. Reiche, 1855, LXXX. — *hispidulus*, GRAELLS, Descr. de cinq esp. nouv. de Col. d'Espagne, 1847, 307. — *id.*, PERRIS, 1855, 282. — *Illigeri*, PERRIS, Réunion des *C. hirtulus* et *villosulus*, 1855, 280.

**Cheirolosia** *Burkei*, SCHAU, Lamell. mélit., 1849, 242.

**Chelroplatys** *latipes*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 9. — *pecuarius*, Descr. d'une nouv. esp. de Col., 1860, 332.

**Chelodermus Childrenii**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 486.

**Chenolarium**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 136.

**Chennium**, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 88. — *bituberculatum*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 504. — *id.*, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 89. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 99. — *id.*, LABOULBÈNE, trouvé aux environs de Mont-de-Marsan par M. Ed. Perris, 1854, xxx. — *id.*, pris à Loudun par M. Cremière, aux env. de Mons par M. Anjubante et aux env. de Toulouse par M. Lespès, 1854, xxx. — *id.*, JACQ. DU VAL, Remarques et notes diverses, 1857, 98.

**Chevriaria angulata**, DE BARAN, prise par M. Berthoud aux env. de Valence, 1857, CXLVI.

**Chevrolatia**, JACQ. DU VAL, Descr. d'un genre nouv. et de qqes nouv. esp. de Col., 1850, 45. — *insignis*, 1850, 46. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 721. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 149. — *id.*, DE BARAN, prise aux env. de Valence, 1857, CXLVI.

**Chlasognathus Grantii**, AUDOUIN, Présentation d'un indiv. femelle, 1834, LVI. — *Jousselinii*, REICHE, Mémoire sur ce genre, 1850, 265. — *id.*, fait le passage entre ce genre et celui des *Sphenognathus*, 1853, 69.

**Chilocorus uva**, COQUEREL, Descr. de la larve et de la nymphe, 1849, 452.

**Chltona variegata**, FAIRMAIRE, Col. de Tanger, 1851, XXI.

**CHLÆNIDES**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 227.

**Chlænius**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 238. — *id.*, BRULLÉ, Communic. d'une esp. ayant les pattes de couleurs différentes, 1834, IV. — *id.*, LUCAS, Note relative à div. esp. de *Chlænius*, 1859, CLXXXI. — *æneocephalus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 362. — *agilis*, 1858, 363. — *algerinus*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 225. — *Audouini*, identique avec *villosulus*, BRULLÉ, 1851, 291. — *auricollis*, GORY, 1833, 224. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 759. — *azureus*, 1858, 759. — *Brunet*, GORY, 1833, 222. — *capensis*, 1833, 226. — *chrysocephalus*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *cupreocinctus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 96. — *differens*, PEYRON, 1858, 360. — *diffinis*, DE LA FERTÉ, 1851, 241. — *Douëi*, PEYRON,

1858, 362. — *Ernest*, GORY, 1833, 219. — *Favieri*, LUCAS, Descr. d'une nouv. esp. de Tanger, 1858, CCXXIX. — *id.*, FAIRMAIRE, C'est le *C. azureus* Dej., 1859, L. — *id.*, LUCAS, l'auteur insiste sur leurs dissemblances, 1859, CLXXXI. — *festivus*, DOUÉ, Monstruosité remarquable, 1847, XCVIII. — *id.*, PEYRON, 1858, 359. — *gonioderus*, DE LA FERTÉ, 1851, 241. — *Gory*, GORY, 1833, 222. — *Guerin*, 1833, 217. — *holosericeus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 111. — *id.*, PEYRON, 1851, 249. — *id.*, LUCAS, découvert en Algérie, 1855, CIII. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 759. — *laticollis*, PEYRON, 1858, 363. — *Leprieur*, GORY, 1833, 223. — *Lucasii*, PEYRON, 1858, 361. — *macrocerus*, LUCAS, Synonymie, 1859, CLXXXII. — *marginipennis*, GORY, 1833, 227. — *mae*, 1833, 221. — *mirabilis*, 1833, 218. — *montanus*, LUCAS, Descr. d'une nouv. esp. de l'Algérie, 1858, CCXXVIII. — *nigripes*, FAIRMAIRE, envoyé des Pyrénées-Orientales par M. Bigot, 1856, LXXXI. — *ophonoides*, Descr. de trois nouv. esp. de l'Océanie, 1843, 11. — *opulentus*, GORY, 1833, 216. — *palæstinus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 595. — *id.*, PEYRON, 1858, 362. — *porcatus*, GORY, 1833, 220. — *Schrankii*, GHILIANI, 1847, 88. — *tibialis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *tigreanus*, REICHE, 1852, 96. — *Varvasii*, LUCAS, ne peut être réuni au *Chl. æratus*, 1859, CLXXXII. — *vestitus*, PEYRON, 1858, 361. — *virens*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 759. — *id.*, LUCAS, diffère du *cælestinus*, 1859, CLXXXII. — *virescens*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 443. — *viridis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 236.

**Chlorida**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 31. — *costata*, 1834, 32. — *denticulata*, BUQUET, Descr. de qqes Longicornes nouv., 1860, 623. — *festiva*, AUD.-SERVILLE, 1834, 32. — *obliqua*, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp. de Longicornes, 1852, 655.

**Chlorophanus salicicola**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1854, 631. — *viridis*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685.

**Chærorhinus**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 742. — *squalidus*, 1857, 743.

**Choleva colonoïdes**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI. — *formicetorum*, PEYRON, Descr. de qqes Col. nouv. et observ. div., 1857, 716. — *intermedia*, *neglectus*, *nitidicollis*, *rotundicollis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE,

1859, CXXII. — *rotundicollis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 414. — *rufipennis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 792. — *spadicea*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CXXXI.

**Cholevocera**, REICHE, Étymologie critique du mot, 1855, LXXV. — *id.*, WOLLASTON, Deux espèces remarquables rapportées de Madère, 1850, LIX. — *id.*, REICHE, Nouv. esp. envoyée par M. Mocquerys, 1855, LXXV. — *id.*, FAIRMAIRE, prise dans des fourmilières, près de Toulon, 1857, XCV. — *formicaria*, prise dans les env. de Béziers, 1856, v. — *punctata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 170.

**Choragus Sheppardi**, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1843, 313. — *id.*, Rectification relative à la composition de la bouche de cet Ins., 1844, XL.

**Chrysestes**, SOLIER, Buprestides, 1833, 290. — *impressicollis*, *tripunctata*, 1833, 291.

**Chrysobothris**, SOLIER, Buprestides, 1833, 310. — *affinis*, 1833, 311. — *id.*, LUCAS, prise à Paris, dans un grenier, sur des bûches de bois, 1846, LI. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 103. — *azurea*, *chrysostigma*, SOLIER, 1833, 311. — *id.*, GHILIANI, 1847, 132. — *cribraria*, *femorata*, *mellicula*, *plicata*, SOLIER, 1833, 311. — *Solieri*, PERRIS, Hist. des Ins. du Pin maritime, 1854, 117.

**Chrysochroa**, SOLIER, Buprestides, 1833, 270. — *dives*, *fulminans*, *vittata*, 1833, 272.

**Chrysochus pretiosus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 125.

**Chrysomela aegyptiaca**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 32. — *aeipennis*, 1858, 34. — *aethiops*, SUFFRIAN, Monographie des Chrysomèles d'Europe, extrait par M. Fairmaire, 1853, 100. — *alcyonea*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 654. — *alternata*, SUFFRIAN, 1858, 557. — *americana*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1858, 541. — *analís*, 1854, 326. — *angelica*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 33. — *atra*, SUFFRIAN, 1853, 94. — *aurocuprea*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. récoltées en Corse, 1859, 282. — *Banksii*, KIESENWETTER, 1851, 653. — *id.*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 342. — *id.*, SUFFRIAN, 1853, 98. — *Berytensis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 36. — *Besseri*, SUFFRIAN, 1854, 320. — *bicolor*, 1858, 541. — *bætica*, 1853, 99. — *caliginosa*, 1853, 118. — *carbonaria*, KIESENWETTER, 1851, 653. — *id.*, SUFFRIAN, 1853,

118. — *carnifex*, 1854, 321. — *centaurei*, GHILIANI, 1847, 135. — *cerealis*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1858, 543. — *chalcitis*, 1858, 552. — *circumducta*, 1854, 323. — *cærulea*, 1855, 108. — *cærulescens*, 1854, 322. — *confusa*, 1853, 117. — *convergens*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *corcyria*, FAIRMAIRE, 1858, 563. — *coriacea*, 1853, 125. — *crassicollis*, 1853, 119. — *crassimargo*, 1853, 105. — *cretica*, 1853, 98. — *cribellata*, 1853, 116. — *cribrosa*, 1853, 96. — *cruentata*, 1854, 321. — *cupreopunctata*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 30. — *Dahlii*, SUFFRIAN, 1853, 106. — *depressa*, 1854, 317. — *Desdouestii*, BUQUET, trouvée aux env. de Bastia. 1856, XII. — *didymata*, SUFFRIAN, 1858, 560. — *diluta*, 1838, 566. — *distincta*, 1853, 103. — *duplicata*, 1858, 558. — *fastuosa*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1858, 539. — *femoralis*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1853, 122. — *fimbrialis*, 1853, 95. — *Findelii*, 1854, 319. — *fossulata*, 1853, 101. — *fucata*, 1858, 554. — *fulminans*, 1858, 534. — *geminata*, 1858, 559. — *id.*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1834, 473. — *Genei*, GHILIANI, 1847, 114. — *globipennis*, SUFFRIAN, 1853, 111. — *globosa*, 1853, 120. — *gloriosa*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 289. — *gættingensis*, SUFFRIAN, 1853, 110. — *graminis*, PAUL LAMBERT, Cas de parasitisme, 1851, XXII. — *id.*, SUFFRIAN, 1858, 537. — *Gypsophilæ*, 1854, 314. — *id.*, FAIRMAIRE, envoyée par M. Bigot, des Pyrénées-Orientales, 1856, LXXXI. — *hæmoptera*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1853, 121. — *id.*, FAIRMAIRE, accouplement d'un ♂ avec un ♂ de *Timarcha tenebriosa*, 1855, XCVIII. — *helopioides*, 1853, 97. — *hemisphærica*, 1853, 115. — *herii*, 1853, 115. — *hochhuthii*, 1854, 320. — *hyacinthina*, SUFFRIAN, 1853, 116. — *interstincta*, 1854, 323. — *lævicollis*, lamina, 1858, 551. — *lepida*, 1858, 561. — *limbata*, GHILIANI, 1847, 129. — *id.*, SUFFRIAN, 1854, 318. — *limbifera*, 1854, 319. — *lucidicollis*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1854, 316. — *lurida*, 1854, 327. — *luxurians*, GHILIANI, 1847, 135. — *mactata*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes esp. nouv. de Col., 1859, CLII. — *marcasitica*, SUFFRIAN, 1853, 104. — *marginalis*, 1854, 317. — *marginata*, 1854, 324. — *melanaria*, 1858, 548. — *menthastri*, 1858, 533. — *mixta*, 1858, 546. — *molluginis*, 1853, 123. — *morio*, 1858, 550. — *nigriceps*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 545. — *nigrina*, KIESENWETTER, 1851, 655. — *obscura*, SUFFRIAN, 1853, 96. — *olivacea*, 1853, 120. — *opaca*, 1853, 124. — *opulenta*, 1853,

107. — *orientalis*, 1853, 115. — *palustris*, 1848, 536. — *Peirolerii*, BASSI, Descr. de qqes nouv. esp. de Col. d'Italie, 1834, 465. — *polita*, SUFFRIAN, 1858, 548. — *prasina*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1854, 327. — *pretiosa*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *purpurascens*, SUFFRIAN, 1853, 105. — *quadrigemina*, 1858, 556. — *quadriimpressa*, 1858, 542. — *relucens*, 1858, 547. — *resplendens*, 1858, 535. — *Rossii*, GHILIANI, 1847, 99. — *id.*, SUFFRIAN, 1853, 112. — *rufa*, 1853, 106. — *rufo-ænea*, FAIRMAIRE, Commun. de qqes Col. rares trouvés en France, 1856, LXIII. — *id.*, SUFFRIAN, 1858, 553. — *salviæ*, 1858, 564. — *sanguinolenta*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, FAIRMAIRE, Larves de Chalcidites sorties de son corps, 1848, XXXVI. — *id.*, SUFFRIAN, 1854, 315. — *Schottii*, 1853, 112. — *sparshalli*, 1854, 314. — *speciosa*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 289. — *squalida*, SUFFRIAN, 1853, 107. — *stachydis*, BUQUET, trouvée aux env. de Bastia, 1856, XII. — *id.*, SUFFRIAN, 1858, 565. — *staphylea*, 1853, 102. — *subænea*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *id.*, SUFFRIAN, 1853, 126. — *subferruginea*, 1853, 103. — *subseriata*, 1854, 324. — *Suffriani*, FAIRMAIRE, Descr. des esp. nouv. récoltées en Corse, 1859, 282. — *sulcata*, SUFFRIAN, 1854, 325. — *superba*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *suturella*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 38. — *tagana*, SUFFRIAN, 1853, 95. — *thalassina*, 1858, 29. — *tussilaginis*, KIESENWETTER, 1851, 654. — *unicolor*, SUFFRIAN, 1853, 122. — *varians*, 1853, 108. — *varipes*, KIESENWETTER, 1851, 653. — *id.*, SUFFRIAN, 1853, 99. — *ventricosa*, 1858, 539. — *vernalis*, 1853, 114. — *violacca*, 1858, 532. — *viridana*, 1858, 536.

**Chrysomèles d'Europe**, SUFFRIAN, Monographie, extraits par M. Fairmaire, 1853, 91. — 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> groupes, 1853, 94, 97, 107 et 111. — 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> groupes, 1854, 313 et 317. — 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup> et 10<sup>e</sup> groupes, 1858, 531, 549, 553 et 565.

**CHRYDOMÉLINES**, REICHE, Observations sur l'ouvrage de M. Lacordaire, 1845, XLV. — *id.*, CHEVROLAT, Larves vivant de substances ligneuses, 1845, XLIX.

**Chrysoprasis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 5. — *aurigena*, 1834, 6. — *festiva*, *rufiventris*, *ventralis*, 1834, 7.

**Cleindela**, BRULLÉ, Indication du journal de Boston contenant la description de celles du Massachussetts, 1837, XLIV. — *id.*, THOMSON, (qqes obs. sur ce genre, 1858, LXXIX. — *Audouini*, BARTHELEMY,

Annonce de l'envoi de cette espèce au Muséum, 1834, LXII. — *id.*, Deux Cicindèles nouv., 1835, 597. — *id.*, GHILIANI, Caractères distinctifs entre cette espèce et la *C. Ritchii*, 1853, 645. — *id.*, REICHE, Note sur cette esp., 1854, LVI. — *id.*, GHILIANI, Demande de la nomination d'une commission pour décider l'identité ou la différence de cette espèce avec la *C. Ritchii*, 1855, XII. — *id.*, FAIRMAIRE, Rapport de la commission nommée sur la demande de M. Ghiliani, 1855, XXIII. — *bicolor*, AUD.-SERVILLE, Obs. sur une lettre de M. Westermann, 1833, 490. — *Brunet*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 173. — *campestris*, MORINEAU, trouvée sous terre en décembre, 1834, LXI. — *id.*, GRAELLS, Descr. de deux var. nouv., 1847, 309. — *id.*, BLISSON, Lecture d'un mémoire sur la nymphe de cette espèce, 1847, CIV. — *id.*, Note pour servir à compléter l'histoire de ses mœurs, 1848, 155. — *id.*, DOÛÉ, Exemple de longévité, 1848, LX. — *id.*, GODART, Var. trouvée courant sur la neige des Hautes-Alpes, 1850, LVI. — *id.*, Autre variété trouvée dans la vallée de la Durance, 1850, LVI. — *id.*, PEYRON, très-rare aux envir. de Tarsous, 1858, 354. — *Cherubin*, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp. de Col., 1858, 315. — *Chloris*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 128. — *id.*, FAIRMAIRE, Plus indiv. courant sur la neige, vallée de Fenestrelle, 1847, CVII. — *fallax*, COQUEREL, Observ. sur div. Ins. recueillis à Madagascar, 1852, 359. — *figurata*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 435. — *Fischeri*, PEYRON, rare à Ichmé, 1858, 354. — *flamula*, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 326. — *flexuosa*, GHILIANI, 1847, 111. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 744. — *germanica*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Paris sur les dalles du boulevard, 1847, LXXIV. — *Guerin*, GORY, 1833, 178. — *hemicycla*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 233. — *hispanica*, GORY, 1833, 175. — *hybrida*, FAIRMAIRE, très-jolie var. prise à Fontainebleau par M. Berce, 1850, XVI. — *id.*, THOMSON, Qques remarques sur la larve, 1857, CXIII. — *Ismenia*, GORY, 1833, 174. — *Lacordairei*, 1833, 172. — *leucosticta*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 745. — *littoralis*, REICHE, Col. trouvés aux env. de Grandville (Manche), 1858, CLXXII. — *id.*, BLANCHARD, trouvée à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, III. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 744. — *luctuosa*, FAIRMAIRE, Suite de Col. provenant de Tanger, 1851, XXI. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 744. — *lugdunensis*, GHILIANI, 1847, 87. — *lugubris*, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu

connus, 1844, 288. — *luteolineata*, CHEVROLAT, Note sur la synonymie de qqques Col. 1856, cv. — *id.*, THOMSON, Réponse à la note de M. Chevrolat, 1856, cvi. — *luteosignata*, CHEVROLAT, Réponse à la note de M. Thomson sur la synonymie de certains Col., 1857, XLVII. — *maritima*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *ib.*, REICHE, Col. trouvés aux env. de Grandville, 1858, CLXXII. — *marocana*, MARIANO DE SANS, Envoi de deux exemplaires qui ne seraient qu'une var. de *campestris*, 1835, LXXIX. — *melancholica*, PEYRON, très-commune aux env. de Tarsous, 1858, 354. — *mixta*, DE CHAUDOIR, 1835, 436. — *neglecta*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 745. — *id.*, REICHE, prise en Algérie, au bord du désert du Sahara, 1859, XVII. — *propinqua*, DE CHAUDOIR, 1835, 434. — *quadraticollis*, 1835, 436. — *4-maculata*, GORY, 1833, 179. — *Ritchii*, LUCAS, recueillie par M. le général Levaillant dans le Djebel-Amour, 1847, CIX. — *id.* (voir à l'art. *Audouini*). — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, faits relatifs à sa synonymie avec la *C. Peletieri*, 1855, XLIX. — *id.*, TRUQUI, Note sur la même question, 1855, XLIX. — *Rouxii*, BARTHÉLEMY, Deux Cicindèles nouv., 1835, 600. — *saphyrina*, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. de Sardaigne, 1836, II. — *6-punctata*, AUD.-SERVILLE, Observ. sur une lettre de M. Westermann, 1833, 491. — *sobrina*, GORY, 1833, 176. — *sylvatica*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 467. — *id.*, FAIRMAIRE, Gorges de Franchart, 1846, LV. — *syriaca*, TROBERT, Lecture de sa descr., 1844, XXXVI. — *trilunaris*, COQUEREL, Propriété de marcher sur l'eau de la mer, 1849, LXII. — *trisignata*, FAIRMAIRE, Commun. d'une var. très-remarquable, 1845, CXIV. — *id.*, Var. retrouvée aux env. de Bordeaux, 1846, CVI. — *id.*, BOISDUVAL, GUÉNÉE et PIERRET, Rem. au sujet de la communic. de M. Fairmaire, 1846, CVI. — *id.*, DOÛÉ, Série de dégradation successive de la couleur typique, 1848, XXXV. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 744. — *Truquii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Diagnose de cette espèce, 1855, L. — *varians*, GORY, 1833, 171. — *venustula*, 1833, 177. — *vidua*, 1833, 174. — *20-punctata*, *Walkeriana*, THOMSON, Descr. de qqques Col. nouv. ou peu connus, 1856, 331.

**CICINDELÈTES**, THOMSON, Note sur la monogr. qu'il se propose de publier, 1856, XXX.

**CICINDELITES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Observ. critiques sur la révision de cette famille par M. Lacordaire; indication de la correspondance qui en a été la suite, 1843, IX et XIV.



- Cillenum laterale**, JAVET, trouvé en grande abondance sur le bord de la mer, en Écosse, 1848, XXXI. — *Leachii*, SOUVERBIE, pris en abondance sur la plage de la Teste, 1852, LXVII. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679.
- Clonus fraxini, gibbifrons**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 647.
- Circeillum**, REICHE, Coprophages, 1842, 76. — *Bacchus*, 1841, 79. —
- Cirsa**, REICHE, Coprophages, 1842, 76. — *Bacchus*, 1841, 79.
- Cirsa striaticollis**, LUCAS, Nouveau genre du Sahara algérien, 1857, LVI.
- Cirta cursor**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. de qqes esp. d'Algérie, 1859, CLXXXIX. — *velox*, 1859, CLXXXVIII.
- Cis**, MELLIÉ, Monogr. de l'ancien genre *Cis*, 1848, 205, 236. — *id.*, Explication des figures des planches de la monographie, 1848, 395. — *id.*, Table par ordre de classific. des Ins. décrits dans la monogr., 1848, 392. — *alni*, Monographie de l'ancien genre *Cis*, 1848, 338. — *alpinus*, 1848, 347. — *atripennis*, 1848, 258. — *betulæ*, 1848, 389. — *bicornis*, 1848, 356. — *bidentatus*, 1848, 322. — *bidentulus*, 1848, 391. — *boleti*, 1848, 238. — *brunneus*, 1848, 327. — *capensis*, 1848, 254. — *castaneus*, 1848, 351. — *Chevrolatii*, 1858, 249. — *comptus*, MELLIÉ, 1848, 268. — *concinus*, 1848, 387. — *convexus*, 1848, 359. — *creberrimus*, 248, 357. — *curtula*, 1848, 391. — *dentatus*, 1848, 324. — *diadematus*, 1848, 331. — *dubius*, 1848, 273. — *elongatulus*, 1843, 274. — *emarginatus*, 1848, 267. — *fagi*, 1848, 388. — *festivus*, 1848, 349. — *fissicollis*, 1848, 247. — *fissicornis*, 1848, 317. — *flavipes*, 1848, 265. — *id.*, Species invisæ de la monogr., 1848, 389. — *flavus*, 1848, 388. — *fulvipes*, 1848, 316. — *fuscatus*, 1848, 352. — *fuscipes*, 1848, 271. — *glabratus*, 1848, 329. — *glabriculus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *granarius*, MELLIÉ, 1848, 320. — *grossus*, 1848, 321. — *Guerinii*, 1848, 250. — *hirtus*, 1848, 391. — *hispidus*, 1848, 260. — *interpunctatus*, 1848, 263. — *Jacquemartii*, 1848, 328. — *laminatus*, 1848, 318. — *laricinus*, 1848, 355. — *lineato-cribratus*, 1848, 336. — *Mellici*, COQUEREL, Obs. sur divers Col. recueillis aux Antilles, 1849, 441. — *micans*, MELLIÉ, 1848, 255. — *minutissimus*, 1848, 334. — *muriceus*, 1848, 348. — *murinus*, 1848, 252. — *nitidulus*, 1848, 334. — *nitidus*, 1848, 325. — *obesus*, 1848, 335. — *oblongus*, 1848, 341. — *Olivieri*, 1848, 259. — *pallidus*, 1848, 246. — *pallipennis*, 1848, 391. — *piccus*,

1848, 332. — *puberulus*, 1848, 358. — *pumicatus*, 1848, 533. — *punctatus*, 1848, 337. — *punctifer*, 1848, 344. — *punctiger*, 1848, 389. — *punctulatus*, 1848, 345. — *quadricornis*, 1848, 390. — *quadridentis*, 1848, 270. — *rugulosus*, 1848, 241. — *sericeus*, 1848, 346. — *setiger*, 1848, 244. — *setulosus*, 1848, 257. — *striatulus*, 1848, 264. — *subtilis*, 1848, 353. — *tristis*, 1848, 343. — *tomentosus*, 1848, 253. — *ustulatus*, 1848, 250. — *verrucosus*, 1848, 391. — *vestitus*, 1848, 354. — *vitulus*, 1848, 390. — *Wollastoni*, Descr. d'une nouv. esp., 1849, LXXXVI.

**Cistela**, SOLIER, Prodrome des Xystropides, 1835, 244. — *apicalis*, 1835, 245. — *atra*, *ceramboides*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 106. — *ceramboides*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *fulvipes*, SOLIER, 1835, 245. — *fulvipes*, *fusca*, CHEVROLAT, 1833, 471. — *lepturoides*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 288. — *melanaria*, GHILIANI, 1847, 106. — *murina*, SOLIER, 1835, 245. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *nigrita*, GHILIANI, 1847, 106. — *rufipes*, nov. sp. ? CHEVROLAT, 1833, 471.

**CISTÉLIDES**, SOLIER, Essai d'une divis. des Col. hétéromères, 1834, 493.

**CISTÉLITES**, SOLIER, Xystropides, 1835, 230.

**Cladiscus strangulatus**, CHEVROLAT, Descr. de 24 nouv. esp. de Térédiles, 1843, 33.

**Cladognathus**, *Antilopus*, REICHE, c'est le *L. Martinii*, 1853, 76. — *cinnamomeus*, le *L. Rafflesii*, n'est pas sa ♀, 1853, 76. — *Rhinoceros*, REICHE, le nom d'*Hexarthrus Rhinoceros* doit être maintenu, 1853, 75. — *Parryi*, le *serricornis* en est la ♀, 1863, 75.

**CLAIRIENS**, KLUG, Mémoire sur la distribution systématique de cette famille, 1838, XL.

**Clambus enshamensis**, PERRIS, Hist. de ses métamorphoses, 1852, 571 et 574.

**Claviger**, AUBÉ, Révision des Psélaphiens, 1844, 151. — *colchicus*, 1844, 154. — *foveolatus*, Note sur la famille des Psélaphiens. 1833, 511. — *id.*, trouvé aux environs de Mantes, 1841, XXI. — *id.*, AUBÉ, aux environs de Vernon, 1855, XLVII. — *longicornis*, Note sur la famille des Psélaphiens, 1833, 511. — *id.*, Révision des Psélaphiens, 1844, 154. — *id.*, LESPÈS, rencontré dans les Pyrénées, 1854,

LXV. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, rencontré dans les env. de St-Germain, 1860, XLVIII. — *testaceus*, AUBÉ, 1844, 153. — *id.*, JACQ. DU VAL, en grand nombre sur des tas d'œufs et de larves de Fourmis, 1849, LXXII.

**Clavipalpus Dejeanii**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 406.

**Cleogonus Deyrollei**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 909. — *dichrous*, 1860, 908. — *Fairmairei*, COQUEREL, Descr. de deux Curculionites nouv. de la Martinique, 1849, 450. — *impressus*, *luctuosus*, MONTROUZIER, 1860, 908. — *zonatus*, 1860, 909.

**Cleonis albidus**, *grammicus*, *marmoratus*, *ophthalmicus*, *palmaris*, *plicatus*, GHILLANI, Col. du Piémont, 1847, 106.

**Cleonus**, A. DEYROLLE, Communic. de plusieurs indiv. dont les larves ont fait de grands ravages dans les plantations de Betteraves de la Russie mérid., 1859, CXIII. — *albidus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *brevirostris*, JACQ. DU VAL, et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 731. — *hieroglyphicus*, LUCAS, trouvé dans la province de Constantine, 1850, IV. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans l'oasis d'Ouargla (Algérie), 1857, CXV et 1859, CXCI. — *Maresii*, LUCAS, du Sahara algérien, 1857, LVI. — *marmoreus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *mendicus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 731. — *Miegii*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de la faune méditerranéenne, 1855, 317. — *nebulosus*, CHEVROLAT, 1833, 471. — *obliquus*, PAUL LAMBERT, trouvé à St-Ouen, 1851, CXVII. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 731. — *ocularis*, AZAMBE, trouvé en Italie, 1856, XVIII. — *orbitalis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 674. — *ornatus*, 1857, 672. — *Petletii*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes nouv. Col. de France, 1859, LII. — *punctiventris*, JACQ. DU VAL, Rectification, 1854, XXXVIII. — *samaritanus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 671. — *sulcivrostris*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *tessellatus*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv. d'Europe et de France, 1849, 424. — *vittiger*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 672.

**CLÉRITES**, AUD-SERVILLE, Analyse de l'Essai monogr. de M. Max. Spinola, 1845, 227.

**Clerus biguttatus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 260. — *Buqueti*, LEFEBVRE, Descr. d'un Col. nouv. du genre *Clerus*,

1835, 575. — *id.*, WESTWOOD, Rectifications et omission signalées dans les descr. et fig. de cet Ins., 1838, XIII et XVIII. — *id.*, LEFEBVRE, L'auteur prend cet Ins. pour type d'un genre nouv. (*Thaneroclerus*), 1838, XVIII. — *Castelnaui*, MONTROUZIER, 1860, 260. — *cinctiventris*, CHEVROLAT, Descr. de 24 nouv. esp. de Térédiles 1843, 32. — *formicarius*, LUCAS, Larve trouvée sous l'écorce d'un Pin sylvestre, 1852, v. — *id.*, JACQ. DU VAL, Ses mœurs étaient connues de Linné, 1857, 98. — *marginicollis*, CHEVROLAT, 1843, 31. — *mutillarius*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *oblique-fasciatus*, 1843, 32.

**Clidius grandis**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 396. — *id.*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 529.

**Clisteria atra**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 258. — *cincticollis*, 1849, 262. — *cerulea*, *confinis*, 1849, 259. — *confinis*, 1844, 366 et 1849, 259. — *Hoffmeisteri*, 1849, 262. — *imperialis*, 1849, 259. — *pantherina*, *permutans*, 1849, 262. — *6-pustulata*, 1844, 365. — *spuria*, *suavis*, 1849, 262.

**Clivina**, SOLIER, Observ. sur le genre *Dilomus*, 1834, 669. — *bimaculata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 87. — *fossor*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 386. — *striatipennis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 210. — *subcylindrica*, PEYRON, 1858, 386.

**Closterus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 193. — *bupthalmus*, *flabellicornis*, *spinicornis*, 1832, 194.

**Clostrocera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 82. — *Banonii*, 1834, 83.

**CLINOcéPHALIDES**, SOLIER, Essai d'une division des Col. hétéromères, 1834, 494.

**CLYPÉASTRIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur les caract. et la comp. de cette famille, 1857, 98 et 102.

**Clythra**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larves trouvées dans leurs coques près de Marseille, 1846, cv. — *id.*, L. DUFOUR, sur les coques des *Clythra*, 1852, 450. — *id.*, Un dernier mot sur les coques de ces Ins., 1852, LXXXV. — *azurea*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 26. — *Belliceri*, REICHE, Descr. des esp. nouv. recueillies en Sicile, 1860, 735. — *chalibeicornis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 26. — *concolor*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851,

651. — *id.*, LETHIERRI, prise au Puy-de-Dôme, 1859, CXXVII. — *cynocephala*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 473. — *Guerinii*, BASSI, Descr. de qqes nouv. esp. de Col. d'Italie, 1834, 472. — *hebræa*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 25. — *maculicollis*, 1858, 26. — *meridionalis*, *nigritarsis*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *nigrocincta*, *9-punctata*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 25. — *palmata*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *pubescens*, L. DUFOUR, Sur les coques de cet Ins., 1852, 450. — *quadripunctata*, CHEVROLAT, Larve à fourreau trouvée dans des fourmilières, 1838, LII. — *6-maculata*, *6-punctata*, *taxicornis*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *tetradyma*, CHEVROLAT, 1833, 473. — *tibialis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 26. — *tibialis*, *tripunctata*, KIESENWETTER, 1851, 651.

**Clytus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 83. — *id.*, CHEVROLAT, Descr. d'esp. de Clytes propres au Mexique, 1860, 451. — *id.*, vrais, 1860, 456. — *id.*, divis. du genre, 1860, 453. — *Actéon*, 1860, 499. — *Æsopus*, 1860, 502. — *alni*, *annularis*, AUD.-SERVILLE, 1834, 87. — *anthophilus*, CHEVROLAT, 1860, 485. — *antilope*, AUD.-SERVILLE, 1834, 85. — *Apelles*, CHEVROLAT, 1860, 464. — *arcuatus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 86. — *arietis*, 1834, 85. — *id.*, PERRIS, Observ. sur les larves, 1847, 547. — *arvicol*, AUD.-SERVILLE, 1834, 85. — *astecus*, CHEVROLAT, 1860, 489. — *atripes*, 1860, 469. — *Augusti*, 1860, 495. — *balteatus*, 1860, 503. — *bilineatus*, 1860, 461. — *Boryi*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 504. — *brevicornis*, CHEVROLAT, 1860, 480. — *Cacicus*, 1860, 493. — *chilensis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 504. — *circuliferus*, CHEVROLAT, 1860, 472. — *citrinus*, 1860, 474. — *clathratus*, 1860, 483. — *clavicornis*, REICHE, Esp. recueillies en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 734. — *clavipes*, CHEVROLAT, 1860, 495. — *consobrinus*, LUCAS, Descr. d'une nouv. esp. de Longicornes d'Algérie, 1851, XXXI. — *crinicornis*, CHEVROLAT, 1860, 460. — *Cristoforii*, CHEVROLAT, 1860, 477. — *curtulus*, 1860, 497. — *detritus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 86. — *dimidiaticornis*, CHEVROLAT, 1860, 487. — *distortus*, 1860, 500. — *erythrocephalus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 84. — *erythropus*, CHEVROLAT, 1860, 458. — *Fabricii*, 1860, 490. — *flexuosus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 85. — *flexus*, CHEVROLAT, 1860, 468. — *floralis*, AUD.-SERVILLE, 1834, 86. — *fortunatus*, CHEVROLAT, 1860, 465. — *gazella*, AUD.-SERVILLE, 1834, 85. — *gibbosus*, 1834, 88. — *guttatus*, CHEVROLAT, 1860, 459. — *Hartwegii*, LUCAS, Note sur le ♂ de ce Col. mexicain, 1857, XLVIII. — *id.*, CHEVROLAT, 1860, 466. — *hirtellus*, 1860, 467. — *impar*, AUD.-SERVILLE, 1834,

84. — *lon*, CHEVROLAT, 1860, 496. — *Jekelii*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 504. — *Klugii*, CHEVROLAT, 1860, 490. — *labyrinthicus*, 1860, 463. — *Lorquinii*, BUQUET, Mémoire sur div. Col., 1859, 629. — *maxiliensis*, AUD.-SERVILLE, 1834, 85. — *melanotelus*, CHEVROLAT, 1860, 468. — *mexicanus*, 1860, 461. — *Montezuma*, 1860, 487. — *novus*, 1860, 501. — *mundus*, 1860, 498. — *mysticus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 87. — *nebulosus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 504. — *nigropunctatus*, CHEVROLAT, 1860, 486. — *obliquus*, 1860, 473. — *ornatus*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, AUD.-SERVILLE, 1834, 87. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734. — *pellitus*, CHEVROLAT, 1860, 462. — *piniaeus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 88. — *plebeius*, 1834, 84. — *pollinosus*, CHEVROLAT, 1860, 476. — *psillocerus*, 1860, 504. — *quadripunctatus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 87. — *id.*, DE ROMAN, Notice sur cet ins., 1846, XXXIII. — *quinquepunctatus*, LUCAS, Descr. de cet ins., 1848, XLVIII. — *regalis*, CHEVROLAT, 1860, 488. — *rubripes*, 1860, 482. — *ruficornis*, AUD.-SERVILLE, 1834, 86. — *rufitarsis*, CHEVROLAT, 1860, 494. — *Sartorii*, 1860, 492. — *scutellaris*, AUD.-SERVILLE, 1834, 86. — *sexfasciatus*, 1834, 85. — *Sommeri*, CHEVROLAT, 1860, 474. — *spinicornis*, 1860, 504. — *sulphurifer*, 1860, 470. — *tomentosus*, 1860, 479. — *tricolor*, 1860, 483. — *trifasciatus*, *tropicus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 86. — *tropicus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvé au bois de Boulogne, 1855, LXXXVII. — *Truquii*, CHEVROLAT, 1860, 484. — *verbasci*, AUD.-SERVILLE, 1834, 87. — *terrucosus*, 1834, 88. — *virescens*, CHEVROLAT, 1860, 481. — *viridicollis*, 1860, 464. — *viridiventris*, 1860, 479. — *vitticollis*, 1860, 465. — *Westwoodii*, 1860, 471. — *Z-littera*, 1860, 476.

**Cnemaplatia atropos**, REICHE, Note sur ce genre et les esp. qui s'y rapportent, 1855, CXI.

**Cnemidotus cærus**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 396. — *rotundatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 784.

**Cnecorhinus affinis**, *albicans*, *faber*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme. 1852, 685. — *lateralis*, GRAELLS, Descr. de Col. nouv. de la faune centrale de l'Espagne, 1851, 21. — *ludificator*, FAIRMAIRE, Suite de Col. de Tanger, 1851, XXI. — *tubericollis*, du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 86.

**Cocelnella alpina**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 140. — *bipunctata*, AUDOUIN, Accouplement, ponte et éducation, 1832, 232. — *id.*,

Accouplement avec la *C. dispar*, 1832, 233. — *dispar*, Accoupl. avec la *bipunctata*, 1832, 233. — *impustulata*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *marginepunctata*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *19-punctata*, DOÛÉ, Masse énorme observée au pied d'un Peuplier, 1847, XCIV. — *oblongoguttata*, GHILIANI, 1847, 128. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, LVI. — *ocellata*, GHILIANI, 1847, 128. — *11-notata*, 1847, 136. — *7-punctata*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 343. — *id.*, TAPPES, Anomalie, 1858, CCXIV. — *specularis*, GHILIANI, 1847, 99. — *tigrina*, 1847, 101.

**Coccinelle**, DOUMERC, Fait tératologique curieux, 1859, CCXIX.

**Cœliodes lamii, ruber**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686.

**Cœlocraera**, DE MARSEUL, Descr. d'un genre nouv. et de plusieurs esp. nouv., 1857, 426. — *costifera*, 1857, 430.

**Cœlodera excavata**, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. de Sardaigne, 1836, III.

**Cœlodon cinereum**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 164.

**Cœlosternus impressus**, MONTROUZIER, Col. de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 891. — *Panchezi*, 1860, 890. — *pictus*, 1860, 892. — *squamosus*, 1860, 900. — *tuberculatus*, 1860, 892.

**Cœlus**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 211. — *ciliatus*, 1840, 213. — *hirticollis*, 1840, 212.

**Cœnochilus Paulus**, SCHAUUM, Lamell. mélit., 1844, 396. — *plathrinus*, 1844, 419. — *trabecula*, 1844, 397. — *ventricosus*, 1844, 396.

**Colaphus barbarus**, FAIRMAIRE, pris aux env. de Saumur, 1856, LXVI.

**Colaspis barbara**, L. DUFOUR, Notice sur les dévastations de la larve, 1836, 371. — *id.*, DAUBE, Lettre sur les ravages de la larve près de Montpellier, 1836, XLV. — *id.*, Moyen pour la destruction de cette larve, 1837, XLIX.

**Colenis dentipes**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682.

**Coléoptères** (Larve de), AUDOUIN, Galeries creusées par une larve dans des tiges de Poirier, 1836, LXX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larve de grande taille se rapprochant de celles du genre *Drilus*, 1844, LXXXVII. — *id.*, MACQUART, Larve nuisible à la Betterave, 1847, LXXXI. — *id.*, REICHE, Cette larve est celle d'un Élatéride, et probablement celle de l'*Agriotes segetis*, 1847, LXXXI.

**COLLAPTÉRIDES**, SOLIER, Essai d'une division des Col. hétéromères, 1834, 492. — *id.*, Essai d'une monogr. des Collaptérides, 1834, 496. — *id.*, AUD.-SERVILLE, Obs. sur le travail de M. Solier, 1838, VII.

**Colliuris** *ortygia*, BUQUET, Descr. de qqes Col. nouv. de la famille des Carabiques, 1835, 604.

**Colobius** *marginatus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 104,

**Colobodera** *elongata*, *mucronata*, *nitida*, *ovata*, *striata*, KLUG, Descr. de deux genres nouv. de Col. de Madagascar, 1837, LXXXVIII.

**Colobogaster** *4-dentata*, SOLIER, Essai sur les Buprestides, 1833, 308.

**Colobothra**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 69. — *id.*, *Cassandra*, *Contaminata*, 1835, 70,

**Colobura** *alboplagiata*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 523.

**Colobus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 554. — *hemipterus*, 1833, 555.

**Colen** *angularis*, FAIRMAIRE, trouvé près de St-Germain-en-Laye, 1857, XCII. — *Barnevillei*, KRAATZ, Descr. de qqes nouv. esp de Col., 1858, CXCII. — *claviger*, JACQ. DU VAL, Remarques et notes diverses, 1857, 98. — *confusus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 730. — *denticulatum*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXX. — *dentipes*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *latus*, FAIRMAIRE, 1857, XCII. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CXXXI. — *murinus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 397. — *rufescens*, Zoberi, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CXXXI. — *viennensis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 414.

**Colophotia** *lusitanica*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119. — *pedemontana*, 1847, 91. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvée en Piémont, fin d'août, 1851, LXXXVIII.

**Colotes** *Jaceti*, JACQ. DU VAL, Descr. de deux genres et de plusieurs esp. nouv. de la faune franç., 1852, 705. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 728. — *rubripes*, JACQ. DU VAL, 1852, 707. — *trinotatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 621.



**Colovocera** (voy. *Cholovocera*).

**Colpoderus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 178. — *caffer*, 1832, 179.

**Colpodes**, DE CHAUDOIR, Monogr. de ce genre, 1859, 287. — *id.*, Index, 1859, 361. — *acuminatus*, *æquinoctialis*, 1859, 339. — *æneipennis*, 1859, 359. — *æreipennis*, 1859, 356. — *amænus*, 1859, 326. — *Anachoreta*, 1859, 325. — *anchomenoides*, 1859, 310. — *aphædrus*, 1859, 321. — *ater*, 1859, 358. — *atramentarius*, 1859, 305. — *atratus*, 1859, 323. — *australis*, 1859, 359. — *azureipennis*, 1859, 355. — *azurgæus*, 1859, 354. — *brachypterus*, 1859, 302. — *brevicollis*, 1859, 344. — *Brullei*, 1859, 330. — *brunnipennis*, 1859, 312. — *brunneus*, *Buchanani*, 1859, 359. — *chalcopterus*, 1859, 340. — *chalybeus*, 1859, 357. — *cæruleomarginatus*, 1859, 343. — *cæruleus*, 1859, 335. — *cordatus*, 1859, 337. — *corvinus*, 1859, 305. — *cyanellus*, 1859, 344. — *cyanicollis*, 1859, 359. — *cyanipennis*, 1859, 341. — *cyano-notus*, 1859, 344. — *cycloderus*, 1859, 335. — *Dejeanii*, *dilatatus*, 1859, 359. — *dilutus*, 1859, 332. — *Eremita*, 1859, 325. — *erythrocerus*, 1859, 348. — *feronioides*, 1859, 303. — *Fischeri*, 1859, 318. — *gracilis*, 1859, 330. — *grandicollis*, 1859, 308. — *Hardwickii*, 1859, 359. — *janthinus*, 1859, 357. — *Jegæri*, 1859, 315. — *laticolle*, 1859, 359. — *latidens*, 1859, 317. — *Lherminieri*, 1859, 318. — *longipenne*, *lugens*, *Mannerheimii*, 1859, 359. — *marginatus*, 1859, 328. — *marginicollis*, 1859, 312. — *meridanus*, 1859, 306. — *metallicus*, 1859, 345. — *mæstus*, 1859, 313. — *monticola*, 1859, 325. — *nchrioides*, 1859, 342. — *niger*, 1859, 352. — *nitidipennis*, 1859, 357. — *nitidus*, 1859, 319. — *obscurus*, 1859, 322. — *oopterus*, 1859, 301. — *orbicollis*, 1859, 346. — *pallidipes*, 1859, 339. — *parallelus*, 1859, 326. — *planicollis*, 1859, 320. — *purpuratus*, 1859, 359. — *4-collis*, 1859, 300. — *reflexicollis*, 1859, 328. — *reflexus*, 1859, 347. — *ruficeps*, 1859, 348. — *ruficornis*, 1859, 346. — *rufitarsis*, 1859, 351. — *Schmidtii*, 1859, 360. — *seriepunctatus*, 1859, 298. — *6-punctatus*, 1859, 345. — *smaragdinipennis*, 1859, 351. — *sphodroides*, 1859, 309. — *spini-penne*, *spinosum*, 1859, 360. — *striatopunctatus*, 1859, 332. — *sub-metallicus*, 1859, 359. — *subviolaceus*, 1859, 339. — *sulcatus*, 1859, 307. — *tenuicornis*, 1859, 333. — *transversicollis*, 1859, 343. — *tristis*, 1859, 314. — *validus*, 1859, 342. — *variabilis*, *violaceipennis*, 1859, 340. — *violaceus*, 1859, 351.

**Colydium** *cylindricum*, *elongatum*, CHEVROLAT, trouvés à Fontaine-

bleau, 1833, 472. — *elongatum*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVL. — *sulcatum*, CHEVROLAT, 1833, 472.

**Colymbetes** *bipustulatus*, LEPRIEUR, Antenne droite offrant un faciès anormal, 1847, LXIV. — *Clairvillei*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 242. — *collaris*, *conspersus*, GAUBIL, pris à Strasbourg, dans les flaques d'eau du Rhin, 1850, XXXIX. — *coriaceus*, LUCAS, Notice sur une monstruosité dans l'antenne droite, 1843, 55. *dorsalis*, MONTROUZIER, 1860, 243. — *Grapii*, GAUBIL, 1850, XXXIX. — *id.*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LVIII. — *Montrouzieri*, MONTROUZIER, 1860, 243.

**Cometes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 208. — *hirticornis*, 1835, 210.

**Compsocephalus** *horsfieldanus*, SCHAU, Lamelliforme mélitophiles, 1849, 253.

**Compsocerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 62. — *barbicornis*, 1834, 63.

**Compsochilus** *africanus*, FAIRMAIRE, Diagn. de nouv. esp. de Col., 1860, 338.

**Compsozona**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 55. — *mutillaria*, *niveosignata*, 1835, 56. — *variegata*, 1835, 57.

**Coniatus** *chrysochlora*, LUCAS, Descr. de cette esp., 1848, XVII. — *id.*, Note sur cet Insecte, 1849, XXVII. — *id.*, PERRIS, Note sur ses mœurs, 1850, 25. — *id.*, LUCAS, Note sur le même sujet, 1850, 29. — *id.*, GODART, Note sur son habitat, 1851, XIII. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 731. — *Mimonti*, BOIELDIEU, 1859, 474. — *Tamarisci*, AZAMBRE, sur les bords de la mer, 1856, XVIII.

**Conoderus** *malleatus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 161.

**Conognatha**, SOLIER, Buprestides, 1833, 294. — *amæna*, 1833, 295.

**Conopalpus** *flavicollis*, *pallens*, REICHE et BOIELDIEU, pris dans la forêt de St-Germain-en-Laye, 1854, XXXV.

**Contipus**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 543. — *didymaostrius*, 1853, 546. — *digitatus*, 1853, 547. — *subquadratus*, 1853, 548.

**Conurus** *lividus*, *pubescens*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 413.

**Copelatus Aubei**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 244.

**Copraecus**, REICHE, Coprophages, 1842, 70. — *hemisphaericus*, 1841, 72.

**Copris hispanus**, AUDOUIN, Communic. de deux coques de terre renfermant cet Ins., 1833, LXXI. — *neptis*, *orphanus*, *trogodytarum*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97.

**Coproporus colchicus**, KRAATZ, Descr. de qqes esp. nouv. de Col., 1858, CXC.

**COPROPHAGES**, REICHE, Essai d'une classific. de cette tribu, 1842, 59.

**Coptia**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 225.

**Coptocephala scopolina**, *tetradyma*, Cap. GODART, Différences spécif. des organes mâles dans les cétoines de France, 1851, 667.

**Coptocephalus 4-spinosus**, BUQUET, Descr. de qqes Longicornes nouv., 1860, 619.

**Coptodera flavosignata**, GORY, Centurie de Carabiques nouv.. 1833, 193. — *massiliensis*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv. d'Europe et de France, 1849, 419. — *id.*, PERROUD, trouvé deux exemplaires parmi des Arachides du Sénégal, 1852, LXX. — *id.*, REICHE, Cette esp. a été décrite par Dejean sous le nom de *Lebia univittata*, 1854, XLV. — *nigripennis*, GORY, 1833, 195. — *plagiata*, REICHE et DE SACLAY, Col. d'Orient, 1855, 578 et 1858, 57. — *rufescens*, BUQUET, Descr. de qqes Col. nouv. de la famille des Carabiques. 1835, 617. — *tresignata*, 1835, 616. — *unifasciata*, PEYRON, trouvée à Tarsous dans des criblures de sésame, 1858, CLXXXI. — *id.*, REICHE, cet Ins. est une *Lebia*, 1858, CLXXXI. — *velox*, GORY, 1833, 195. — *viridipennis*, 1833, 194.

**Cordilomera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 23. — *nitidipennis*, *spinicornis*, 1834, 24.

**Coremia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 22. — *crythromera*, *hirtipes*, 1834, 23.

**Corœbus æneicollis**, *amethistinus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 726. — *amethistinus*, LUCAS, trouvé dans les env. de Tiaret, 1847, IX. — *cylindræus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 727. — *undatus*, BOIELDIEU et FAIRMAIRE, pris dans la forêt de St-Germain, 1851, LIII.

**Corotoca Melantho**, Philo, LUCAS, Remarque sur la viviparité de certains Col., 1856, LXXXVII.

**Corsyra**, SOLIER, Obs. sur les genres *Brachinus* et *Aptimus*, 1833, 459 et 463.

**Corticaria crassiuscula**, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 331.  
— *pubescens*, PIERIS, Hist. des métam. de cette esp., 1852, 585.

**Corticus foveolatus**, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv., 1848, 171.

**Corymbetes æruginosus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 586. — *castaneus*, *cupreus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 150. — *Gyllenhallii*, REICHE, Synonymie de cette esp., 1860, CVIII. — *hæmatodes*, LATREILLE, 1834, 150. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 586. — *pectinicornis*, LATREILLE, 1834, 150. — *pyrenæus*, KIESENWETTER, 1851, 586. — *quercûs*, REICHE, 1860, CVIII.

**Corynetes**, GÉRIN-MÉNEVILLE, Os perforés par des Ins., 1845, LXXXVII.  
— *marginellus*, CHEVROLAT, Descr. de 24 nouv. esp. de Térédiles, 1843, 42. — *ruficollis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 92.

**Corynosecellis glaucon**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 11.

**Coryphocera africana**, SCHAU, Lamelliforme mélitophiles, 1844, 354.  
— *bimacula*, *elegans*, *læta*, 1844, 352. — *smaragdina*, 1844, 354. — *viridicyanea*, 1844, 355.

**CORYSOPTÉRIDES**, SOLIER; Division des Col. hétéromères, 1834, 492.

**Coscinia**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditonus*, 1834, 670.

**Cosmiocomus hispanicus**, GOUGELET et CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de Col. nouv. de Gallicie et d'Algérie, 1859, CCXXXVII. — *Poupillieri*, 1859, CCXXXVIII.

**Cosmisoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 19. — *axillare*, *scopipes*, *scopulicorne*, 1834, 20.

**Cossonus cylindricus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, III. — *holomelas*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 911.

**Cossyphus ovatus**, GAUTIER DES COTTES, non rencontré en Corse, 1860, LV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, même remarque, 1860, LXXXIII. — *rugulosus*, LUCAS, Communic. de cette esp. décrite par M. Peyron, 1854, XXXII.

- Cotaster**, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1857, 741. — *littoralis*, MOTSCHULSKY, Notice sur un nouv. genre de Curculionites, 1850, LXV.
- Cotinis Klugii**, SCHAUM, *Lamelliforme mélitophiles*, 1844, 356. — *pauperula*, 1849, 262. — *subviolacea*, 1844, 356.
- Coxelus pictus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 112.
- Cratomerus cyanicornis**, SOLIER, *Buprestides*, 1833, 295.
- Cratonychus brunnipes**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 586. — *dimidiatipennis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 416,
- Cratesomus Roddami**, DOUÉ, *Communic. d'une var. de cette esp.*, 1857, XXXIX.
- Crepidodera**, E. ALLARD, *Descr. des Altises d'Europe et des bords de la Méditerranée*, 1860, 47. — *atropæ*, 1860, 66. — *cicatrix*, CHEVROLAT, Elle vit sur le *Solanum nigrum*, 1859, CXXX. — *id.*, AUBÉ, Elle vit sur la *Mercurialis annua* et non sur le *Solanum nigrum*, 1859, CCXL. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, *Confirm. de l'opinion de M. Aubé*, 1859, CCXL. — *id.*, CHEVROLAT, *Nouv. note sur son habitat*, 1860, XXXIII. — *corpulenta*, ALLARD, *Addenda et corrigenda*, 1860, 831. — *cyaneus*, *Monogr. des Altises*, 1860, 59. — *exoleta*, 1860, 52. — *femorata*, 1860, 58. — *fulvicornis*, 1860, 64. — *helxines*, 1860, 63. — *impressa*, 1860, 49. — *lineata*, 1860, 48. — *marginicollis*, 1860, 53. — *melanopus*, *Addenda et corrigenda*, 1860, 831. — *melanostoma*, 1860, 57. — *modeeri*, 1860, 64. — *nigritula*, 1860, 60. — *nitidula*, 1860, 62. — *pubescens*, 1860, 65. — *punctulata*, *Diagn. de qqes Altises nouv.*, 1859, c. — *rufipes*, *Monogr. des Altises*, 1860, 55. — *semirufa*, 1860, 56. — *id.*, *Addenda et corrigenda*, 1860, 831. — *strangulata*, 1860, 61. — *transversa*, 1860, 51. — *ventralis*, 1860, 54.
- Criocephalum rusticum**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127. — *id.*, LUCAS, trouvé à Fontainebleau sur des écorces de Pin, 1847, LXXX. — *id.*, PERRIS, *Ins. du Pin maritime*, 1856, 450.
- Crioceris asparagi**, *paracentthesis*, Var. *suturalis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 651. — *paracentthesis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734.
- Criodion**, AUD.-SERVILLE, *Longicornes*, 1833, 571. — *angustatum*, BUQUET, *Descr. de cinq nouv. esp. de Criodion*, 1852, 358. — *divit-*

*latum*, 1852, 356. — *corvinum*, AUD.-SERVILLE, 1833, 572. — *Feisthamelii*, BUQUET, 1852, 355. — *modestum*, 1852, 357. — *sculpticolle*, 1852, 356. — *selosum*, *tomentosum*, AUD.-SERVILLE, 1833, 572.

**Crioprosopus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 53. — *Servillei*, 1834, 54.

**Cressotus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 52, — *plumicornis*, 1835, 53.

**Cryphalus binodutus**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII.

**Cryptarcha punctatissima**, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv. de Col., 1859, 467.

**Crypticus alpinus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137. — *glaber*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *inflatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient. 1857, 262. — *longulus*, 1857, 263. — *ulooides*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 85.

**Cryptobias**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 35. — *coccineus*, 1834, 36.

**Cryptobium fracticorne**, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 723. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 424. — *id.*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LX. — *Jacquelinii*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv. 1859, 466.

**CRYPTOCEPHALÆ**, E. ALLARD, Monogr. des Altises, 1860, 785.

**Cryptocephalus**, THION et PERCHERON, Larve inconnue dans un fourreau solide, 1833, XXXIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larves trouvées à Marseille dans leurs coques, 1846, CV. — *id.*, L. DUFOUR, sur les coques de *Cryptocephalus*, 1852, 450. — *id.*, Un dernier mot sur leurs coques, 1852, LXXXV. — LEPRIEUR, sur une coque de *C. gravidus*, 1859, CCXXXIX. — *id.*, SUFFRIAN, Monogr. des esp. européennes extrait par M. Fairmaire, 1848, 285. — *abietis*, 1849, 153. — *albolineatus*, 1848, 291. — *anticus*, 1850, 277. — *aureolus*, 1849, 149. — *biguttulus*, 1850, 274. — *bilineatus*, 1850, 281. — *bimaculatus*, 1848, 291. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 651. — *bipunctatus*, SUFFRIAN, 1850, 276. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *bistripunctatus*, SUFFRIAN, 1850, 276. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de St-Germain, 1849, LX. — *id.*, pris dans la forêt de Fontainebleau, 1856, LXVI. — *Bæhmii*,

SUFFRIAN, Monogr. des esp. européennes, 1849, 147. — *bæticus*, 1848, 288. — *carinthiacus*, 1850, 271. — *celtibericus*, 1850, 280. — *centrimaculatus*, 1850, 292. — *coloratus*, 1849, 145. — *concolor*, 1849, 148. — *connexus*, 1850, 282. — *cordiger*, 1848, 292. — *coronatus*, 1848, 290. — *coryli*, 1849, 144. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 108. — *crassus*, SUFFRIAN, 1850, 278. — *creticus*, 1849, 156. — *cribratus*, 1849, 143. — *cristatus*, 1850, 292. — *curvilinea*, 1848, 286. — *cyanipes*, 1849, 151. — *cynaræ*, 1848, 286. — *10-punctatus*, LEPRIEUR, Var. prise à Dieppe sur un Saule, 1846, CXVI. — *id.*, SUFFRIAN, 1850, 273. — *digrammus*, 1850, 289. — *distinguendus*, 1848, 293. — *12-punctatus*, 1849, 152. — *12-plagiatus*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes esp. nouv. de Col., 1859, CLI. —  *duplicatus*, SUFFRIAN, 1849, 148. — *elongatus*, 1849, 147. — *fasciatus*, 1849, 144. — *flavescens*, 1850, 272. — *flavilabris*, 1850, 273. — *flavipes*, SUFFRIAN, 1849, 154. — *flavoguttatus*, 1849, 156. — *flexuosus*, 1849, 146. — *florentinus*, 1848, 292. — *frontalis*, 1850, 291. — *fulcratus*, 1850, 273. — *geminus*, 1850, 289. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 687. — *globicollis*, SUFFRIAN, 1849, 150. — *gracilis*, 1850, 287. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 687. — *id.*, LEPRIEUR, pris à la Glacière, près de Gentilly, 1847, L. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *gravidus*, SUFFRIAN, 1850, 278. — *Grohmanni*, SUFFRIAN, 1850, 274. — *halophilus*, 1849, 145. — *hirticollis*, 1848, 287. — *holoxanthus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 64. — *Hubneri*, SUFFRIAN, 1850, 288. — *hypochæridis*, 1849, 150. — *ilicis*, 1848, 287. — *imperialis*, 1848, 290. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 108. — *informis*, SUFFRIAN, 1848, 292. — *id.*, ROUGET, Note sur cet Ins., 1849, 159. — *interruptus*, SUFFRIAN, 1849, 143. — *janthinus*, 1850, 273. — *Koyi*, 1850, 279. — *Koyi, labiatus*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *labiatus*, SUFFRIAN, 1850, 288. — *lævicollis*, 1849, 143. — *lævigatus*, 1849, 152. — *larvatus*, 1850, 290. — *lincola*, GHILIANI, 1847, 108. — *lividimanus*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *lobatus*, SUFFRIAN, 1849, 151. — *lætus*, 1848, 289. — *Loreyi*, SOLIER, Descr. d'une nouv. esp. 1836, 687. — *id.*, LOREY, Notice sur la découverte de cette esp., 1837, 125. — *id.*, VILLA, Obs. sur cet Ins., 1838, XXXIII. — *id.*, SUFFRIAN, 1848, 292. — *lusitanicus*, 1849, 144. — *major*, VILLA, Cette espèce, décrite par Comolli, appartient au genre *Homalopus*, 1838, XXXV. — *marginatus*, 1850, 274. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Sénart, 1848, XLIV. — *marginellus*, SUFFRIAN, 1859, 154. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *minutus*, SUFFRIAN, 1850, 285. — *modestus*, 1850, 291. — *moræi*,

1849, 157. — *mystacatus*, 1850, 289. — *nigritarsis*, 1849, 146. — *nitens*, 1849, 153. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 687. — *id.*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, xxxii. — *nitidulus*, SUFFRIAN, 1849, 153. — *ochroleucus*, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1859, 63. — *id.*, DELAROUZÉ, trouvé à Paris sur le Peuplier, 1859, cxxxix. — *pallifrons*, SUFFRIAN, 1850, 275. — *Peronii*, GIRARD, du voyage de Péron, 1857, clv. — *pexicollis*, FAIRMAIRE, 1848, 290. — *pini*, 1849, 152. — *populi*, 1850, 286. — *pulchellus*, 1850, 285. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *punctiger*, SUFFRIAN, 1850, 278. — *pusillus*, 1850, 286. — *pygmaeus*, 1850, 284. — *4-guttatus*, 1849, 155. — *4-punctatus*, 1849, 144. — *id.*, KIESEWENTTER, 1851, 651. — *4-pustulatus*, SUFFRIAN, 1849, 155. — *4-signatus*, 1849, 157. — *querceti*, 1850, 290. — *Ramburi*, 1849, 156. — *Rossii*, 1850, 279. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *rubi*, SUFFRIAN, 1849, 147. — *rugicollis*, 1848, 288. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *salicis*, SUFFRIAN, 1850, 275. — *scapularis*, 1850, 290. — *scutellaris*, TRUQUI, *Novæ Histerinorum et Cryptocephalorum species*, 1852, 65. — *sericeus*, SUFFRIAN, 1849, 148. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1862, 687. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *6-maculatus*, GHILIANI, 1847, 113. — *id.*, SUFFRIAN, 1848, 286. — *6-punctatus*, 1848, 294. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 687. — *id.*, GHILIANI, 1847, 108. — *6-pustulatus*, SUFFRIAN, 1850, 278. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *signaticollis*, SUFFRIAN, 1850, 284. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *signatus*, SUFFRIAN, 1849, 157. — *stramineus*, 1849, 152. — *strigosus*, 1850, 291. — *Suffriani*, 1850, 292. — *sulphureus*, 1849, 152. — *tessellatus*, 1850, 281. — *tetraspilus*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *tristigma*, SUFFRIAN, 1848, 287. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *undatus*, SUFFRIAN, 1848, 291. — *variabilis*, 1848, 294. — *variegatus*, 1848, 293. — *villosulus*, 1849, 151. — *violaceus*, 1849, 147. — *virens*, 1849, 148. — *virgatus*, 1848, 289. — *vittatus*, GHILIANI, 1847, 108. — *id.*, SUFFRIAN, 1850, 280. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 687. — *vittula*, 1850, 283. — *ypsilon*, 1849, 146. — *Wasastjernii*, 1850, 289.

**Cryptochile**, SOLIER, *Collaptérides*, 1840, 248. — *assimile*, 1840 (1), 363. — *costatum*, 1840, 252. — *crassipes*, 1840, 364. — *decoratum*, 1840, 355. — *distinctum*, 1840, 254. — *fallax*, 1840, 358. — *Gayi*, 1840, 362. — *globulum*, 1840, 359. — *maculatum*, 1840, 251. —

[1] La pagination de ce volume est fautive depuis la page 254 exclusivement ; le chiffre 2 des centaines est remplacé par le chiffre 3.



*penicillatum*, 1840, 357. — *trilineatum*, 1840, 361. — *vicinum*, 1840, 354.

**CRYPTOCHILITES**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 248.

**Cryptocranium**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 75. — *laterale*, 1835, 76.

**Cryptodentes**, *Latreillianus*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 19.

**Cryptoglossa**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 680. — *bicostata*, 1836, 681.

**Cryptohypnus** *flavipes*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 338. — *pulchellus*, *4-pustulatus*, *riparius*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 153. — *rivularis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 139.

**CRYPTOPHAGIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 102.

**Cryptophagus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larve trouvée dans des Pommes de terre malades, 1845, LXXXVI. — *id.*, PAUL DE SAINT-MARTIN, Note sur une nymphe trouvée dans des Pommes de terre malades, 1849, XLV. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé dans de l'Orge avariée, 1851, LXXXVII. — *id.*, *dentatus*, PERRIS, Hist. de ses métamorph., 1852, 578. — *hirtus*, BLISSON, Descr. de la larve et de la nymphe, 1849, 315.

**Cryptorhynchus** *Huoni*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 904,

**Cryptostoma** *denticornis*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 136,

**Crypturgus** *pusillus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 201.

**Crypturus**, DE MARSEUL, Histerides, 1853, 290. — *ænescens*, 1853, 293.

**Ctelsa**, SOLIER, Prodrome de la famille des Xystropides, 1835, 242. — *hirta*, 1855, 243.

**CTÉNIOPITES**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 245..

**Cteniops**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 246. — *bicolor*, *sulphurea*, *sulphuripes*, 1835, 247.

**Ctenistes**, AUBÉ, Révision de la famille des Psélaphiens, 1844, 96. — *æquinocialis*, 1844, 98. — *barhipalpis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 792. — *carinatus*, AUBÉ, 1844, 100. — *Dejeanii*, Note sur la famille des Psélaphiens, 1833, 505. — *Ghilianii*, 1844, 99. — *integricollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 793. — *palpalis*,

AURÉ, 1833, 505. — *id.*, Révision des Psélaphiens, 1844, 97. — *id.*, GHILLIANI, Col. du Piémont, 1847, 99. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 401.

**Ctenodactyla** *Drapiez*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 181. — *maculata*, 1833, 182. — *tristis*, 1833, 183.

**Ctenodes** 10-*maculata*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 35.

**Ctenognathus** *novæ-zelandiæ* FAIRMAIRE, Descr. de trois. nouv. esp. de l'Océanie, 1843, 12.

**Ctenoscelis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 134. — *id.*, BUQUET, Notice monographique sur ce genre, 1843, 231. — *acanthopus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 135. — *id.*, BUQUET, 1843, 237. — *ater*, AUD.-SERVILLE, 1832, 135. — *id.*, BUQUET, 1843, 233. — *dyrrachus*, 1843, 235. — *nausithous*, 1843, 236. — *tuberculatus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 135.

**CUCUJIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 101.

**Cucujus** *ater*, *crassicornis*, *ferrugineus*, *monilis*, CHEVROLAT, trouvés à Fontainebleau, 1833, 472.

**Curculio** *frumentarius*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, C'est certainement la *Calandra granaria*, et non l'*Apion frumentarius*, 1845, vi.

**CURCULIONITES**, LABOULBÈNE, éclos de larves trouvées dans les sommités desséchées d'une Synanthérée (*Carlina*), 1856, LXXXVI. — *id.*, GOUREAU, Remarques sur plusieurs Insectes, 1857, XXVI. — *id.*, TAPPES, Communication d'une coque qui se meut par des bonds successifs, 1857, XCII. — *id.*, SOLIER et GAY, Mém. sur deux genres remarq. de Curcul. du Chili, 1839, v. — *id.*, Note sur des rectific. à faire au mém. précéd., 1839, XLIX. — *id.*, JEKEL. L'auteur annonce qu'il va s'occuper exclusivement de cette famille, 1846, XCVII. — *id.*, DODÉ, trouvé en très-grande quantité sur les poulies en fer du port de Brest, 1851, LXXXIV. — *id.*, JEKEL, Commun. d'un mémoire sur la révision des genres *Hypsonotus*, *Lordops* et *Eurylobus*, 1851, CXVI. — *id.*, PASSERINI, Note sur une larve qui fait grand dommage aux Fèves, 1852, XLIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE. L'auteur pense que cette larve est celle du *Lixus angustatus*, 1852, L. — *id.*, JEKEL, Dépôt de la description de qqes esp. nouv. de l'archipel australien, 1855, XLIV. — *id.*, Note relat. à la géogr. de qqes esp., 1856, XLVI.

**Curis** *Betta*, *Chloris*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Révision des Col. du Chili, 1858, 719.

**Cyathodera longicollis**, CHEVROLAT, Note sur la synonymie de qqes Col., 1856, cv.

**Cybister ægyptiacus**, PEYRON, Descr. de deux genres et de quatre esp. de Col. de l'Orient, 1856, 722. — *africanus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 785. — *artensis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 241. — *bimaculatus*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LVIII. — *bimaculatus*, *binotatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 785. — *Jordanis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 637. — *novæ-caledoniæ*, MONTROUZIER, 1860, 241. — *Ræselii*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 785. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 402.

**Cychramus chloroticus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 168. — *luteus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII.

**Cychnus acuticollis**, REICHE, trouvé dans les env. de Bagnères, 1858, XCV. — *angustatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 120 et 140. — *cordicollis*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et espèces de Carabiques nouv., 1835, 442. — *id.*, GHILIANI, 1847, 141. — *elongatus*, DOUÉ, trouvé le 4 mai dans la forêt de Bondy, 1846, XLIX. — *italicus*, AL. PIERRET, découvert aux env. de Turin, 1841, XXXIII. — *id.*, DUPONCHEL, trouvé dans les Apennins, 1838, XXXIII. — *id.*, GHILIANI, 1847, 102. — *rostratus*, ROUZET, trouvé dans la forêt de Bondy, 1850, L. — *id.*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXI.

**Cyclocephala concolor**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 6. — *cribrata*, *dorsalis*, 1859, 7. — *immaculata*, *longicollis*, 1859, 6. — *lucida*, 1859, 7. — *lunulata*, *pelioptera*, 1859, 6. — *Percheroni*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 271. — *quercina*, *sanguinicollis*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 6. — *signaticollis*, *stictica*, *tutilina*, 1859, 7. — *verticalis*, *villosa*, 1859, 6.

**Cyclomaurus velutinus**, FAIRMAIRE, Diagnoses de deux Col. nouv. d'Algérie, 1860, XXXI.

**Cyclonotum orbiculare**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680.

**Cyclopeplus cyaneus**, DOUÉ, Ins. de Cayenne, 1854, XLIII.

**Cynoderus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 101. — *id.*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 531. — *tenuatus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 102. — *testaceus*, *tricolor*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 502.

**Cylldrus, agilis**. LUCAS, Note sur plusieurs Col. nouv. du nord de

l'Afrique, 1843, xxv. — *gagates*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 260.

**Cylindroderus femoratus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 163.

**Cylindromorphus parallelus**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1852, 49.

**Cylistus**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 287. — *cylindricus*, 1852, 289.

**Cyllene**, CHEVROLAT, *Clytus* du Mexique, 1860, 453.

**Cyllidium seminutum**, LEPRIEUR, env. de Bone, 1853, LVIII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786.

**Cymatopterus striatus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119.

**Cymindis adusta**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 392. — *axillaris*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 136. — *carinulata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 752. — *cayensis*, BUQUET, Descr. de qqes esp. nouv. de la fam. des Carabiques, 1835, 611. — *cingulata*, GHILIANI, 1847, 125. — *coadunata*, 1847, 140. — *confusa*, PEYRON, 1858, 390. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 752. — *corrosa*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 570, et 1858, 57. — *discoidea*, PEYRON, 1858, 390. — *domestica*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 240. — *etrusca*, BASSI, Descr. de qqes nouv. esp. de Col. d'Italie, 1834, 467. — *Faminii*, major BLANCHARD, deux individus trouvés à Misserghin (Algérie), 1849, LXV. — *id.*, FAIRMAIRE, Proposition d'en faire un nouv. genre sous le nom de *Platytarus*, 1850, xvii. — *id.*, PEYRON, 1858, 392. — *gcophila*, MONTROUZIER, 1860, 235. — *gracilis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 753. — *guadelupensis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 186. — *Henonii*, FAIRMAIRE, Note sur qqes Ins. de Barbarie, 1859, LI. — *homagrica*, GHILIANI, 1847, 117. — *id.*, major BLANCHARD, trouvée à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV. — *id.*, PEYRON, 1858, 392. — *humeralis*, GHILIANI, 1847, 120. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvée à Saint-Germain, 1850, XLVIII. — *maculata*, GORY, 1833, 187. — *mauritanica*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 752. — *melanocephala*, GHILIANI, 1847, 125. — *meridionalis*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 286. — *miliaris*, GHILIANI, 1847, 100. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *id.*, FAIRMAIRE, Note sur qqes Ins. de Barbarie, 1851, LI. — *id.*, PEYRON, 1858, 392. — *Osiridis*, Descr. de deux genres et de quatre espèces provenant d'Orient, 1856, 720. — *id.*, SCHAUM, sans doute le même que *carinata* et que *tessellata* de

Klug, 1857, LXXX. — *id.*, PEYRON, Note en réponse à M. Schaum, 1857, CX. — *pallida*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 569. — *picea*, MONTROUZIER, 1860, 235. — *punctata*, GHILIANI, 1847, 128. — *Servillci*, SOLIER, Desc. de qqes esp. nouv. de la famille des Carabiques, 1835, 112. — *sinuata*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 571. — *suturalis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 751. — *id.*, DOUÉ, provenant d'Algérie, 1854, XLI. — *tabida*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 568. — *tutetina*, BUQUET, 1835, 612.

**Cymindoldea bisignata**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. de Col. nouv. ou peu connus, 1832, 390.

**Cyphogenia**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 677. — *aurita*, 1836, 679.

**Cyphon**, DE LAPORTE, Rhipicérides, 1834, 227. — *id.*, JACQ. DU VAL, trouvé dans l'eau, sous des pierres, 1855, LXXX. — *testaceus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468.

**CYPHONTES**, DE LAPORTE, Rhipicérides, 1834, 227.

**Cyphonota Buqueti**, BUQUET, Communic. d'un Buprestide monstrueux, 1840, XXVII.

**Cyria imperialis**, SOLIER, Buprestides, 1833, 269. — *Varennesi*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 248.

**Cyrtonus**, FAIRMAIRE, Monogr. de ce genre, 1850, 535. — *id.*, envoyés par M. Bigot des Pyrénées-Orientales, 1856, LXXXII. — *angusticollis*, 1850, 543. — *brevis*, *curtus*, 1850, 547. — *Dufouri*, 1850, 546. — *id.*, L. DUFOUR, Note sur cet Ins., 1847, CIII. — *id.*, CHEVROLAT, Obs. sur cet Ins., 1847, CIV. — *id.*, BUQUET, Détails intéressants sur le même Ins., 1851, LIII. — *elegans*, FAIRMAIRE, 1850, 541. — *cumolpus*, 1850, 545. — *montanus*, 1850, 542. — *plumbeus*, 1850, 540. — *punctipennis*, Miscellanea entomologica, 1857, 744. — *rotundatus*, Monogr. du genre *Cyrtonus*, 1850, 539. — *ruficornis*, *thoracicus*, 1850, 544.

**Cyrtothorax Sallci**, CHEVROLAT, déjà signalé par Erichson sous le nom de *Quedius buphthalmus*, et par Dejean sous celui de *Bolitogyrus cribrepennis*, 1859, v.

**Cyrtusa pauxilla**, FAIRMAIRE, trouvé près de Saint-Germain-en-Laye, 1857, XCII.

## D.

**Daliedentus**, REICHE, *Helluonides*, 1842, 337. — *cayennensis*, *rufipes*, 1842, 338.

**Dallognata**, SOLIER, *Collaptérides*, 1835, 258. — *Audouini*, 1835, 266. — *caraboides*, *Cærceli*, 1835, 265. — *crenata*, REICHE et DE SAULCY, *Col. d'Orient*, 1857, 196. — *hispana*, SOLIER, 1835, 261. — *impressicollis*, *rugata*, 1835, 263. — *variabilis*, 1835, 262. — *vicina*, 1835, 267.

**Demaster blaptoides**, DE MNISZECH, *Communic. de ce magnifique Col.*, 1855, XXXIII. — *id.*, LUCAS, *Réflexions à ce sujet*, 1855, XXXIII.

**Depta trimaculata**, JACQ. DU VAL, *Obs. recueillies dans un voyage à Prades*, 1850, XXIV.

**Daptus vittiger**, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, *Col. des env. de Montpellier*, 1852, 721.

**Dascillus**, LATREILLE, *Serricornes*, 1834, 170 (voir *Atopa*).

**Dasycerus echinatus**, GHILIANI', *Col. du Piémont*, 1847, 101.

**Dasygnathus**, REICHE, *Notes synonymiques*, 1859, 16.

**Dasysterna**, LUCAS, *Obs. sur ce genre*, 1850, 515. — *id.*, LUCAS, *Quques remarques sur les D. hirticollis et unicolor*, 1859, 445. — *barbara*, *canariensis*, RAMBUR, *Monogr. du genre Elaphocera*, 1843, 331. — *hirticollis*, LUCAS, *Descr. de trois nouv. esp. du nord de l'Algérie*, 1850, 523. — *Reichèi*, RAMBUR, 1843, 332. — *rufipennis*, LUCAS, Cette esp. citée par M. Burmeister est imaginaire, 1859, 446. — *id.*, SCHAUM, Par inattention on a imprimé *rufipennis* au lieu de *rubripennis*, 1859, CCLII. — *rubripennis*, LUCAS, 1850, 521. — *unicolor*, 1850, 525.

**Dasytes ater**, DUPONCHEL, *trouvé dans la Lozère*, 1834, 287. — *ciliatus*, GRAELLS, *Descr. d'une nouv. esp.*, 1842, 221. — *id.*, KIESENWETTER, *Col. du midi de la France et de Catalogne*, 1851, 621. — *cæruleus*, FAIRMAIRE, *Larve et nymphe trouvées dans la forêt de St-Germain*, 1850, XIX. — *id.*, LABOULBÈNE, *Descr. des métamorph. de cette esp.*,

1858, 513. — *cylindraceus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *cylindricus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 728. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé aux environs de Vernon, 1855, XLVII. — *flavipes*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 599. — *imperialis*, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. de Sardaigne, 1836, III. — *niger*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 135. — *nigricornis*, CHEVROLAT, trouvé à Arminvilliers, 1859, XXXVIII. — *nobilis*, GRAELLS, Descr. d'une nouv. esp. de ce genre, 1842, 223. — *nobilis*, *pallipes*, *plumbeus*, KIESENWETTER, 1851, 621. — *prolensus*, GÉNÉ, 1836, II. — *4-pustulatus*, KIESENWETTER, 1851, 621. — *rust-collis*, GHILIANI, 1847, 135. — *scaber*, KIESENWETTER, 1851, 621. — *splendidus*, LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 398. — *villosus*, DUPONCHEL, 1834, 287.

**Dellus fugax**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 73.

**Deleaster dichrous**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 433.

**Deltaspis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 7. — *aurmarginata*, 1834, 8.

**Deltochilum arrogans**, *hypona*, REICHE, Confirmation de l'existence des tarsi antérieurs, 1855, CII.

**Domestrias atricapillus**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 393. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 753.

**Dendarus cribratus**, *gravidus*, REICHE et F. DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 253. — *variolosus*, major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV.

**Dendrobias**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 41. — *mandibularis*, 1834, 42. — *maxillosus*, 1834, 44.

**Dendroctenus piniperda**, LUCAS, Dégâts causés aux *Pinus laricio* du Jardin des Plantes, 1850, XLVIII.

**Dendrophilus**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 146. — *delicatulus*, 1857, 164. — *minutus*, 1857, 165. — *punctatus*, 1855, 148. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 104. — *punctulatus*, DE MARSEUL, Descr. d'un genre nouv. et de plusieurs esp. nouv., 1857, 435. — *pygmaeus*, Histérides, 1855, 150. — *sulcatus*, 1857, 166.

**Derancistrus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 181. — *elegans*, 1832, 182.

**Dereylus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 256. — *ater*, LAPORTE, Descr. de 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 392. — *gibbosus*, *infernus*, *tenebricosus*, DE LA FERTÉ, 1851, 258.

**Dermestes**, EMM. ROUSSEAU, Obs. relatives à la distinction des sexes, 1838, LIII. — *id.*, L. REICHE, Esp. probablement nouv. trouvée dans des nids de chenilles, 1857, XX. — *ater*, *atomarius* KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 579. — *cadaverinus*, AUBÉ, très-abondant dans les marchandises de droguistes, 1853, LXVII. — *chinensis*, LHERMINIER, Obs. sur les habitudes des Ins. de la Guadeloupe, 1837, 499. — *diadema*, FAIRMAIRE, Suite de Col. provenant de Tanger, 1851, XXI. — *Frischii*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *id.*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 340. — *hispidulus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1850, 264. — *lardarius*, D'HOMBRES-FIRMAS, larves attaquant les cocons et les larves de Vers à soie, 1839, XLV. — *id.*, AUDOUIN, Confirmation de l'obs. précédente, 1839, XLVI. — *id.*, DESMAREST, Perforation d'un mur en calcaire grossier, 1844, XXXIII. — *listerianus*, JACQ. DU VAL, Synonyme de *Necrophorus germanicus*, 1857, 95. — *murinus*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *mustelinus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 638. — *pardalis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 725. — *peruvianus*, JACQ. DU VAL, Se trouve depuis deux ou trois ans aux env. de Bordeaux, 1853, LXVII. — *roseiventris*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 92. — *sardous*, KIESENWETTER, 1851, 579. — *scaber*, 1851, 579. — *serra*, PERRIS, Note pour servir à son histoire. 1846, 339. — *vulpinus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 725.

**Derobrachus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 154. — *agyleus*, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp. de Prionien, 1852, 657. — *brevicollis*, AUD.-SERVILLE, 1832, 155. — *Levoiturieri*, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp. de Prionien, 1842, 203.

**Deroplia** *Genei*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 98.

**Desmiphora** *fasciculata*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 62. — *hirticollis*, 1835, 63.

**Desmocerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 202. — *aurcipennis*, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp. de Col., 1858, 325. — *cyaneus*, AUD.-SERVILLE, 1835, 202.

**Desmoderus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 37. — *variabilis*, 1834, 38.



**Dendrocerus tuberosus.** CHEVROLAT. Rapport aux genres actuels des Longicornes de la coll. de Banks. 1851. 664.

**Dia nitida.** Stongor. EM. BLANCHARD. Quelques Enmolpides recueillies en Sicile. 1845. IV.

**Dicranellus fuscus.** LATREILLE. Serricornes. 1834. 151. — *fuscus*, *emphicollis*. KIESSENWETTER. Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851. 387. — *variatus*, *depressus*, *latus*. LATREILLE. Serricornes, 1834. 151. — *reticulatellus*. FAIRMARE. envoyé par M. Bigot des Pyrénées orientales. 1856. LXXI.

**Dicranellus germanus.** PEYRON. Col. des env. de Tarsous, 1858. 385. — *id.* FAIRMARE et COQUEL. Col. de Barbarie, 1855. 759.

**Dianous curticornis.** KIESSENWETTER. Col. du midi de la France et de Catalogne. 1851. 123.

**Diaperis paludica.** MONTROCHIER. Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 291. — *xygaster*. 1860. 304.

**Diaphonia Bassii**, SCHACH. Lameil melit. 1849. 288. — *frontalis*, 1849, 283. — *notabilis*, *palmata*, *rugosa*, *xanthopyga*, 1849, 288.

**Diaphorus Leprieuri**, BOQUET. Descr. de quelques Col. nouv. de la fam. des Carabiques. 1835. 605.

**Diaprepes Doublierii**, GÉRIN-MÉNEVILLE. Communic. de deux indiv. de Saint-Domingue. 1846. CIII.

**Diastoleus**, SOLIER, Collapterides. 1838. 67. — *collaris*, 1838. 68.

**Dibolia**, VILLARD, Essai monogr. sur les Altises d'Eur. 1860, 785. — *chryptocephala*, 1860. 789. — *cynoglossi*, 1860. 791. — *depressiuscula*, 1860, 793. — *femoratis*, 1860. 787. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de quelques Col. propres à la faune française, 1859, CXXXII. — *Forsteri*, 1860, 794. — *maura*, *occultans*, 1860, 795. — *paludina*, 1860, 792. — *pelleti*, 1860, 788. — *rugulosa*, 1860, 787. — *Schillingii*, 1860, 790. — *timida*, 1860, 791.

**Dicera acuminata**, *ænea*, *berolinensis*, SPINOLA, Lettre sur un groupe de Buprestides, 1837. 106. — *berolinensis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90. — *id.*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 468. — *fagi*, larves trouvées à Fontainebleau, dans le bois de Hêtre, 1846, LXXIV. — *maesta*, SPINOLA, 1837, 106.

- Diceroederes**, BUQUET, C'est le genre *Prosomenes* de Dejean, 1840, XXIX — *id.*, SOLIER, Collaptérides, 1841, 46. — *mexicanus*, 1841, 49.
- Diceros decorus**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 352. — *ornatus*, 1844, 351.
- Dichodontus cræsus**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 16.
- Dichomma**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 271. — *Chevrolatii*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 200. — *Duponti*, SOLIER, 1835, 274. — *Maillei*, 1835, 273.
- Dichotrachelus Stierlini**, ROUGET, trouvé aux env. de Besançon, par M. Godart, 1859, CLXV.
- Dicelus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 275. — *ambiguus*, *Lecontei*, *quadratus*, *sculptitis*, 1851, 277.
- Dicrania brasiliensis**, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 409. — *flavoscutellata*, 1832, 408. — *hirtipes*, *velutina*, 1832, 409.
- Dicranorrhina micans**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 349.
- Dicrepidius rufipes**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 156 et 157.
- Dicrochile anchomenoides**, *Fabrii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur deux Carabiques de la Nouvelle-Hollande, 1846, CIII.
- Diesia**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 18. — *4-dentata*, 1836, 20.
- Dietopsis**, SOLIER, Xystropides, 1835, 236.
- Diglossa mersa**, JAVET, prise en Écosse, 1851, XLI. — *id.*, SOUVERBIE, prise à la Teste, 1852, LXVII. — *id.*, AUBÉ, prise au même lieu, 1851, XLI — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682.
- Dilobitarsus tuberculatus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 142.
- Dilobochilus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 253. — *Westermanni*, 1851, 253 et 293.
- Dima elateroides**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 155.
- Dimerocerus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 788 et xc. — *sociator*, COQUEREL, Descr. d'un nouv. genre d'Histéride, des env. de Mers-el-Kébir, 1858, xc. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 790.

- Dineutes**, CHEVROLAT, Communic. de deux Col. présentant des particularités intéressantes, 1860, LXXXVI. — *leucopoda*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 245.
- Dinoderus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. classific. du groupe des Bostri-  
chides, 1845, XVII.
- Dinodes**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 264. — *affinis*, *delicatulus*, 1851, 264 et 265. — *fulvipes*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 444. — *persicus*, DE LA FERTÉ, 1851, 264 et 265. — *rufipes*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 759.
- Dinomorphus** *pimelioides*, FAIRMAIRE, Communic. de ce Curculionite de Bahia, 1855, LXXII.
- Diodontes**, SOLIER, Essai sur les Collaptérides, 1834, 518. — *fossulatus*, 1834, 521. — *porcatus*, 1834, 519. — *sulcatus*, 1835, 522.
- Diodyrhynchus** *attelaboides*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 434. — *austriacus*, JACQ. DU VAL, Glanures entomologiques, 1857, 85. — *id.*, SCHAUUM, est-il réellement la ♀ de l'*attelaboides*, 1857, LXXX.
- Diphucrania** *macromera*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 251.
- Diplognatha** *admixta*, SCHAUUM, Lamell. mélit., 1844, 394 et 1849, 285 et 287. — *Blanchardi*, 1844, 417. — *gagates*, 1844, 393 et 1849, 284. — *herculcana*, 1849, 288. — *holosericea*, 1849, 285, 287. — *ornatipennis*, 1849, 288. — *pectoralis*, 1849, 285. — *silicea*, 1844, 293 et 1849, 284.
- Diphyllomorpha** *Mearsii*, SCHAUUM, synonyme d'*Anomalocera Parrii*, 1844, 351.
- Diphyllus** *fagi*, ARBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 329. — *frater*, 1850, 330. — *lunatus*, PERRIS, Qques mots sur les métam. de Col. Mycétophages, 1851, 42.
- Diræa** *australis*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 546. — *discolor*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 105. — *griscoguttata*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv. d'Europe et de France, 1849, 423. — *4-guttata*, Miscellanea entomologica, 1856, 546.
- Dirhagus** *pygmæus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 130 et 131.

**Dianlax hirsuticornis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 562.

**Dischirius**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 669. — *chalcus*, *nitidus*, *obscurus*, *punctipennis*, *salinus*, *thoracicus*, FAIRMAIRE, Excursion à la Baie de la Somme, 1852, 678.

**Discopeltis concinna**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 406.

**Disopus pini**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 341.

**Distenia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 207. — *id.*, BUQUET, Commun. d'un Longicorne de ce genre, 1842, XXXIII. — *columbina*, AUD.-SERVILLE, 1835, 208.

**Distichocera maculicollis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 59.

**Ditoma crenata**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 614.

**DITOMITES**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 669.

**Ditomus**, SOLIER, Obs. sur ce genre, 1834, 659, 662 et 669. — *id.*, BAULLE, Examen des genres *Brachinus* et *Ditomus*, 1835, 627. — *id.*, SOLIER, Réponse à l'examen des genres *Brachinus* et *Ditomus*, 1836, 691. — *id.*, REICHE, Deux esp. nouv. trouvées en Algérie, 1848, XCII. — *bucidus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 585. — *bucidus*, *calydonius*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 387. — *calydonius*, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 664. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 102. — *id.*, LABOULBÈNE, trouvé aux env. d'Agen, 1849, XLIX. — *id.*, JACQ. DU VAL, trouvé à Toulouse, 1849, XLIX. — *cephalotes*, SOLIER, 1834, 663. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 655. — *cornutus*, SOLIER, 1834, 664. — *cribratus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 588. — *id.*, REICHE, retrouvé en Palestine par M. de Saulcy, 1856, XLVI. — *Frioli*, SOLIER, 1834, 664. — *robustus*, 1834, 663. — *Samson*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 586. — *siagonoides*, SOLIER, 1834, 664. — *solitarius*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 387. — *sulcatus*, GHILIANI, 1847, 102. — *tomentosus*, REICHE, Notes sur div. Col., 1859, 639.

**Ditylus palmarum**, *puberulus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 304.

**Delicnon illyricus**, *venustus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 428.

**Delichosoma filum**, FAIRMAIRE, Diagn. de nouv. esp. de Col., 1860, 630. — *linearis*, Baie de la Somme, 1852, 685.

**Dolichus flavicornis**, JACQ. DU VAL, Quatre indiv. pris au pied d'un arbre aux env. de Toulon, 1849, XLII. — *rufus*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 231.

**Donacia**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur leurs métam., 1846, LXXV. — *appendiculata*, JACQ. DU VAL, Communic. de deux exemplaires pris aux env. d'Auch, 1849, XLII. — *cincla*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 473. — *crassipes*, AUBÉ, Détails sur cette esp., 1840, XXXVI. — *lemnæ*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, sortie de racines de *Sparganium ramosum*, 1846, LXXIX. — *id.*, Indic. d'un mémoire de M. Mulsant sur ses métam., 1846, CII. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 98. — *sagittariæ*, PERRIS, Hist. de ses métam., 1848, 33. — *simplex*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686.

**Dorcacerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 30. — *barbatus*, 1834, 31.

**Dorcadion**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 96. — *fuliginator*, 1835, 97. — *fulvum*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 289. — *glycyrrhizæ*, CHEVROLAT, Rapport aux genres nouv. des Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 653. — *italicum*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 111. — *Lorquini*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Col. de la faune méditerranéenne, 1855, 322. — *pedestre*, GHILIANI, 1847, 111. — *Perezi*, GRAELLS, Col. nouveaux de la faune centrale de l'Espagne, 1851, 24. — *4-lineatum*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *rufipes*, AUD.-SERVILLE, 1835, 98.

**Dorcasomus cbulinus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 12.

**Dorcatoma dichroa**, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv. de Col., 1859, 471. — *rubens*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469.

**Dorcus bubalus**, REICHE, Notes synonymiques. C'est le *Luc. axis* Dej., 1853, 79. — *bucephalus*. Il a pour ♂ le *Luc. briarcus* Hope, et pour ♀ le *rugifrons* Hope, 1853, 79. — *curycephalus*, C'est le *bubalus* Perty qui doit prévaloir, 1853, 79. — *Lessonii*, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp. de Lucanides, 1842, 283. — *Luxerii*, Descr. de cet Ins., 1843, LI. — *Musimon*, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. de Sardaigne, 1836, III. — *nepalensis*, REICHE, n'appartient pas au genre *Dorcus*, 1853, 81. — *oryx*, L'auteur est d'avis de lui maintenir le nom de *cribriceps*, 1853, 80. — *parallelipipedus*, Communication d'une notice de M. le vicomte de Bar sur les métam. de cet Ins., 1844, XVIII. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 105. — *id.*, LUCAS, Communic.

de plusieurs indiv. des env. de Tanger, 1858, iv. — *Peyronis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 407. — *Reichei*, REICHE, Esp. bien distincte, 1853, 427. — *serricornis*, REICHE, N'appartient pas à ce genre, 1853, 81. — *striatus*, E. BLANCHARD, Diffère du *Lucanus striatus* Fabr., 1845, v. — *titan*, REICHE, Est-il bien de Célèbes ? 1853, 78.

**Dorystenes rostratus**, CHEVROLAT, Rapport aux genres actuels des Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 657.

**Dorytomus dorsalis**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686.

**Drapetes frater**, DE BONVOULOIR, Descr. de plusieurs esp. nouv. de Troscides, 1860, 357. — *retrofasciatus*, 1860, 360. — *sanguinicollis*, 1860, 361. — *signatipennis*, 1860, 358.

**Drepanocerus**, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 98.

**Drepanus**, SOLIER, Obs. sur les genres *Brachinus* et *Aptinus*, 1833, 460.

**Drilus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larve de grande taille qui se rapproche de celles des *Drilus*, 1844, LXXXVII. — *flavescens*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 588.

**Drimostoma 4-pustulatum**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 371.

**Dromica gigantea**, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 289.

**Dromius capitalis**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1857, 725. — *corticalis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 87. — *cupreus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 754. — *fenestratus*, REICHE, Col. algériens, 1848. XCII. — *foveola*, *foveolatus*, *glabratus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 754. — *glabratus*, PEYRON, Col. des env. des Tarsous, 1858, 394. — *mutabilis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 574. — *myrmidon*, FAIRMAIRE, Diagn. de plusieurs esp. nouv. de Col. d'Europe, 1859, CIII. — *oblitus*, BOIELDIEU. Descr. d'esp. nouv., 1859, 462. — *obsкуроguttatus*, PEYRON, 1858, 393. — *plagiatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 754. — *sacerdos*, PEYRON, 1858, 393. — *scapularis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 754. — *Sturmii*, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. nouv. de Sardaigne, 1836, II. — *tener*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 753. — *virgatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 575. — *id.*, PEYRON, 1858, 394.

**Dromocherus** *Pilatei*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Caract. d'un nouv. genre de Cicindélites, 1845, xcv.

**Drymeotus** *Kovaksii*, FAIRMAIRE, Communic. de trois Col. européens excessiv. rares, 1857, xxiv. — *Kovaksii* et *Kraatzii*, KRAATZ, des grottes de Hongrie, 1858, lxxxix.

**Dryoctenes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 27. — *caliginosus*, 1835, 28.

**Dryophthorus** *lymexilon*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 245.

**Dryops**, WESMAEL, C'est la villosité dont ils sont couverts qui leur permet de vivre sous l'eau, 1835, xl. — *femorata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124. — *id.*, FAIRMAIRE, pris aux env. de Bordeaux, 1849, iv. — *id.*, LEVRAT, trouvé le soir au mont Dore voltigeant sur le Lierre en fleurs, 1856, xciii. — *flavicans*, FAIRMAIRE, Diagn. de nouv. esp. de Col., 1860, 632.

**Drypta** *cylindricollis*, *emarginata*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 389. — *emarginata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 750.

**Dryptelytra** *cayennensis*, DE LAPORTE, Révision du genre *Lampyris*, 1833, 128.

**Duvalius**. DELAROUZÉE, Descr. d'un nouv. genre de Carabiques, 1859, 65. — *Raymondi*, 1859, 66. — *id.*, Communic. de l'esp. typique, 1859, xxxiv.

**Dyctyopterus** *affinis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 129. — *alternatus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 531. — *minutus*, *rubens*, GHILIANI, 1847, 104. — *sanguineus*, PERRIS, Note pour servir à son histoire, 1846, 343.

**Dymusia** *cyanea*, SCHAUUM, Lamell. mélit., 1849, 244.

**Dynastes** *Jupiter*, BUQUET, Note sur son identité avec le *Scarabæus Jupiter* publié antérieurement par l'auteur, 1842, iv.

**Dyschromus**, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 429. — *opacus*, 1835, 430.

**Dyscolus** *æncipennis*, DE CHAUDOIR, Monogr. du genre *Colpodes* de Mac-Leay, 1859, 359. — *anchomenoides*, Descr. de qqes esp. de Carabiques nouv., 1835, 440. — *australis*, *cyanicollis*, *Dejeanii*, *dilatatus*, *Memnonius*, *purpuratus*, Monogr. du genre *Colpodes*, 1859, 359.

**Dyschirius** *chalceus*, *nitidus*, *obscurus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme,

1852, 678. — *politus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 386. — *punctipennis*, FAIRMAIRE, 1852, 678. — *rugicollis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 386. — *salinus*, *thoracicus*, FAIRMAIRE, 1852, 678.

**Dysides**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. classific. du groupe des Bostrichides, 1845, XVII.

**Dytiscus**, GUYOT, Esp. faisant le passage entre le *circumcinctus* et le *dubius*, 1837, XVI. — *circumflexus*, FAIRMAIRE et COQUEREL. Col. de Barbarie, 1858, 785. — *lapponicus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 118. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans les Alpes, à une grande hauteur, 1849, XC. — *id.*, FAIRMAIRE, M. Ghiliani l'avait déjà indiqué comme habitant les eaux du Piémont, 1849, XC. — *latissimus*, LEFEBVRE, trouvé dans les étangs de la Sologne, par M. Paris de Boisrouvray, 1836, XXX. — *id.*, PARIS, trouvé en grande quantité dans les étangs des env. d'Épernay, (Marne), 1837, XIV. — *marginalis*, LEGRAND, Entozoaires sortis vivants de cet Ins., 1858, CLXXXV. — *pisanus*, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies dans un récent voyage à Prades, 1850, XXV. — *Ræselii*, DUPONCHEL, trouvé dans les eaux d'Acqui en Piémont, à 40° de chaleur, 1832, 312.

## E.

**Ebeus congressarius**, FAIRMAIRE, Session de Montpellier, 1857, 637. — *flavicollis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 619.

**Eburia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 8. — *lineata*, CHEVROLAT, Rapport aux genres nouv. des Longicornes, de la coll. de Bancks, 1851, 659. — *lineola*, *morosa*, AUD.-SERVILLE, 1834, 10. — *4-maculata*, 1834, 9. — *sericea*, SALLÉ, Col. de la république dominicaine, 1855, 271. — *6-maculata*, AUD.-SERVILLE, 1834, 10. — *speciosa*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 486. — *stigma*, AUD.-SERVILLE, 1834, 10.

**Ecoptogaster** (Voyez *Scolytus*).



**Ectigonia** *Buqueti*, SPINOLA, Lettre sur un groupe de Buprestides, 1837, 101. — *id.*, BUQUET, Rectification de son habitat, 1837, LVIII et 1838, LXI.

**Ectinus** *aterrimus, brunneus, fugax, marginatus, sputator*, LATREILLE, Distrib. méthod. des genres de la fam. des Serricornes, 1834, 160.

**Ega**, SOLIER, Mémoire sur quatre genres de la famille des Carnassiers terrestres, 1836, 593. — *anthicoides*, 1836, 594.

**Elaphidion**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 66. — *cyanipennis*, 1834, 68. — *irroratum, spinicorne*, 1834, 67. — *spinicorne*, CHEVROLAT, Rapport aux genres actuels, des Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 659.

**Elaphinis** *cincerascens, irrorata*, SCHAUUM, Lamell. mélit., 1844, 389.

**Elaphocera**, GÉNÉ, Phrases spécifiques, 1836, III. — *id.*, RAMBUR, Monogr. du genre, 1843, 329 et 333. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Deux nouv. esp. recueillies en Algérie, 1857, XVIII. — *barbara*, RAMBUR, 1843, 350. — *Bedcaui*, 1843, 337. — *bysantica*, 1843, 354. — *carteiensis*, 1843, 356. — *churianensis*, 1843, 355. — *dilatata*, 1843, 348. — *gracilis*, 1843, 357. — *granatensis*, 1843, 349. — *hiemalis*, 1843, 345. — *hispalensis*, 1843, 353. — *longitarsis*, 1843, 344. — *malaccensis*, 1843, 343. — *mauritanica*, 1843, 341. — *numidica*, 1843, 343. — *obscura*, GÉNÉ, Phrases spécifiques, 1836, III. — *id.*, RAMBUR, 1843, 346. — *rubripennis*, LUCAS, Communic. et descr. de cette esp., 1848, XLVIII. — *Sardoa*, RAMBUR, 1843, 352.

**Elaphropus**, SCHAUUM, Note sur ce genre, 1860, 636. — *caraboides*, DE MOTSCHULSKY, diffère du *Bembidium Fockii*, 1859, CCV. — *gracilis, latissimus*, esp. inédites des Indes orient. publiées par l'auteur, 1859, CCVI.

**Elaphrus** *cupreus*, FAIRMAIRE, pris dans la Baie de la Somme, 1852, 678. — *metallicus*, JACQ. DU VAL, n'est autre que le *Notiophilus 4-punctatus*, 1857, 95. — *pyrenæus*, MOTSCHULSKY, Note sur un *Elaphrus* nouv. des Pyrénées et du midi de la France, 1850, LXVI. — *id.*, LABOULBÈNE, Le *pyrenæus* Motsch. n'est qu'une var. de l'*uliginosus*, 1850, LXVII. — *riparius*, FAIRMAIRE, 1852, 678. — *splendidus*, M. Gaubil l'a reçu des Hautes-Pyrénées, 1846, LXXV.

**Elater**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 153. — *id.*, FAIRMAIRE, Quelques observations sur la voracité de ces Insectes, 1859, IV. — *atomarius*.

DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans des troncs de Pins, midi de la France, 1849, LXXII. — *balteatus*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *biguttatus*, LABOULBÈNE, pris dans le midi de la France, 1850, XXXIX. — *bracteri*, *cruciat*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *ephippium*, LATREILLE, 1834, 154. — *madagascariensis*, GORY, Trois esp. de Col. nouv., 1832, 385. — *murinus*, LABOULBÈNE, Le gésier de cet Ins. présente quatre séries de poils, 1851, LXVII. — *id.*, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 338. — *pectinicornis*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *pictus*, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Calédonie, 1860, 257. — *pomorum*, JOHN CURTIS, Note adressée sur les métam. de cet Ins., 1853, VIII. — *id.*, Note sur sa larve, 1853, 43. — *potensis*, MONTROUZIER, 1860, 257. — *præustus*, LATREILLE, 1834, 154. — *rhombus*, JOHN CURTIS, Notice sur la larve, 1853, 417. — *sanguineus*, LATREILLE, 1834, 154. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 148. — *segetis*, LEFEBVRE, La larve cause de grands dégâts près de Montfort-l'Amaury, 1835, XLIV. — *id.*, MACQART, Larves très-nuisibles à l'agriculture dans le nord de la France, 1847, XLIV. — *id.*, BRUAND, il en est de même dans les environs de Besançon, 1848, XCI. — *trifasciatus*, REICHE, Communication de Col. recueillis dans les Pyrénées, 1853, LII. — *tristis*, LATREILLE, 1834, 154. — *varius*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, la descr. et la fig. se trouvent dans De Géer, 1845, CIV. — *id.*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV.

**ÉLATÉRIDES**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 138. — *id.*, MOCQUERYS, Qques observ. recueillies au Brésil sur un Élatéride, 1844, LXIII. — *id.*, LUCAS, Remarq. sur leurs métam., 1852, 261.

**Elenophorus**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 643. — *collaris*, 1836, 645. — *id.*, LUCAS, recueilli aux env. d'Alger, 1850, XLIV. — *id.*, aux env. de Paris, 1856, LIX.

**Ellipsodes pictoratus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans les écailles des jeunes pousses de Bambou, 1859, CXCH. — *id.*, LEPRIEUR, rencontré plusieurs fois sous les feuilles sèches, etc., 1859, CXCH.

**Elmidomorphus**, CUSSAC, Descr. d'un genre nouv. de Curculionites, 1851, 203. — *id.*, Réponse à une note de MM. Jacq. du Val et Lareynie, 1853, XXXI. — *Aubci*, 1851, 206. — *id.*, SCHAU, Ce Col. est le *Bagous petrosus* Herbst, 1853, IX. — *id.*, REICHE, Rapport de la commission chargée de l'examen de cet Insecte, 1854, 521.

**Elmis**, WESMAEL, Moyen qui leur permet de vivre sous l'eau, 1835,

- XXXIX. — *æneus, angustatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de la Catalogne, 1851, 585.
- Elophorus** *aquaticus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786. — *fracticosus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 29. — *id.*, DELAROUZÉE, Rectific. sur son habitat, 1859, CXXXIX. — *frigidus*, GRAELLS, Descr. de cinq esp. nouv. de Col. d'Espagne, 1847, 305. — *granularis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 786. — *granularis, nubilus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680.
- Elytrocallis** *Chevrolatii*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 875.
- Elytreden** *Chevrolatii*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 5. — *Labrami*, MONTROUZIER, Col. de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 881.
- Elytrurus** *alatus*, SAUNDERS et JEKEL, Description de quelques Curculionites, 1855, 289. — *marginatus*, 1855, 291.
- Emathion** *brasiliensis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 178. — *Buquetii*, 1843, 180. — *cuneatum*, 1843, 179. — *cylindricum*, 1843, 178. — *Leprieurii, Mannerheimi, porrectus*, 1843, 179.
- Emphytaëcia**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 529. — *alboliturata*, 1859, 530. — *dimidiata*, 1859, 531. — *lincolata*, 1859, 530. — *sutura-alba*, 1859, 531. — *suturella*, 1859, 530.
- Emus** *brunnipes*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 89. — *castanopterus*, 1847, 123. — *chloropterus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *falcifer*, GHILIANI, 1847, 102. — *fossor, hirtulus*, 1847, 123. — *italicus*, 1847, 112. — *latebricola, lutarius*, 1847, 123. — *trincinctus*, 1847, 114.
- Enccladus**, SOLIER, Observ. sur le genre *Ditomus*, 1834, 670.
- Endecatomus**, MELLIÉ, Monographie de l'ancien genre *Cis* des auteurs, 1848, 213. — *dorsalis*, 1848, 218. — *reticulatus*, 1848, 216.
- Endomychus** *coccineus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 113. — *id.*, DOUÉ, Larves et nymphes au pied et dans les racines d'un Bouleau, 1856, v. — *id.*, DESMAREST, même observ., 1856, v.
- Enedreutes** *hilaris*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de quelques Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI.
- Enema** *lupercus*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 17.

**Engis sanguinicornis**, THIBEZARD, trouvé près de Laon, 1853, xxix. — *id.*, FAIRMAIRE, Bois de Lardy, 1854, xxxiv.

**Enicopus acutatus**, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv. de Col., 1859, 469. *Bonrouloiri*, 1859, 468. — *fulculifer*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 53. — *orientalis*, 1859, 51. — *pyrenæus*, 1859, 50. — *subvittatus*, 1859, 52. — *truncatus*, 1859, 51.

**Enicotarsus ater**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 402. — *quadratus*, 1832, 403.

**Ennearthron**, MELLIÉ, Monographie du genre *Cis*, 1848, 360. — *id.*, sous-genre *Cerasis*, 1848, 375. — *affine*, 1848, 364. — *bicornis*, 1848, 374. — *castaneipennis*, 1848, 376. — *corniferum*, 1848, 371. — *cornutum*, 1848, 362. — *id.*, détails sur les larves, 1849, xl. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 639. — *cucullatum*, MELLIÉ, 1848, 372. — *curtum*, 1848, 367. — *fronticornis*, 1848, 265. — *furcifer*, 1848, 379. — *hastiferum*, 1848, 370. — *Mellyi*, 1848, 369. — *militaris*, 1848, 378. — *multipunctatum*, 1848, 368. — *Sallei*, 1848, 376. — *tabelliferum*, 1848, 373. — *variabilis*, 1848, 380.

**Enoplium balteatum**, CHEVROLAT, 24 nouv. esp. de Térédiles, 1843, 36. — *calceata*, *divisum*, 1843, 37. — *dulce*, LEDOUX, Nouv. esp. du genre *Enoplium*, 1833, 474. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, Il se rapporte au *Tillus Weberi* ou au *T. ruficornis*, 1837, liv. — *fimbriolatum*, *niveum*, *pantherinum*, Nouv. esp. de Térédiles, 1843, 35. — *punctatissimum*, 1843, 34. — *sanguinicollis*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, lv. — *seminigrum*, CHEVROLAT, 1843, 34. — *serraticornis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 109.

**Enoplocerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 146. — *armillatus*, 1832, 147.

**Enoplotarsus**, LUCAS, Nouv. coupe générique de Cétonides, 1859, xcvi. — *costatus*, *deserticola*, 1859, xcix. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 449.

**Enteles Vigorsii**, LUCAS, trouvé dans des tiges de *Zamia spiralis*, en Tasmanie, 1847, xiii.

**Entomoderes**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 346. — *Ercbi*, 1836, 348. — *id.*, LACORDAIRE, Note tendant à rectifier l'habitat de quelques Mélasomes, 1837, 254. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Lacordaire, 1837, 488.

**Epicauta adspersa**, GIRARD, Communic. de plusieurs indiv. Note à ce sujet, 1860, LXXIII. — *verticalis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 101.

**Epicometis crinita**, SCHAUW, Lamell. mélit., 1844, 378, et 1849, 267. — *hirtella*, 1849, 267.

**Epielus**, DE MARSEUL, Histérides, 1854, 671. — *alutaceus*, 1854, 694. — *antillarum*, 1854, 700. — *arciger*, 1854, 684. — *bisbistriatus*, 1854, 687. — *brunnipennis*, 1854, 697. — *comptus*, 1854, 699. — *id.*, WENKER, trouvé à Luc (Var) par M. Robert, 1858, LXXXIX. — *coproides*, DE MARSEUL, 1854, 682. — *frater*, 1854, 690. — *fulvicornis*, 1854, 706. — *hastatus*, 1854, 685. — *Incas*, 1854, 681. — *incultus*, 1854, 703. — *intermedius*, 1854, 691. — *levistrius*, 1854, 686. — *longulus*, 1854, 704. — *lucens*, 1854, 689. — *lucidulus*, 1854, 695. — *mundus*, 1854, 680. — *nigrellus*, 1854, 692. — *planulus*, 1854, 702. — *pulicarius*, 1854, 705. — *rabellus*, 1854, 707. — *retusus*, 1854, 688. — *russicus*, 1854, 698. — *tersus*, 1854, 682. — *vicinus*, 1854, 693. — *Waterhousii*, 1854, 696.

**Epilachna chrysomelina**, AZAMBRE, trouvé communément en Italie, 1856, XVIII.

**Epipedonota**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 342. — *ebenina*, 1836, 343. — *id.*, LACORDAIRE, Note tendant à rectifier l'habitat de qqes Mélomes, 1837, 254. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Lacordaire, 1837, 487. — *erythropus*, Collaptérides, 1836, 345. — *id.*, LACORDAIRE, 1837, 254. — *id.*, SOLIER, 1837, 488.

**Epiphanis**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 175.

**Epistomentis**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 715. — *Gaudichaudii*, *pictus*, 1858, 716.

**Epomis**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 252. — *capensis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 228. — *circumscriptus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 88. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 720. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 750. — *senegalensis*, GORY, 1833, 229.

**Eretes griseus**, LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 397.

**Eretmotus**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 141. — *Lucasii*, 1855, 144.

**Ergates**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 143. — *faber*, LUCAS, Obs. pour servir à son hist., 1844, 161. — *id.*, indiv. dont les élytres et

une partie des pattes sont avortées, 1845, LXXX. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 118. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 444. — *Huberti*, BUQUET, Descr. abrégée de cet Ins., 1840, XXVIII. — *serrarius*, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 144.

**Erioderus lanuginosus**, CHEVROLAT, Rapport aux genres nouv., des Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 658.

**Eriphus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 88. — *bisignatus*, *immaculicollis*, *mexicanus*, 1834, 89.

**Erirhinus affinis**, LEFEBVRE, trouvé dans les bouches sulfureuses du Vésuve, 1832, 312. — *australis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 886. — *filirostris*, CHEVROLAT, Rectific., 1857, XXX. — *hirsutus*, MONTROUZIER, 1860, 893. — *incanus*, FAIRMAIRE, Cette espèce doit être rapportée à l'*E. tomentosus*, 1860, LXVI. — *scirrhusus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *Silbermanni*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *tæniatus*, GOUREAU, La larve vit dans les chatons de la fleur femelle du Saule-Marceau, 1858, XI. — *tomentosus*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 61. — *voral*, DOUMERC, Note sur ses mœurs, 1856, LXXXIV.

**Erirhips pubera**, SCHAUW, Lamell. mélit., 1844, 375.

**Erix Bellieri**, REICHE, Descr. des esp. nouv. recueillies en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 730. — *Fairmairei*, 1860, 731.

**ERODITES**, SOLIER, Collaptérides, 1834, 506.

**Erodus**, E. BLANCHARD, Indication des moyens propres à distinguer les espèces de ce genre, 1845, XXIII. — *id.*, SOLIER, Collaptérides, 1834, 523. — *id.*, sous-genre *Dimeriscis*, 1834, 530. — *affinis*, 1834, 589. — *africanus*, 1834, 578. — *ambiguus*, 1834, 586. — *Audouini*, 1834, 569. — *barbarus*, 1834, 538. — *bicostatus*, 1834, 536. — *bilineatus*, 1834, 534. — *Boyeri*, 1834, 553. — *brevicostatus*, 1834, 551. — *carinatus*, 1834, 549. — *Chauvneti*, 1834, 568. — *costatus*, 1834, 539. — *curvipes*, 1834, 567. — *Dejeanii*, 1834, 543. — *Duponti*, 1834, 562. — *Emondi*, 1834, 585. — *europæus*, 1834, 560. — *exilipes*, LUCAS, Note sur les Col. de l'Algérie envoyés à M. Doué, 1858, CLXXX. — *Fabricii*, SOLIER, 1834, 552. — *gibbus*, 1834, 547. — *glabratus*, 1834, 544. — *Goryi*, 1834, 564. — *granulosus*, 1834, 532. — *lævigatus*, 1834, 531. — *lævis*, 1834, 588. — *laticollis*, 1834, 558. — *Latreillei*, 1834, 587. — *latus*, 1834, 574. — *longus*, 1834, 553. — *lusitanicus*, 1834, 565. — *Maillei*, 1834, 546. — *marginicollis*, 1834, 587. — *Mittrei*, 1834,

591. — *neapolitanus*, 1834, 571. — *nitidicollis*, 1834, 583. — *nitidiventris*, 1833, 576. — *oblongus*, 1834, 555. — *Olivieri*, 1834, 530. — *orientalis*, 1834, 563. — *parvus*, 1834, 557. — *Peiroleri*, 1834, 590. — *proximus*, 1834, 575. — *puncticollis*, 1834, 556. — *scaber*, 1834, 542. — *Servillei*, 1834, 540. — *siculus*, 1834, 570. — *subcostatus*, 1834, 580. — *subnitidus*, 1834, 579. — *subparallelus*, 1834, 584. — *syriacus*, 1834, 592. — *tangerianus*, 1834, 581. — *vicinus*, 1834, 582.

**ÉROTYLIENS**, DEJEAN, Obs. sur la Monographie de M. Lacordaire, 1842, 285.

**Erymanthus variolatus**, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 294.

**Estola**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 524. — *hirsuta*, 1859, 525. — *unicolor*, 1859, 526.

**Ethra**, DE LAPORTE, Révision du genre *Lampyris*, 1833, 133. — *interrupta*, 1833, 134. — *lateralis*, *marginata*, 1833, 133.

**Eublepharus**, GAY et SOLIER, Mémoire sur deux genres de Curculionites du Chili, 1839, 5. — *id.*, AUD.-SERVILLE, Rectifications sur ce mémoire, 1839, XLIX. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Aud.-Serville, 1839, XLIX. — *Germari*, GAY et SOLIER, 1839, 21. — *Roulcti*, 1839, 17. — *Schænherrri*, 1839, 19. — *Servillei*, 1839, 15.

**Eubria Marchantiæ**, JACQ. DU VAL, trouvée par M. Ch. Lespez dans le midi de la France, 1853, XLVI. — *Marchantii*, phrases diagnostiques de qqes esp. nouv., 1854, XXXVII. — *palustris*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90.

**Eucalosoma versicolor**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 185.

**Euchirus bimucronatus**, REICHE, trouvé par M. Peyron en Caramanie, 1856, LXXI.

**Euchræa abdominalis**, SCHAU, Lamell. mélit., 1844, 389.

**Euchroma**, SOLIER, Buprestides, 1833, 284. — *columbica*, A. ROJAS, Obs. sur qqes Col. de Vénézuéla, 1857, 333. — *gigantea*, SOLIER, 1833, 284.

**Eucinetus hæmorrhoidalis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 91. — *meridionalis*, PERRIS, Qques mots sur les métamorphoses de Col. Mycétophages, 1851, 48.

**EUCNÉMIDES**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 122. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Revue critique de cette tribu, 1843, 163, 170.

**Eucnemis capucinus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *id.*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 133. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 187. — *id.*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *id.*, CUSSAC, Note relative à ses métamorphoses, 1857, LXXIV. — *Feisthameli*, GRAELLS, Cinq Col. nouv. d'Espagne, 1847, 307. — *foveolatus*, *fulvicornis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 187. — *orientalis* Wicardi, 1843, 186.

**Eucranium**, REICHE, Coprophages, 1842, 81. — *ælianus*, 1842, 85. — *arachnoides*, 1842, 83. — *dentifrons*, *dioscorides*, 1842, 84. — *heteroclytum*, 1842, 85.

**Eudaetylus**, SALLÉ, Col. de la républ. dominicaine, 1855, 266. — *Wapleri*, 1855, 267.

**Eudesmus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 81. — *fascinus*, *griseus*, 1835, 82.

**Eudorus javanicus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 176.

**Eumierus hæmaticus**, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes esp. nouv. de Col. européens et algériens, 1859, CCXXXV. — *Helwigii*, *rufus*, *tarsatus*, *thoracicus*, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 396.

**Eumolpus æruginosus**, E. BLANCHARD, Qques Eumolpides recueillies en Sicile, 1845, IV. — *pretiosus*, AUBÉ, Obs. curieuse au sujet de cet Ins., 1837, LVIII. — *vitis*, BRULLÉ, Grappe de Raisin et feuilles de Vigne rongées, 1837, LVIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ravages causés par le même Ins., 1846, XXXV.

**Eumorphus calabrus**, JACQ. DU VAL, C'est une esp. nouv. du genre *Dapsa*, 1857, 95.

**Eumyeterus sulcicollis**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 914.

**Eusectes sticticus**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1848, 402. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 785.

**Eusceila gymnopleura**, SCHAUUM, Lamell. mélit., 1844, 388.

**Euphanias insignicornis**, REICHE, M. Peyron en a rencontré une quinzaine près de Marseille, 1857, xx.



**Eupheria leprosa**, SCHAUM, Lamell. mérit., 1844, 375. — *Lesumprii*, 1844, 374. — *leucographa*, *turida*, *melancholica*, 1849, 266. — *melancholica*, *sepulchralis*, 1844, 374.

**Euplectes**, AUBÉ, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 509, et Révision de cette famille, 1844, 140. — *id.*, JACQ. DU VAL, Ce genre lie les Psélaphiens aux Staphyliniens, 1854, LXVI. — *ambiguus*, AUBÉ, 1833, 510, et 1844, 149. — *bicolor*, 1833, 510, et 1844, 150. — *id.*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *Dupontii*, AUBÉ, 1833, 510, et 1844, 145. — *xasterbroochianus*, 1833, 510, et 1844, 151. — *Erichsonii*, 1844, 143. — *Fischeri*, 1833, 510, et 1844, 144. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 417. — *Karstenii*, AUBÉ, 1833, 510, et 1844, 146. — *id.*, LABOULEÈNE et JACQ. DU VAL, pris une trentaine dans le cœur d'un Peuplier, à Meudon, 1849, LXXIII et XCIV. — *Kirbyi*, AUBÉ, 1833, 510. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *Kunzei*, AUBÉ, 1844, 142. — *leiocephalus*, 1833, 510. — *Merkelii*, 1844, 142. — *minutissimus*, 1833, 510, et 1844, 150. — *nanus*, 1833, 510, et 1844, 148. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *id.*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LV. — *nitidus*, Miscellanea entomologica, 1857, 736. — *perplexus*, JACQ. DU VAL, Phrases diagnostiques, 1854, XXXVI. — *piccus*, AUBÉ, 1844, 148. — *pusillus*, 1833, 510. — *Riedelii*, FAIRMAIRE, 1859, 34. — *sanguineus*, AUBÉ, 1833, 510, et 1844, 146. — *Schmidtii*, 1844, 151. — *signatus*, 1833, 510, et 1844, 145. — *Spinolæ*, 1844, 147. — *ulcicollis*, 1833, 510, et 1844, 141.

**Euplines Schmidtii**, DE CHAUDOIR, Monographie du genre Colpodes, 1859, 360.

**Euporus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 20. — *strangulatus*, *viridis*, 1834, 21.

**Eurhipsis**, DE LAPORTE, Rhypicérides, 1834, 258. — *senegalensis*, 1834, 259.

**Euriptera venusta**, DE BRÉNZ, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 311.

**Eurychora**, SOLIER, Collaptérides, 1837, 154. — *id.*, REICHE, Col. nouv. de l'Algérie, 1848, XCH. — *ciliata*, SOLIER, 1837, 157. — *id.*, REICHE, prise en Algérie au bord du Sahara, 1859, XVII. — *id.*, AUD.-SERVILLE, Obs. sur une lettre de M. Westermann, 1833, 491. — *cinerea*, SOLIER, 1837, 159. — *crenata*, 1837, 160. — *Levaillantii*, LUCAS, Descr. de cet Ins., 1850, VI. — *major*, SOLIER, 1837, 158.

**Eurydactylus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 255.

**Eurydera flavicornis**, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 203.  
*mormotycoïdes*, COQUEREL, Obs. sur des Ins. recueillis à Madagascar, 1852, 360. — *spinosa*, GORY, 1833, 202.

**Eurymerus eburioïdes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 566.

**Eurymorpha**, FAIRMAIRE, Note sur ce genre, 1856, 93. — *cyanipes*, 1856, 94. — *Mouffleti*, 1856, 95.

**Euryommatus Mariæ**, KRAATZ, Nouv. genre de Curculionites, 1858, LXXIX.

**Euryptera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 222. — *latipennis*, 1835, 223. — *venusta*, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 341.

**Eurysternus trogiformis**, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 98.

**Eurythyrea austriaca**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468.  
 — *id.*, DE BARAN, trouvé à Fontainebleau, 1853, LI. — *id.*, REICHE, Communication de qqes-uns des Col. recueillis dans les Pyrénées, 1853, LII.

**Euryusa brachelytra, linearis**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 412. — *sinuata*, FAIRMAIRE, env. de Paris, avec de petites Fourmis, 1846, LV.

**EUSCHIONIDES**, SOLIER, Essai d'une div. des Col. hétéromères, 1834, 493.

**Eusomus smaragdulus**, FAIRMAIRE, Descr. de qqes esp. nouv. de Col., 1859, CLI.

**Eustrophus dermestoides**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470.

**Eutelocera**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 237. — *viatica*, 1840, 238.

**Everstethus leviusculus**, JACQ. DU VAL, Descr. d'un genre nouv. et de qqes esp. nouv. de Col., 1850, 50. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *Lespesii*, JACQ. DU VAL, 1850, 48 et 51. — *ruficapillus, scaber*, 1850, 50.

**Exocentrus balteatus**, GOUREAU, Position de la première paire de stigmates dans la larve, 1844, 443. — *pusillus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 514.

## F.

**Falagria crassiuscula**, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 301. — *thoracica*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 403.

**Faronus**, AUBÉ, Révision des Psélaphiens, 1844, 157. — *Aubri*, LUCAS, Note sur une esp. algérienne, 1854, XXIV. — *id.*, LABOULBÈNE, trouvé dans les Landes, 1853, XLI. — *Lafertei*, AUBÉ, 1844, 158. — *id.*, REICHE, Rencontré dans les env. de Marseille par M. Peyron, 1857, XXXIII. — *id.*, AUBÉ, trouvé dans le midi de la France, 1860, L. — *telonensis*, FAIRMAIRE, Diagn. de cette nouv. esp., 1860, XLIV.

**Feronia**, AUBÉ, M. de Chaudoir divise ce genre en 42 genres, 1838, LXIX. — *æraria*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 766. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Obs. sur cette esp., 1860, LXXXVII. — *alacris*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 770. — *ambigua*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Corse, 1859, 271. — *angustiformis*, SOLIER, Descr. de qqes esp. nouv. de la fam. des Carabiques, 1835, 120. — *anthracina*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 378. — *aquila*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 768. — *berytensis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 618. — *Bonvoisini*, 1855, 608. — *castanea*, GIRARD, Du voyage de Péron, 1857, CLV. — *crenata*, PEYRON, 1858, 377. — *cupræa*, 1858, 372. — *cupripennis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 764. — *cursoria*, PEYRON, 1858, 372. — *curticollis*, 1858, 375. — *curtula*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 520. — *cyanella*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 606. — *elongata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 773. — *fuscicornis*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 620. — *gallega* (*Stropus*), FAIRMAIRE, Descr. de qqes esp. nouv. de Col., 1859, CL. — *id.*, C'est le même que *F. Lacordairci*, 1860, XLVI. — *glabrata*, PEYRON, 1858, 374. — *græca*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 612. — *Hagenbachii*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Col. de la faune méditerranéenne, 1855, 309. — *incpta*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 767. — *Johannis*, PEYRON, Descr. de deux genres et de quatre esp. de Col. d'Orient, 1856, 721. — *languida*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 610. — *laticornis*, FAIR-

**MAIRE**, *Miscellanea entomologica*, 1856, 519. — *lineata*, SOLIER, 1835, 119. — *longula*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 616. — *lugens*, DE CHAUDOIR, *Modogr.* du genre *Colpodes*, 1859, 360. — *mauritanica*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 765. — *Melliei*, MONTROUZIER, *Faune de la Nouv.-Calédonie*, 1860, 238. — *meridionalis*, PEYRON, 1858, 378. — *minuta*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 614. — *modica*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 770. — *murex*, 1858, 765. — *neapolitana*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 615. — *micænsis*, FAIRMAIRE, 1856, 518. — *nigrita*, PEYRON, 1858, 378. — *notata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 771. — *numidica*, 1858, 765. — *planata*, PEYRON, 1858, 376. — *prælonga*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 619. — *puncticollis*, PEYRON, 1858, 376. — *punctigera*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 611. — *rebellis*, 1855, 621. — (*Argutor*) *rectangula*, FAIRMAIRE, *Note sur quelques Ins. de Barbarie*, 1859, LI. — *Reicheiana*, PEYRON, 1858, 372. — *Reichei*, FAIRMAIRE, *Descr. des esp. nouv. de Corse*, 1859, 271. — *rubicunda*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 769. — *ruficollis*, PEYRON, 1858, 377. — *sicana*, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1857, 722. — *Tournieri*, GAUTIER DES COTTES, *Descr. de trois Col. nouv. d'Europe*, 1859, CCIX. — *id.*, TOURNIER, *Cette esp. n'est qu'une var. de *Molops terricola**, 1860, XXV. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, *Note en réponse aux obs. de M. Tournier*, 1860, XLVII.

**Figulus** *levipennis*, MONTROUZIER, *Faune de la Nouvelle-Calédonie*, 1860, 286. — *lifuanus*, 1860, 287. — *regularis*, REICHE, *C'est le *pacificus* Dej.*, 1853, 84. — *striatus*, E. BLANCHARD, *Communic. de la larve et de la nymphe*, 1845, v. — *subcastaneus*, REICHE, *C'est le *F. hædulus* Dej.*, 1853, 84.

**Filotarsus**, SOLIER, *Collaptérides*, 1840, 239. — *tenuicornis*, 1840, 241.

**Formicomus** *pedestris*, KIESENWETTER, *Col. du midi de la France et de Catalogne*, 1852, 625.

**Fornax**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, *Eucnémides*, 1843, 181. — *Chevrolatii*, 1843, 185. — *grandis*, 1843, 182. — *longulus*, *luridus*, 1843, 185. — *madagascariensis*, 1843, 182. — *id.*, COQUEREL, *Obs. sur div. Ins. recueillis à Madagascar*, 1856, 511. — *id.*, l'auteur reconnaît l'erreur relevée par M. Lacordaire, 1858, CLXII. — *obrutus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 183. — *opifex*, 1843, 184. — *Petitii*, 1843, 183. — *ruficollis*, *sanguineo-signatus*, 1843, 184. — *testaceus*, *timidus*, 1843, 185.

## G.

- Galba**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 190. — *bisulcatus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 132. — *bombycina*, *flavicornis*, *mar-morata*, *murina*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 193.
- Galbodema**, *flabellicornis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 190. — *Mannerheimii*, 1843, 189.
- Galerita** *Lecontei*, SALLÉ, Descr. de la larve et de la nymphe, 1849, 298.
- Galeruca** *calmariensis*, BUQUET, Dégâts causés aux Ormes du parc de Saint-Cloud, 1850, I. — *id.*, OGIER DE BAULNY, trouvée en grande quantité à Saint-Cloud, 1858, LXXXI. — *elongata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 42. — *tanaceti*, COULON, Pâturages du Jura dévorés par la larve, 1834, XIX. — *id.*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852. 341. — *viburni*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 120.
- GALLÉRUCITES ANISOPODES**, ALLARD, Essai monogr., 1860, 39. — *id.*, Tableau de concordance avec les esp. de M. Foudras, 1860, 140.
- Gametis** *felina*, *histrion*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 373. — *jucunda*, 1844, 372. — *malayana*, 1844, 373. — *prasina*, *versicolor*, *veridibscura*, 1844, 372.
- Gasterocercus** *consocialis*, Duvali, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 905.
- Gastraulacus** *atratus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides 1843, 188. — *Leprieurii*, 1843, 189.
- Gastrophysa** *raphani*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 655.
- Gedeon**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 219. — *hierichontichus*, 1857. 221 et 1858, 59.

**Genyodonta** *bicolor*, *trivittata*, *umbonata*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 355.

**Geobius**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 225. — *tingitanus*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 84.

**Geonemus** *Doüei*, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 880. — *flabellipes*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 731. — *Laperousei*, MONTROUZIER, 1860, 878.

**Geopyris** (voir *Phosphænus*) *hemiptera*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684.

**Georyssus**, WESMAEL, Ne vivent pas sous l'eau, 1835, XL. — *pime-loides*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 45. — *id.*, Elytres très-obsoletement sillonnées, 1860, XLV. — *pygmæus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *striatus*, *sulcatus*, GHILIANI, 1847, 93.

**Geotrupes**, GODARD, Détails sur leurs dispositions sexuelles, 1852, X. — *alpinus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 129. — *fossor*, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 47. — *Hoffmanseggi*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 174. — *hypocrita*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 115. — *id.*, ROUGET, pris en grand nombre dans l'île de Saint-Ouen, 1848, XLIX. — *4-geminus*, FAIRMAIRE, 1859, 48. — *subarmatus*, Descr. de qqes Col. nouv., 1848, 172. — *sylvaticus*, MOCQUERYS, Indiv. avec deux gibbosités sur les élytres, 1846, LXIII. — *id.*, Autre indiv. semblable, 1856, LXIII. — *typhæoides*, FAIRMAIRE, Suite de Col. provenant de Tanger, 1851, XXI. — *id.*, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 85. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 175. — *typhæus*, GHILIANI, 1847, 115. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 175.

**Gerania**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 70. — *Boscii*, 1835, 71.

**Gibbium**, BOIELDIEU, Ptiniore, 1856, 676. — *æquinotiale*, Diagnoses latines des esp., 1854, LXXXIV. — *id.*, Ptiniore, 1856, 679. — *Chevrolatii*, 1854, LXXXV et 1856, 680. — *scotias*, AUDOUIN, Vase rempli de cet Ins., trouvé dans un ancien tombeau de Thèbes, 1835, v. — *id.*, Présentation du vase égyptien rempli de cet Ins., 1835, XI. — *id.*, BOIELDIEU, 1854, LXXXIV et 1856, 678.

**Glaphyrus** *pulchellus*, LUCAS, reçu par M. Doüé du nord de l'Afrique,

... ue. Col. venant de Saül. 1850,

... melit., 1844. 376. — *Berrii*,  
... 70. — *brunnipes*, 1849. 263. —  
... 1844. 371. — *Horsfordii*, 1844.  
... 1849. 263. — *Kuperi*, 1849. 287.  
— ... 1849, 287. — *prasina*, 1849. 264.  
— *variegata*, *versicolor*, 1849. 264.

**Gal**

... 1856, 279. — *Candezii*, 1856. 252.

... ges, 1842, 85. — *sterquilinus*.

**Gal**

... manes, 1851, 260.

**Ga**

... v. trouvé a Fontainebleau, 1856. LXXV.  
... ris. 1846, LV.

**G.**

... il fallait préférer le nom *bonasus* Dej.,  
... fallait préférer *squalidus* Hope, 1853.

DE SAULCY, Col. d'Orient. 1856, 383. —

... Nouv. esp. de Lamellicornes, 1836,  
... t., SCHAU. le *Diceros decorus* la est  
... os, Lamell. mélit., 1844. 389.

... mell. mélit., 1849, 290. — 10-punc-  
... europæa sectionis Trichidum, 1853,  
... 1849, 291. — 8-punctatus, GILLIANT,  
... — *variabilis*, PERRIS, Ins. du Pin mari-  
... MAIRE, envoi des Pyrénées orientales.

... mell. mélit., 1848, LI.

... scv. sur diverses espèces de ce genre.  
... A ce relative à la distinction des espèces.  
... réunie d'un grand nombre d'individus  
... 1857, ACH. — *cucicus*, SCHAU. Notice  
... sp. de ce genre, 1848, LI. — *id.*, DE  
... mois a Londres, 1851, LXXXVIII. — *id.*

- DE CASTELNAU, C'est le mâle dont le *princeps* serait la femelle, 1841, LVIII. — *Daphnis*, BUQUET, Descr. d'un Col. nouv. du genre *Goliathus*, 1835, 135. — *Druryi*, DE MNISECH, Vu encore vivant à Londres, 1851, LXXXVIII. — *Fornassinii*, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 319. — *Grallii*, BUQUET, Descr. de qqes nouv. esp. de Lamellicornes, 1836, 201. — *id.*, TROBERT, Communic. de dessins de qqes Ins. présumés nouv., 1837, xv. — *id.*, *Grallii micans*, DE MNISECH, Communic. de plusieurs Col. remarquables, 1851, CXI. — *princeps*, DE CASTELNAU, Ce serait la femelle du *G. cacticus*, 1841, LVIII. — *rhynophyllus*, BUQUET, 1836, 203. — *torquatus*, *Savagei*, DE MNISECH, 1851, CXI.
- Golefa*** *claviger*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 18. — *imperialis*, THOMSON, Diagnose, 1858, CXLVI. — *Iphiclus*, *Leander*, REICHE, 1859, 18.
- Gonioctena*** *10-punctata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 108. — *pallida*, 1847, 139.
- Gonipterus*** *artensis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 906.
- Genogenins***, SOLIER, Collaptérides, 1838, 48. — *vulgaris*, 1838, 50.
- Gracilla***, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 81. — *brevipennis*, LABOULBÈNE, trouvé par M. Ed. Perris dans de vieux papiers d'osier, 1850, XXXIII. — *fasciolata*, LUCAS, Note sur plusieurs Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXIV. — *pygmaea*, AUD.-SERVILLE, 1834, 82. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, obtenu tous les ans d'un vieux panier d'osier, 1850, XXXIII. — *id.*, FAIRMAIRE, MM. L. Dufour et Mellié l'obtiennent de la même manière, 1850, XXXIII. — *id.*, LUCAS, Communic. sur ce Longicorne, 1858, CL. — *timida*, LUCAS, sortie d'une branche d'arbre rapportée d'Afrique depuis quatre ans, note à ce sujet, 1846, LIV. — *id.*, LABOULBÈNE, trouvée aux env. d'Agen et près de Paris, 1847, XXVIII. — *id.*, LUCAS, Sept individus obtenus d'éclosion à Paris, 1849, LXVI.
- Grammicosum*** *flavofasciatum*, *flavonitidum*, *minutum*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 507. — *semipolatum*, 1859, 508. — *signaticolle*, 1859, 507.
- Grammoptera***, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 215. — *femorata*, 1835, 216. — *lævis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 123. — *lurida*, AUD.-SERVILLE, 1835, 216. — *id.*, GHILIANI, 1847, 127. —



*præusta*, AUD.-SERVILLE, 1835, 217. — *ruficornis*, 1835, 216. — *id.*, PERRIS, Obs. sur les larves, 1847, 551. — *suturalis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 216. — *varians*, GHILIANI, 1847, 98.

**Graphipterus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Réflexions sur leur étude et tableau des espèces, 1859, CCXXIV. — *arcuatus*, GORY, Centurie de Carabiques nouveaux, 1833, 206. — *Barthelemyi*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1859, CCXXVII. — *exclamationis*, LUCAS, Note sur sa manière de vivre, 1850, LXI. — *luctuosus*, *multiguttatus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1859, CCXXVI. — *multiguttatus*, provenant des oasis d'Ouargla, 1857, CXV. — *obscurus*, GORY, 1833, 207. — *rotundatus*, *serrator*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1859, CCXXVI. — *trivittatus*, GORY, Deux Carabiques nouv., 1836, 209. — *Valdani*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1859, CCXXVI. — *variegatus*, LEFEBVRE, Qques renseignements sur cet Ins., 1832, 311. — *id.*, KLEUG, C'est l'esp. rapportée des oasis de Bahryeh, 1834, XXIV. — *id.*, DOUÉ, provenant d'Algérie, 1854, XLI. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 755. — *Westwoodii*, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 291.

**Graphoderus cinereus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119.

**Graptodera**, ALLARD, Diagnoses des espèces de ce genre, 1859, CLXVI, et Monographie des Altises, 1860, 75. — *id.*, GUÉRIN, Différences organiques et spécifiques dans les larves, 1859, CXCII. — *ampelophaga*, ALLARD, 1859, CLXVI et 1860, 78. — *id.*, GUÉRIN, Dégâts causés par cette espèce dans les Vignes en Algérie, 1859, CXCII. — *basalis*, ALLARD, 1859, CLXVIII. — *carduorum*, 1859, CLXVII et 1860, 86. — *cicatrix*, 1859, CLXVIII. — *consobrina*, 1860, 81. — *coryli*, 1860, 77. — *epilobii*, 1859, CLXVII. — *criceti*, 1859, CLXVI et 1860, 82. — *erucæ*, 1859 CLXV et 1860, 76. — *helianthemii*, 1859, CLXVI et 1860, 85. — *hippophaes*, 1859, CLXVII et 1860, 80. — *longicollis*, 1860, 83. — *lythri*, 1859, CLXVIII et 1860, 79. — *mercurialis*, 1859, CLXVIII. — *id.*, AUBÉ et REICHE, trouvée à Compiègne, 1852, XXXII. — *oleracea*, ALLARD, 1859, CLXVI et 1860, 84. — *potentillæ*, 1859, CLXVII. — *ruficollis*, 1859, CLXVIII. — *sicula*, 1859, CLXVII.

**Gronops lunatus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé aux env. d'Orléans, 1851, XLIII. — *id.*, Baie de la Somme, 1852, 685.

**Grypdius brassicæ**, AUBÉ, C'est un *Ceuthorynchus* et probablement le *C. assimilis*, 1852, LXXXIII. — *equiseti*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 96.

**Gymnetis**, REICHE, Avortement du corselet et particularités en résultant, 1849, LVI. — *Alauda*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 359 et 424. — *albiventris*, 1849, 253. — *bajula*, 1849, 359. — *Bomplandi*, 1844, 363 et 406. — *Chevrolatii*, 1844, 360. — *dyzoni*, 1849, 262. — *flava*, 1844, 363. — *flaveola*, 1844, 361. — *flavomarginata*, 1844, 365. — *foeda*, 1849, 262. — *glauca*, 1844, 359. — *graculus*, 1849, 254. — *hebraica*, 1849, 255. — *holosericea*, 1844, 361 et 362. — *insculpta*, 1844, 358. — *litigiosa*, 1844, 365. — *liturata*, 1844, 357. — *maculosa*, 1844, 359. — *magnifica*, 1844, 361. — *marmorea*, 1844, 390 et 1849, 256. — *Meleagris*, 1844, 363 et 1849, 255. — *miniata*, 1844, 365. — *monacha*, 1844, 357. — *ocellata*, 1844, 357. — *pæcila*, 1849, 262. — *pardalis*, *perplexa*, 1844, 360. — *phasianus*, 1849, 257. — *picta*, 1844, 360. — *punctatissima*, 1844, 358. — *radiicollis*, 1849, 262. — *reticulata*, 1849, 253. — *rubida*, 1844, 357. — *Rudolphi*, 1844, 365. — *Sallei*, 1844, 365. — *schistacea*, 1849, 262. — *similis*, 1844, 364. — *singularis*, 1844, 357 et 1849, 253. — *Spencei*, 1849, 257. — *stellata*, 1844, 364. — *suasa*, 1844, 358. — *tigrina*, 1844, 364. — *tristis*, 1844, 360. — *undata*, 1844, 363. — *undulata*, 1844, 357. — *vermiculea*, 1844, 359. — *Wollastonii*, 1849, 262.

**Gymnetron**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Esp. trouvée dans la racine de la Linaire, 1851, CI. — *campanulæ*, LABOULBÈNE, Ses métam., 1858, 900. — *teter*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734.

**Gymnocerus**, AUD. SERVILLE, Longicornes, 1835, 84. — *scabripennis*, 1835, 85.

**Gymnopleurus flagellatus**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, pris au bois de Boulogne, 1846, LIII. — *indigaceus*, *pumilus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *Sturmii*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 725.

**Gynandromorphus etruscus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 89. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 385.

**Gynandrotarsus**, DE LA FERTÉ, Note sur un nouv. genre de Carabiques, 1844, 201. — *harpaloides*, 1844, 203.

**Gyretes**, LABOULBÈNE, Descr. de plusieurs nouv. esp. de ce genre, 1853, 47. — *bidens*, 1853, 55. — *cinctus*, 1853, 57. — *dorsalis*, 1853, 55. — *lævis*, 1853, 58. — *leionotus*, 1853, 56. — *melanarius*,

1853, 55. — *morio*, 1853, 57. — *nitidulus*, 1853, 53 et 57. — *parvulus*, 1853, 59. — *Sallei*, 1853, 51 (\*) et 58. — *sericeus*, 1853, 48 et 56. — *vulneratus*, 1853, 56.

**GYRINIENS**, DEJEAN, Réflexions critiques sur le Species de M. Aubé, 1839, 67.

**Gyrinus**, JACQ. DU VAL, Obs. sur les mâchoires des espèces de ce genre, 1853, XLV. — *bicolor*, *concinus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 402. — *harrarha*, KLUG, C'est le *Gyr. æreus* Klug, 1884, xxiv. — *limbatus*, SOLIER, Descr. d'une nouv. esp. de *Gyrinus*, 1833, 464. — *id.*, LEFEBVRE, confondu avec le *lineatus*, 1833, XXXVIII. — *lineatus*, trouvé au pied du dernier cône de l'Etna, 1832, 425. — *marinus*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LIX. — *nitens*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 402. — *urinator*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 785. — *villosus*, (*G. Orectachilus*), ROBERT, trouvé dans les rivières de la Belgique, 1835, LXXX.

**Gyrophæna complicans**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681.

## H.

**Hadrotoma fasciata**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1859, 45.

**Hadrus**, FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 546.

**Hæmonia**, LESPES, Coques trouvées dans un marais à Meudon, 1854, XLII. — *equiseti*, FAIRMAIRE, trouvée au mois de mars, près Paris, 1850, XXI.

**Hæterius punctulatus**, LUCAS, Note sur cet Ins. trouvé en Algérie, 1855, III.

(\*) La page des Annales est indiquée par erreur 52 au lieu de 51.

**Maliphus fluviatilis**, LABOULBÈNE, trouvé en grande quantité près de Sèvres, 1849, LXV. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Même découverte dans les îles de Chatou, 1849, LXV. — *fulvus*, Col. de Barbarie, 1858, 784. — *fulvus, obliquus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *pyrenaeus*, DELAROUZÉE, Descr. diagnostiques, 1857, XCIII. — *ruficollis*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *variegatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 396.

**Malloemenus flexuosus**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 378. — *humeralis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 117. — *id.*, PERRIS, 1857, 382.

**Malobates**, FAIRMAIRE, Communic. d'une note sur ce genre, 1848, XVI.

**Maltica** (voy. au mot *Altica*) *corrugata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 46. — *corynthia*, 1858, 47. — *discedens*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv. de Col., 1859, 475. — *id.*, AUBÉ, Note au sujet du mémoire de M. Boieldieu, 1859, CCXL. — *id.*, E. ALLARD, l'auteur l'a nommée *Podagrica distinguenda*, 1859, CCXLI. — *inflata*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 50. — *pallida*, BOIELDIEU, 1859, 478. — *id.*, AUBÉ, 1859, CCXL. — *id.*, E. ALLARD, indiquée sous le nom d'*Aphthona flaviceps*, 1849, CCXLI. — *parallela*, BOIELDIEU, 1859, 476. — *saracena*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 52. — *signata*, 1858, 49. — *variipennis*, BOIELDIEU, 1859, 477.

**MALTISES D'EUROPE**, E. ALLARD, Note relative aux Altises européennes, 1858, CCXXXVIII. — *id.*, Tableau de concordance des noms de l'auteur avec ceux de M. Foudras, 1860, 141.

**Hammaticherus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 15. — *batus*, 1834, 16. — *bellator*, 1834, 15. — *holosericeus*, CHEVROLAT, Rapport aux genres actuels des Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 658. — *intricatus*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv., 1848, 167. — *Manderstjernæ*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 12. — *mauritanicus*, BUQUET, Descr. de plusieurs Col. nouv., 1840, 395. — *miles*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 107. — *Mirbeckii*, LUCAS, trouvé aux environs de Sébastopol, 1856, LXXXII. — *plicatus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 16. — *sericeus*, PERROUD, éclos à Marseille, de bois provenant du Sénégal, 1852, LXX. — *velutinus*, DUPONCHEL, 1834, 289. — *id.*, FAIRMAIRE, envoyé des Pyrénées orient., 1856, LXXXII.

**Hammoderus Buquetii**, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 324.

**Hamotus**, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 91. — *bryaxoides*, *humeralis*, 1844, 93. — *latericius*, 1844, 92.

**Haplochile**, REICHE, Ce genre est identique avec le genre *Nomius* Casteln., 1857, CLXIII. — *pygmæus*, il doit être inscrit sous le nom de *Nomius pygmæus*, 1857, CLXIII.

**Harminius**, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 80. — *castaneus*, 1852, 81.

**Harmonia** *marginè-punctata*, AZAMBRE, trouvée à Florence, 1856, XVIII.

**Harpalus** *ambiguus*, *anxius*, THIBÉZARD, trouvés près de Laon, 1853, XXX. — *anxius*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 385. — *asphaltinus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 96. — *Caïphus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 630. — *id.*, PEYRON, 1858, 384. — *complanatus*, PEYRON, 1858, 384. — *cordatus*, PEYRON, 1858, 383. — *crassiusculus*, JACQ. DU VAL, Remarques et notes diverses, 1857, 96. — *cribratus*, PEYRON, 1858, 382. — *cribrellus*, PEYRON, 1858, 383. — *decolor*, REICHE, indiv. pris à Saint-Jean-de-Luz, 1855, CVII. — *distinguendus*, *diversus*, PEYRON, 1858, 385. — *fallax*, 1858, 384. — *ferrugineus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 89. — *id.*, DOÛÈ, trouvé plusieurs fois à Fère-en-Tardenois, 1847, XCVIII. — *Fræhlichii*, THIBÉZARD, trouvé près de Laon, 1853, XXX. — *glebalis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 762. — *Gory*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 241. — *griseus*, PEYRON, 1858, 384. — *hirtipes*, *impiger*, THIBÉZARD, trouvé aux env. de Laon, 1853, XXX. — *honestus*, PEYRON, 1858, 385. — *impressus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *Janus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 524. — *laminatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 763. — *id.*, FAIRMAIRE, Erreur reconnue, 1860, XLV. — *Langloisii*, PEYRON, 1858, 381. — *Lethierryi*, REICHE, Notes sur div. Col., 1859, 640. — *Lycaon*, LINDER, Descr. de deux nouv. Col. pyrénéens, 1860, 612. — *mandibularis*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 96. — *marginellus*, trouvé dans les Basses-Alpes, 1858, CXCII. — *melancholicus*, trouvé aux env. de Grandville, 1858, CLXXII. — *modestus*, THIBÉZARD, 1853, XXX. — *neglectus*, 1853, XXIX. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1856, 764. — *oblongiusculus*, JACQ. DU VAL, Cette esp. doit rentrer dans le genre *Diachromus*, 1854, LXVI. — *obscurus*, PEYRON, 1858, 381. — *patruelis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 721.

— *pharissus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 632. — *id.*, PEYRON, 1858, 385. — *piceus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 763. — *picipennis*, THIBÉZARD, 1853, xxx. — *planicollis, punctato-striatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 764. — *punctato-striatus*, PEYRON, 1858, 385. — *pygmaeus*, var. *ochreatus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 633. — *rotundatus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 721. — *rotundicollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 763. — *rubripes*, PEYRON, 1858, 385. — *rufibarbis*, 1858, 383. — *ruficornis*, 1858, 385. — *rugulosus*, REICHE, trouvé dans les Basses-Alpes, par M. Bellier de la Chavignerie, 1858, CXII. — *rupicola*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 764. — *satyrus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 130. — *segnis, semiviolaceus*, THIBÉZARD, 1853, xxx. — *semiviolaceus*, FAIRMAIRE, Communic. de qqes Col. rares trouvés en France, 1856, LXIII. — *id.*, PEYRON, 1858, 385. — *serripes, servus*, THIBÉZARD, 1853, xxx. — *siculus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 764. — *similis*, PEYRON, 1858, 382. — *tardus*, THIBÉZARD, 1853, xxx. — *tenebrosus*, PEYRON, 1858, 385. — *villosulus*, REICHE, Notes sur div. Col., 1859, 641.

**Harpegnathus**, KRAATZ, se rapporte au genre *Coryphium*, 1857, LIII.

**Mebestola apicalis**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 529. — *humeralis, parvula, petrosa, vitticollis*, 1859, 528.

**Meelinoschema spinosa**, CHEVROLAT, c'est le *Monohammus armatus* de White, 1859, VI.

**Medobla**, BOIELDIEU, Monogr. des Ptimores, 1856, 291. — *imperialis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 622. — *id.*, BOIELDIEU, 1856, 293. — *pubescens*, 1856, 292. — *id.*, AUBÉ, pris dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, 1849, LIII. — *regalis*, BOIELDIEU, 1856, 294.

**Megeter**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 375. — *amaroides*, 1835, 378. — *striatus*, 1835, 377.

**Meilipus trachypterus**, DOUÉ, Indiv. couvert de parasites jaunâtres et de très-petite taille, 1851, XXI.

**Mellocopris densissa**, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 97.

**Mellocopris hybridus**, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies à Prades, 1850, XXIV. — *id.*, FAIRMAIRE, pris aux env. de Saumur, 1856, LXVI.

**Heliothrips hæmorrhoidalis**, SALLÉ, Feuilles d'Orchidées couvertes de ces Insectes, 1854, xvii.

**Helluo**, REICHE, Recherches sur les Helluonides, 1842, 331. — *agathyrnus*, BUQUET, Descr. de qqes Col. nouv. de la fam. des Carabiques, 1835, 618. — *costatus*, REICHE, 1842, 332. — *heros*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 197. — *Saulcyi*, CHEVROLAT, Note sur la synonymie de qqes Col. exotiques, 1856, cvi.

**Helluomorpha**, REICHE, Helluonides, 1842, 340. — *agathyrnus*, *bellicosa*, 1842, 341. — *Clairvillei*, *coracina*, *femorata*, 1842, 342. — *heros*, 1842, 341. — *laticornis*, 1842, 342. — *melanaria*, 1842, 343. — *nigerrina*, *nigripennis*, *præusta*, *pubescens*, *sparsa*, 1842, 342. — *pygmæus*, 1842, 344. — *unicolor*, 1842, 341.

**HELLUONIDES**, REICHE, Recherches sur cette tribu, 1842, 323.

**Helmina pilipennis**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 527.

**Helochares**, JACQ. DU VAL, Ce genre doit être réuni aux *Philhydrus*, 1857, liv. — REICHE, Note en réponse à la communic. de M. Jacq. du Val, 1857, LXXVII. — *dilutus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 358. — *lividus*, CUSSAC, Mœurs et métam., 1852, 622. — *parvulus*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 359.

**Helodes marginella**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 99. — *violacea*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 687.

**Helophorus acutipalpis**, *granularis*, *pallidipennis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 404.

**Helops acutipennis**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 269. — *caraboides*, BLISSON, Larve trouvée dans des galles avec des chenilles de la *Sesia cynipsiformis*, 1849, xxiv. — *cæruleus*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *convexus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 141. — *fulvipes*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 267. — *laticollis*, GHILIANI, 1847, 147. — *picipes*, 1847, 106. — *robustus*, DE BARAN, pris par M. Delarouzée dans les îles d'Hyères, sous des écorces de Chêne-Liége, 1857, calvi. — *striatus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 367. — *testaceus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729. — *tuberculiger*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 265. — *Valdani*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. sommaire, 1859, cxc.

**Memilophus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 49. — *dimidiaticornis*, 1835, 50.

**Memicyrthus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 272.

**Memirhipus lineatus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 140.

**Mephæstion flavicans**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 495.  
— *gracilipes*, *macer*, 1859, 493. — *ocreatus*, 1859, 492. — *opacus*, 1859, 494. — *pallidicornis*, 1859, 493. — *rufo-femoratus*, 1859, 494.  
— *virescens*, 1859, 495.

**Merpiscus**, SOLLIER, Collaptérides, 1838, 188, — *Sommeri*, 1838 191.  
— *Spinola*, 1838, 190.

**Meserophanes**, LABOULBÈNE, a dû vivre pendant dix ans dans le bois d'une chaise, 1853, LXIV. — *affinis*, LUCAS, Notes sur plusieurs Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXIV. — *bimaculatus*, CHEVROLAT, Rapport aux genres actuels des Longicornes de la collect. de Banks, 1851, 660. — *cinereus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1849, 1849, 509. — *griseus*, LUCAS, Ins. obtenus de bûches rapportés d'Afrique, 1846, LIV. — *id.*, Note sur cet Ins., 1848, LXIII. — *id.*, pris aux env. d'Alger, 1850, XLIV. — *holosericeus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 120. — *inspergatus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 509. — *obscurus*, CHEVROLAT, 1851, 660. — *rotundicollis*, LUCAS, Note sur plusieurs Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXIV. — *id.*, COQUEREL, trouvé dans l'arsenal de Toulon, 1849, XLI. — *id.*, Doué, pris en Corse par M. Pierret père, 1849, XLI. — *sericeus*, LUCAS, sorti d'une branche d'arbre rapportée d'Afrique depuis quatre ans, 1846, LIV. — *tomentosus*, LUCAS, 1843, XXIV. — *unicolor* CHEVROLAT, 1851, 660.

**Mesycha cribripennis**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 523.

**Metærius**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 137. — *brunnipennis*, 1857, 433. — *punctulatus*, 1857, 432. — *id.*, LUCAS, Note sur cet Ins. trouvé dans une fourmilière, en Algérie, 1855, III. — *id.*, DE MARSEUL, 1857, 432. — *id.*, FAIRMAIRE, Communic. de plusieurs esp. curieuses trouvées aux env. de Mers-el-Kébir, 1857, XXXIII. — *quadratus*, DE MARSEUL, 1855, 140.

**Meteracantha depressa**, LUCAS, reçue du nord de l'Afrique, 1858, CLXXVII. — *id.*, THOMPSON, Communic. de cette esp., 1858, CCXVII.



**Heterarthron**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. classif. des Bostrichides, 1845, xvii.

**Heterocerus**, L. DUFOUR, Les Hétérocères, 1852, 453. — *aragonicus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 586. — *fossor*, LUCAS, pris aux env. de Misserghin, par M. le major Blanchard, 1849, LXXXIX. — *id.*, JACQ. DU VAL, pris aux env. de Toulouse, 1849, LXXXIX. — *id.*, L. DUFOUR, 1852, 456. — *fossor*, *hispidulus*, *lævigatus*, *maritimus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *marginatus*, 1852, 454 et 457. — *marmota*, KIESENWETTER, 1851, 586. — *minutus*, 1851, 585. — *obsoletus*, FAIRMAIRE, 1852, 683. — *pruinosis*, 1851, 586. — *sabulosus*, JAVET, M. Haliday le croit identique avec l'*H. femoralis*, 1850, xxiv.

**Heteroderes fuscus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 155.

**Heterogomphus** *Achilles*, *Aidoneus*, *Eteocles*, *Pauson*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 17.

**HÉTÉROMÈRES**, SOLIER, Essai d'une division de cette fam., 1834, 479. — *id.*, Lettre à M. Al. Lefebvre sur les tarses dans cette fam., 1834, XLII.

**Heteronychus**, LUCAS, Ins. vivant dont l'auteur réclame le nom spécifique, 1858, CLXXII. — *globosus*, *Lycas*, *morator*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 8.

**Heteropalpus**, BUQUET, Confirmation par la femelle de l'établissement du genre, 1845, xi.

**Heterophaga**, REICHE, Nouv. esp. envoyée par M. Mocquerys, 1854, LXXV. — *chrysomelina*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 95. — *opatroides*, LUCAS, Détails sur la larve, 1848, xiii.

**Heterops Loreyi**, E. BLANCHARD, Notice sur un Ins. de la fam. des Longicornes, 1842, 49.

**Heterorhyna africana**, SCHAUUM, Lamell. mélitoph., 1849, 249. — *bicostata*, 1849, 253. — *biguttata*, *bimaculata*, *Childreni*, *dives*, 1849, 252. — *elegans*, 1849, 247. — *flavipennis*, 1849, 252. — *glaberrima*, *Hopei*, 1849, 247. — *induta*, 1844, 404, et 1849, 252. — *smaragdina*, *suavis*, 1844, 403. — *Swanzyana*, 1849, 253. — *tibialis*, 1849, 248. — *viridicyanea*, 1849, 251.

**Heteroscellis**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 502. — *parallelus*, 1836, 506. — *variolosus*, 1836, 505.

**Meterosoma collata**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 390, et 1849, 283.  
— *Gurrinii*, 1844, 390.

**Meterothops acuminatus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 155. — *binotatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 428. — *prævius*, LEPRIEUR, env. de Bone, 1853, LX.

**Hexaphyllum æquinociale**, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp. de Lucaïde, 1840, 375. — *id.*, Note sur son identité avec l'*Hexap. Westwoodii* Hope, 1842 v.

**Hexaphyllus**, REICHE, ce genre diffère du genre *Syndesus*, 1853, 68. — *id.*, il diffère aussi du genre *Psilodon*, 1853, 69.

**Hexodon Hopci**, REICHE, synonyme d'*unicolor*, 1859, 6. — *reticulatum*, LUCZOT, découvert à Madagascar, dans les sables, 1835, LXI. — *unicolor*, REICHE, C'est l'*H. Kirbyi* Hope, 1859, 5. — *Villersi*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 272.

**Hexarthrus Forsteri**, REICHE, est la 4<sup>e</sup> esp. du genre, 1853, 76.

**Hippopsis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 41. — *lineolatus*, *penicornis*, 1835, 42.

**Hispa cariosa**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 54. — *testacea*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 735. — *id.*, Major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV.

**HSPIDES**, REICHE, Détails sur les antennes, 1845, XLVI.

**Hister**, DE MARSEUL, Histerides, 1854, 161. — *abbreviatus*, 1854, 283. — *abyssinicus*, 1854, 222. — *æquatorius*, 1844, 227. — *æquistrius*, 1854, 589. — *afer*, 1834, 592. — *americanus*, 1854, 575. — *amplifrons*, 1854, 208. — *arabicus*, 1854, 263. — *arcuatus*, 1854, 258. — *id.*, 1857, 163. — *id.*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *assamensis*, DE MARSEUL, Descr. d'un genre nouv. et de plusieurs esp. nouv., 1857, 409. — *atramentarius*, 1857, 158. — *Baconi*, 1854, 198. — *bengalensis*, 1854, 182. — *bifidus*, 1854, 284. — *bifrons*, 1854, 545. — *bimaculatus*, 1854, 582. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 408. — *binotatus*, DE MARSEUL, 1854, 303. — *biplagiatus*, 1854, 552. — *bipunctatus*, 1854, 555. — *bipustulatus*, 1854, 581. — *bisquinguestriatus*, 1854, 309. — *bisseæstriatus*, 1854, 572. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 787. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *bolivianus*, DE MARSEUL, 1854, 235. — *brunnipes*,

1854, 277. — *cadaverinus*, 1854, 291. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 683. — *id.*, PEYRON, 1854, 407. — *caffer*, DE MARSEUL, 1854, 188. — *calabaricus*, Descr. de qqes esp. nouv., 1857, 415. — *californicus*, Histérides, 1854, 544. — *caliginosus*, 1854, 311. — *capicola*, 1854, 220. — *carbonarius*, 1854, 534. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *cavifrons*, DE MARSEUL, 1854, 267. — *chinensis*, 1854, 190. — *civilis*, 1854, 570. — *cælestis*, 1857, 416. — *cænosus*, Histérides, 1854, 276. — *cognatus*, 1854, 548 et 1857, 421. — *confinis*, 1854, 250. — *conformis*, 1854, 249. — *contemptus*, 1854, 231. — *coprophilus*, 1854, 226. — *coracinus*, 1854, 307. — *corvinus*, 1854, 588. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *costatus*, DE MARSEUL, 1857, 407. — *cribrurus*, 1854, 229. — *cruentus*, 1854, 242. — *cupratus*, 1857, 167. — *curtatus*, 1854, 272. — *curvatus*, 1854, 262. — *decollatus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *depurator*, DE MARSEUL, 1854, 274. — *diadema*, 1854, 559. — *dispar*, 1854, 576. — *distans*, 1857, 164. — *distinctus*, 1854, 300. — *distortus*, 1854, 195. — *dubius*, 1854, 279. — *12-striatus*, 1854, 586. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *duplicatus*, 1854, 280. — *elongatulus*, 1854, 194. — *encaustus*, 1854, 211. — *Eschscholtzii*, 1854, 282. — *exaratus*, 1854, 549. — *fmctarius*, 1854, 528, *faedatus*, 1854, 292. — *formicetorum*, AUBÉ, Descr. des deux Col. nouv., 1833, 95. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *fossor*, DE MARSEUL, Histérides, 1854, 566. — *funestus*, 1854, 571. — *furcipes*, 1854, 304. — *gagatinus*, 1854, 202. — *Gehini*, 1854, 306. — *geminus*, 1854, 251. — *gigas*, 1854, 170. — *glabratus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *globulus*, CHEVROLAT, 1833, 449. — *Goudotii*, 1854, 585. — *græcus*, 1854, 529. — *grandicollis*, 1854, 209. — *gratiosus*, 1854, 302. — *guincensis*, 1854, 246. — *Harrisii*, 1854, 299. — *helluo*, TRUQUI, Novæ Histerinorum et Cryptocephalorum species, 1852, 61. — *id.*, DE MARSEUL, 1854, 214. — *heros*, 1854, 242. — *hipponensis*, 1854, 278. — *hottentota*, 1854, 223. — *ignarus*, 1854, 243. — *ignobilis*, 1854, 532. — *immunis*, 1854, 310. — *impressifrons*, 1854, 266. — *inæqualis*, 1854, 184. — *id.*, PEYRON, 1858, 407. — *incertus*, DE MARSEUL, 1854, 269. — *incisus*, 1854, 241. — *incognitus*, 1854, 289. — *indistinctus*, 1854, 573. — *interruptus*, 1854, 295. — *japonicus*, 1854, 201. — *javanicus*, 1854, 557. — *Jekeli*, 1857, 417. — *Krynickyi*, 1857, 167. — *kurdistanus*, 1857, 418. — *labiatus*, 1857, 158. — *lævipes*, 1854, 233. — *lamæcola*, 1857, 411. — *latobius*, 1854, 219. — *lentulus*, 1854, 564. — *lentus*, 1854, 580. — *limbatus*, TRUQUI, 1852, 64. — *id.*, DE

MARSEUL, 1854, 562. — *lissurus*, 1854, 275. — *Loandæ*, 1854, 236. — *longicollis*, 1854, 257. — *luctuosus*, 1854, 197. — *lugubris*, TRUQUET, 1852, 63. — *id.*, DE MARSEUL, 1854, 560. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *lutarius*, DE MARSEUL, 1854, 183. — *major*, 1854, 173. — *id.*, PEYRON, 1858, 407. — *maurus*, DE MARSEUL, 1854, 242. — *marginatus*, 1854, 539. — *marginicollis*, 1854, 542. — *melanarius*, 1854, 191. — *Memnonius*, 1854, 196. — *merdarius*, 1854, 297. — *metallicus*, CHEVROLAT, 1833, 469. — *mærens*, DE MARSEUL, 1854, 563. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *montanus*, DE MARSEUL, 1857, 413. — *navus*, 1857, 157. — *navus*, 1854, 541. — *neglectus*, 1854, 530. — *nigellatus*, 1854, 538. — *nigrinus*, 1854, 218. — *nigrita*, 1854, 186 et 591. — *niloticus*, 1854, 237. — *nomas*, 1854, 216. — *obesus*, 1854, 568. — *obscurus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *orientalis*, DE MARSEUL, 1854, 193. — *ovatulus*, 1854, 228. — *panamensis*, 1854, 234. — *parallelogrammus*, 1857, 161. — *parallelus*, 1857, 162. — *Paykulli*, 1854, 286. — *Peyroni*, 1857, 420. — *philippinensis*, 1854, 547. — *platysomoides*, PEYRON, 1854, 407. — *id.*, Le nom de *Peyroni* a l'antériorité, 1857, CIX. — *prætermisus*, PEYRON, Descr. d'une nouv. esp. du genre *Hister*, 1856, 727. — *id.*, DE MARSEUL, 1857, 424. — *pullatus*, 1854, 244. — *punctatus*, CHEVROLAT, 1833, 469. — *puncticollis*, DE MARSEUL, 1854, 591. — *punctifer*, 1854, 265. — *punctiventer*, 1854, 543. — *punctulatus*, 1854, 256. — *purpurascens*, 1854, 536. — *pustulosus*, 1854, 206. — *putridus*, 1854, 270. — *4-maculatus*, 1854, 204. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *4-notatus*, DE MARSEUL, 1854, 556. — *14-striatus*, 1854, 248. — *rectisternus*, 1854, 213. — *recurvus*, 1854, 232. — *refletus*, 1854, 310. — *reflexilabris*, 1854, 187. — *robustus*, 1854, 172. — *ruficornis*, 1857, 159. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *Sallei*, DE MARSEUL, 1854, 584. — *Scævola*, 1854, 189. — *scissifrons*, 1854, 240. — *scutellaris*, 1854, 579. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 367. — *semigranulosus*, DE MARSEUL, 1854, 210. — *sempianus*, 1854, 239. — *Sennevillei*, 1857, 422. — *sepulchralis*, 1854, 565. — *scrvus*, 1854, 561. — *16-striatus*, 1854, 285. — *6-striatus*, 1854, 290. — *sibiricus*, 1854, 305. — *sinuatus*, 1854, 553. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *smyrnæus*, DE MARSEUL, 1854, 308. — *sordidus*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 322. — *id.*, DE MARSEUL, 1854, 577. — *spinipes*, 1854, 199. — *spretus*, 1854, 271. — *squalidus*, 1854, 576. — *stercorarius*,

1854, 546. — *striolatus*, 1854, 200. — *stygicus*, 1854, 301. — *subsulcatus*, 1854, 221. — *terricola*, 1854, 294. — *teter*, TRUQUI, 1852, 62. — *id.*, DE MARSEUL, 1854, 259. — *thibetanus*, 1857, 412. — *thoracicus*, 1854, 243. — *torquatus*, 1854, 587. — *torridus*, 1854, 230. — *tristriatus*, 1854, 569. — *tropicalis*, 1854, 217. — *tropicus*, 1854, 225. — *uncostratus*, 1854, 532. — *unicolor*, 1854, 261. — *validus*, 1854, 171. — *ventralis*, 1854, 535. — *viduus*, 1854, 247. — *vilis*, 1854, 245.

**HISTÉRIDES**, DE MARSEUL, Essai monogr. sur cette fam., 1853, 131 et 447; 1854, 161, 525 et 671; 1855, 83, 327 et 677; 1856, 97, 258 et 549; 1857, 109 et 397; supplément 1860, 581 et 835. — *id.*, Caractères distinctifs de la fam., 1857, 112. — *id.*, Anatomie, variations de formes, 1857, 117. — *id.*, Métam. et mœurs, distrib. géographiques, 1857, 126. — *id.*, Hist. des travaux sur les Histérides, 1857, 130. — *id.*, Classification, 1857, 147. — *id.*, Tableau synoptique des trib. et des genres, 1857, 149. — *id.*, Table alphabétique des genres et des esp., 1857, 451. — *id.*, Catalogue des trib., genres et esp., 1857, 467. — *id.*, JACQ. DU VAL, Explications sur la forme et la composition de leur lèvre inférieure, 1857, LV.

**Hololeius nitidulus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 274.

**Hololepta**, DE MARSEUL, Essai monog sur la fam. des Histérides, 1853, 135. — *aradiformis*, 1853, 181. — *arcifera*, 1853, 159. — *arcitensis*, 1860, 598. — *attenuata*, 1853, 182. — *australica*, 1853, 146. — *Batchiana*, 1860, 588. — *Bautnyi*, 1857, 399. — *bidentata*, 1853, 156. — *bogotana*, 1853, 184. — *bractea*, 1853, 157 et 1860, 591. — *cacti*, 1853, 220. — *caffra*, 1853, 219. — *caracasica*, Supp. à la monogr. des Histérides, 1860, 601. — *cayennensis*, 1853, 180. — *columbiana*, 1853, 154. — *cubensis*, 1853, 178. — *curta*, 1853, 187. — *elongata*, 1853, 190. — *excisa*, 1853, 148. — *flagellata*, 1857, 155. — *fossularis*, 1853, 147. — *glabra*, 1860, 596. — *id.*, 1857, 155. — *guidonis*, 1860, 595. — *humilis*, 1853, 179. — *indica*, 1853, 152. — *januarii*, 1860, 602. — *lamina*, 1853, 180. — *lissopyga*, 1854, 144. — *lucida*, 1853, 177 (1). — *manillensis*, 1853, 145. — *marginipunctata*, 1853, 153. — *meridana*, 1853, 184. —

(1) Par une erreur de pagination, l'imprimeur des Annales a sauté de la page 160 à la page 177, et a continué jusqu'à la fin du volume; en sorte que les pages 161 à 176 semblent manquer, quoique le texte se suive sans interruption.

*morator*, 1860, 603. — *obscura*, 1853, 150. — *Perraudieri*, 1857, 397. — *plana*, 1853, 143. — *pontavicei*, 1860, 594. — *populnea*, 1860, 592. — *princeps*, 1860, 605. — *procera*, 1853, 189. — *quadriformis*, 1853, 186. — *scissoma*, 1860, 599. — *semicincla*, 1853, 159. — *sidnensis*, 1860, 587. — *similis*, 1853, 155. — *striatidra*, 1854, 151. — *subhumilis*, 1853, 179. — *sublucida*, 1853, 149. — *victina*, 1853, 220. — *truxillana*, 1860, 590.

**Helenychus**, COQUEL, Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 242. — *acanthopus*, 1859, 242. — *camelus*, *æruginosus*, 1859, 243. — *sacerus*, 1859, 244.

**Holoparamecus depressus**, *Panckouckii*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Note sur ce genre et sa synonymie, 1844, v. — *Panckouckii*, AUBÉ, Réponse à la note de M. Guérin-Méneville, 1844, vi. — *id.*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Identité de cet Ins. avec le *Calyptribium caularum* Aubé, 1844, x. — *id.*, AUBÉ, Identité et antériorité reconnues du genre de Curtis, 1844, x.

**Holopterus araneipes**, *chilensis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 500. — *compressicornis*, 1859, 501.

**Homæotarsus Chaudoirii**, BONVOULOIR, Esp. et genre nouveaux pour l'Europe, 1860, xxii. — *id.*, PEYRON, Env. de Tarsous, 1858, 428.

**Homalirhinus rufrostris**, CHEVROLAT, Descr. de deux genres nouv. de Curculionites, 1833, 60.

**Homaligus** (voyez *Omaligus*).

**Homalolachnus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 293.

**Homalopus** (*Cryptocephalus*), *Loreyi*, ROUGET, Notice sur cet Ins., 1844, 207. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 108. — *id.*, trouvé dans les Alpes-Maritimes, 1848, xliii. — *id.*, FAIRMAIRE, Commun. au nom de M. Rouget, de plusieurs indiv. vivants, 1855, liii. — *major*, GHILIANI, 1847, 108.

**Homalota**, BOIELDIEU, Esp. crue nouv. trouvée dans un nid d'hirondelle de rivage, 1854, xxxv. — *id.*, JACQ. DU VAL, Nouv. esp. trouvée dans une grotte des Pyrénées, 1855, lxxxi. — *anthracina*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681 et 687. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 419. — *Aubei*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de qqes Col. nouv. de la faune française, 1860, 339. — *brunnea*, KJESSENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851,

441.—*cadaverina*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 341.—*castanea*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 306. — *celata*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 561. — *circellaris*, KIESENWETTER, 1851, 409. — *cuspidata*, PERRIS, 1853, 562. — *debilis*, FAIRMAIRE, 1852, 681.—*difficilis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Diagnoses d'esp. nouv., 1859, CCXIX. — *Dux*, PEYRON, 1858, 418. — *elongatula*, KIESENWETTER, 1851, 407.— *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 681. — *eucera*, AUBÉ, 1850, 307. — *excavata*, AUBÉ et REICHE, trouvée à Compiègne, 1852, XXXI. — *Fairmairii*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CCXVIII. — *fimorum*, 1860, 343. — *fungi*, KIESENWETTER, 1851, 411. — *fungi, fungicola*, PEYRON, 1858, 419. — *granigera*, 1851, 406.—*hypnorum*, 1851, 407.—*immunda*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 342. — *incana*, JACQ. DU VAL, Remarques et notes diverses, 1857, 98. — *labilis*, KIESENWETTER, 1851, 407. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 681.—*lacustris*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CCXVIII.—*liliputana*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 344. — *longicornis*, FAIRMAIRE, 1852, 681.—*major*, AUBÉ, 1850, 306.—*minuscule*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CCXVIII.—*muscorum*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 344.—*myops*, KIESENWETTER, 1851, 410.—*myrmidon*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 151. — *niger-rima*, AUBÉ, 1850, 308. — *nigrina*, 1850, 304. — *nivicola*, FAIRMAIRE, Esp. rares en France, 1857, LII. — *notha, ochracea*, Env. de Paris, 1846, LV. — *orbata*, Baie de la Somme, 1852, 681. — *parisiensis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CCXVII.—*pavens*, KIESENWETTER, 1851, 407.—*planaticollis*, AUBÉ, 1850, 305.—*Reyi*, KIESENWETTER, 1851, 405. *rigidicornis, ripicola*, FAIRMAIRE, 1852, 681.—*rustica*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 340. — *sequanica*, 1859, CCXVII. — *socialis*, KIESENWETTER, 1851, 411. — *tabida*, 1851, 409. — *torrentum*, 1851, 408. — *umbonata*, 1851, 405. — *velata*, 1851, 407.

**Hoplia** *argentea*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *farinosa*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 288. — *nuda*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 94.— *Peronii*, GIRARD, Du voyage de Péron, 1857, CLV. — *praticola*, GHILIANI, 1847, 104. — *pulverulenta*, CHEVROLAT, C'est à cette esp. et non à l'*H. squamosa* qu'il faut rapporter, l'*Hoplia* trouvée par M. Berce à Fontainebleau, 1850, LXVI. — *squamosa*, BERCE, prise à Fontainebleau sur les fleurs de l'égantier, 1850, XLIV.

**Hoplideres**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 147.— *id.*, COQUEREL.

Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 253. — *aquilus*, *spinipennis*, 1859, 254. — *spinipennis*, AUD.-SERVILLE, 1832, 148.

**Hoplus variabilis**, MORINEAU, trouvé dans la terre, fin d'octobre, 1834, LXI.

**Hoplogenius**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 237.

**Hoplolenus insignis**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 266.

**Hoplenotus spiniferus**, *subarmatus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 516.

**Hoplepus atriplicis**, LUCAS, Synonymie de cette esp., 1855, CIII.

**Hoploscellis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 169. — *lucanoides*, 1832, 170.

**Hoplostomus fuligineus**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 395.

**Horatoma**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 364. — *parvulum*, 1861, 366.

**Horia maculata**, *maxillosa*, *testacea*, AUD.-SERVILLE, Obs. sur une lettre de M. Westermann, 1833, 491.

**Hyas denticornis**, *flabellata*, DE LAPORTE, Essai d'une révision du genre *Lamproyris*, 1833, 134. — *guttata*, 1833, 135.

**Hybalus**, LUCAS, Remarq. synonymiques sur ce genre, 1855, 535. — *angustatus*, 1855, 558. — *cornifrons*, trouvé dans l'estomac du *Bufo pantherinus*, en Algérie, 1853, v. — *id.*, 1855, 547 — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 173. — *Dorcas*, LUCAS, 1855, 549. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 173. — *Doursii*, LUCAS, Note sur cette esp., 1853, XXII. — *id.*, 1855, 552. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 173. — *parvicornis*, LUCAS, 1855, 556. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 173. — *tingitanus*, LUCAS, 1855, 545. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 173. — *tricornis*, LUCAS, 1855, 554.

**Hybomorphus**, SAUNDERS et JEKEL, Descr. de qqes Curculionites, 1855, 301. — *melanosomus*, 1855, 304.

**Hybosorus arator**, REICHE, Note sur cette esp., 1853, 87.

**Hydaticus austriacus**, *bilineatus*, *cinereus*, GAUBIL, pris à Strasbourg dans les flaques d'eau du Rhin, 1850, XXXIX. — *fusciventris*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 639. — *grammicus*, GAUBIL, 1850,



XXXIX. — *id.*, GHILIANI, 1847, 119. — *Hybneri*, GAUBIL, 1850, XXXIX.  
— *Nauzeletii*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes nouv. Col. de France, 1859,  
LII. — *transversalis, zonatus*, GAUBIL, 1850, XXXIX.

**Hydnobius Perrisi**, FAIRMAIRE, Courte descr., 1855, LXXV.

**Hydraena angustata, curta, flaviceps, nigrita**, KIESENWETTER, Col. du  
midi de la France et de Catalogne, 1851, 392. — *nigrita, pul-*  
*chella*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 406. — *riparia, Sie-*  
*boldii*, KIESENWETTER, 1851, 392. — *testacea*, LEPRIEUR, Env. du  
Rhône, 1853, LVIII.

**Hydrobius**, SOLIER, Obs. sur la trib. des Hydrophiliens, 1834, 313. —  
*æneus*, 1834, 314. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858,  
403. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786. —  
*artensis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 247. —  
*convexus*, SOLIER, 1834, 314. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858,  
786. — *fuscipes*, CUSSAC, Mœurs et métam. de cette esp., 1855, 246.  
— *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 786. — *fuscipes, globulus*,  
PEYRON, 1858, 403. — *orbicularis, picipes, scarabæoides*, SOLIER,  
1834, 314. — *strigosus*, FAIRMAIRE, trouvé près de Saint-Germain-en-  
Laye, 1857, XCII.

**HYDROCANTHARES**, DEJEAN, Réflexions sur le Species de  
M. Aubé, 1839, 67. — *id.*, LEPRIEUR, trouvés dans les env. de Bone,  
1853, LVIII.

**Hydrocanthus diophthalmus**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient,  
1855, 641 et 1858, 58. — *id.*, SCHAUM, La figure convient à l'*Hydr.*  
*notula*, 1857, LXXX. — *id.*, REICHE, Paraît se rapporter à l'*Hydr.*  
*notula* Erich., 1857, CLXII.

**Hydrochus angustatus**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 404.  
— *foveostriatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858,  
786. — *nitidicollis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de  
Catalogne, 1851, 391.

**HYDROPHYLIENS**, SOLIER, Obs. sur cette tribu, 1834, 299.

**Hydrophylus**, AUDOUIN, Qques mots sur leur mode de respiration, 1832,  
III. — *id.*, SOLIER, Obs. sur la tribu des Hydrophiliens, 1834, 299.  
— *ægyptiacus*, PEYRON, Descr. de deux genres et de quatre esp. de  
Col. d'Orient, 1856, 723. — *id.*, SCHAUM, paraît être le *spinipennis*  
de Guérin, 1857, LXXX. — *id.*, PEYRON, Note en réponse à M. Schaum,

1857, CIX. — *aterrimus*, LEPRIEUR, Environs de Dieuze, 1847, XLVII. — *id.*, GAUBIL, Pris à Strasbourg, 1850, XXXIX. — *id.*, LEPRIEUR, Qques mots sur l'*Hyd. inermis*, 1854, 69. — *australis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 248. — *caraboides*, SOLIER, 1834, 312. — *inermis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 721. — *id.*, LEPRIEUR, 1854, 69. — *piceus*, 1854, 69. — *Péronii*, GIRARD, Voyage de Péron, 1857, CLV. — *pistaceus*, JACQ. DU VAL, Glan. entom., 1857, 88. — *id.*, LEPRIEUR, Qques indiv. différents de forme générale, 1860, XLVIII. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsons, 1858, 403. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786. — *scrobiculatus*, SOLIER, 1834, 312.

**Hydroporus** *analis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 391. — *angulipennis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsons, 1858, 398. — *assimilis*, LEPRIEUR, Pris à Metz, 1846, CV. — *Aubei*, KIESENWETTER, 1851, 390. — *bicarinatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 784. — *bicruciatu*, LEPRIEUR, Pris en Algérie, 1859, CCXXXIX. — *borealis*, KIESENWETTER, 1851, 390. — *canaliculatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 149. — *Cerisyi*, KIESENWETTER, 1851, 390. — *Cleopatraz*, PEYRON, 1858, 397. — *confluens*, PEYRON, 1858, 399. — *confluens*, *consobrinus*, LEPRIEUR, Détails sur les Col. des marais salants de Dieuze, 1845, XCIV. — *consobrinus*, env. de Bone, 1853, LIX. — *cuspidatus*, Source thermale des env. de Bone, 1860, LXXXVI. — *id.*, PEYRON, 1858, 398. — *Davisi*, KIESENWETTER, 1851, 390. — *decoratus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 689. — *discretus*, Miscell. entomol., 1859, 28. — *12-pustulatus*, Env. de Paris, 1846, LV. — *id.*, LEPRIEUR, env. de Bone, 1853, LIX. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *Escheri*, 1853, LIX. — *exornatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 644. — *id.*, PEYRON, 1858, 398. — *flavipes*, KIESENWETTER, 1851, 391. — *formosus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *frater*, LEPRIEUR, Marais salants des env. de Dieuze, 1845, XCIV. — *geminus*, PEYRON, 1858, 398. — *glacialis*, GAUBIL, esp. nouv., 1852, VII. — *id.*, REICHE et LABOULBÈNE, Très-voisin de l'*Hyd. nivalis*, 1852, XXXVII. — *Goudoti*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *inæqualis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *incertus*, LEPRIEUR, 1845, XCIV et 1853, LIX. — *laviventris*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 542. — *Lareynii*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Corse, 1859, 273. — *lepidus*, *lineatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *lineellus*, LEPRIEUR, 1845, XCIV. — *luctuosus*, PEYRON, 1858, 399. — *marginatus*, FAIR-

MAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *Martinii*, FAIRMAIRE, 1859, 274. — *meridionalis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 721. — *minutissimus*, KIESENWETTER, 1851, 390. — *id.*, LEPRIEUR, 1853, LIX. — *mæstus*, FAIRMAIRE, 1859, 272. — *Mulsantis*, PEYRON, 1858, 400. — *nivalis*, KIESENWETTER, 1851, 391. — *opatrinus*, 1851, 390. — *pallidulus*, AUBÉ, Descr. de qqes espèces d'Europe et d'Algérie, 1850, 300. — *parallelogrammus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *id.*, PEYRON, 1858, 401. — *parallelogrammus*, *picipes*, LEPRIEUR, 1845, XCIV. — *pictus*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *planus*, PEYRON, 1858, 398. — *polonicas*, AUBÉ, Note sur qqes Col. nouv., 1842, 230 et 345. — *pubesceus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *Schaumei*, AUBÉ, 1842, 229. — *searpustulatus*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *thermalis*, LEPRIEUR, dans les eaux thermales, 1859, CCXXXIX. — *unistriatus*, FAIRMAIRE, 1852, 639. — *varius*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 784. — *vestitus*, FAIRMAIRE, Miscel. entom., 1859, 27.

**Hydrous**, SOLIER, Hydrophiliens, 1834, 304. — *guadelupensis*, *piceus*, 1834, 306.

**Hygrobia Hermannii**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119. — *id.*, COQUEREL, pris sur les eaux du Tage après un grand coup de vent, 1850, XLIV.

**Hylastes angustatus**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 228. — *ater*, 1856, 223. — *attenuatus*, 1856, 229. — *palliatus*, 1856, 224. — *variolosus*, 1856, 229.

**Hylecoetus, brasiliensis**, DE LAPORTE, Mémoire sur cinquante esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 398. — *dermestoides*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127. — *morio*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1847, XL.

**Hylesinus Aubci**, PERRIS, Signalement de sept Col. nouv. du département des Landes, 1855, LXXVIII. — *crenatus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques indiv. vivants pris dans le parc de Saint-Cloud, 1845, XXVIII. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 133. — *oleiperda*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 2<sup>e</sup> mémoire sur les Ins. qui attaquent l'Olivier, 1840, 104. — *thuyæ*, PERRIS, 1855, LXXVII. — *varius*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur ses mœurs, 1846, LXIX.

**Hyllthus**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 408. — *distinctus*, 1835, 411. — *tentyrioides*, 1835, 410.

**Hylebius abietis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 431. — *alpheus*, REICHE et DE SAULCY, Col. de l'Orient, 1857, 675. — *fatuus*, GHILIANI, 1847, 96. — *pinarstri*, *pincti*, 1847, 127.

**Hylechares**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 127. — *ambulator*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 176. — *cruentatus*, LATREILLE, 1834, 128. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 175. — *Lanierii*, 1843, 176. — *melasinus*, LATREILLE, 1834, 128. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 176. — *procerulus*, LATREILLE, 1834, 127. — *senegalensis*, *subacutus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 176. — *unicolor*, LATREILLE, 1834, 128. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 176.

**Hylotrupes bajulus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1884, 77. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 454.

**Hylurgus**, AUDOUIN, Obs. sur les dégâts causés au *Pinus sylvestris*, 1837, LVI. — *ater*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472. — *betulae*, AUBÉ, Dégâts causés au bois de Boulogne, 1838, LVI. — *ligniperda*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 204. — *minor*, 1856, 221. — *piniperda*, CHEVROLAT, 1833, 472. — *id.*, AUBÉ, Entozoaire vivant dans son tissu cellulaire graisseux, 1844, XIII. — *id.*, PERRIS, 1856, 208. — *socius*, CHEVROLAT, 1833, 472.

**Hymenoplia sicula**, LUCAS, Commun. d'individus trouvés à Bouçada (Algérie), 1854, L.

**Hymenopus Doublieri**, FAIRMAIRE, Pris à Arcachon, 1859, CXXIX.

**Hyperantha**, DESMAREST, Descr. de deux nouv. esp. de Buprestides, 1843, 17. — *Chabrillacii*, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 327. — *Sallei*, ROJAS, Descr. de trois nouv. Col. de Venezuela, 1856, 693. — *stigmaticollis*, DESMAREST, Descr. de deux nouv. Buprestides, 1843, 21. — *Vargasi*, Descr. d'un nouv. Buprestide, 1855, 261. — *id.*, CHEVROLAT, doit être rapporté au genre *Conognatha*, 1856, CVI. — *vittaticollis*, DESMAREST, 1843, 19.

**Hyperops**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 275. — *coromandelensis*, 1835, 279. — *parvus*, 1835, 278. — *tagenoides*, 1835, 277. — *unicolor*, 1835, 280.

**Nyphidius variegatus**, ROUZET, trouvé à Bondy, 1848, XXXIII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 784.

**Hypocephalus armatus**, DOUË, L'auteur a remarqué cette esp. dans le musée du Havre, 1854, LV. — LUCAS et DESMAREST, Remarques à ce sujet, 1854, LV.

**Hypocœlus procerulus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 175.

**Hypocyptus grandicornis**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 152. — *longicornis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *rufipes*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI.

**Hypodesis sericea**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 156.

**Hypoglypthus pictus**, KRAATZ, Commun. de cette esp. venant de Grèce, 1860, LXII.

**Hypolithus javanus**, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 241. — *vicinus*, 1833, 240.

**Hypophlœus castaneus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470. — *depressus*, REICHE, envoyé par M. Mocquerys, 1855, LXXV. — *ferrugineus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 354. — *linearis*, 1857, 358. — *pini*, CHEVROLAT, 1833, 470.

**Hyporhagus**, THOMSON, Monogr. de la fam. des Monommides, 1860, 25. — *æneus*, 1860, 27. — *brasiliensis*, 1860, 26. — *castaneus*, 1860, 29. — *cayennensis*, 1860, 30. — *costulatus*, 1860, 34. — *fuscipes*, 1860, 31. — *lævepunctatus*, 1860, 30. — *Lecontei*, 1860, 31. — *marginatus*, 1860, 27. — *pertinax*, 1860, 28. — *piceus*, 1860, 34. — *punctulatus*, 1860, 32. — *resinorum*, 1860, 35. — *valdepunctatus*, 1860, 28. — *venezuelensis*, *yucatanus*, 1860, 33.

**Hypsioma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 38. — *gibbera*, 1835, 39.

**Hypsiophthalmus buphthalmus**, *luciferus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 145.

# I.

**Ibidion**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 103. — *armatum*, 1834, 107. — *bituberculatum*, 1834, 105. — *comatum*, 1834, 104. — *fusi-ferum*, *pictum*, 1834, 106. — *6-guttatum*, 1834, 105. — *signatum*, 1834, 104.

- leosium tomentosum**, LUCAS, Note sur un nouv. genre de la fam. des Longicornes, 1854, VIII; 1857, 609 et 613.
- lybius fuliginosus**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 402.
- lnea Bomplandi**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 289. — *Burmeisteri*, 1849, 294. — *clathratus*, 1849, 288. — *irroratus*, 1844, 399. — *lineola*, 1844, 397. — *Weberi*, 1844, 399.
- lphilus**, REICHE, Communic. de deux nouv. esp. de ce genre, 1855, XXX. — *croaticus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 265.
- lpidia lata**, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 328.
- lps bimaculata**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 262. — *ferruginea*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 596. — *canaliculata*, JACQ. DU VAL, Se rapporte au *Rhyssodes sulcatus*, 1857, 95. — *puberula*, MONTROUZIER, 1860, 263.
- larthron luridum**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127.
- lcharlotes**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 572. — *hierichonticus*, 1855, 573.
- lchnostoma albomarginata**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 393. — *cuspidata*, 1844, 391, et 1849, 284. — *heteroclyta*, 1844, 392. — *nasuta*, 1849, 288.
- loderus hirtus**, CHEVROLAT, Rapport aux genres actuels des Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 659.
- loden curtus**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 9.
- lomerluthus barbipes**, SAUNDERS et JEKEL, Descr. de qqes Curculionites, 1855, 293.
- lopus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 299. — *Blanchardi*, 1860, 299.
- lserhipls Lepaigei**, CHEVROLAT, Larves trouvées à Fontainebleau dans les bois de Hêtre, 1846, LXXIV.
- lotarsus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 217. — *amplicollis*, SCHAUM, Qques obs. sur le groupe des Panagéites, 1853, 438. — *cyaneus*, 1853, 439. — *guttiferus*, 1853, 437. — *insignis*, 1853, 435. — *mandarinus*, 1853, 436.
- lthyporus bigibbosus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 907.

## J.

**Jenthodes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 558. — *formosa*, 1833, 559.

**Julodis**, SOLIER, Buprestides, 1833, 272. — *Aristidis*, LUCAS, Descr. de cette nouv. esp., 1860, XXVII. — *Caillaudi*, SOLIER, 1844, 273. — *id.*, LUCAS, Note géographique sur cette espèce, 1859, CLXXXIII. — *cicatricosa*, Note sur deux nouv. esp. de *Julodis*, 1859, CLXXXIII. — *Clouei*, BUQUET, Notice sur une monstruosité dans l'antenne droite, 1843, 97. — *cyanitarsis*, SOLIER, 1833, 273. — *deserticola*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes esp. nouv. de Col. européens et algériens, 1859, CCXXXVI. — *fascicularis*, *gnaphalon*, *hirsuta*, *hirta*; SOLIER, 1833, 273. — *Jaminii*, LUCAS, 1859, CLXXXIII. — *lasios*, *Latreillei*, SOLIER, 1833, 273. — *leucosticta*, FAIRMAIRE, 1859, CCXXXVI. — *Olivieri*, *onopordinis*, SOLIER, 1833, 273. — *onopordinis*, A. DEYROLLE, Communic. de plusieurs indiv, des env. de Murcie, 1853, XLVII. — *Rothii*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 410. — *tingitana*, FAIRMAIRE, Col. provenant de Tanger, 1851, XXI.

## L.

**Laccobius globosus**, CHEVROLAT, Communic. de deux indiv. présentant des particularités intéressantes, 1860, LXXXVI. — *minutus*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LVIII. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 403. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786.

**Laccophilus interruptus**, LEPRIEUR, Col. des env. de Bone, 1853, LIX. — *minutus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 401. — *testaceus*, LEPRIEUR, 1853, LIX. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 785. — *variegatus*, PEYRON, 1858, 401.

**Lichenus?** *rugosifrons*, CHEVROLAT, Dépôt de descr. et fig. de deux Col. nouv., 1853, XIV.

**Lachnea** *vicina*, LUCAS, Nouv. obs. sur ses foureaux, 1852, 463.

**Lachnia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 63. — *parallela*, *subcincta*, 1835, 64.

**Lachnophorus** *bipunctatus*, *niger*, GORY, Centurie de Carabiques nouv. 1833, 245.

**Lacou** *marinus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 586.

**Lamophloeus**, CHEVROLAT, Deux nouv. esp. trouvées dans de l'Orge avariée, 1851, LXXVII. — *bimaculatus*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *Dufourii*, LABOULBÈNE, Descr. d'une nouv. esp. française, 1848, 295. — *id.*, JACQ. DU VAL, Cinq indiv. pris à Toulouse sous des écorces de Chêne, 1849, LXXIII. — *id.*, LABOULBÈNE, prise à l'automne et au printemps près de Tarbes, 1850, XVII. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 618. — *fractipennis*, LABOULBÈNE, Descr. d'une nouv. esp. française, 1848, 299. — *hypobori*, PERRIS, Signalement de sept Col. nouv. du département des Landes, 1855, LXXVII.

**Lagri** *dichroa*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 305. — *tristis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119.

**Lains** *rufipes*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 259.

**LAMELLICORNES**, DEJEAN, Obs. sur l'absence des tarses chez quelques Lamellicornes, 1838, VIII. — *id.*, BOISDUVAL et BRULLÉ, Obs. sur les tarses dans cette famille, 1838, XVIII. — *id.*, LUCAS, Commun. de var. curieuses pour des différences de tailles, 1856, IV. — *id.*, REICHE, Notes synonymiques sur le cinquième volume de l'Handbuch der entomologie, 1859, 5.

**LAMELLICORNES MÉLITOPHILES**, SCHAUUM, Obs. critiques de cette famille, 1844, 333, et 1849, 241. — *id.*, Catalogue des espèces connues de cette famille, 1845, 37. — *id.*, Rectific. au travail de cette famille, 1851, XLVII.

**Lamia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 93. — *ædificator*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 622. — *æstuans*, *æthiops*, AUD.-SERVILLE, 1835, 94. — *æthiops*, CHEVROLAT, 1851, 601. — *Banksii*, *bidens*, 1851, 662. — *bifasciata*, 1851, 664. — *crista*, 1851,



662. — *formosa*, AUD.-SERVILLE, 1835, 94. — *fronticornis*, CHEVROLAT, 1851, 662. — *funesta*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, CHEVROLAT, 1851, 661. — *gigas*, DE LAPORTE, Communic. de plusieurs indiv. recueillis en Afrique, 1837, LVL. — *glycirrhizæ*, CHEVROLAT, 1851, 663. — *hottentota*, AUD.-SERVILLE, 1835, 94. — *imperialis*, CHEVROLAT, 1851, 662. — *jucunda*, GORY, Descr. de deux esp. nouv., 1835, 139. — *nigricornis*, CHEVROLAT, 1851, 663. — *nutator*, 1851, 662. — *oculator*, AUD.-SERVILLE, 1835, 94. — *pedicornis*, *pulchra*, CHEVROLAT, 1851, 662. — *radiata*, GORY, 1835, 141. — *id.*, DUPONT, Rectific. de la syn. de cette esp., 1835, 665. — *regalis*, CHEVROLAT, 1851, 662. — *reticulator*, *rotator*, 1851, 661. — *rubra*, Synonymie, 1859, VI. — *rubus*, AUD.-SERVILLE, 1835, 94. — *ruspator*, *scabrator*, CHEVROLAT, 1851, 661. — *scabrator*, AUD.-SERVILLE, 1835, 94. — *solandri*, *spinator*, CHEVROLAT, 1851, 662. — *textor*, AUD.-SERVILLE, 1835, 95. — *id.*, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies à Prades, 1850, XXV. — *trifasciata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 93. — *tuberculator*, CHEVROLAT, 1851, 663. — *variegata*, 1851, 661.

**LAMIAIRES**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 5.

**Lampetis**, SPINOLA, Lettre sur un genre de Buprestides, 1837, 113. — *albicincta*, REICHE, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 96. — *bioculata*, *chalybeata*, *composita*, *fastuosa*, *galamensis*, SPINOLA, 1837, 114. — *Schimperi*, REICHE, 1852, 96. — *valens*, SPINOLA, 1837, 114.

**Lampra**, SPINOLA, Lettre sur un groupe de Buprestides, 1837, 108. — *conspersa*, 1837, 109. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 103. — *festiva*, SPINOLA, 1837, 109. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 726. — *Guiraoi*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Col. de la faune méditerranéenne, 1855, 315. — *rutilans*, SPINOLA, 1837, 109. — *id.*, GHILIANI, 1847, 90. — *id.*, LABOULBÈNE, Vit à l'état de larve sur l'Orme à grandes feuilles, 1860, CIX.

**Lamprima ænea**, REICHE, C'est la *viridis* d'Erichs., 1853, 83. — *cultridens*, N'est qu'une var. de *micardi*, 1853, 83. — *Latreillei*, Ne fait qu'une espèce avec *rutilans*, *splendens* et *fulgida*, 1853, 83.

**Lamprocera grandis**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1833, 129 et 130.

**Lampyrus**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1833, 122 et 139. — *id.*, Liste alphabétique des esp. des

*auteurs*, 1833, 151. — *antiqua*, Révision du genre *Lampyris*, 1833, 139. — *Bellieri*, REICHE, Descr. d'une nouv. esp. du genre *Lampyris*, 1858, 155. — *libani*, DE LAPORTE, 1833, 139. — *Mulsantii*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 587. — *sepalensis*, *noctiluca*, DE LAPORTE, 1833, 139. — *noctiluca*, KIESENWETTER, 1851, 587. — *id.*, DAUMONT, Nymphe présentant deux points lumineux, 1851, CII. — *phosphorea*, REICHE, Revue du docteur Roth, 1852, 96. — *Sencki*, F. DE VILLARET, Descr. d'une nouv. esp. du genre *Lampyris*, 1833, 352. — *splendidula*, *Zenkeri*, DE LAPORTE, 1833, 139.

**Langelandia**, AUBÉ, Note sur qqes Col. nouv., 1842, 227. — *enopthalma*, 1842, 228. — *id.*, CORDIER, Elle vient d'être retrouvée dans un chantier, 1845, XLIII, et dans un Bolet, 1846, L. — *id.*, DESMAREST, trouvée en grande quantité au Jardin des Plantes et à Bondy, 1845, XLIV et CXII, et 1846, XLIX. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvée dans une fourmilière, forêt d'Orléans, 1846, XLIX. — *id.*, DELAROCZÉS, Communic. d'une larve qui paraît se rapporter à cette espèce, 1855, XXXVII.

**Languria lineata**, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 412.

**Laphyra Audouini**, REICHE, Col. algériens, 1848, XCII.

**Laricobius Erichsonii**, JAVET, Col. fort rare trouvé dans le Tyrol, 1847, CVI.

**Larinus**, C. DUMÉRIL, Substance médicinale produite par la coque d'un *Larinus*, 1858, CXLVII. — *id.*, GODART, Note sur la matière pulvérulente du *Larinus* mâle, 1851, XIII. — *buccinator*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé vivant, fin d'octobre, en Algérie, 1859, CXCH. — *carlinæ*, LABOULBÈNE, Hist. de ses métam., 1858, 279. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *id.*, GOUREAU, Larves trouvées dans la *Carlina vulgaris*, 1857, XXVI. — *confinis*, *ferrugatus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 733. — *flavescens*, 1852, 732. — *maculosus*, 1852, 731. — *maurus*, 1852, 732. — *onopordinis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé en Algérie en septembre, 1859, CXCII. — *sturnus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 732. — *ursus*, 1852, 733.

**Lasiostola**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 27. — *hirta*, 1836, 31. — *pubescens*, 1836, 29.

**LATHRIDIIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 102.

***Lathridius cordaticollis***, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 232. — *elegans*, FLUM, 1850, 334. — *Genoi*, 1850, 333. — *gibbosus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *liliputanus*, GHILLIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *minutus*, PERRIS, Hist. de ses métam., 1852, 581. — *sculptilis*, FAIRMAIRE, 1852, 683.

***Lathrobium concinnum***, GOUGELET et H. BRIBOUT DE BARNEVILLE, Descr. de Col. nouv. de Galice et d'Algérie, 1859, CCXXXVIII. — *elongatum*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 429. — *elongatum*, *fulvipenne*, KRIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1854, 422. — *longulum*, 1854, 428. — *melanacephalum*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 366. — *multipunctatum*, KRIESENWETTER, 1854, 422. — *quadratum*, 1854, 423. — *striatopunctatum*, 1854, 422. — *Tarnieri*, BOUQUET, Descr. d'une nouv. esp. de *Lathrobium*, 1854, 83.

***Latipalpis***, SOLIER, Buprestides, 1833, 287. — *id.*, SPINOLA, Lettre sur un groupe de Buprestides, 1837, 107. — *acuminata*, *ænea*, *alni*, SOLIER, 1833, 288. — *aurolimbata*, 1833, 289. — *berolinensis*, 1833, 288. — *biocutata*, *conspersa*, 1833, 289. — *corrota*, 1833, 288. — *cuprea*, *festiva*, *galamensis*, *lugubris*, 1833, 289. — *pisana*, 1833, 290. — *id.*, SPINOLA, 1837, 108. — *præstans*, *rutilans*, SOLIER, 1833, 289.

***Lebia acutipennis***, LEPRIEUR, Descr. de 11 esp. nouv. du genre *Lebia*, 1834, 674. — *ænea*, 1834, 673. — *africana*, SOLIER, Descr. de qqes nouv. esp. de la famille des Carabiques, 1835, 114. — *arcuata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 577. — *binotata*, LEPRIEUR, 1834, 679. — *capensis*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes Carabiques nouv., 1835, 439. — *chlorocephala*, LUCAS, prise sous les pierres au Muséum d'Hist. naturelle, 1846, LI. — *chloroptera*, DE CHAUDOIR, 1835, 437. — *cæca*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 192. — *cærulea*, LEPRIEUR, 1834, 681. — *cynocephala*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 394. — *cyathigera*, GHILLIANI, Col. du Piémont, 1847, 101. — *elegans*, GORY, 1833, 191. — *ephippium*, REICHE, Note sur ses habitudes cosmopolites, 1858, CLXXXI. — *fulvicollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 754. — *id.*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 286. — *Gerardii*, BUQUET, Descr. de plusieurs Col. nouv., 1840, 283. — *jantiniipennis*, 1834, 676. — *lepida*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 576. — *nigripes*, GHILLIANI, 1847, 87. — *nigromaculata*, GORY, 1833, 192. — *nitidula*, LEPRIEUR, 1834, 677. — *pubescens*, 1834,

675. — *pallipes*, GORY, 1833, 193. — *4-signata*, LEPRIEUR, 1834, 676. — *rufipes*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 719. — *rufula*, LEPRIEUR, 1834, 680. — *6-maculata*, 1834, 679. — *striaticollis*, DE CHAUDOIR, 1835, 438. — *triangularis*, LEPRIEUR, 1834, 678. — *triangulifera*, Descr. de qqes Col. nouv. de la famille des Carabiques, 1835, 615. — *unifasciata* (voir *Coptodera*), REICHE, envoyée par M. Mocquerys, 1855, LXXV. — *Viard*, GORY, 1833, 120.

**Leichenium** *pictum*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 95. — *pulchellum*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729.

**Lelestes** *seminiger*, CHEVROLAT, trouvé le 1<sup>er</sup> mai dans la forêt de Fontainebleau, 1847, XL.

**Lelenota**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 196. — *cacti*, 1853, 220. — *caffa*, 1853, 219. — *cerdo*, 1853, 206. — *confusa*, 1853, 205. — *devia*, 1853, 211. — *grandis*, 1853, 204. — *interrupta*, 1853, 214. — *lata*, 1853, 215. — *mexicana*, 1853, 209. — *minuta*, 1853, 217. — *polita*, 1853, 208. — *punctulata*, 1853, 216. — *4-dentata*, 1853, 212. — *Reichii*, 1853, 210. — *rimosa*, 1853, 218. — *strigicollis*, 1853, 207. — *vicina*, 1853, 220. — *yucateca*, 1853, 203.

**Lelepus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 86. — *asperipennis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 513. — *femoratus*, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1859, 62. — *melancholicus*, AUD.-SERVILLE, 1835, 87. — *nebulosus*, 1835, 86. — *pogonocheroides*, 1835, 88. — *soricinus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1859, 512. — *varipennis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 87.

**Leistus** *abdominalis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 564. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 355. — *asfer*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 746. — *analis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 115. — *crenatus*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Col. de la faune méditerranéenne, 1855, 307. — *montanus*, JAVET, Commun. d'un indiv. du nord de l'Angleterre, 1856, XII. — *spini-barbis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *terminatus*, DOUÉ, Deux indiv. trouvés dans la forêt de Bondy, 1854, XXXIII.

**Lema** *cyanella*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 651. — *dodecastigma*, *12-punctata*, GODART, Rem. sur les diff. spécif. des organes mâles de la génération, 1851, 667. — *flavipes*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 111. — *Hoffmanseggii*,

AUBÉ, trouvée dans le midi de la France, 1860, L. — *melanopa*, KIESENWETTER, 1851, 651. — *paracenthesis*, *rugicollis*, GHILIANI, 1847, 111.

**Leptacinus ampliventris**, JACQ. DU VAL, Phrases diagnostiques, 1854, xxxvii. — *basalis*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 314. — *nothus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722.

**Leptinus testaceus**, WAGA, Note sur une esp. trouvée sur le corps d'une Musareigne vivante, 1857, cxxv. — *id.*, REICHE, trouvé aux env. de Metz par M. de Saulcy, 1859, cxxxix et ccxii. — *id.*, LINDER, Caverne de Bétharam, 1858, clxx.

**Leptocera scripta**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 109.

**LEPTODÉRIDES**, SOLIER, Essai d'une division des Col. Hétéromères, 1834, 495.

**Leptoderus angustatus**, FAIRMAIRE, Communic. de trois Col. européens très-rares, 1857, xxiv. — *Hohenwarti*, Communic. de deux Col. envoyés par M. Dohrn, 1853, xxxv. — *id.*, Communic. de trois Col. européens très-rares, 1857, xxiv. — *Quercilhacii*, REICHE, La forme de ses antennes le place dans le genre *Drimeotus* Müller, 1858, cxci. — *id.*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 31.

**Leptodes**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 191. — *Boisduvalii*, 1838, 193.

**Leptomastax (Pylades)**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 526. — *Coquereli*, *hypogaeum*, 1856, 528.

**Leptomorpha**, FAIRMAIRE, doit être remplacé par *Leptispa*, 1860, xlvi. — *ænea*, *Mulsanti*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 297. — *sulcata*, 1860, 291. — *viridipennis*, 1860, 298.

**Leptonychus**, SOLIER, Collaptérides, 1834, 509. — *erodioides*, 1834, 511. — *Maillei*, 1834, 512. — *rufipennis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. de qqes esp. nouv. d'Algérie, 1859, clxxxvii.

**Leptopodia sagittaria**, LUCAS, Note sur son habitat, 1860, 326.

**Leptosophus**, BRULLÉ, Genre publié par M. Audouin sous le nom de *Psilocera*, 1835, xi.

**Leptotrachelus suturalis**, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 389.

**Leptura**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 217. — *aurulenta*, 1835,

219. — *bipunctata*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 289. — *chlorotica*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. européens, 1859, CCXVI. — *cincta*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 133. — *coriacea*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 473. — *distigma*, GHILIANI, 1847, 98. — *id.*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1855, LXXXVII. — *dubia*, 12-*maculata*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 664. — *hastata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 218. — *melanura*, 1835, 219. — *militaris*, CHEVROLAT, Descr. de cette esp., 1858, 529. — *oblongomaculata*, BUQUET, Descr. de plusieurs Col. nouv., 1840, 396. — *id.*, REICHE, Communic. de plusieurs indiv. des deux sexes, 1860, XI. — 4-*fasciata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 220. — *rubra*, CHEVROLAT, Se trouve à la fois en Espagne et en Bretagne, 1843, XLIV. — *rubro-testacea*, GHILIANI, 1847, 133. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 475. — *rufa*, GHILIANI, 1847, 108. — *rufipes*, 1847, 141. — *sanguinolenta*, 1847, 133. — *id.*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1855, LXXXVII. — *scutellata*, GHILIANI, 1847, 133. — *Silbermann*, AUD.-SERVILLE, 1835, 219. — *strangulata*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 548. — *tresignata*, var. de *rufa*, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 92. — *unipunctata*, GHILIANI, 1847, 111. — *villica*, AUD.-SERVILLE, 1835, 219. — *virens*, 1835, 218. — *id.*, GHILIANI, 1847, 139.

**LEPTURÉTES**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 197.

**Leptynoderes**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 44. — *varicosus*, 1838, 47.

**Lesteva** *bicolor*, *fontinalis*, *pubescens*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 434.

**Lethrus**, FAIRMAIRE, Nouv. esp. trouvée par M. Vesco dans la baie de Besika, 1855, XXXI. — *brachiicollis*, Descr. d'esp. nouv. de Col. de la faune méditerranéenne, 1855, 314. — *id.*, Miscell. entom., 1856, 522.

**Leucocelis** *eustalacta*, COQUEREL, Obs. sur diverses esp. de Madagascar, 1848, 280. — *hæmorrhoidalis*, *rubra*, SCHAUUM, Lamell. mélit., 1844, 378.

**Leucolæphus**, LUCAS, Note sur plusieurs Mélanosomes, 1859, XXII. — *liliputanus*, 1859, XXIV. — *nigropunctatus*, 1849, XXIII. — *id.*, GUÉPIN-MÉNEVILLE, trouvé en l'oasis d'Ouargla, 1859, CXCI. — *Perrisi*, LUCAS, 1859, XXIII.

**Leucopholis** *irrorata*, REICHE, Note sur les citations synonymiques, 1858, 311. — *pollinosa*, 1858, 312.

**LICINIDES**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 274.

**Licinus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 280. — *ægyptiacus*, 1851, 282 et 283. — *agricola*, 1851, 281 et 282. — *angustus*, 1851, 284. — *brevicollis*, 1851, 281 et 283. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 759. — *depressus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *id.*, DOÛÉ, trouvé au bois de Boulogne, 1852, XXV. — *granulatus*, DE LA FERTÉ, 1851, 281, 282. — *Hoffmannseggii*, 1851, 284. — *hyerichonticus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 594. — *id.*, REICHE, retrouvé en Palestine, 1856, XLVII. — *oblongus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 122. — *id.*, DE LA FERTÉ, 1851, 284. — *siculus*, 1851, 283 et 285. — *silphoides*, 1851, 281 et 282. — *id.*, PEYRON, Col. des environs de Tarsous, 1858, 358.

**Lignyodes rudesquamosus**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1857, 740. — *suturatus*, Diagnoses de qqes esp. nouv. de Col. européens et algériens, 1859, CCXXXVII.

**Limnebius æneus**, *affinis*, *bipunctatus*, *globulus*, SOLIER, Hydrophiliens, 1834, 316. — *papposus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786. — *truncatellus*, SOLIER, 1834, 316.

**Limnicus incanus**, *sericeus*, *versicolor*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 584.

**Limnius troglodytes**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 585. — *tuberculatus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 725.

**Limobius globicollis**, REICHE et DE SAUCY, Col. d'Orient, 1857, 680.

**Limonius bipustulatus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90. — *Bructeri*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *Bructeri, lythrodes*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 586.

**Lina collaris**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 134. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 687. — *lapponica*, GHILIANI, 1847, 129. — *populi*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 655. — *20-punctata*, GHILIANI, 1847, 115.

**Linozosta**, ALLARD, Altises d'Europe, 1860, 72. — *cicatrix*, 1860, 73. — *mercurialis*, 1860, 72. — *ruficollis*, 1860, 74.

**Lioderma (Lionota)**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 196; 1857, 469 et

1860, 606. — *cacti*, 1857, 400 et 1860, 606. — *caffa*, 1860, 606. — *cardo*, 1853, 206. — *clauda*, 1860, 609. — *confusa*, 1853, 205. — *devia*, 1853, 211. — *grandis*, 1853, 204 et 1860, 606. — *interrupta*, 1853, 214. — *lata*, 1853, 215. — *mexicana*, 1853, 209. — *minuta*, 1853, 217. — *polita*, 1853, 208. — *punctulata*, 1853, 216. — *4-dentata*, 1853, 212 et 1860, 608. — *Reichii*, 1853, 210. — *rimosa*, 1853, 218. — *strigicollis*, 1853, 207. — *yucateca*, 1853, 203 et 1860, 606.

**Liodes humeralis**, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII.

**Liopterus cyanescens**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 57. — *gibbus*, nubilis, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 132.

**Liopterus oblongus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119.

**Liparus glabratus**, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288.

**Lissauchenius biguttatus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 237.

**Lisogenius**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 420. — *planicollis*, 1844, 421.

**Lisomus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 135. — *lævigatus*, 1834, 136. — *mastrucatus*, BONVOULOIR, Descr. de plusieurs esp. de la fam. des Throscides, 1860, 363. — *morio*, LATREILLE, 1834, 136. — *ustulatus*, BONVOULOIR, 1860, 362.

**Lissonotus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 56. — *biguttatus*, 1834, 57. — *brasiliensis*, BUQUET, Descr. de qqes Longicornes nouv., 1860, 622. — *flabellicornis*, AUD.-SERVILLE, 1834, 57. — *4-signatus*, BUQUET, 1860, 621. — *spadiceus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 57.

**Listroptera tenebrosa**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 71.

**Lithius**, COQUEREL, Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 246. — *humeralis*, ludiosus, 1859, 248. — *nigrocristatus*, 1859, 250. — *niveus*, 1859, 249. — *planus*, 1859, 251. — *superciliosus*, 1859, 247.

**Lithecharis angularis**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes esp. de Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI. — *brevicornis*, ALLARD, Descr. d'une nouv. esp., 1857, 747. — *brunnea*, FAIRMAIRE,



Env. de Paris, 1846, LV. — *despecta*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 160. — *diluta*, *fuscata*, *melanocephala*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 429. — *nigritula*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 723. — *obsoleta*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1854, 423. — *picca*, KRAATZ, Descr. de qqes nouv. esp. de Col., 1858, CXCI. — *pocofera*, PEYRON, Descr. de qqes Col. nouv., 1857, 718. — *rufiventris*, KIESENWETTER, 1854, 423. — *seminigra*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 161. — *sericella*, 1860, 159. — *vicina*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de qqes esp. de Col. français, 1859, CCXXXIII.

**Lithonoma**, ALLARD, Altises d'Europe, 1860, 44. — *andalusica*, 1860, 45. — *marginella*, 1860, 44.

**Litopus violaceus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 563.

**Lixus**, LABOULBÈNE et FOLLIN, Note sur la matière pulvérulente des *Lixus*, 1848, 301. — *id.*, GODART, Note sur la même matière, 1851, XIII. — *id.*, SICHEL, Analyse d'une lettre de M. Passerini sur les habitudes d'une esp. de ce genre, 1855, XCVII. — *acutus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *anguinus*, LUCAS, Recueilli dans le Djebel-Amour, 1847, CIX. — *angustatus*, PERRIS, Notes pour servir à son hist., 1848, 147. — *id.*, GODART, Cas de monstruosité, 1851, LXXXII. — *Ascanii*, JACQ. DU VAL, Erreurs de M. Costa, 1857, 95. — *cylindricus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Commun. de plusieurs individus trouvés sur des Ombellifères, 1855, LXVII. — *id.*, Détails de mœurs, 1856, LXX. — *gemellatus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 547. — *inops*, LUCAS, 1847, CIX. — *id.*, FAIRMAIRE, 1856, 547. — *id.*, JACQ. DU VAL, C'est le *L. furcatus* de Costa, 1857, 94. — *ophthalmicus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé près de Toulon, 1846, CIV. — *turbatus*, Réclamation relative à la publication de l'histoire de ses métam., 1847, XII. — *venustulus*, L. DUFOUR, Hist. des métam. de divers Col., 1854, 656. — *vittatus*, ROJAS, Obs. sur qqes Col. de Vénézuéla, 1857, 330.

**Loboderus monolicornis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 148.

**Lobopoda**, SOLIER, Fam. des Xystropides, 1835, 233. — *brunnea*, *contracta*, 1835, 234. — *dircaoides*, 1835, 236. — *striata*, 1835, 235.

**Loborhynchus Carmagnolæ**, CHEVROLAT, N'est autre que l'*Otiorhynchus angustior* de Rosenhauer, 1859, v.

**Lemaptera ebena**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 367. — *fasciata*, 1849, 260. — *rugata*, 1849, 263. — *valida*, 1844, 367 et 1849, 260. — *virens*, 1849, 263.

**Lomechusa australis**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 259. — *bifoveolata*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de qqes Col. nouv. de la faune française, 1860, 345. — *paradoxa*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *id.*, LESPES, Note sur les mœurs de cette esp., 1855, LI. — *pubicollis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860, 346.

**Lonchesternus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 267. — *hispanicus*, *annistriatus*, *sublævis*, 1851, 268.

**Lonchotus crassus**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 13.

**Loncophorus**, CHEVROLAT, Monog. de deux genres nouv. dans la fam. des Curculionites, 1832, 215. — *humeralis*, Errata et addenda, 1832, 442. — *obliquus*, 1834, 218. — *parasita*, 1832, 218 et 442.

**LONGICORNES**, AUD.-SERVILLE, 1832, 118; 1833, 528; 1834, 5, et 1835, 5 et 197. — Table des genres et des esp., 1835, 224. — *id.*, D'après les expériences de M. Solier, tous les Longicornes ont cinq articles à tous les tarses., 1833, LXVIII. — *id.*, SOLIER, Lettre sur les tarses des Longicornes, 1833, LXVIII, et 1834, 400. — *id.*, REICHE, Note sur cette famille, 1839, 563. — *id.*, DEJEAN, Obs. sur la monogr. de M. Mulsant, 1840, 69. — *id.*, DE BRÈME, Cartouches entamées par des larves, 1844, XX. — *id.*, GOUREAU, Org. céphal. des larves, 1844, 433. — *id.*, BLANCHARD, propose de les rapprocher des Buprestides, 1845, CXVI. — *id.*, BUQUET, espèces nouv. du Brésil, 1855, XVIII. — *id.*, DELAROUZÉE, Habitat de qqes larves, 1858, CXLVI.

**Lophoma**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 285. — *impunctata*, FAIRMAIRE, Diagnoses de nouv. esp. de Col., 1860, 632. — *punctata*, SOLIER, 1835, 287. — *id.*, FAIRMAIRE, Col. de Tanger, 1851, XXI. — *id.*, REICHE, trouvée dans le midi de l'Espagne, 1854, XXX.

**Lophocerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 33. — *barbicornis*, *hirticornis*, 1834, 34.

**Loricera**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 226 et 290. — *id.*, JACQ. DE VAL, Ce genre doit former un groupe particulier de Carabiques avec le genre *Apotomus*, 1854, LXVI. — *pilicornis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 133. — *Wollastonii*, JAVET, Descr. de cette esp. découverte à Madère par M. Wollaston, 1852, XXIII.

**Loxocrepis amabilis**, DE CHAUDOIR, Monogr. du genre *Colpodes*, 1859, 359.

**Loxoprosopus ceramboides**, FAIRMAIRE, l'Ins. de MM. Dohrn et Lucas. — a été décrit sous ce nom par M. Guérin-Méneville, 1855, LIII.

**Lucanus**, REICHE, Indication des collections où se trouvent les types de quelques *Lucanus*, 1853, 426. — *atratus*, Ne peut être la ♀ de *vicinus*, 1853, 85. — *barbarossa*, Cette esp. est différente du *tetraodon*, 1853, 69 et 85. — *bellicosus*, les *L. Siva*, *Wishnu* et *Cumingii*, n'en sont que des var., 1853, 73 et 86. — *capreolus*, AUDOUIN, Calculs trouvés dans les canaux biliaires, 1835, LXXXI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur ses cocons, 1846, XXVIII. — *carinatus*, REICHE, Confondu à tort par M. Burmeister avec le *bellicosus*, 1853, 72. — *cervus*, DE VILLIERS, Cocons trouvés au pied d'un arbre très-vieux, 1842, XI. — *id.*, DESMAREST, Indiv. avec un seul œil, 1845, LIII et LVIII. — *id.*, MONTET, Indiv. trouvé vivant dans un nid construit en terre, 1833, LXIV. — *id.*, AUDOUIN, Communic. de l'ouvrage de Rœssel qui traite du même sujet, 1833, LXXI. — *id.*, REICHE, Quelques différences avec le *capreolus*, 1853, 70. — *id.*, H. DEYROLLE, Communic. d'une série de cette esp., 1860, XXII. — *dorcus*, major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Infér.), 1853, IV. — *giraffa*, REICHE, doit être un *Cladognathus* ou *Macrogathus*, 1853, 75. — *glabratus*, REICHE, n'est pas une var. de l'*alces*, et doit s'appeler *laticollis*, 1853, 73. — *hircus*, Synonyme de *capra* et non de *cervus*, 1853, 85. — *lama*, paraît être la ♀ du *L. alces*, 1853, 71. — *id.*, le *lama* Dej. est l'*Anoplocnemus Dejeanii*, 1853, 72. — *lifuanus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 281. — *lunifer*, REICHE, Cette esp. doit être maintenue et on doit lui réunir le *L. villosus*, 1853, 72. — *id.*, diffère de *Cantori* et de *Mearsii*, 1853, 85. — *parallelipipidus*, CHEVROLAT, vu dévorant un *Helops caraboides*, 1834, XI. — *id.*, Obs. diverses à cette occasion, 1834, XI. — *id.*, BRULLÉ, Indiv. à élytres, poitrine et corselet ferrugineux, 1837, LXXVII. — *pentaphyllus*, REICHE, Question à M. Delarouzée, 1859, XLII. — *id.*, DELAROUZÉE, Réponse à M. Reiche, 1859, XLII. — *Parryi*, REICHE, est une var. de *nepalensis*, 1853, 427. — *rhinoceros*, REICHE, bien distinct du *Buquetii*, 1853, 86. — *serraticornis*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Corse, 1859, 275. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Obs. relatives à diverses Col. propres à la faune de la Corse, 1860, LIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Remarques sur quelques Col. de l'île de Corse, 1860, LXXXII. — *tetraodon*, REICHE, Les *serraticornis* et *iber-*

*ricus* lui sont identiques, 1853, 70. — *vitulus*, REICHE, Notes entomologiques, 1853, 427.

**Laecernuta**, DE LAPORTE, Genre *Lampyris*, 1833, 143. — *bicotor*, 1833, 143. — *discoidalis*, 1833, 144. — *fenestrata*, 1833, 143. — *laticornis*, 1833, 144. — *Savignyi*, *thoracica*, 1833, 143.

**Laelo**, DE LAPORTE, Genre *Lampyris*, 1833, 135. — *abdominalis*, 1833, 136.

**Luciola**, DE LAPORTE, Genre *Lampyris*, 1833, 146. — *apicalis*, 1833, 149. — *australis*, 1833, 150. — *capensis*, 1833, 148. — *chinensis*, 1833, 149. — *discicollis*, 1833, 147. — *dispar*, FAIRMAIRE, *Miscellanea entomologica*, 1857, 739. — *Goudotii*, DE LAPORTE, 1833, 150. — *græca*, 1833, 147. — *illyrica*, 1833, 149. — *italica*, 1833, 146. — *japonica*, 1833, 150. — *Lucifer*, REICHE et DE SAULCY, *Col. d'Orient*, 1857, 170. — *lusitanica*, DE LAPORTE, 1833, 149. — *maculicollis*, 1833, 148. — *madagascariensis*, 1833, 150. — *melanura*, *pedemontana*, *præusta*, 1833, 149. — *puncticollis*, 1833, 148. — *vittata*, 1833, 150.

**Lucidota**, DE LAPORTE, Genre *Lampyris*, 1833, 136. — *antennata*, 1833, 138. — *appendiculata*, *Banoni*, *compressicornis*, *flabellicornis*, *limbata*, 1833, 137. — *modesta*, 1833, 138. — *thoracica*, 1833, 137.

**Ledius æneus**, *apicalis*, GHILIANI, *Col. du Piémont*, 1847, 123. — *aulicus*, 1847, 131. — *castaneus*, 1847, 119. — *crocatus*, LABOULBÈNE, *Obs.* qui indiqueraient que cette esp. est carnassière, 1848, xxxvii. — *cruciatus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *ferrugineus*, LATREILLE, *Serricornes*, 1834, 154. — *latus*, GHILIANI, 1847, 100. — *leucopoda*, MONTROUZIER, *Faune de la Nouvelle-Calédonie*, 1860, 256. — *pectinicornis*, GHILIANI, 1847, 123. — *rugosus*, 1847, 137. — *signatus*, 1847, 131.

**Laperus flavipes**, *rufipes*, FAIRMAIRE, *Baie de la Somme*, 1852, 686.

**Lycomedes**, DE BRÈME, *Col. nouv. ou peu connus*, 1844, 298. — *Reichei*, 1844, 299.

**Lycoperdina hovistæ**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *id.*, L. DUFOUR, *Hist. des métam. de divers Col.*, 1854, 647. — *fasciata*, CHEVROLAT, 1833, 472.

**Lyctus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans les racines et les farines d'ignames, 1857, cxiv. — *contractus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473.

- Lycus Cosnardi**, CHEVROLAT, trouvé dans la forêt de Fontainebleau, 1833, 468 et 1847, XL. — *sanguineus*, PERRIS, Note pour servir à son histoire, 1846, 343.
- Lygistopterus sanguineus**, PERRIS, Note pour servir à son hist., 1846, 343. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 104.
- Lymexilon navale**, LEPRIEUR, trouvé dans les marais salants des env. de Dieuze, 1845, xcv. — *id.*, WESTWOOD, sa larve dévorée par celle d'un *Artractocerus*, 1850, LIX.
- Lyprus cylindrus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124.
- Lystronychus equestris**, SOLIER, Xystropides, 1835, 240.
- Lytta vesicatoria**, BOYER DE FONSCOLOMBE, 2<sup>e</sup> mém. sur les Ins. qui attaquent l'Olivier, 1840, 109. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Dégâts causés dans les plantations d'Asperges, 1849, xciii. — *id.*, Lecture d'un mém. sur les Ins. qui vivent sur le Tabac, 1849, xciii.

## M.

- Machia**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 476. — *Duponti*, 1836, 482. — *rauca*, 1836, 478, — *serrata*, 1836, 480. — *villosa*, 1836, 483.
- Macraspis nigra**, FAIRMAIRE, Larves et nymphes recueillies à la Gadeloupe, 1856, LXXXV. — *pretiosa*, DE BRÊME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 303.
- Macrocrates bucephalus**, REICHE, Notes synonymiques, 1853, 78.
- Macrocheilus**, REICHE, Helluonides, 1842, 333. — *Saulcyi*, REICHE, Col. d'Orient, 1855, 579. — *tripustulatus*, 1842, 334.
- Macroderes Greenii**, REICHE, est le même que le *Coprobus fornicatus*, Dej., Cat. 1853, 425.
- Macrodonia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 139. — *cervicornis*, 1832, 140. — *id.*, GORY, Note monogr. sur le genre *Macrodonia*, 1839, 126. — *crenata*, 1839, 128. — *Dejeanii*, 1839, 127. — *flavipennis*, CHEVROLAT, Descr. d'un nouv. Prionien, 1833, 65. — *id.*, GORY, 1839, 128. — *4-spinosa*, AUD.-SERVILLE, 1832, 140.

- Macrogathus nepalensis**, REICHE, Notes synonymiques, 1853, 81.
- Macroma bilineata**, BUQUET, Nouv. esp. de Lamellicornes, 1836, 207.  
— *scutellaris*, *scutellata*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 394.
- Macronota apicalis**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 369. — *aurogut-tata*, *dives*, 1849, 262. — *elongata*, 1844, 369. — *Luxerii*, BUQUET, Nouv. esp. de Lamellicornes, 1836, 204. — *penicillata*, SCHAUM, 1844, 367. — *picta*, 1844, 369. — *4-vittata*, 1849, 263. — *regia*, 1844, 369. — *stictica*, 1849, 263. — *tetraspila*, 1844, 370. — *tristis*, 849, 262.
- Macronychus**, AUDOUIN, Communic. d'un mémoire de Contarini sur ce genre, 1833, XLV. — *4-tuberculatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124.
- Macropalpus**, CUSSAC, Descr. d'un nouv. genre de Brachélytres, 1852, 613. — *id.*, KRAATZ, se rapporte au genre *Coryphium*, 1857, LIII. — *pallipes*, CUSSAC, 1852, 613. — *id.*, PIRRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 573. — *id.*, SCHAUM, Cet Ins. est le *Coryphium angusticolle*, Kirby, 1853, XXXV. — *id.*, AUBÉ, Qques obs. relatives à la note de M. Schaum, 1853, XXXVI. — *id.*, SCHAUM, Réponse aux obs. de M. Aubé, 1853, XXXVII. — *id.*, LACORDAIRE, Note relative à cet Ins., 1854, XVIII.
- Macropoda**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 515. — *id.*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 877. — *Boyeri* SOLIER, 1835, 519. — *convera*, MONTROUZIER, 1860, 878. — *rivularis*, SOLIER, 1835, 520. — *setacca*, MONTROUZIER, 1860, 878. — *variolaris*, SOLIER, 1835, 517.
- MACROPODITES**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 509.
- Macropus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 18. — *accentifer*, *trochlearis*, 1835, 19.
- Macrosternus**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 239 et 1860, 850. — *foliaceus*, 1853, 245. — *Lafertei*, 1853, 243 et 1860, 850. — *Montrouzieri*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 264. — *ocae*, DE MARSEUL, 1853, 245. — *striatellus*, 1853, 246. — *taciturnus*, 1853, 244.
- Macrotona**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 137 et 443. — *castanea*, 1832, 138. — *corticinum*, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. recueillis à Madagascar, 1856, 508. — *dimidiaticornis*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 658. — *tuzonum*, *palmata*, *scripae*, AUD.-SERVILLE, 1831, 138.

**Magdalinus carbonarius**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 258. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXII. — *duplicatus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *rufus*, JEKEL, Sur les Pins de Vincennes, 1856, XLVI.

**Malachius**, DEJEAN, Note sur les différences sexuelles des esp. d'Europe, 1840, 205. — *aneus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 617. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *id.*, PERRIS, Hist. de ses métam., 1852, 591. — *bipustatus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Obtenu par M. Vallot des tiges d'*Echium*, 1847, XXIII. — *id.*, LABOULBÈNE, Note sur les caroncules thoraciques de cette esp., 1858, 522. — *elegans*, KIESENWETTER, 1851, 617. — *id.*, GOUREAU, Accouplement de qqes Ins., 1839, 550. — *fasciatus*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *humeralis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 180. — *inornatus*, KIESENWETTER, 1851, 618. — *limbifer*, 1851, 617. — *maculiventris*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 179. — *marginellus*, KIESENWETTER, 1851, 617. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *miniatus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 178. — *præustus*, CHEVOLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *pulicarius*, PERRIS, parasite des *Apate 6-dentata* et *sinuata*, 1830, 566. — *pulicarius*, *rubricollis*, KIESENWETTER, 1851, 618. — *spinosus*, *viridis*, 1851, 617.

**Malacopterus pavidus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 565.

**Malacosoma lusitanica**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 99.

**Mallaspis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 188. — *leucaspis*, 1832, 189. — *Moreletii*, LUCAS, Présentation et descr. d'un Longicorne de la famille des Prioniens, 1851, LXV. — *scutellaris*, AUD.-SERVILLE, 1832, 189.

**Mallocera glauca**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 567.

**Malloderes microcephalus**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 483.

**Mallodon**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 176. — *Fairmairei*, MONTROUZIER, Élytres renflées et pleines d'une eau limpide, 1859, CXLV. — *timæ*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 485. — *maxillosus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 177.

**Mallonia albosignata**, CHEVOLAT, Descr. de nouv. esp. de Col., 1858, 320.

- Malleotus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 68. — *bicolor*, SALLÉ, Descr. de dix nouv. esp. de la répub. dominicaine, 1856, 687. — *elegans*, AUD.-SERVILLE, 1834, 69.
- Malthinus biguttatus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 613. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *chelifer*, 1851, 614. — *flicornis*, 1851, 611. — *forcipifer*, 1851, 614. — *hamatus*, 1851, 615. — *marginatus*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *modestus*, KIESENWETTER, 1851, 616. — *4-spinus*, 1851, 618. — *sanguinolentus*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *scriptus*, KIESENWETTER, 1851, 611. — *seriepunctatus*, 1851, 610.
- Malthodes berytensis**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 477.
- Manticora**, THOMSON, Palpe labial ayant cinq art. au lieu de quatre, discussion à ce sujet, 1856, XCIV.
- Margarinetus**, DE MARSEUL, Histiérides, 1853, 549. — *scaber*, 1853, 552. — *id.*, LUCAS, Communiqué de deux Ins. trouvés dans la province d'Oran, 1857, LXXXIX.
- Margus ferrugineus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans la racine de Squine, 1845, XVI. — *id.*, doit prendre le nom de *Tribolium castaneum*, 1845, CXVII. — *id.*, DOUË, une vingtaine trouvée dans le corps desséché d'un *Phileurus*, 1857, CXXV. — *id.*, plusieurs trouvés vivants dans une boîte d'Ins. venant de Californie, 1859, CLIV.
- Masoreus luxatus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé à Saint-Germain-en-Laye, 1851, LXXXVII. — *id.*, Baie de la Somme, 1852, 678. — *ruficornis* PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 394.
- Mastigus liguricus**, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. européens, 1859, CCXVI. — *palpalis*, GHILIANI, trouvé dans les Alpes maritimes, 1848, XLIII. — *id.*, REICHE, L'auteur la croit une esp. nouv., 1848, XLIII.
- Mastogenius parallelus**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 742.
- Mecinus dorsalis**, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 343. — *id.*, JEKEL, plaine de Saint-Maur, 1856, XLVI. — *filiformis*, AUBÉ, 1850, 344. — *janthinus*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *longiusculus*, JEKEL, trouvé à Meung-sur-Loire, 1856, XLVI.



**Mecocerus** s.-g., SOLIER, Xystropides, 1835, 241. — *Dejeanii*, 1835, 242.

**Mecognatus** *cribellatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 162.

**Mecosarthron** *tuberculatus*, BUQUET, Notice monog. sur le genre *Ctenoscelis*, 1843, 239.

**Mecynorhina** *Savagei*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 253.

**Mecynotarsus** LEPRIEUR, Col. nouv. observés en Algérie, 1859, ccxi. — *rhinoceros*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 625.

**Megabasis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 53. — *speculifer*, 1835, 54.

**Megacephala** *Adonis*, LEFEBVRE, Obs. sur son identité avec la *M. Laportei*, Chevr., 1834, xxv. — *affinis*, GHILIANI, Note sur ses mœurs, 1847, xxxviii. — *algeriana*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur l'indiv. trouvé en Algérie, par M. le major Blanchard, 1846, xxxviii et cii. — *carolina*, DE CASTELNAU, Obs. entomologiques, 1842, xiii. — *euphratica*, GRAELLS, Plusieurs individus trouvés en Espagne, 1847, cvi et cviii. — *id.*, DESMAREST, Observ. sur cette esp., 1849, l. — *id.*, LUCAS, Communic. de plusieurs exemplaires trouvés entre Totana et Murcie, 1853, iv. — *id.*, A. DEYROLLE, Communic. de ceux recueillis aux env. de Murcie par M. Guirao, 1853, xlvii. — *id.*, COQUEREL, Note de la larve de cette esp., 1859, 615. — *id.*, COTTY, Obs. de cette esp., 1860, 327. — *Lacordairei*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 171. — *Laportei*, LEFEBVRE, Obs. sur son identité avec la *M. Adonis*, 1834, xxv. — *orycheloides*, REICHE, décrite précédemment par l'auteur sous le nom de *M. nigricollis*, 1852, lxvi. — *4-collis*, décrite précédemment par M. Brullé sous le nom de *M. spinosa*, 1852, lxvii. — *virginica*, DE LAPORTE, Observ. entomologiques, 1842, xii.

**Megacera** AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 42. — *vittata*, 1835, 43.

**Megaceras** *Philoctetes*, *Tecur*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 16.

**Megaderus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 57. — *stigma*, 1834, 58.

**Megagenius**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 513. — *Frioli*, 1835, 514.

- Megagnathus mandibularis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 107.
- Megalæmus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 281. — *Olivieri*, 1860, 281.
- Megalophthalmus Bennetii**, DE LAPORTE, Genre *Lampyris*, 1833, 131. — *costatus*, 1833, 132. — *melanurus*, 1833, 131.
- Megalorhina Harrisii**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 253.
- Megapalpus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 295. — *6-guttatus*, 1860, 296.
- Megaprethes hirsuticornis**, BUQUET, Communic. d'une esp. remarquable de Longicornes, 1859, CXXX.
- Megarhipls brunnea**, DE LAPORTE, Rhipicérites, 1834, 265.
- Megarthus denticollis**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 434.
- Megasoma Mars**, THOMSON, Communic. de cette esp. des rives de l'Amazonie, 1858, CCXVII.
- Megasternum boletophagum**, LEPRIEUR, Environs de Bone, 1853, LVIII.
- Megatoma serra**, PERRIS, Note pour servir à son hist., 1846, 339. — *undata*, AZAMBRE, Larves trouvées dans de vieux nids d'Hyménoptères, 1857, XVII.
- Megischia curvipes**, SOLIER, Xystropides, 1835, 247. — *erythrocephala*, *hæmorrhoidalis*, *nigrita*, *picicornis*, *ruficollis*, 1835, 248.
- Megopis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 161. — *mutica*, 1832, 162.
- Meira** JACQ. DU VAL, Desc. de qqes esp. propres à la faune française, 1852, 711. — *crassicornis*, 1852, 713. — *elongatula*, FAIRMAIRE, Diagnoses de plusieurs nouv. esp. de Col. d'Europe, 1859, CIV. — *sutarella*, Miscell. entom., 1859, 59.
- Melanerus**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 190. — *hegetericus*, 1857, 193. — *lævigatus*, 1852, 192 et 1858, 59. — *pygmæus*, 1857, 194.
- Melandrya costata**, DOUË, prise dans la forêt de St-Germain, 1849, LX. — *serrata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 113.
- Melanophila tarda**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 221.

**Melanotus niger**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 158. — *rufipes*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 134.

**Melaphorus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, genre substitué à *Stenholoma*, 1835, 412.

**Melasis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 129. — *buprestoides*, 1834, 130. — *flabellicornis*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Encydémides, 1843, 172. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 112. — *id.*, PERRIS, Obs. complémentaires pour son hist., 1847, 541. — *Lepaigei*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468.

**MÉLASOMES**, LACORDAIRE, Note tendant à rectifier l'habitat de quelques esp., 1837, 247. — *id.*, SOLIER, Réponse à la notice de M. Lacordaire, 1837, 481. — *id.*, DEJEAN, Obs. au sujet du dernier mém. de M. Solier sur leur habitat., 1838, XXVI.

**Meligethes æneus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 578. — *id.*, JACQ. DU VAL, très-nuisible aux Crucifères dans le département de l'Oise, 1857, XCI. — *erythropus*, KUNZEI, *lugubris*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *rufipes*, KIESENWETTER, 1851, 578. — *serripes*, AUBÉ et REICHE, 1852, XXXII. — *tristis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 668. — *umbrosus*, *viridescens*, KIESENWETTER, 1851, 578.

**Meloe**, LABOULBÈNE, Éclosion de plus de 1,000 *Triagulinus* qui seraient le premier âge des *Meloe*, 1851, LXVII. — *id.*, FAIRMAIRE, Communiqué d'une brochure qui les préconise pour le traitement de la rage, 1856, LXXVII. — *ænea*, JACQ. DU VAL, trouvée en assez grand nombre aux env. de Perpignan, 1849, XLII. — *id.*, LABOULBÈNE, prise récemment dans le midi de la France, 1850, XXXIX. — *Chevrolatii*, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. recueillis à Madagascar, 1852, 395. — *cicatricosus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 95. — *cælatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 271. — *majalis*, RAMBUR, La liqueur qu'elle excrète est tout à fait insipide, 1837, LVIII. — *sardous*, GÉNÉ, Phrases spécifiques de 17 Col. de Sardaigne, 1836, IV. — *sericellus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 273.

**Melœnus**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 670.

**Melolontha**, BASSI, Individu ayant trois cuisses à la patte antérieure droite, 1834, IV. — LHERMINIER, Œufs funestes aux Gallinacées, 1837, 503. — *id.*, DE CASTELNAU, Obs. entomologiques, 1842, XII. —

*albida*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127. — *atra*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 288. — *cærulea*, JACQ. DU VAL, se rapporte à l'*Anomala oblonga*, 1857, 95. — *fullo*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, GHILIANI, 1847, 94. — *id.*, DOÛÈ, Monstruosité remarquable, 1847, xcviii. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *hippocastani*, DESMAREST, Anomalie dans la forme des ant., 1846, li. — *id.*, MULSANT, L'auteur a vu souvent son accouplement avec le *M. vulgaris*, 1848, lx. — *id.*, MOCQUERYS, Sur les Ins. nuisibles, 1851, cii. — *monticola*, JACQ. DU VAL, c'est l'*Hoplia minuta*, 1857, 95. — *papposa*, REICHE, Citations synonymiques, 1858, 313. — *pini*, DUPONCHEL, 1834, 288. — *vulgaris*, LEFEBVRE, Apparition extraordinaire, 1832, 236. — *id.*, DOUMERC, Dessin d'une anomalie remarq., 1833, xlv. — *id.*, Notice sur qqes monstruosité entomol., 1834, 171. — *id.*, LEFEBVRE, Apparition précoce de plusieurs indiv., 1835, lxxxvi. — *id.*, AUD-SERVILLE, Compte rendu de l'ouvrage de M. Vibert sur le Ver blanc, 1836, xlvi. — *id.*, LUCAS, Deux var. remarquables, 1845, xxxviii. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larve renfermant deux Helminthes de plus d'un pied de long, 1845, cix. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Notes sur un individu monstrueux, 1846, xviii. — *id.*, BOULARD, Note sur un semblable individu présenté par M. Chevrolat, 1846, xlviii. — *id.*, MULSANT, Vu souvent son accouplement avec le *M. hippocastani*, 1848, lx. — *id.*, MOCQUERYS, Sur les Ins. nuisibles, 1851, cii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Tête présentant un encroûtement de matière cornée, 1852, lxxviii. — *id.*, FARKAS, On en tire en Hongrie une substance huileuse pour graisser les roues des voitures, 1832, 237. — *id.*, LABOULBÈNE, Examen anatomique de deux ♂ accouplés, 1859, 567. — *id.*, GODET, Prime donnée en Suisse pour leur destruction, 1832, 237.

**MÉLOLOSTHIDES**, DEJEAN, Obs. sur un Ins. de cette tribu, 1838, xi.

**Melyris** *corrosa*, *hæmorroidalis*, *pectoralis*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97.

**Menophilus** *curvipes*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 361.

**Meropachis** *tristis*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 659.

**Merophysia** *formicaria*, LUCAS, Descr. et figure de deux genres nouv.,

1852, XXVIII. — *id.*, FAIRMAIRE, prise dans des fourmilières, près de Toulon, par M. le capitaine Martin, 1857, xcv.

**Meroscellus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 157. — *opacus*, BUQUET, Descr. de longicornes nouv., 1860, 618. — *violaceus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 158.

**Mesites**, *aquitanus*, FAIRMAIRE, Descr. de Col. de France, 1859, LII. — *cribratus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 542. — *pallidipennis*, GRAELLS, Lecture d'une note sur un *Mesites* cru nouveau, 1848, XXXVII. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 251.

**Mesosa**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 43. — *curculionoides*, *nebulosa*, 1835, 44.

**Mesosthena**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 396. — *elegans*, 1835, 399. — *Klugii*, 1835, 404. — *lævicollis*, 1835, 402. — *longicollis*, LUCAS, Descr. de plusieurs Mélanosomes du nord de l'Afrique, 1858, CCXXII. — *oblonga*, SOLIER, 1835, 401. — *parvula*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 211. — *puncticollis*, SOLIER, 1835, 405. — *punctipennis*, 1835, 403.

**Mesus**, CHEVROLAT, Note rectificative sur ce genre, 1859, CXXX. — *rugatifrons*, Descr. de nouv. esp. de Col., 1858, 317.

**Metallites** *Fairmairei*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 633. — *parallelus*, CHEVROLAT, Descr. d'esp. nouv. de Curculionites d'Europe, 1860, 507. — *scutellaris*, 1860, 506. — *sicanus*, 1860, 505.

**Metæcus** *paradoxus*, AUD.-SERVILLE, trouvé près de Coulommiers, 1847, xcvi. — *id.*, DE LA FERTÉ, trouvé dans la forêt de Saint-Germain, 1847, xcvi. — *id.*, SICHEL, trouvé aux env. de Paris, 1854, xvii. — *id.*, 14 éclos. d'un indiv. de *Vespa vulgaris*, 1854, LVIII.

**Metonius** *purpureus*, LACORDAIRE, Genre créé par Th. Say, dans un recueil américain, 1849, LXXVIII.

**Metopias**, AUBÉ, Psélaphiens, 1833, 504, et révision de cette famille, 1844, 78. — *curculionoides*, 1833, 504, et 1844, 79.

**Metopocoilus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 170. — *maculicollis*, 1832, 171. — *Rojasi*, SALLÉ, Descr. d'une nouv. esp. de Vénézuéla, 1853, 649.

- Metriopus**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 570. — *Hoffmanseggii*, 1835, 571.
- Mézium**, BOIELDIEU, Pliniores, 1856, 673. — *affine*, 1856, 674. — *americanum*, 1856, 675. — *sulcatum*, 1856, 673.
- Micipsa**, LUCAS, Note sur ce nouv. genre, 1855, xxxiv. — *Doüei*, Note sur cet Ins., 1856, xlv. — *philistina*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 212. — *rustarsis*, LUCAS, Communic. de cet Ins., 1835, xxxiv.
- Micralymma**, FAIRMAIRE, trouvée par M. Pradier sur les côtes de Bretagne, 1853, xlvii. — *brevipenne*, JAVET, trouvée en Angleterre, 1850, xxiv. — *id.*, LABOULBÈNE, trouvée au Havre dans les fentes des rochers submergés, 1856, lxxxvi, et 1857, xcv. — *id.*, Détails anatomiques sur cette esp. dans ses divers états, 1857, civ. — *id.*, Sur les mœurs et l'anatomie de cette esp., 1858, 73.
- Microleptes albomaculatus**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 520. — *aranea*, 1859, 519. — *clavipes*, *variolosus*, 1859, 520.
- Microdera**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 304. — *convexa*, 1835, 312. — *coromandelensis*, 1835, 313. — *gracilis*, 1835, 312. — *lucida*, 1835, 307. — *pygmæa*, 1835, 310. — *Servillei*, 1835, 309. — *sublunata*, 1835, 308.
- Micropeplus costatus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833 468. — *Maillei*, 1833, 467.
- Micropila**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 21. — *agilis*, 1835, 22.
- Microplophorus castaneus**, *magellanicus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 485.
- Microrhagus Emyi**, ROUGET, Descr. de deux esp. nouv. de Col. des env. de Dijon, 1857, 749, — *Manueli*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 530. — *pygmæus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 180. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Saint-Germain, 1849, lx, et 1851, liii. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468. — *Sahlbergii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 180.
- Microschatla**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 474. — *punctata*, 1836, 475.
- Microtelus**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 9. — *asiaticus*, 1838, 10. — *careniceps*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 227. — *Lethierryi*, REICHE, descr. d'une nouv. esp., 1860, 334.

**Microzoum tibiale**, FAIRMAIRE, Envir. de Paris, 1846, LVI.

**Migneauxia serraticollis**, AUBÉ, Cette esp. est la même que la *Corticaria crassiuscula* Aubé, 1859, CX.

**Miscodera**, SOLIER, Observ. sur le genre *Ditomus*, 1834, 669.

**Misolampus scabricollis**, GRAELLS, Descr. de qqes Col. de l'Espagne, 1851, 15.

**Mitomermus hystrix**, JEKEL, Est le *Cathormiocerus variegatus* Kust., 1856, LXXII. — *id.*, JACQ. DU VAL, Glanures entomologiques, 1857, 89.

**Mitragenius**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 328. — *Dejeanii*, 1836, 330. — *id.*, LACORDAIRE, Note tendant à rectifier l'habitat de qqes Mélasomes, 1837, 253. — *id.*, SOLIER, Réponse à la note de M. Lacordaire, 1837, 487.

**Mnematum**, REICHE, Coprophages, 1842, 91. — *id.*, *Ritchii*, 1842, 93. — *Silenus*, 1842, 94.

**Mniophila**, ALLART, Monogr. des Altises d'Europe, 1860, 553. — *muscorum*, 1860, 553.

**Moleps terricola**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 109.

**Molorchus** (voyez *Necydalis*) *abbreviatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 107. — *major*, BELLIER et LABOULBÈNE, Plusieurs indiv. trouvés sur un Orme aux env. de Paris, 1848, XLIV.

**Moluris**, GUERIN-MÉNEVILLE, Nouv. esp. provenant de la côte de Mozambique, 1844, XLVIII.

**Molytes bajulus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 106. — *carinerosus*, *coronatus*, *cribrum*, *glabratus*, 1847, 141.

**Monocrania luridipennis**, *nigricans*, DE LAPORTE, Mémoire sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 410.

**Monocrepidius abbreviatus**, *cribratus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 155. — *id.*, *fulvus*, DOUË, trouvé dans les env. de Narbonne par M. le capitaine Godart, 1853, LXIII. — *sulphuripes*, LATREILLE, 1834, 155.

**Monodesmus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 160. — *callidioides*, 1832, 161.

**Monochamus** (voyez *Monohammus*).

**Monohammus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 91. — *dentator*,

1835, 92. — *dentifer*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 661. — *galloprovincialis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 92. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 464. — *lateralis*, CHEVROLAT, 1851, 661. — *sartor*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 141. — *subgemmatus*, CHEVROLAT, C'est le *Monoh. Georgius* White, 1859, VI. — *sutor*, AUD.-SERVILLE, 1835, 92. — *id.*, GHILIANI, 1847, 141. — *lomentosus*, CHEVROLAT, Longicornes de Banks, 1851, 661.

**Monolepta**, *lepida*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 44.

**Monomma**, THOMSON, Monographie des Monommides, 1860, 11. — *angustatum*, 1860, 21. — *brunneum*, 1860, 23. — *brunnipes*, 1860, 21. — *ferrugineum*, 1860, 15. — *gibbosum*, 1860, 22. — *giganteum*, 1860, 13. — *grandis*, 1860, 14. — *gyrinoides*, 1860, 17. — *indistinctum*, 1860, 19. — *irroratum*, *maculatum*, 1860, 16. — *minutissimum*, 1860, 22. — *nigrum*, 1860, 20. — *philippinarum*, 1860, 24. — *proletarium*, 1860, 19. — *pusillum*, 1860, 24. — *sepultum*, 1860, 18. — *syriacum*, 1860, 12. — *tristum*, 1860, 18.

**MONOMMIDES**, THOMSON, Monogr. de cette famille, 1860, 5. — *id.*, Table des espèces, 1860, 37.

**Monoplius**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 122. — *inflatus*, 1855, 124.

**Monotoma**, AUBÉ, Essai sur le genre *Monotoma*, 1837, 453. — *americana*, 1837, 461. — *angusticollis*, 1837, 457. — *brevicollis*, 1837, 460. — *conicicollis*, 1837, 455. — *longicollis*, 1837, 467. — *picipes*, 1837, 458. — *id.*, CHEVROLAT, trouvée dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII. — *punctaticollis*, AUBÉ, Descr. de deux Col. nouv. appartenant à la faune parisienne, 1843, 73. — *4-collis*, 1837, 465. — *4-foveolata*, 1837, 468. — *id.*, Obs. sur la publication de M. de Motschulsky, 1843, XX. — *id.*, CHEVROLAT, 1851, LXXXVII. — *spini-collis*, AUBÉ, 1837, 463.

**Monotropus** *angulicollis*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes esp. nouv. de Col., 1859, CLII.

**Mordella** GUÉRIN-MÈNEVILLE, Notes sur les métamorphoses des *Mordella*, 1845, LXIX. — *abdominalis*, *angustata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 134. — *angustata*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730. — *artensis*, *dodonacæ*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 306. — *minima*, 1860, 307. —



- obtusata*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de qqes esp. nouv. de Col. français, 1859, CCXXXIII. — *16-guttata*, MONTROUZIER, 1860, 305.
- Morica**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 646. — *id.*, LUCAS, Lecture d'une notice contenant des remarques sur ce genre, 1855, CXIII. — *Favieri*, Deux esp. nouv. de Mélanosomes du nord de l'Afrique, 1859, CXIII. — *Jevini*, Communic. et courte descr., 1850, III. — *id.*, Note sur une nouv. esp. du genre *Morica*, 1856, 711. — *id.*, Communic. de cet Ins. trouvé dans la province d'Oran, 1857, LXXXIX. — *obtusa*, SOLIER, 1836, 650. — *8-costata*, 1836, 649. — *planata*, 1836, 648.
- Morimus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 95. — *funestus*, LUCAS, de la faune parisienne, 1856, LIX. — *funestus, lugubris*, AUD.-SERVILLE, 1835, 96. — *lugubris*, GOUREAU, Note pour servir à son hist., 1844, 427. — *id.*, SOUVERBIE, trouvé en février, près Bordeaux, sur des troncs de saule, 1850, XX. — *id.*, CHEVROLAT, Pris plusieurs fois en hiver, près de Paris, au pied de saules et de peupliers, 1850, XX. — *id.*, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473. — *obsoletus*, FAIRMAIRE, Miscell. entomol., 1859, 62. — *tristis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 96.
- Morio**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditonus*, 1834, 669. — *olympicus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 389. — *pygmaeus*, SCHAU, On doit lui rapporter la figure du *Nomius græcus*, 1857, LXXVIII.
- Mormolyce phyllodes**, AUD.-SERVILLE, Revendication de priorité pour son placement parmi les Troncatipennes, 1837, LXX et LXXIX. — *id.*, DEJEAN, Adhésion à l'avis de M. Serville, 1837, LXXX.
- Moronillus, ruficollis**, JACQ. DU VAL, Phrases diagnostiques, 1854, XXXVIII. — *id.*, DELAROUZÉE, Env. d'Hyères, 1858, CV.
- Morychus, æneus**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *modestus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 583.
- MYCÉTÉIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 102.
- Mycetocharax barbata, bipustulata**, SOLIER, Xystropides, 1835, 244. — *bipustulata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 135. — *flavipes*, SOLIER, 1835, 244. — *humeralis*, GHILIANI, 1847, 135. — *linearis*, CUSSAC, Notices sur ses métamorphoses, 1855, 243. — *4-notata*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470. — *4-pustulata*, SOLIER, 1835, 244.

**MYCÉTOPHAGIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 102.

**Mycetophagus atomarius**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472. — *balanophoræ*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 263. — *fulvicollis*, *lunatus*, CHEVROLAT, 1833, 472. — *pictus*, MONTROUZIER, 1860, 264. — *variabilis*, CHEVROLAT, 1833, 472.

**Mycetoporus biplagiatus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 153. — *crassicornis*, *longicornis*, *pronus*, REICHE, trouvés aux environs de Lille, 1856, LXIII.

**Mycterus curculionoides**, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*; GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 110. — GOUGELET, trouvé dans le bois de Vincennes, 1855, LIV.

**Mylabris armeniaca**, JACQ. DU VAL, pas très-rare aux env. de Toulouse, 1853, LXVI. — *id.*, JACQ. DU VAL, Obs. sur les mœurs, 1857, 96. — *Dufourii*, GRAELLS, Col. de l'Espagne, 1851, 16. — *flexuosa*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124. — *hieracii*, GRAELLS, 1851, 17. — *intersecta*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 274. — *Peronii*, GIRARD, du voyage de Péron, 1857, CLV. — *sobrina*, GRAELLS, 1851, 20.

**Myllaena elongata**, *forticornis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI. — *glauca*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 314. — *gracilicornis*, FAIRMAIRE, Miscell. entomol., 1859, 39. — *gracilis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 413. — *infuscata*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE. — *intermedia*, KIESENWETTER, 1851, 413.

**Myrmacicelus**, CHEVROLAT, Nouv. genre de Curculionites, 1833, 357. — *formicarius*, 1833, 359.

**Myrmecoxenus**, JACQ. DU VAL, Ce genre doit être placé avec les Mycétophagiens, 1854, LXVI. — *picinus*, AUBÉ, Ins. d'Europe et d'Algérie, 1850, 330. — *vaporariorum*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. d'une nouv. esp., 1843, 69. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734.

**Myrmedonla aptera**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 417. — *canaliculata*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 403. — *Erichsonis*, FAIRMAIRE, Col. nouv., 1857, 635.

— *id.*, PEYRON, 1858, 417. — *Fernandi*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de la faune méditerranéenne, 1855, 309. — *funesta*, *humeralis*, AUBÉ, Esp. recueillies sous des feuilles mortes, 1844, XXXVII. — *laminata*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *laticollis*, AUBÉ, 1844, XXXVII. — *limbata*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *lugens*, AUBÉ, 1844, XXXVII. — *physogastra*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 150. — *rigida*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722. — *Rougeti*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. nouv., 1859, CLXIV. — *tuberiventris*, FAIRMAIRE, 1855, 310. — *id.*, Miscell. entomol., 1856, 530.

**Myzomorphus scutellatus**, SALLÉ, Col. nouv. de l'Amérique, 1849, 429.

## N.

**Nacerdes Gaubili**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 308. — *maritima*, COQUEREL, Obs. sur des Ins. recueillis à Madagascar, 1848, 177. — *melanura*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 392. — *Moorii*, MONTROUZIER, 1860, 307. — *nigripennis*, 1860, 308.

**Nanodes** (voyez *Nanophyes*) *tamarisci*, PAUL GERVAIS, Qques détails sur sa larve, 1847, xciv. — *id.*, LUCAS, Détails sur les ovaires du tamarix attaqués par cet Ins., 1849, LXIV.

**Nanophyes cuneatus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 650. — *flavidus*, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 345. — *hemisphæricus*, L. DUFOUR, Hist. de ses métamorphoses, 1854, 651. — *hemisphæricus*, *languidus*, *nitidulus*, *pallidulus*, *posticus*, KIESENWETTER, 1851, 649. — *siculus*, 1851, 648. — *id.*, JEKEL, trouvé à Meung-sur-Loire et à Loudun, 1856, XLVI. — *stigmaticus*, KIESENWETTER, 1851, 649. — *tamarisci*, GERVAIS, Qques détails sur sa larve, 1837, xciv. — *id.*, LUCAS, Détails sur les ovaires du tamarix attaqués par cet Ins., 1869, LXIV. — *transversus*, AUBÉ, 1850, 346.

**Nebria andalusiaca**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858,

**746.** — *angustata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 142. — *angusticollis*, 1847, 128. — *arenaria*, major BLANCHARD, trouvée à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV. — *brevicollis*, BRISSON, Descr. de la larve et de la nymphe, 1848, 73. — *complanata*, major BLANCHARD, trouvée à Fouras (Charente-Inférieure), 1833, IV. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 746. — *crenatostrata*, BASSI, Descr. de plusieurs esp. de Col. d'Italie, 1834, 464. — *fossulata*, GHILIANI, 1847, 142. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Rem. sur divers Col. propres à la faune française, 1858, LXVII. — *Foudrasii*, DE BARAN, trouvée au mont Dore, 1856, LXXVI. — *fulviventris*, BASSI, 1834, 463. — *Hemprichii*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 163. — *id.*, REICHE, retrouvée en Palestine par M. de Saulcy, 1856, XLVI. — *Jockischii*, GHILIANI, 1847, 122. — *Lafrenayei*, 1847, 117. — *Lareynii*, FAIRMAIRE, Descr. des esp. nouv. de Corse, 1859, 269. — *laticollis*, GHILIANI, 1847, 118. — *id.*, DOÛÉ, trouvée près de Besançon par M. le capitaine Godart, 1853, LXIII. — *nivalis*, GHILIANI, 1847, 126. — *picicornis*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 247. — *rubripes*, DE BARAN, 1856, LXXVI. — *id.*, LETHIERRY, trouvé au Puy-de-Dôme, 1859, CXXVII. — *tibialis*, GHILIANI, 1847, III. — *Villæ*, 1847, 142.

**Iecrobia** *ruficollis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 261.

**Iecrodes** *littoralis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 92.

**Iecrophilus** *subterraneus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 141.

**Iecrophorus**, CREMIÈRE aîné, Indiv. d'une nouv. esp., 1835, XXXVIII. — *cadaverinus*, COLIN, d'Arras, Note sur ses mœurs, 1847, CX. — *corcicus*, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 399. — *germanicus, mortuorum*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 119.

**Iecydallis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 543. — *abbreviatus*, 1833, 544. — *major*, 1833, 543. — *minor, umbellatarum*, 1833, 544 (voyez *Molorchus*).

**Iecydalopsis** *femoralis, trizonatus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1849, 499.

**Iematodes**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 125. — *filum*, 1834, 126. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 174. — *Sahlbergi*, LATREILLE, 1834, 126.

- Neomida bicolor**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 131. — *cornuta*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 294. — *cucullata*, 1860, 294. — *elongata*, 1860, 291. — *striata* 1860, 290. — *violacea*, GHILIANI, 1847, 131.
- Niphona picticornis**, DELAROUZÉE, Habitat de la larve, 1858, CXLVI.
- Niptus**, BOIELDIEU, Ptinières, 1856, 662. — *elongatus*, Diagnoses, 1854, LXXXIII et Monogr., 1856, 666. — *globulus*, 1856, 665. — *hololeucus*, 1856, 664.
- Nitidula argentea**, *Guerinii*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 916. — *Signoreti*, 1860, 915.
- Nogrus griseus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 118.
- Nosodendron fasciculare**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93.
- Nosoderma**, SOLIER, Collaptérides, 1841, 31. — *denticulatum*, 1841, 33. — *Duponchelii*, 1841, 34. — *morbillosum*, 1841, 37. — *scabrosum*, 1841, 36. — *vicinum*, 1841, 38.
- Notaphus pallidipenne**, *ustulatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679.
- Noterus convexiusculus**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 640. — *crassicornis*, LEPRIEUR, Larve trouvée au bois de Meudon, 1860, LXVII. — *lævis*, Env. de Bone, 1853, LIX. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 785.
- Notiophilus aquaticus**, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 355. — *geminatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 746. — *palustris*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *punctulatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 746. — *id.*, WESMAEL, Carnassiers de la Belgique, 1835, XXXVIII. — *4-punctatus*, JAVET, trouvé en Écosse, 1846, LXXV. — *id.*, PEYRON, 1858, 355. — *semi-punctatus*, FAIRMAIRE, 1852, 678. — *id.*, PEYRON, 1858, 354.
- Notiophygus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Monographie, 1834, 453. — *cine-reus*, *dentipennis*, 1834, 455. — *maculicornis*, 1834, 456. — *nigropunctatus*, 1834, 454. — *parvulus*, 1834, 456.
- Notodoma**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 133. — *globatum*, 1855, 136.
- Notophysis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 158. — *lucanoides*, 1832, 159.

**Notexus**, DE LA FERTÉ, Question de synonymie soumise à la Société et résolue, 1846, XXII. — *caledonicus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 361. — *cornutus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 625. — *cruentatus*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, trouvé en l'oasis d'Ouargla, 1859, CXCI. — *mollis*, AUBÉ, Larves se nourrissant d'*Anobium*, 1838, LVI. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 92. — *monocerus*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *id.*, FAIRMAIRE, Bate de la Somme, 1852, 685. — *testaceus*, LEPRIEUR, en Algérie sur des fucus, 1860, LXXXVII.

**Nyetella**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 308. — *nodosa*, 1836, 310. — *id.*, LACORDAIRE, Note rectific. sur son habitat, 1837, 252. — *id.*, SOLIER, Réponse, 1837, 485.

**NYCTÉLITES**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 303.

**Nycterilampus lifuanus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 258.

**Nyctophanes**, MOCQUERYS, Qques obs. recueillies pendant un voyage au Brésil, 1844, LXIII.

## O.

**Oberon** *erythrocephala*, *linearis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 108. — *modesta*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 663. — *perpillata*, AUD.-SERVILLE, Note sur ses habitudes, 1844, L. — *id.*, GHILIANI, 1847, 108.

**Obrium**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 93. — *brunneum*, 1834, 94. — *id.*, ROUZET, pris dans la forêt de Bondy, 1849, LXVIII. — *cantharinum*, AUD.-SERVILLE, 1834, 94. — *minutum*, CHEVROLAT, Col. de la coll. de Banks, 1851, 661.

**Ocalon** *castanea*, *concolor*, *decumana*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 403.

**Ochina** *sanguinicollis*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 104.

- Ochodæus chrysomelinus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93.—*id.*, REICHE, pris au bois de Boulogne, 1847, LXIV.—*id.*, TAPPE, trouvé au même lieu en juin, 1860, LXXXVIII.
- Ochræthes**, CHEVROLAT, *Clytus* propres au Mexique, 1860, 454.
- Ochthebius bicolor, exaratus**, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LVIII.—*exsculptus, difficilis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 391. — *Fabricii*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 245. — *lanuginosus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 353. — *lividipennis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 405. — *margipallens*, KIESENWETTER, 1851, 391. — *id.*, LEPRIEUR, 1853, LVIII. — *marinus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *marinus, punctatus*, LEPRIEUR, 1853, LVIII. — *pygmaeus*, FAIRMAIRE, 1852, 680. — *sericeus* PEYRON, 1858, 406. — *viridis*, 1858, 404.
- Ochthenomus angustatus**, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies à Prades, 1850, XXIV. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 625. — *sinuatus*, JACQ. DU VAL, 1850, XXIV. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 625. — *id.*, FAIRMAIRE, Envoyé des Pyrénées orientales, 1856, LXXXI.
- Octotemnus**, MELLIÉ, Monogr. du genre *Cis*, 1848, 384. — *glabriculus*, 1848, 385. — *opacus*, 1848, 386.
- Ocybatus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 230 et 293.
- Ocydromus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 230 et 293.
- Ocypus, abbreviatipennis**, AUBÉ, Descr. de Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 315. — *alpicola*, CHEVROLAT, pris aux env. de Saint-Germain, 1843, XL. — *æthiops*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 157. — *ater*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 158. — *atrocyaneus*, 1860, 157. — *Baudii*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 424. — *bellicosus*, FAIRMAIRE, Descr. de Col. de la faune méditerranéenne, 1855, 312. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 158. — *cupreus*, Baie de la Somme, 1852, 681. — *cyaneus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 414. — *cyclopus*, PEYRON, 1858, 422. — *erosicollis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1846, 364. — *etruscus*, GAUTIER DES COTTES, Descr. d'une nouv. esp. d'Europe, 1860, 368. — *nigrinus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 156. — *obs-curoæncus*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de

l'Afrique, 1852, 73. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 157. — *æthiops*, PEYRON, 1858, 422. — *olens*, KIESENWETTER, 1851, 414. — *id.*, PEYRON, 1858, 422. — *opacus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *picipennis*, PEYRON, 1858, 422. — *planipennis*, AUBÉ, Note sur qqes Col. nouv., 1842, 235. — *rubripennis*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 365. — *Saulcyi*, REICHE, Desc. sommaire d'Ins. de l'expédition aux mers arctiques, 1857, IX. — *siculus*, AUBÉ, 1842, 234. — *subæneus*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96.

**Odacantha** *melanura*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 87. — *id.*, REICHE, trouvée aux env. de Marseille par M. Peyron, 1856, LXXV. — *senegalensis*, DE LAPORTE, 50 espèces de Col. nouv. ou peu connus, 1832, 388.

**Odogenus**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 664 et 669. — *barbarus*, *dama*, *fulvipes*, *pilosus*, 1834, 665.

**Odontocarus**, S.-G., SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 662.

**Odontocera**, AUD.-SERVILLE, 1833, 546. — *aurulenta*, 1833, 548. — *crinita*, 1833, 549. — *cylindrica*, *gracilis*, 1833, 548. — *vitrea*, 1833, 547.

**Odontochella** *egregia*, DE CHAUDOIR, Descr. de Carabiques nouv., 1835, 433.

**Œdecerus** *bipunctatus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Calédonie, 1860, 872.

**Œdeenema** *dubia*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 664.

**Œdemera** *dispar*, L. DUFOUR, Hist. des métam. d'une *Œdemera*, 1841, 5. — *notata*, *ruficollis*, DUPONCHEL, trouvées dans la Lozère, 1834, 288. — *sanguinicollis*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 471.

**Œdichirus** *unicolor*, AUBÉ, Note sur deux Brachélytres, 1843, 89.

**Œgesoma** *scabricorne*, CHEVROLAT, Larve trouvée à Fontainebleau dans le bois de hêtre, 1846, LXXIV.

**Œme** *annulicornis*, BUQUET, Mém. sur divers Col., 1859, 627 et CCLXI. — *decorata*, 1859, 625. — *filiformis*, 1859, 628. — *pallida*, 1859, 626.



- **Estinomus ædilis**, CHEVROLAT, Larves trouvées dans le Pin maritime, 1846, LXXV (voyez *Astynomus*).
- **Oligota subtilis**, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722.
- **Olisthopus glabricollis**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 370, — *interstitialis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 781. — *minor*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 605. — *orientalis*, 1855, 603 et 1858, 58. — *id.*, REICHE, Cet Ins. n'est autre que l'*O. græcus* de M. Brullé, 1857, xcv.
- **Olophrum alpinum**, FAIRMAIRE, Esp. nouv. pour la faune française, 1857, LII. — *piceum*, DE SAULCY, La ponctuation de l'écusson aussi forte que celle des élytres, 1860, LXVIII.
- **Omacantha**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 89. — *gigas*, 1835, 90.
- **Omala 4-plagiata**, DE MOTSCHULTSKY, doit être maintenue comme européenne, 1859, CCVII.
- **Omalisus sanguinipennis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 104. — *suturalis*, 1847, 130. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684.
- **Omalium**, MELLIÉ, pris une esp. nouv. sur les fleurs de l'*Ulex europæus*, 1848, XXXVI. — *Allardii*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 44. — *atrum*, 1857, 738. — *cæsum*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 724. — *deplanatum*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *florale*, *fossulatum*, DE SAULCY, Les écussons sont ponctués, 1860, LXVIII. — *florale*, *fossulatum*, *nigriceps*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 435. — *pusillum*, FAIRMAIRE, 1846, LV. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 578. — *rivulare*, KIESENWETTER, 1851, 435. — *striatipenne*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. de l'Europe et de l'Algérie, 1850, 321. — *validum*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. de la faune française, 1859, CXXXI. — *vile*, PERRIS, 1853, 576.
- **Omalodes**, DE MARSEUL, Histerides, 1853, 498. — *angulatus*, 1853, 508. — *anthracinus*, 1853, 533. — *bifoveolatus*, 1853, 510. — *brasilianus*, 1853, 513. — *conicicollis*, 1853, 519. — *consanguineus*, 1853, 527. — *depressisternus*, 1853, 537. — *ebeninus*, 1853, 529. — *extorris*, 1853, 528. — *exul*, 1853, 514. — *faustus*, 1853, 515. —

*foveola*, 1853, 517. — *grossus*, 1853, 522. — *haitianus*, 1853, 525. — *laceratus*, 1853, 507. — *lævigatus*, 1853, 530. — *lævinotus*, 1853, 532. — *lucidus*, 1853, 509. — *marquisicus*, 1853, 512. — *monilifer*, 1853, 520. — *novus*, 1853, 524. — *omega*, 1853, 506. — *planifrons*, 1853, 526. — *pulvinatus*, 1853, 521. — *punctistrius*, 1853, 516. — *ruficlavis*, 1853, 531. — *serenus*, 1853, 536. — *sinuaticollis*, 1853, 535. — *sobrinus*, 1853, 534. — *texanus*, 1853, 523.

**Omalepilla** *ochroptera*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 444. — *sericans*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 94. — *angularis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 445.

**Omalesoma** Vigors, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 233.

**Omalotrichus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 233. — *id.*, Nom générique changé en celui de *Homalolachnus*, 1851, 293. — *panagzoides*, *6-maculata*, *vertagoides*, 1851, 234.

**Omascus**, *anthracinus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *fuscoæneus*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 448. — *melas*, var. *italicus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 88. — *minor*, FAIRMAIRE, 1852, 678.

**Omius** *brunnipes*, *hirsutulus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *sulcicollis*, JEKEL, pris en Espagne par M. Perris, 1856, XLVL. — *sulcifrons*, identique avec le *Barypethes rufipes*, 1855 XXVL.

**Omophilus**, DOÛÉ, Deux esp. remarquables venant de Sétif, 1850, XXVI. — *curvipes*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 614. — *lepturoides*, SOLIER, Fam. des Xystropides, 1835, 246. — *lepturoides*, *sericeicollis*, KIESENWETTER, 1851, 624.

**Omophron**, FAIRMAIRE, Larve trouvée en Égypte par M. Schaum, 1855, LXXIII. — *capense*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 212.

**Omesita** *cadaverina*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le Dr Roth, 1852, 97.

**Omphra**, REICHE, Helluonides, 1842, 330. — *atrata*, *complanata*, 1842, 334. — *complanata*, 1842, 342. — *hirta*, *pilosa*, 1842, 331.

**Omus**, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connus, Ins. 1832, 386. — *id.*, Obs. entom., 1842, XIII. — *id.*, REICHE, Note sur ce genre et descr. de deux nouv. esp., 1838, 297. — *Audouini*, 1838, 300. — *californicus*, DE LAPORTE, 1832, 387. — *id.*, REICHE, 1838,

301. — *cylindriformis*, 1838, 302, — *id.*, doit être rapporté au genre *Amblycheila*, 1839, 557. — *Dejeanii*, 1838, 299.

**Oncideres**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 67. — *impluviata*, *vomicosa*, 1835, 68.

**Oncinotus arcuatus**, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1831, 658.

**Oniticellus inæqualis**, *intermedius*, *militaris*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 98. — *pallipes*, GHILLANI, Col. du Piémont, 1847, 93. — *spathulatus*, *spinipes*, REICHE, 1852, 98.

**Onitis abyssinicus**, *ambigua*, REICHE, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 98. — *aygulus*, 1852, 99. — *Bison*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *Chevrolatii*, REICHE, n'est que l'*O menalcas*, ♂, 1849, LVI. — *id.*, Rectif, d'une communic. faite en la séance du 27 juin 1849, 1851, XII. — *crenatus*, 1852, 98. — *Ezechias*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 390. — *Fabricii*, REICHE, 1852, 98. — *Inuus*, 1852, 99. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 170. — *melibæus*, REICHE, Notes synonymiques, 1856, XXII. — *numida*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 170.

**Onthobium Mac-Ilayi**, MONTROUZIER, faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 266.

**Onthocharis Myrmidon** Westw., REICHE, n'est pas celui de M. Lacordaire, 1853, 425. — *smaragdina*, n'est pas celui du Cat. Dejean, 1853, 426.

**Onthophagus æruginosus**, *bifidus*, *centromaculatus*, REICHE, Notes synonymiques, 1856, XXIII. — *distichus*, *diversus*, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 98. — *emarginatus*, 1856, XXIII. — *excisus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 388. — *fmietarius*, *fuliginosus*, *litteratus*, *lugubris*, REICHE, 1852, 98. — *Maki*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 726. — *morio*, *mundus*, REICHE, 1856, XXIII. — *nuchicornis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *nutans*, *pullus*, REICHE, 1852, 98. — *Orcas*, REICHE, 1856, XXII. — *ruficapillus*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 387. — *scaber*, *secundarius*, REICHE, 1852, 98. — *subæneus suturellus*, 1856, XXIII. — *tages*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 386. — *tenuicornis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 726. — *variegatus*, *Worcissa*, REICHE, 1852, 98.

**Onthophilus**, de MARSEUL, Histérides, 1856, 549. — *affinis*, 1856, 561. — *alternatus*, 1856, 558. — *costipennis*, 1856, 565. — *exaratus*, 1856, 555. — *hispidus*, 1856, 565. — *nudatus*, 1856, 556. — *9-costatus*, 1856, 563. — *pluricostatus*, 1856, 564. — *striatus*, 1856, 560. — *sulcatus*, ROUZET, trouvé à Noizy-le-Sec, dans des détritux de végétaux, 1850, LV. — *id.*, DE MARSEUL, 1856, 554.

**Onychocerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 83. — *scorpio*, 1835, 84.

**Onypterygia faminii**, SOLIER, Descr. d'esp. nouv. de Carabiques, 1835, 113.

**Oochrotus unicolor**, LUCAS, Détails et descr., 1852, XXVIII et 1854, XLIII. — *id.*, FAIRMAIRE, pris, par le cap. Martin, dans des fourmières, à Toulon, 1857, XCV.

**Oodes**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 269. — *æneus*, DE LA FERTÉ, 1851, 270. — *æruginosus*, 1851, 272. — *agilis*, 1851, 273. — *amaroides*, 1851, 271. — *americanus*, 1851, 270. — *australis*, 1851, 271. — *bipustulatus*, 1851, 270. — *Buquetii*, 1851, 269. — *cayennensis*, BUQUET, Descr. de deux nouv. *Oodes*, 1834, 474. — *id.*, DE LA FERTÉ, 1851, 272. — *ellipticus*, 1851, 270. — *excavatus*, 1851, 271. — *femorialis*, DE CHAUDOIR, Descr. de qqes Carab. nouv., 1835, 444. — *flavicrus*, DE LA FERTÉ, 1851, 273. — *fossor*, 1851, 269. — *fuscipes*, 1851, 273. — *Goryi*, GORY, Centurie de Carab. nouv., 1833, 229. — *id.*, DE LA FERTÉ, 1851, 270. — *gracilior*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 359. — *grandis*, 1851, 269. — *helopioides*, 1851, 272. — *hispanicus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 759. — *humilis*, DE LA FERTÉ, 1851, 270. — *lævigatus*, 1851, 272. — *latus*, 1851, 269. — *Leprieuri*, BUQUET, 1834, 473. — *id.*, DE LA FERTÉ, 1851, 272. — *leucodactylus*, *metallicus*, 1851, 273. — *mexicanus*, 1851, 270. — *minutus*, 1851, 271. — *nigricornis*, 1851, 272. — *pallipes*, 1851, 273. — *parallelus*, 1851, 271. — *politus*, GORY, 1833, 230. — *pulcher*, DE LA FERTÉ, 1851, 270. — *Reichci*, 1851, 271. — *robustus*, 1851, 270. — *rufipes*, GORY, 1833, 210. — *senegalensis*, *stenocephalus*, DE LA FERTÉ, 1851, 271. — *striatellus*, 1851, 272. — *striatus*, *subæneus*, *subolivaceus*, 1851, 261. — *sulcatus*, *tenebrioides*, 1851, 269. — *tibialis*, 1851, 273. — *Westermanni*, 1851, 271.

**ODITES**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 266.

**Ophorus algericus** FAIRMAIRE, Env. de Perpignan, 1858, CXIII, et 1859, 49.

- Opatrum** *armatum*, REICHE, appartient au genre *Cnemaplatis*, 1855, CXII. — *aterrimum*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 289. — *australe*, 1860, 288. — *Colliardi*, FAIRMAIRE, Diagnoses de nouv. esp., 1860, 630. — *ferrugineum, orientale*, REICHE, 1855, CXII. — *sculpturatum*, FAIRMAIRE, 1860, 630. — *soricinum*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 259. — *tibiale*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470.
- Ophonus** *Billiarderii*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 237. — *brevicollis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *cribellus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 629. — *laminatus*, REICHE, Notes sur div. Col., 1859, 639. — *violaceus*, REICHE et DE SAULCY 1855, 628.
- Opilo** *Ferreti*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le Dr Roth, 1852, 97.
- Opilus** *dorsalis*, LUCAS, Notes sur plusieurs Col. d'Afrique, 1843, XXIV. — *germanus*, CHEVROLAT, Nouv. esp. de Térédiles, 1843, 37. — *Mimonti*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv., 1859, 471. — *mollis*, PERRIS, C'est un parasite, 1850, 565. — *id.*, Ins. du Pin maritime, 1854, 608.
- Oplocephala**, DE CASTELNAU, Obs. entom., 1842, XIII.
- Orchesia** *fasciata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 114. — *micans*, 1847, 105.
- Orchestes** *fagi*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *irroratus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 643. — *melanarius*, 1851, 645. — *rufus*, LABOULBÈNE, Hist. de ses Métam., 1858, 286. — *rufus, salicis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 636. — *tricolor*, KIESENWETTER, 1851, 644.
- Orectochilus** *villosus*, AUDOUIN, trouvé fréquemment en Belgique, 1835, LXXX.
- Oregostema**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 551. — *collare*, 1833, 553. — *discoideum*, 1833, 552. — *nigripes*, 1833, 552. — *rubricorne*, 1833, 553.
- Oreina** *cacaliæ*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 140. — *carrulolincata*, 1847, 128. — *gloriosa*, 1847, 136. — *ignita*, 1847, 114. — *melanocephala*, 1847, 142. — *snecionis*, 1847, 118 et 139. — *speciosa*, 1847, 125. — *id.*, PIERRET, indiv. encore vivant, pris depuis longtemps à Chamouny, 1849, LXXXII. — *speciosa, superba*, LUCAS, viviparité observée chez ces deux esp., 1856, LXXXVII. — *tristis*,

- GHILIANI, 1847, 138. — *venusta*, 1847, 128. — *viridis*, 1847, 139.
- Oreodera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 19. — *cinerea*, 1835, 20. — *glauca*, 1835, 20. — *pubicornis*, 1835, 21.
- Orestia**, ALLARD, Quelques détails relatifs à ce genre, 1859, CCXLI. — *id.*, Essai monogr. sur les Altises d'Europe, 1860, 67. — *alpina*, 1860, 68. — *Aubei*, *Leprieuri*, 1860, 70. — *Leprieuri*, Diagnoses, 1859, CCLX. — *punctipennis*, Monographie, 1860, 69.
- Orobittis?** *gibbosa*, MONTROUZIER, Col. de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 892. — *globosus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *id.*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, xxxii.
- Orophius**, MELLIE, Monogr. de l'ancien genre *Cis*, 1848, 381. — *mandibularis*, 1848, 382.
- Orphnus** *Mac-Leayi*, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 405. — *senegalensis*, 1832, 406.
- Orsedacna** *nigriceps*, JACQ. DU VAL, trouvée sur le quai de la Rapée, 1853, XLVI.
- Orthogenium**, DE CHAUDOIR, Descr. de Carabiques nouv., 1835, 432. — *femorale*, 1835, 433.
- Orthognathus** *prionoides*, BUQUET, Communic. des deux sexes, 1837, XLVIII.
- Orthogenius** *malabariensis*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 196.
- Orthomegas**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 149. — *cinnamomeus*, 1832, 149. — *sericeus*, 1832, 150.
- Orthoperus** *brunnipes*, PEYRON, La conformation de ses ailes semble le rattacher aux Trichoptérydes, 1857, CXIV. — *piceus*, PERRIS, Hist. de ses Métam., 1852, 587.
- Orthorhinus** *centurio*, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 884. — *cruciatus*, 1860, 883. — *cylindricus*, 1860, 884. — *lætus*, SAUNDERS et JEKEL, Descr. de quelques Curculionides, 1855, 297. — *Leseleuci*, 1855, 298. — *variegatus*, 1855, 300.
- Orthosoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 155. — *cylindricum*, 1835, 156.

**Orthostoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 61. — *abdominalis*, 1834, 62.

**Orthotrichus**, PEYRON, Descr. de Col. d'Orient, 1856, 717. — *cymindoides*, 1856, 719.

**Oryctes**, A. DEYROLLE, Indiv. de Chine présentant deux gibbosités aux élytres, 1846, LXIV. — *id.*, FAIRMAIRE, Commun. d'un indiv. hydrocéphale, 1857, XXI. — *id.*, COQUEREL, Obs. entom. recueillies à Madagascar, 1855, 167. — *Abderus*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 14. — *Agamemnon*, *Augias*, 1859, 15. — *Bacchus*, 1859, 13. — *Chevrolatii*, COQUEREL, 1852, 374. — *colonicus*, 1852, 371. — *Corydon*, *Dionysius*, REICHE, 1859, 13. — *Erebus*, 1859, 15. — *Grypus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ins. qui attaquent l'olivier, 1840, 103. — *id.*, AUBÉ, Ne vit pas aux dépens de l'olivier, 1840, II. — *insularis*, COQUEREL, 1852, 372. — *madagascariensis*, 1852, 374. — *monoceros*, REICHE, 1859, 15. — *Montrouzieri*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 276. — *nasicornis*, AUDOUIN, Indiv. ayant trois jambes entées sur une seule cuisse, 1834, IV. — *Orion*, REICHE, 1859, 15. — *ovariensis*, 1859, 16. — *Radama*, COQUEREL, 1852, 366. — *Ranavalo*, 1852, 368. — *senegalensis*, REICHE, 1859, 15. — *Silenus*, 1859, 13. — *id.*, BUQUET, Indiv. monstrueux, 1841, XXXVIII. — *id.*, LABOULBÈNE, Monstruosité, 1859, 645. — *simiar*, COQUEREL, 1852, 369. — *id.*, Larve de cette esp., 1855, 174. — *Stentor*, 1852, 374. — *tarandus*, 1852, 374. — *id.*, REICHE, 1859, 15.

**Oryotus** *Schmidtii*, KRAATZ, Des grottes de Carniole, 1858, LXXXIX.

**Osmoderma** *cremita*, BAYLE, Cas particulier de monstruosité, 1851, LXXXII. — *id.*, DE BARAN, 1853, LI. — *rugosa*, SCHAU, Lamell., mérit., 1844, 397. — *scabra*, 1849, 289.

**Osorius** *cornutus*, DE LAPORTE, 1832, 395. — *incisicrurus*, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. recueillis à Madagascar, 1848, 180.

**Othius**, FAIRMAIRE, Env. de Paris, dans un hêtre pourri, 1846, LV.

**Otlocephalus**, CHEVROLAT, Monogr. du genre, 1832, 98 et 442. — *americanus*, 1832, 105. — *flavipennis*, 1832, 106. — *formicarius*, 1832, 108. — *mexicanus*, 1832, 102. — *myrmecodes*, Errata, 1832, 445. — *pilosus*, 1832, 104. — *Poei*, 1832, 107.

**Otiorhynchus** *amplipennis*, FAIRMAIRE, Diagnoses de Col. européens, 1859, CLXXXV. — *armadillo*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 106.

— *artensis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 879. — *atropterus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *europunctatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 634. — *bicostatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 690. — *bisphæricus*, 1857, 692. — *caudatus*, GHILIANI, 1847, 114. — *corsicus*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Corse, 1859, 280. — *cypricola*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 688. — *corsicus*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Corse, 1859, 280. — *cribratus*, CHEVROLAT, Reçu précédemment sous le nom d'*O. fussii*, 1859, VI. — *cupreosparsus*, FAIRMAIRE, Diagnoses de deux Col. d'Europe, 1859, CL. — *fuscipes*, GHILIANI, 1847, 117. — *id.*, FAIRMAIRE, pris auprès d'Orléans, 1848, XXXVI. — *Ghilianii*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 540. — *graniger*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 694. — *guttula*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Corse, 1859, 281. — *humilis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 731. — *impoticus*, KIESENWETTER, 1851, 638. — *impressiventris*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 60. — *lanuginosus*, CHEVROLAT, Le même que l'*O. insubricus*, nom plus ancien, 1859, V. — *Macquartii*, FALDERMANN, Notice sur ses mœurs, 1837, LXX. — *meridionalis*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ins. nuisible à l'olivier, 1840, 107. — *meridionalis*, *monticola*, *navaricus*, KIESENWETTER, 1851, 638. — *nitidus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 690. — *obscurus*, GHILIANI, 1847, 127. — *ovatus*, KIESENWETTER, 1851, 638. — *id.*, LABOULBÈNE, Fruits de l'*Ophris nidus* avis perforé par cet Ins., 1853, XLVIII. — *planidorsis*, FAIRMAIRE, 1856, 541. — *platypennis*, MONTROUZIER, 1860, 881. — *populeti*, CHEVROLAT, Répandu par Dahl sous le nom de *Lob. granatus*, 1859, VI. — *pulverulentus* et var. *geniculatus*, GHILIANI, 1847, 106. — *pyrenæus*, KIESENWETTER, 1851, 637. — *raucus*, ROUZET, Feuilles de poirier entièrement rongées par cet Ins., 1852, XXXIV. — *Raymondi*, GAUTIER DES COTTES, Descr. d'un Curculionite nouv. de la faune française, 1860, CXII. — *id.*, AUBÉ, Obs. sur la public. de ce travail, 1860, CXIII. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Réponse à l'obs. de M. Aubé, 1860, CXIV. — *rufipes*, KIESENWETTER, 1851, 638. — *stricticollis*, FAIRMAIRE, Diagnoses de Col. nouv., 1859, CLXIV. — *sulphureus*, GHILIANI, 1847, 110.

**Oxilus**, BRUNET, Mém. sur deux nouv. genres de Longicornes, 1859, 619.  
— *terminatus*, 1859, 620.

**Oxyera**, SOLIER, Aystropides, 1835, 254. — *blapsoides*, 1835, 255.



- Oxychella** *affinis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 234.  
 — *aquatica*, REICHE, Rappel de la faculté de marcher sur l'eau, 1849, LXIII. — *arrogans*, MONTROUZIER, 1860, 233. — *pulchella*, 1860, 234.
- Oxychelide**, THOMPSON, Commun. d'une superbe esp. de l'Amérique méridionale, 1856, LIX.
- Oxycorynus**, CHEVROLAT, Monogr. de deux nouv. genres de Curculionites, 1832, 212. — *melanocerus*, *melanops*, 1832, 214.
- Oxylœmus** *cæsus*, BOIELDIEU et FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Saint-Germain, 1851, LIII. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rare aux env. de Paris, 1859, CXXXII.
- Oxymerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 50. — *basilis*, *rivulosus*, 1834, 51.
- Oxypeltus** *4-spinosus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 486.
- Oxypoda** *analisis*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 563. — *angusta*, AUBÉ, Descr. de Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 310. — *corticina*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 411. — *elongatula*, AUBÉ, 1850, 309. — *forticornis*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 37. — *fuliginosa*, AUBÉ, 1850, 310. — *helvola*, *opaca*, KIESENWETTER, 1851, 411. — *nitidiventris*, *planipennis*, FAIRMAIRE, Esp. rares en France, 1857, LII. — *planipennis*, Miscell. entom., 1859, 37. — *prolixa*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 420. — *riparia*, FAIRMAIRE, 1859, 38. — *rugatipennis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI. — *vittata*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV.
- Oxyporus** *maxillosus*, CHEVROLAT et AUBÉ, trouvé à Compiègne, 1850, XXXIV et 1852, XXXI.
- Oxysternus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 164. — *id.*, DE MARSEUL, Histerides, 1853, 220. — *crassus*, LATREILLE, 1834, 164. — *maximus*, DE MARSEUL, 1853, 223. — *nigripennis*, *rufus*, LATREILLE, 1834, 164.
- Oxystomus**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 669.
- Oxytelus** *complanatus*, *inustus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 427. — *inustus*, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 433. — *nitidulus*, KIESENWETTER, 1851, 427. — *piceus*,

*rugosus*, PEYRON, 1858, 433. — *rugosus, sculpturatus*, KIESENNWETTER, 1854, 427. — *sculpturatus, sculptus*, PEYRON, 1858, 433.

● **Oxythyrea** *Abigail*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 372. — *adpersa*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 267. — *æneicollis*, 1844, 409. — *albopicta*, MOTSCHULSKY, C'est la même esp. que la *Noemi* Reiche, 1859, CCVI. — *id.*, REICHE, Réponse, 1859, CCVIII. — *id.*, MOTSCHULSKY, Maintient son opinion, 1860, XCII. — *id.*, REICHE, même réponse, 1860, XCIII. — *id.*, LUCAS, Rapport sur cette controverse, 1860, C. — *amabilis*, SCHAUM, 1844, 408. — *id.*, COQUEREL, Obs. recueillies à Madagascar, 1848, 280. — *amina*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 448. — *cincticollis*, SCHAUM, 1844, 287. — *Clouei*, COQUEREL, 1852, 379. — *costata*, LUCAS, Note sur qqes Col., 1858, CLXXVIII. — *deserticola*, Esp. du Sahara algérien, 1857, LVI. — *hæmorrhoidalis*, SCHAUM, 1849, 267. — *Helenæ*, 1849, 287. — *Noemi*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 371. — (Voyez *Oxyth. albopicta*), *Perroudii*, SCHAUM, 1844, 410. — *septicollis*, 1849, 287. — *stictica*, 1849, 267.

● **Oodes**, AUD-SERVILLE, Longicornes, 1834, 98. — *nodicollis*, 1834, 99.

● **Orema**, BUQUET, provenant de Guinée, 1848, XXI. — *cyanoptera*, THOMSON, Descr. de qqes Col., 1860, 330. — *cyanipennis*, CHEVROLAT, Synonymie de qqes Ins., 1856, cv.

## P.

**Pachnophorus** *arenarius*, PAUL LAMBERT, Deux indiv. pris aux env. de Grécy, 1851, CXVII. — *cylindricus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734.

**Pachnoda** *albinigra*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 287. — *arborescens*, 1844, 388 et 1849, 282. — *aulica*, 1849, 282. — *carmelita*, 1849, 279. — *cincta*, 1844, 384. — *crassa*, 1849, 287. — *fasciata*, 1844, 386. — *fimbriata*, 1844, 385 et 1849, 280. — *flaviventris*, *histrion*, 1844, 388 et 414. — *intermedia*, *laticincta*, 1849, 287. — *leucomelana*, 1849, 282. — *limbata*, 1844, 388 et 1849, 281. — *mar-*

*ginata*, 1844, 385, 1849, 279 et 285. — *monacha*, 1844, 384. — *obsoleta*, 1849, 280. — *olivacea*, 1844, 387 et 1849, 280. — *postica*, 1844, 385, et 1849, 280. — *semipunctata*, 1844, 388. — *sobrina*, 1849, 282.

**Pachybrachys** SUFFRIAN, Esp. européenne du genre *Cryptocephalus*, 1850, 292. — *azureus*, 1850, 293. — *cinctus*, 1850, 594. — *fimbriolatus*, 1850, 296. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 653. — *fulvipes*, SUFFRIAN, 1850, 297. — *hippophæa*, 1850, 294. — *histrio*, 1850, 295. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *hieroglyphicus*, SUFFRIAN, 1850, 294. — *limbatus*, 1850, 296. — *lineolatus*, 1850, 294. — *maculatus*, 1850, 295. — *pallidulus*, KIESENWETTER, 1851, 652. — *piceus*, SUFFRIAN, 1850, 293. — *scripticollis*, 1850, 294. — *scriptus*, 1850, 293. — *tauricus*, 1850, 295. — *viridissimus*, 1850, 293.

**Pachycarus**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditonus*, 1834, 666 et 669. — *aculeatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 590. — *Chaudoirii*, 1855, 592, et 1858, 58. — *cæruleus*, SOLIER, 1834, 667. — *Latreillei*, 1834, 667.

**Pachycerus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 291. — *alboguttatus*, FAIRMAIRE, L'auteur a décrit sous ce nom le *P. tessellatus* de M. Lucas, 1855, x. — *domesticus*, MONTROUZIER, 1860, 292. — *Menetriesi*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 547. — *segnis*, 1856, 547. — *tessellatus*, LUCAS, Communic. d'un indiv. pris en Algérie, 1855, x. — *varius*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 134.

**Pachychila**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 134. — *frioli*, 1835, 301. — *Germari*, 1835, 302. — *hispanica*, 1835, 292. — *impressifrons*, 1835, 299. — *Kunzei*, 1835, 298. — *nitens*, 1835, 293. — *pedinoides*, 1835, 294. — *4-collis*, REICHE, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 729. — *Salzmanni*, SOLIER, 1835, 297. — *Steveni*, 1835, 296. — *subcylindrica*, 1835, 300. — *subovata*, 1835, 291. — *sulcifrons*, 1835, 295. — *tripoliana*, 1835, 303.

**Pachycærus**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 448. — *amethystinus*, 1853, 455. — *Bocandei*, 1853, 456. — *chalybæus*, 1853, 453. — *cyanescens*, 1853, 458. — *cyanipennis*, 1853, 460. — *desidiosus*, 1853, 457. — *histeroides*, 1853, 454. — *jucundus*, 1853, 459. — *viridis*, 1853, 452.

**Pachydema**, LUCAS, Controverse synonymique, 1859, 445. — *id.*, SCHAUM, Réponse à M. Lucas, 1859, CCLII. — *id.*, REICHE, Réponse à la note de M. Schaum, 1859, CCLVII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, recueillis en Algérie, 1857, XVIII. — *anthracina*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 420. — *carthaginensis*, 1860, 423. — *Delesserti*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 376, et 1858, 59. — *Doursii*, LUCAS, Diagnoses de trois nouv. esp., 1859, XXX. — *id.*, Descr. de plusieurs esp., 1859, 459. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 422. — *emarginata*, 1860, 424. — *foveola*, LUCAS, 1859, 455. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 421. — *hirticollis*, 1860, 422. — *id.*, REICHE, Note sur divers Col., 1859, 642. — *Hornbeckii*, LUCAS, 1859, 452 et XXX. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 420. — *immaturata*, 1860, 422. — *Lethierryi*, LUCAS, Descr. d'un nouv. Lamellicorne d'Algérie, 1860, XCVII. — *nigricans*, REICHE, Notes entom., 1859, 642. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 419. — *Reichei*, REICHE et DE SAULCY, 1856, 380. — *rubripennis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 421. — *Saulcyi*, REICHE, Col. d'Orient, 1856, 378, et 1858, 59. — *spretta*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 419. — *unicolor*, 1860, 422. — *Valdani*, LUCAS, 1859, XXI et 457. — *Valdani*, *Wagneri*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 421.

**Pachyderes ruficollis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 149.

**Pachylopus**, DE MARSEUL, Histerides, 1856, 97. — *dispar*, 1856, 100. — *gaudens*, 1856, 103. — *serrulatus*, 1856, 102. — *sulcifrons*, 1856, 101.

**Pachylus dispar**, REICHE, C'est le *Pach. serrulatus* de la coll. Dejean, 1859, 5.

**Pachynotelus**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 367. — *albiventris*, 1840, 368.

**Pachypus candidæ**, GAUTIER DES COTTES, Obs. sur divers Col. propres à la Corse, 1860, LIV. — *cornutus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Remarques sur qqes Col. de Corse, 1860, LXXXII. — *excavatus*, FEISTHAMEL, Note sur cet Ins., 1837, 257.

**Pachyrhynchus aspersus**, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 887. — *Mac-Gilivirayi*, 1860, 876.

**Pachyseelis**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 54. — *clavaria*, 1836, 59. — *crinita*, 1836, 61. — *depressa*, 1836, 57. — *granulosa*, 1836, 60. —

*hirtella*, 1836, 62. — *obscura*, 1836, 65. — *ordinata*, 1836, 58. — *porphyrea*, 1836, 65. — *4-collis*, 1836, 63. — *tenebrosa*, 1836, 60.

**Pachyschelus**, SOLIER, Buprestides, 1833, 313. — *scutellatus*, 1833, 314.

**Pachysoma**, REICHE, Coprophages, 1842, 87. — *Æsculapius*, 1842, 89. — *Hyppocrates*, *striatum*, 1842, 91.

**Pachystola** *texata*, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp. de Col., 1858, 321.

**Pachyta**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 213. — *clatharta*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 138. — *collaris*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, AUD.-SERVILLE, 1835, 215. — *interrogationis* Lamed, GHILIANI, 1847, 138. — *8-maculata*, F. DE BEAUREGARD, prise dans la forêt de Compiègne, 1852, XXXVIII. — *punctipennis*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 664. — *4-maculata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 214. — *id.*, GHILIANI, 1847, 138. — *Servillei*, AUD.-SERVILLE, 1835, 214. — *strigilata*, *trifasciata*, GHILIANI, 1847, 138. — *virginea*, AUD.-SERVILLE, 1835, 215. — *id.*, GHILIANI, 1847, 138.

**Pachyteria**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 553. — *fasciata*, 1833, 554.

**Pachytes**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 244. — *elegans*, 1860, 245.

**Pachytus** *excavatus*, FEISTHAMEL, Notice sur cet Ins., 1837, 257.

**Pæclius** *janthinus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96.

**Pæderus** *Baudii*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. européens, 1859, CLXXXIV. — *brevipennis*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *geniculatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 430. *limnophilus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 423. — *longicornis*, AUBÉ, Descr. de qqes Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 319. — *longipennis*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 430. — *lusitanicus*, AUBÉ, Notes sur qqes Col. nouv., 1842, 236. — *melanurus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 100. — *riparius*, *ruficollis*, KIESENWETTER, 1851, 423.

**PALPICORNES**, LEPRIEUR, Esp. trouvées dans les env. de Bone, 1853, LVIII.

**Panagæus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 223. — *armatus*, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 391. — *eximius*, SONNER, Descr. d'une nouv. esp. du groupe des Carabiques Patellimanes, 1852, 653. — *myops*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 213. — *panamensis*, DE LA FERTÉ, 1851, 223. — *Peronii*, GIRARD, Du voyage de Péron, 1857, CLV. — *4-maculatus*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *4-pustulatus*, DOUË, Plusieurs indiv. trouvés au bois de Boulogne, 1852, XXV. — *regalis*, GORY, 1833, 213. — *Thomæ*, SCHAUM, Qques obs. sur le groupe des Panagéites, 1853, 441. — *vicinus*, GORY, 1833, 214.

**PANAGÉIDES**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 214. — *id.*, SCHAUM, Qques obs. sur ce groupe, 1853, 429. — *id.*, Liste des *Panagæus* non mentionnés dans le mémoire de M. de la Ferté, 1853, 433.

**Pandarinus** *cætatus*, *piceus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 254.

**Pandarus** *tristis*, AZAMBRE, trouvé à Civita-Vecchia, 1856, XIII.

**Pantheropterus**, THOMSON, Descr. de Col. nouv. ou peu connus, 1856, 323. — *Pfeifferii*, 1856, 323.

**Pantella** *ebenina*, *rubrofasciata*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 415.

**Parachilla** *Bufo*, *Leroyi*, COQUEREL, Note sur qques Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 240. — *menalocola*, 1859, 239.

**Paramecosoma** *abietis*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 633.

**Parandra**, BUQUET, Longicorne nouv. et monstrueux de Colombie, 1840, XXIX. — *Lherminieri*, FAIRMAIRE, Larves et nymphes recueillies à la Guadeloupe, 1856, LXXXV.

**Parmena**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 98. — *algorica*, RAMBUR, Larve recueillie en Espagne et éclore deux ans après, 1838, VII. — *id.*, LUCAS, sorti de morceaux de bois rapportés d'Algérie, 1843, XXIV. — *id.*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 548. — *Dahlîi*, LABOULBÈNE, trouvé dans un herbier de plantes du royaume de Grenade, 1852, LXII. — *pilosa*, AUD.-SERVILLE, 1835, 100. — *id.*, SOLIER, Descr. dans tous ses états, 1835, 123. — *unifasciata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 107.

**Parnus** *griscus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 688. — *hydrobates*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne,

1851, 585. — *luridus, lutulentus*, 1851, 584. — *nitidulus*, FAIRMAIRE, 1852, 683. — *prolifericornis*, KIESENWETTER, 1851, 584. — *puberulus*, REICHE et DE SAULCY, Col. du Piémont, 1856, 368, et 1858, 59. — *striatellus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 46.

**Paromalus**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 100. — *æqualis*, 1855, 108. — *affinis*, 1855, 107. — *bistriatus*, 1855, 114. — *complanatus*, 1855, 109. — *convexus*, 1855, 118. — *didymus*, 1855, 111. — *exiguus*, 1855, 121. — *flavicornis*, 1855, 117. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 91. — *infimus*, DE MARSEUL, 1855, 112. — *minimus*, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 322. — *oceanitis*, DE MARSEUL, 1855, 110. — *opuntiae*, 1855, 100. — *parallelepipedus*, 1855, 116. — *productus*, 1855, 113. — *Rouzeti*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv. d'Europe et de France, 1859, 421. — *seminulum*, DE MARSEUL, 1855, 120.

**Paromia dorcoides**, REICHE, Notes entom., 1853, 425.

**Pasimachus**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 669.

**Passalus**, LHERMINIER. Habitent les bois pourris ainsi que leurs larves, 1857, 504. — *id.*, MOCQUERYS, Bruit causé par le frottement des derniers anneaux de l'abdomen contre les élytres, 1844, LXIII. — *fuscicornis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 288. — *Goryi*, THOMSON, Amérique méridionale, 1858, xxxviii.

**PASSANDRIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette famille, 1857, 101.

**PATELLIMANES**, DE LA FERTÉ, Révision de cette tribu, 1851, 209.

**Patrobus Napoleonis**, REICHE, Descr. sommaire d'Ins. de l'expéd. aux mers arctiques, 1857, VIII. — *punctatissimus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 782. — *rufipennis*, FAIRMAIRE, Reçu des Pyrénées orientales, 1856, LXXXI. — *rufipes*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 88. — *septentrionis*, GAUTIER DES COTTES, Remarques sur divers Col. propres à la France, 1858, LXVIII.

**PAUSSIDÆ**, AUDOUIN, Note sur un travail de M. Westwood, 1833, XLIV. — *id.*, BURMEISTER, Extrait d'obs. sur les affinités naturelles de cette famille, 1841, xxxi.

**Pausus Favieri**, FAIRMAIRE, Descr. d'une nouv. esp. de Col., 1851, cx. — *id.*, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 76. — *id.*, trouvé aux env. de Tanger, 1852, xxxv. — *id.*, trouvé en Espagne par M. Dohrn, 1852, LXXIII. — *id.*, COQUEREL, Communic. de

plusieurs esp. des env. de Mers-el-Kébir, 1857, 1857, XXXIII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 149. — *id.*, DELAROUZÉE, Note sur cette esp. trouvée à Collioure, 1860, XLVI. — *Olcesii*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 149. — *turcicus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 417.

**PECTINICORNES**, REICHE, Notes synonymiques sur les esp. décrites par M. Burmeister, 1853, 67.

**Pedaria nigra**, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connus d'Ins., 1832, 403.

**Pediacus costipennis**, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 78. — *id.*, Rencontré dans les env. d'Hyères, 1859, CX. — *depressus*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII.

**Pedius femoralis**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470.

**Pelargoderus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 72. — *vittatus*, 1835, 73.

**Pelecopselaphus**, SOLIER, Buprestides, 1833, 286. — *angularis, depressa*, 1833, 287.

**Pelecyphorus**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 467. — *asidoides*, 1836, 471. — *capensis*, 1836, 473. — *foveolatus*, 1836, 472. — *mexicanus*, 1836, 469.

**Pelidnota lucida**, DOUÉ, Élytres à dissemblances remarquables, 1848, IV.

**Pelobius Hermannii**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 784.

**Pelorurus**, DE MARSEUL, Nom substitué à celui de *Pelorus*, 1857, 494.

**Pelorus**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 125. — *bruchoides*, 1855, 128.

**Peltis dentata**, FAIRMAIRE, Esp. nouv. pour la France, 1857, LII. — *ferruginea*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 469. — *ferruginea, grossa*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 132. — *grossa*, FAIRMAIRE, reçue de Sicile, 1852, LXIII. — *oblonga*, CHEVROLAT, 1833, 469.



**Peltoides** DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 401. — *cayennensis*, 1832, 402. — *senegalensis*, 1832, 401.

**Pentodon** *algerinus*, *aries*, *monodon*, *punctatus*, *puncticollis*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 8 et 9. — *puncticollis*, SCHAU, Il combat l'adoption du nom de Herbst, 1859, CCLIII. — *id.*, REICHE, Réponse, 1859, CCLVI.

**Pentaphyllus** *testaceus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI.

**Pentarthrum** *Huttoni*, Miscell. entom., 1857, 743.

**Pereus** *corsicus*, *loricatus*, GAUTIER DES COTTES, Obs. sur divers Col. de Corse, 1860, LIV. — *loricatus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Remarque sur qqes Col. de Corse, 1860, LXXXII. — *Ramburi*, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 394. — *Ramburi*, *Reichei*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, LXXXII.

**Pericallus** *bicornis*, *cornutus*, *furcatus*, *inermis*, *ligneus*, *suturalis*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 148.

**Peritelus** *adusticornis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 635. — *flavipennis*, JACQ. DU VAL, Descr. de genres et d'esp. nouv. de Col. de France, 1852, 713 et 731. — *Marqueti*, GAUTIER DES COTTES, Descr. de 2 esp. nouv., 1857, CXXXVI. — *necessarius*, KIESENWETTER, 1851, 637. — *prolixus*, 1851, 636. — *rusticus*, *senex*, 1851, 637.

**Peronomerus** *fumatus*, SCHAU, Obs. sur les Panagéites, 1853, 440.

**Perotis**, SPINOLA, Lettre sur un genre de Buprestides, 1837, 110. — *Buquetii*, 1837, 112. — *cupræa*, 1837, 110. — *lugubris*, *striata*, *unicolor*, 1837, 111.

**Peryphus** *ataxensis*, GAUBIL, Présenté comme esp. nouv., 1852, VII. — *concinus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679. — *eques*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *nivalis*, GAUBIL, 1852, VII. — *tricolor*, DUPONCHEL, 1834, 287. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 140.

**Phacellus** *Cuvieri*, BUQUET, Nouv. esp. du Brésil, 1850, LVII.

**Phacodes** *lentiginosus*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 660.

**Phædinus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 38. — *Cumingii*.

H. DEYROLLE, Communic. de ce Goliathide, 1860, XXII. — *tricolor*, AUD.-SERVILLE, 1834, 39.

**Phædon salicinum, tumidulum**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 655.

**Phænicorus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 28. — *costicollis*, *Dejeanii*, *Fabricii*, *rotundicollis*, 1834, 29.

**Phænopis** (voyez *Melanophila*), *appendiculata*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90. — *decastigma*, 1847, 103. — *tarda*, 1847, 140.

**Phalacrus caricis, corruscus**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *grossus*, FAIRMAIRE, AUX env. de Madrid, 1849, LXII. — *liquidus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 725. — *maximus*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 77.

**Phaleria cadaverina**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *id.*, major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV. — *convexa*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 300. — *hemisphærica*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729. — *nigriceps*, LUCAS, Communic. de cette esp., 1854, XXXII.

**Phænissus**, AUBÉ, Révision de la famille des Psélapiens, 1844, 94. — *Reichenbachii*, 1844, 95.

**PHANEROGLOSSES**, SOLIER, Collaptérides, 1834, 502, et 1838, 5.

**Phæneus carnifex**, DE CASTELNAU, Obs. entom., 1842, XII.

**Phantasomerus**, JACQ DU VAL, Phrases diagnostiques, 1854, XXXVII. — *id.*, Remarques et notes diverses, 1857, 97. — *æneiceps*, Phrases diagnostiques, 1854, XXXVIII.

**Phellister**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 462. — *acoposternus*, 1853, 475. — *bipulvinatus*, 1853, 484. — *bovinus*, 1853, 474. — *brevis-trius*, 1853, 485. — *circulifrons*, 1853, 473. — *cumanensis*, 1853, 470. — *egenus*, 1853, 480. — *globiformis*, 1853, 483. — *hæmorrhous*, 1853, 476. — *parvulus*, 1853, 486. — *pusio*, 1853, 472. — *4-punctatus*, 1853, 471. — *Rouzeti*, 1853, 488. — *rubens*, 1853, 477. — *sanguinipennis*, 1853, 481. — *subrotundus*, 1853, 487. — *Teapensis*, 1853, 482. — *venustus*, 1853, 468. — *vernus*, 1853, 478. — *violaceus*, 1853, 469.

**Phengodes**, DE LAPORTE, Essai d'une révision du genre *Lampyris*, 1833, 128. — *flavicollis*, *plumosa*, 1833, 128.

**Pheropsophus**, SOLIER, Obs. sur les genres *Brachinus* et *Aptinus*, 1833, 461. — *africanus*, *complanatus*, *equestris*, *Goudotii*, *Jurinei*, *litigiosus*, 1833, 462. — *maculatus*, DE CHAUDOIR, Descr. de Carabiques nouv., 1835, 440. — *madagascariensis*, *parallelus*, *senegalensis*, SOLIER, 1833, 462. — *senegalensis*, Nouv. obs., 1834, 655.

**Phlax gibbus**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *plicatus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 546.

**Philetus populi**, CHEVROLAT, trouvé dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII.

**Phileurus affinis**, *foveicollis*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 13. — *integer*, 1859, 13. — *valgus*, FAIRMAIRE, Larves et nymphe recueillies à la Guadeloupe, 1856, LXXXV. — *valgus*, *vervex*, REICHE, 1859, 12.

**Philhydrus**, SOLIER, Obs. sur les Hydrophyliens, 1834, 315. — *dilutus*, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 403. — *griseus*, *lividus*, SOLIER, 1834, 316. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 786. — *marginellus*, *melanocephalus*, *nigritus*, SOLIER, 1834, 316.

**Philonthus æneus**, *ærosus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 416. — *affinis*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96. — *aterrimus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 427. — *aterrimus*, *bipustulatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *bipustulatus*, PEYRON, 1858, 425. — *cicatricosus*, FAIRMAIRE, trouvé à Marseille, 1857, 718. — *corruscus*, PEYRON, 1858, 425. — *cribratus*, LEPRIEUR, env. de Bone, 1853, LX. — *debilis*, PEYRON, 1858, 425. — *dimidiatipennis*, KIESENWETTER, 1851, 417. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 723. — *discoideus*, PEYRON, 1858, 426. — *ebeninus*, 1858, 425. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 417. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *elongatus*, KIESENWETTER, 1851, 418. — *flum*, 1851, 417. — *finetarius*, 1851, 416. — *fulvipes*, 1851, 417. — *id.*, PEYRON, 1858, 427. — *fumigatus*, 1858, 425. — *intermedius*, FAIRMAIRE, 1852, 681. — *juvenilis*, PEYRON, 1858, 426. — *lævicollis*, KIESENWETTER, 1851, 414. — *micans*, PEYRON, 1858, 426. — *nigrita*, FAIRMAIRE, 1852, 681. — *nitidus*, KIESENWETTER, 1851, 416. — *orbis*, 1851, 418. — *palustris*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE,

Descr. d'esp. nouv. françaises, 1859, CCXXXII. — *parumpunctatus*, *politus*, FAIRMAIRE, 1852, 681. — *id.*, PEYRON, 1858, 425. — *procerulus*, *proli.rus*, KIESENWETTER, 1851, 418. — *pruinus*, 1851, 417. — *id.*, PEYRON, 1858, 427. — *id.*, LEPRIEUR, 1853, LX. — *punctus*, FAIRMAIRE, 1852, 681. — *id.*, PEYRON, 1858, 427. — *pyrenæus*, KIESENWETTER, 1851, 414. — *quisquiliarius*, PEYRON, 1858, 426. — *quisquiliarius*, *rubidus*, KIESENWETTER, 1851, 417. — *rubidus*, PEYRON, 1858, 426. — *rufimanus*, *salinus*, *sericeus*, *sordidus*, KIESENWETTER, 1851, 417. — *splendens*, 1851, 414. — *strangulatus*, PEYRON, 1858, 425. — *thermarum*, AUBÉ, Descr. de Col. nouv. de l'Europe et de l'Algérie, 1850, 316. — *Truquii*, PEYRON, 1858, 427. — *varians*, *ventralis*, 1858, 425. — *vernalis*, 1858, 426. — *vittatus*, REICHE, 1852, 96. — *xantholoma*, KIESENWETTER, 1851, 416. — *id.*, LEPRIEUR, 1853, LX. — *id.*, FAIRMAIRE 1852. 681. — *id.*, PEYRON, 1858, 425.

**Philorhinum** *pallidicorne*, FAIRMAIRE, Diagnoses de nouv. esp., 1860, 629.

**Philothermus**, AUBÉ, Note sur une nouv. esp. de Col. tétramères, 1843, 93. — *Montandoni*, 1843, 94. — *id.*, ROUZET, Note sur deux esp. de la faune parisienne, 1848, XIII.

**Phlæonæus** *cætatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 427.

**Phlæophagus** *depressus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 912. — *nitidulus*, 1860, 94. — *rufipennis*, 1860, 912.

**Phlæopora** *corticalis*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 560 — *rep-tans*, 1853, 557.

**Phlæozeteus**, PEYRON, Descr. de deux genres et de quatre Col. d'Orient, 1856, 715. — *id.*, SCHAU, Note sur ce genre, 1860, 633. — *id.*, REICHE, Réponse à la note de M. Schaum, 1860, 640. — *id.*, Note relative à ce genre, 1859, CXLIII. — *id.*, SCHAU. — Obs. relative à des Mém. insérés dans les Annales, 1859, CCLI. — *id.*, REICHE, rép. à M. Schaum, 1859, CCLV. — *plagiatus*, PEYRON, 1856, 717.

**Phloiophilus** *Edwardsii*, AUBÉ, trouvé près de Compiègne, 1852, XXV.

**Phlotribus** *oleæ*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ins. qui attaquent l'olivier, 1840, 106.

**Pholeuon**, FAIRMAIRE, pris en grand nombre dans les grottes de l'Ariège, 1859, CXXXIX. — *leptoderum*, KRAATZ, des grottes de Hongrie, 1858, LXXXIX.

**Pholldotus Dejeanii**, BUQUET, Présentation des deux sexes et descr., 1841, XXI.

**Phoracantha semipunctata**, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Bancks, 1851, 659.

**Phosphænus hemipterus**, DE LAPORTE, genre *Lampyris*, 1833, 138 et 139.

**Photinus**, DE LAPORTE, genre *Lampyris*, 1833, 140. — *bicolor*, 1833, 143. — *blattoides*, 1833, 144. — *caliginosus*, *corruscus*, 1833, 142. *diaphanus*, 1833, 141. — *discoidalis*, 1833, 144. — *discoideus*, 1833, 142. — *fenestratus*, 1833, 143. — *filicornis*, *fulgidus*, 1833, 142. — *giganteus*, 1833, 141. — *glaucus*, 1833, 142. — *guttulus*, 1833, 143. — *hespera*, 1833, 146. — *ignitus*, 1833, 145. — *lateralis*, 1833, 146. — *laticornis*, 1833, 144. — *linearis*, 1833, 142. — *lividus*, 1833, 144. — *lucidus*, 1833, 141. — *luniferus*, 1833, 142. — *lycoides*, 1833, 145. — *maculatus*, *maculosus*, 1833, 146. — *marginatus*, 1833, 142. — *nitens*, 1833, 146. — *obscurus*, 1833, 142. — *occidentalis*, 1833, 144. — *Olivieri*, 1833, 141. — *pallidus*, 1833, 145. — *pectinatus*, *pennsylvanicus*, 1833, 144. — *pyralis*, 1833, 141. — *rufus*, 1833, 142. — *Savignyi*, *thoracicus*, 1833, 143. — *truncatus*, 1833, 142. — *vittatus*, *vittigerus*, 1833, 141.

**Phoxomela abrupta**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 407. — *umbrosa*, 1849, 265.

**PHRÉPATIDES**, SOLIER, Div. des Col. hétéromères, 1834, 488.

**Phthora crenata**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 351.

**Phyllobius calcaratus**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *lateralis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 682. — *oblongus*, AUBÉ, Moyen appliqué par M. de Waga pour préserver les arbres fruitiers, 1839, VIII. — *sinuatus*, FAIRMAIRE, 1852, 685. — *thalassinus*, *xanthocnemus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 634.

**Phyllobothris 4-maculatus**, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Sénart, 1848, XLIV.

**Phyllocerus**, SPINOLA, Note sur l'esp. de Sicile, 1838, xli. — *fulvipennis*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 165.

**Phylloma**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 191, et 1868, 583. — *bahianse*, 1860, 585. — *corticale*, 1853, 193. — *mandibulare*, 1853, 195. — *oblitum*, 1853, 194.

**Phyllopertha** *egyptiaca*, LUCAS, Indiv. trouvés à Bouçada (Algérie), 1854, l. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 445. — *deserticola*, LUCAS, Nouv. esp. d'Algérie, 1859, lII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 446. — *hirtella*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 375. — *horticola*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 341. — *lineolata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 445.

**Phyllotreta**, E. ALLARD, Altises d'Eur., 1860, 369. — *ærea*, Diagnoses de quelques Altises nouvelles, 1859, c. — *armoraciæ*, Monog., 1860, 378. — *atra*, 1860, 375. — *bimaculata*, 1859, c. et 1860, 381. — *brassicæ*, 1860, 386. — *corrugata*, 1860, 372. — *diademata*, 1860, 374. — *excisa*, 1860, 384. — *fullax*, 1860, 834. — *flexuosa*, 1860, 383. — *melæna*, 1860, 376. — *nemorum*, 1860, 379. — *nigripes*, 1860, 377. — *nodicornis*, 1860, 371. — *parallela*, 1860, 332. — *pæcilocerus*, 1860, 376. — *procera*, 1860, 378. — *punctulata*, 1860, 373. — *rufitarsis*, 1859, c., et 1860, 373. — *sinuata*, 1860, 383. — *tetrastigma*, 1860, 386. — *variipennis*, 1860, 385. — *vittula*, 1860, 380.

**Phymasterna** *cretacea*, COQUEREL, Obs. sur div. Ins. recueillis à Madag., 1852, 397. — *4-dentata*, 1852, 398.

**Phymatoderus** *bizonatus*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 510.

**Phymatodes** *thoracicus*, LUCAS, pris au vol au Jardin-des-Plantes, 1845, xliii.

**Physodactylus** *Henningii*, Serricornes, 1834, 165. — *id.*, FAIRMAIRE, communic. d'un envoi fait par M. Dohrn, 1853, xxxv.

**Physotherus**, GAY et SOLIER, Mém. sur deux genres de Curculionites du Chili, 1839, 22. — *id.*, AUD.-SERVILLE, Rectif. sur deux genres de Curculionites, 1839, l. — *Boyceri*, GAY et SOLIER, 1839, 27. — *Goureaui*, 1839, 26. — *lævirostris*, 1839, 25. — *Maillei*, 1839, 24.

**Phytæcia** *affinis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 140. — *Aumon-tiana*, LUCAS, Descr. d'une nouv. esp. des env. de Tlemcen, 1851, xli. — *Bethseba, croceipes*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 17. — *ephippium*, LAREYNIE, Détails intéressants, 1851, liv. — *humeralis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 17. — *Jezabel*, 1858, 13. — *molybdæna*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, cxxxii. — *nigricornis*, JAVET et DOÛÈ. trouvée à Compiègne, 1852, xxxi. — *orbicollis*, REICHE et DE SAULCY, 1858, 15. — *virescens*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 636.

**Phytobius** *velatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 636.

**Phytonomus** *cypris*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 679. — *fuscescens*, GOUREAU, Larve trouvée sur une feuille de menthe officinale, 1856, xviii. — *globosus*, FAIRMAIRE, Congrès de Grenoble, 1858, 879. — *lineatus*, FAIRMAIRE, pris auprès d'Orléans, 1848, xxxvi. — *maculipennis*, Descr. des esp. nouv. de Corse, 1859, 279. — *nigro-velutinus*, Miscell. entomol. 1859, 56. — *palumbarius*, REICHE, pris en grand nombre près de Charenton, 1851, xxxiii. — *rumicis*, GOUREAU, Note pour servir à son hist., 1844, 49.

**Phytosus** *balticus, nigriventris*, LEPRIEUR, trouvés aux env. de Bone, 1860, lxii. — *nigriventris*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 152. — *spinifer*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 412. — *id.*, SOUVERBIE, pris à La Teste, 1852, lxvii.

**Plestognathus** *Doüei* LUCAS, Nouv. esp. des env. de Tugurth, 1858, clxxxvii.

**Piezocera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 92. — *bivittata*, 1834, 93.

**Pimelia**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 76. — *id.*, FAIRMAIRE, Esp. d'Algérie ayant trois tibias de grandeur normale à la patte postérieure, 1849, lxxxii. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Esp. des oasis d'Ouargla, 1857, cxv. — *id.*, LUCAS, Esp. envoyées d'Alger et encore vivantes, 1850, xxiv. — *angulata*, SOLIER, 1836, 90. — *id.*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1855, lxxxvii. — *angulosa*, SOLIER, 1836, 91. — *angusticollis*, 1836, 163. — *arabica*, 1836, 126. — *arenacea*, 1836, 115. — *asperata*, 1836, 110. — *asperula*, 1836, 182. — *atlantis*, 1836, 139. — *bajula*, REICHE, trouvée en Palestine, 1856, xli. — *balcarica*, 1836, 111. — *barbara*, 1836, 106. — *Barthelmyi*, 1836, 350. — *bifur-*

*cata*, 1836, 157. — *bipunctata*, 1836, 174. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Indiv. encore vivant piqué à Toulon il y a plus d'un mois, 1847, XCIV. — *bætica*, SOLIER, 1836, 170. — *Boyeri*, 1836, 143. — *brevicollis*, 1836, 172. — *Buquetii*, LUCAS, Descr. de plusieurs Mélanosomes nouv. du nord de l'Afrique, 1858, CCXXI. — *capillata*, SOLIER, 1836, 194. — *carinata*, 1836, 97. — *id.*, LUCAS, pris en Algérie, 1850, LXII. — *cephalotes*, SOLIER, 1836, 119. — *comata*, 1836, 128. — *consobrina*, LUCAS, 1858, CCXX. — *coronata*, L. DUFOUR, Note sur l'habitat, 1858, XCV. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, des oasis d'Ouargla, 1857, CXV. — *crassipes*, SOLIER, 1836, 190. — *cribra*, 1836, 151. — *cribripennis*, 1836, 117. — *cylindrica*, 1836, 124. — *Dejeanii*, 1836, 132. — *denticulata*, 1836, 95. — *depilata*, 1836, 129. — *depressa*, 1836, 116. — *distincta*, 1836, 172. — *Duponti*, 1836, 146. — *exanthematica*, 1836, 183. — *gadium*, 1836, 169. — *Goryi*, 1836, 162. — *græca*, 1836, 181. — *grandis*, 1836, 133. — *granifera*, 1836, 147. — *granulata*, 1836, 103. — *hemisphærica*, 1836, 193. — *hesperica*, 1836, 167. — *hispanica*, 1836, 150. — *incerta*, 1836, 166. — *interjecta*, 1836, 152. — *interstitialis*, 1836, 605. — *intertuberculata*, LUCAS, 1858, CCXX. — *irrorata*, SOLIER, 1836, 99. — *latipes*, 1836, 109. — *Latreillei*, 1836, 93. — *liliputana*, LUCAS, Esp. du Sahara algérien, 1857, LVI. — *lineata*, SOLIER, 1836, 169. — *maura*, 1836, 137. — *mauritanica*, 1836, 139. — *Mittrri*, 1836, 134. — *monilifera*, 1836, 184. — *Montgeneti*, 1836, 177. — *nigropunctata*, LUCAS, Note des Col. d'Algérie, 1858, CLXXX. — *obesa*, SOLIER, 1836, 191. — *obsoleta*, 1836, 104. — *oxysterna*, 1836, 121. — *parallela*, 1836, 125. — *Parizet*, KLUG, C'est une des innombrables var. de la *cothurnata*?, 1833, XXIV. — *Payraudii*, SOLIER, 1836, 158. — *phymatodes*, 1836, 187. — *polita*, 1836, 176. — *punctata*, 1836, 148. — *radula*, 1836, 136. — *retrospinosa*, LUCAS, 1858, CLXXIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvée en l'oasis d'Ouargla (Algérie), 1859, CXCI. — *rotundata*, SOLIER, 1836, 149. — *rugulata*, 1836, 159. — *rugulosa*, 1836, 155. — *ruida*, 1836, 153. — *Ryssos*, 1836, 141. — *salebrosa*, 1836, 142. — *sardea*, 1836, 164. — *scabrosa*, 1836, 188. — *Schonherri*, 1836, 117. — *senegalensis*, 1836, 131. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1857, CXV. — *sericea*, 1836, 95. — *sericella*, 1836, 185. — *serricosta*, 1836, 102. — *Servillei*, 1836, 112. — *simpler*, 1836, 123. — *subglobosa*, 1836, 179. — *sublævigata*, 1836, 154. — *subquadrata*, 1836, 153. — *subscabra*, 1836, 160. — *tenuicornis*, 1836, 100. — *tuberculifera*, LUCAS, Descr. de plusieurs Mélanosomes de l'Afrique, 1858, CCXXI. — *undulata*, SOLIER, 1836.



161. — *Valdani*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. d'esp. nouv. de l'Algérie, 1859, CLXXXVII. — *variolosa*, SOLIER, 1836, 130. — *verruculifera*, 1836, 180. — *vestita*, 1836, 98.

**PINÉLITES**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 5.

**Pissodes** *araliæ*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv. Caléd., 1860, 886. — *notatus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 474. — *id.*, AUDOUIN, Mesures prises contre ses ravages, 1835, LXXIX. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 110. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 423. — *piceæ*, GHILIANI, 1847, 133. — *pini*, GOU-REAU, Note pour servir à son hist., 1842, 53. — *id.*, GHILIANI, 1847, 110.

**Placocer** *dimidiatus*, KLUG, Mém. sur la distrib. systématique des esp. de clairons, 1838, XL.

**Placodes**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 229. — *caffer*, 1853, 233, et 1860, 848. — *senegalensis*, 1853, 232.

**Placusa** *pumilio*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 565.

**Plæsiorrhina** *cincta*, *depressa*, SCHAU, Lamell. mélit., 1844, 351.

**Plæsius**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 224. — *ellipticus*, 1853, 227. — *javanus*, 1853, 226. — *lævigatus*, 1853, 228.

**Plagionotus**, CHEVROLAT, Descr. de *Clytus* propres au Mexique, 1860, 456.

**Plagiopisthen**, THOMSON, Descr. de Col. nouv. ou peu connus, 1856, 321. — *paradoxus*, 1856, 322.

**Plagithmysus**, CHEVROLAT, *Clytus* du Mexique, 1860, 457 et 500.

**Planetes**, REICHE, Helliunides, 1842, 335. — *bimaculatus*, 1842, 335. — *stigma*, 1842, 337.

**Platyarthron** *bilineatum*, BUQUET, Mém. sur div. Col., 1859, 623. — *6-lineatum*, 1859, 624.

**Platycerus** *caraboides*, BOULARD, Obs. faites aux env. de Paris, 1839, XXII. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 105. — *id.*, LUCAS, trouvé sur le Djebel-Djurdjura (Algérie), 1854, LXX.

**Platydema**, DE CASTELNAU, Obs. entom., 1842, XIII. — *europæa*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 343. — *id.*, LUCAS, Note sur un point de

géographie entom., 1858, LXXX. — *parallela*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de Col. de la faune méditerranée, 1855, 316. — *subplumbea*, Miscell. entomol., 1856, 533. — *violacea*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 470.

**Platygenia** *barbata*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 290. — *exarata*, 1849, 294.

**Platynathus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 150. — *octangulatus*, *parallelus*, 1832, 151.

**Platyholmus**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 241. — *dilaticollis*, 1840, 243. — *nigritus*, 1840, 244.

**Platynocera** *lepturoides*, *rubriceps*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 499.

**Platynus** *erythrocephalus*, BASSI, Descr. de Col. d'Italie, 1834, 469. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 122. — *Peirolerii*, BASSI, 1834, 470. — *id.*, GHILIANI, 1847, 117.

**Platyope**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 10. — *Bassii*, 1836, 14. — *granulata*, 1836, 16. — *lineata*, 1836, 12. — *unicolor*, 1836, 15.

**Platyproseopus** *hiericonthicus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 361. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 420.

**Platypus** *oxyurus*, AUBÉ, Explication sur la planche 11, fig. 4, 1850, 299.

**Platyrhinus** *latirostris*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 471.

**Platysoma** *arctica*, REICHE, Descr. sommaire d'Ins. de l'expédition aux mers arctiques, 1857, VIII. — *graja*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 138. — *maura*, 1847, 136. — *oblongo-punctata*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 679.

**Platysoma**, DE MARSEUL, Histerides, 1853, 248. — *abruptum*, 1853, 257. — *algiricum*, 1853, 267. — *angustatum*, 1853, 277. — *atratum*, 1853, 259. — *attenuatum*, 1853, 284. — *capense*, 1853, 266. — *carolinum*, 1853, 269. — *castaneum*, 1857, 156. — *castanipes*, 1853, 276. — *coarctatum*, 1853, 282. — *Confucii*, 1857, 404. — *cylindroides*, 1853, 280. — *depressum*, 1853, 271. — *filiforme*, 1853, 278. — *frontale*, 1853, 268. — *gracile*, 1853, 283, et 1857, 405. — *humile*, 1853, 261. — *læve*, 1853, 263. — *lævicolle*, 1853, 284. —

*latisternum*, 1853, 262. — *Leconti*, 1853, 273. — *lineare*, 1853, 276. — *lucifugum*, 1853, 259. — *luzonicum*, 1853, 265. — *Murrayi*, 1857, 403. — *oblongum*, 1853, 275. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 85. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 406. — *ovatum*, DE MARSEUL, 1853, 257. — *parallelum*, 1853, 281. — *Paugami*, 1853, 264. — *rimarium*, 1853, 283. — *sculptum*, 1853, 285. — *striatiderum*, 1853, 270. — *Urvillei*, 1853, 260.

**Platystethus** *capito*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 433. — *cornutus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 427. — *id.*, PEYRON, 1858, 432. — *maxillosus*, PEYRON, 1858, 432. — *morsitans*, *spinosus*, *splendens*, KIESENWETTER, 1851, 427.

**Platyтарus**, FAIRMAIRE, nom proposé pour la *Cymindis faminii*, 1850, XXVII.

**Platyтарus** *aurosus*, JEKEL, fait bien partie de ce genre, 1856, LXXII. — *setiger*, bien différent du *Trachyphlus inermis*, 1856, LXXII.

**Platyterna** *hebræus*, BUQUET, Commun. de ce Longicorne de Cayenne, 1858, CXCIII.

**Plectrocerum** *cribratum*, SALLÉ, Descr. de dix nouv. esp. de la République dominicaine, 1856, 689. — *spinicorne*, 1854, 690.

**Plectroscelis**, ALLARD, Monogr. des Altises d'Europe, 1860, 554. — *ærosa*, 1860, 565. — *angustula*, 1860, 564. — *arenacea*, 1860, 569. — *arida*, 1860, 573. — *aridella*, 1860, 572. — *aridula*, 1860, 567. — *balanomorpha*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv., 1859, 481. — *id.*, ALLARD, décrite par M. Rosenhauer sous le nom de *Pl. augustata*, 1859, CCXLI. — *chlorophana*, 1860, 557. — *chrysicollis*, 1860, 562. — *compressa*, 1860, 564. — *concinna*, ALLARD, Diagn. de qqes Altises de France, 1859, CVI. — *conducta*, 1860, 561. — *confusa*, 1860, 568. — *dentipes*, 1860, 559. — *id.*, CHEVROLAT, se rencontre sur une petite esp. de jonc, 1859, CXXX. — *depressa*, BOIELDIEU, 1859, 482. — *id.*, ALLARD, L'auteur l'avait appelé *Pl. Schupetii*, 1859, CCXLI. — *Fairmairei*, trouvé aux env. de Saint-Valery-sur-Somme, 1852, LII. — *major*, 1860, 556. — *id.*, JACQ. DU VAL, Descr. de plusieurs esp. de la France, 1852, 717. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAKEYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 735. — *Mannerheimii*, ALLARD, 1860, 566. — *meridionalis*, 1859, CV, et 1860, 571. — *obesa*, BOIELDIEU, 1859, 480. — *id.*, ALLARD, L'auteur l'avait indiquée comme var. de la *Sahlbergi*, 1859, CCXLI. — *procerula*, ALLARD, 1860, 563. — *pumila*.

1859, cv. — *Sahlbergi*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *id.*, A cette esp. doit être rapportée la *Pl. Fairmairei* Boield., 1852, 690. — *id.*, ALLARD, 1860, 570. — *scabricollis*, 1860, 569. — *semicærulea*, 1860, 558. — *tibialis*, 1860, 560. — *viridissima*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 735.

**Plegaderus**, DE MARSEUL, Histérides, 1856, 259. — *Barani*, 1857, 449. — *cæsus*, 1856, 267. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *discisus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 92. — *id.*, DE MARSEUL, 1856, 272. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 412. — *dissectus*, DE MARSEUL, 1856, 268. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *Otti*, DE MARSEUL, 1856, 271. — *pusillus*, 1856, 278. — *id.*, PEYRON, 1858, 412. — *sanatus*, TRUQUI, Novæ Histerinorum Species, 1852, 64. — *id.*, DE MARSEUL, 1856, 272. — *saucius*, 1856, 264. — *Sayi*, 1856, 269. — *transversus*, 1856, 277. — *vulneratus*, 1856, 265. — *id.*, PEYRON, 1858, 412.

**Pleuracanthus**, REICHE, Helluonides, 1842, 338. — *anthracinus*, *brasiliensis*, *brevicollis*, *cribratus*, *ferrugineus*, *Lacordairei*, *sanguinolentus*, *sulcipennis*, 1842, 340.

**Plinthus granulipennis**, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 89. — *Illigeri*, *porculus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 117.

**Ploceoderus bipartitus**, BUQUET, Descr. de Longicornes, 1860, 624.

**Plochionus** Boisduval, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 189. — *Bonfilsii*, BARTHELEMY, Obs. sur le genre *Plochionus*, 1834, 429. — *id.*, MOCQUERYS, qqes détails sur cette esp., 1852, XXIII. — *id.*, REICHE, envoyé par M. Mocquerys, 1855, LXXIV.

**Podabrus alpinus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 129. — *id.*, REICHE, trouvé dans la campagne de Calais, 1855, CII.

**Podagrica**, ALLARD, Monogr. des Altises d'Europe, 1860, 539. — *ærata*, 1860, 545. — *discedens*, 1860, 543. — *fuscicornis*, 1860, 544. — *fuscipes*, 1860, 540. — *italica*, 1860, 542. — *malvæ*, 1860, 541. — *rubi*, *salicarizæ*, 1860, 546. — *saracena*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 52. — *id.*, ALLARD, 1860, 542.

**Podaligus Bonariensis**, REICHE, Notes synon., 1859, 10. — *complanus*, 1859, 11. — *cuniculus*, 1859, 10. — *exaratus*, 1859, 11. — *nasutus* (au lieu de *notatus*), *Sarpedon*, 1859, 10. — *talpa*, 1859, 11.

**Podhomala**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 72. — *suturalis*, 1836, 74.

**Podischnus Agenor**, REICHE, Notes synonym., 1859, 17.

**Pœcilonota**, SOLIER, Buprestides, 1833, 298. — *interrogationis*, 1833, 299.

**Pœcillus cupripennis**, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 70. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Identique avec le *purpurascens* Sturm et Dej., 1860, LV. — *cyaneus*, GORY, Centurie de Carabiques, 1833, 254. — *lossinianus*, FAIRMAIRE, Diagnoses de Col. européens, 1859, CCXVI. — *striatopunctatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 88. — *violaceus*, DE BARAN, trouvé près de Valence, par M. Berthoud, 1857, CIV.

**Pœkilosoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 184. — *maculipenne*, 1832, 186. — *ornatipenne*, *ornatum*, 1832, 185. — *rufipenne*, 1832, 186. — *versicolor*, 1832, 185.

**Pogonobasis** SPINOLA, groupe de Buprestides, 1837, 161. — *opatroides*, *ornata*, 1837, 163.

**Pogonocherus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 57. — *accentifer*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 543. — *balteatus*, 1835, 59. — *decoratus*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. méditerranéenne, 1855, 320. — *fascicularis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 133. — *hispidus*, AUD.-SERVILLE, 1835, 58. — *id.*, LUCAS, trouvé en Algérie, 1853, LII. — *latifrons*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 514. — *Perroudi*, DELAROUZÉE, pris sur le pin d'Alep, 1858, CXLVI. — *pilosus*, FAIRMAIRE, vit dans les tiges du guy de l'acacia, 1847, XVII. — *id.*, DELAROUZÉE, vit dans le lierre, le chevrefeuille, le figuier, 1858, CXLVI. — *sertifera*, AUD.-SERVILLE, 1835, 59. — *setosus*, 1835, 58.

**Pogonotarsus Vescoi**, COQUEREL, Obs. sur div. Ins. de Madagascar, 1852, 376.

**Pogonus**, REICHE, Toutes les esp. françaises trouvées aux env. de Marseille par M. Peyron, 1856, LXXV. — *chalceus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 678. — *gracilis*, JACQ. DU VAL, et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 720. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 370. — *halophilus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 783. — *luridipennis*, LUCAS, pris dans les env. de Phalsbourg, 1847, XIV. — *testaceus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852,

720. — *viridimicans*, Col. nouv. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 69. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 783. — *id.*, REICHE, Notes entom., 1859, 640. — *id.*, FAIRMAIRE, Réponse à M. Schaum, 1860, XLV.

**Polistichus** ou **Polystichus** *boopsis*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le docteur Roth, 1852, 95. — *Boyeri*, SOLIER, Descr. de qqes esp. de Carabiques, 1835, 111. — *fasciolatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 87. — *vittatus*, major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, IV.

**Polpogenia**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 70. — *asidioides*, 1836, 71.

**Polyarthron**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 189. — *barbarum*, LUCAS, Col. envoyés d'Algérie, 1858, CLXXIX. — *pectinicornis*, AUD.-SERVILLE, 1832, 189.

**Polybothris**, SPINOLA, Groupe de Buprestides, 1837, 115. — *id.*, BUQUET, Communic. d'une magnifique esp. trouvée à Madagascar, 1853, XIX. — *æneomaculata*, SPINOLA, 1837, 117. — *analisis*, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. de Madagascar, 1852, 365. — *ancora*, SPINOLA, 1837, 117. — *aureocyanea*, COQUEREL, 1848, 275. — *auroclavata*, 1852, 362. — *carcharias*, SPINOLA, 1837, 117. — *cassidea*, 1837, 118. — *cassidoides*, 1837, 119. — *chalcochrysea*, 1837, 118. — *lamina* Spin., et *lamina* Klug., 1837, 119. — *Lelieuri*, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp., 1854, 75. — *platessa*, SPINOLA, 1837, 119. — *pyropyga*, COQUEREL, 1852, 364. — *rhombus*, SPINOLA, 1837, 119. — *rotundata*, 1837, 120. — *6-foveolata*, 1837, 118. — *solea*, 1837, 119. — *sumptuosa*, *zivetta*, 1837, 117.

**Polycesta**, SOLIER, Buprestides, 1833, 284. — *carnifex*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 735. — *porcata*, SOLIER, 1833, 282.

**Polydrosus** *Bohemanni*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 632. — *corruscus*, JAVET, Dessin représentant une tête très-grossie, 1852, XXIX. — *salsicola*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685 et 689. — *setifrons*, JACQ. DU VAL, Descr. de plusieurs esp. de Col. de France, 1852, 710. — *suturellus*, CHEVROLAT, Descr. d'esp. nouv. d'Europe, 1860, 507. — *undatus*, *xanthopus*, KIESENWETTER, 1851, 632.

**Polyosa**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 166. — *Lacordairei*, 1832, 167.

**Polyphylla fullo**, major BLANCHARD, trouvé à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, iv.

**Polypleurus**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 194. — *geminatus*, 1838, 196. — *punctatus*, 1838, 197.

**Polyraphis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 26. — *id.*, BUQUET, Descr. de deux nouv. esp. de Longicornes de ce genre, 1853, 443. — *angustatus*, 1853, 445. — *Grandini*, 1853, 444. — *horrida*, AUD.-SERVILLE, 1835, 27. — *papulosa*, 1835, 27.

**Polyschisis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 564. — *hirtipes*, 1833, 564.

**Polyzonus clavicornis**, *fasciatus*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 659.

**Poophagus olivaceus**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 547.

**Porphyronota carnifex**, SCHAU, Lamell. mélit., 1844, 393.

**Potamophilus acuminatus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé à Paris même, dans un bain public, 1849, LXII. — *id.*, LESPÈS, pris en compagnie de *Dryops* et autres Ins., 1854, LXV. — *id.*, DE BARAN, En grande quantité sur les poutres à fleur d'eau du bain de Grenelle, 1856, LXXV.

**Praocis**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 214. — *ænea*, 1840, 227. — *Audouini*, 1840, 222. — *Chevrolatii*, 1840, 229. — *costata*, 1840, 223. — *costatula*, 1840, 228. — *cribrata*, 1840, 236. — *curta*, 1840, 226. — *Gayi*, 1840, 231. — *hirtuosa*, 1840, 232. — *nigro-ænea*, 1840, 226. — *parva*, 1840, 232. — *pleuroptera*, 1840, 234. — *punctata*, 1840, 236. — *rufilabris*, 1840, 233. — *rufipes*, 1840, 221. — *rufitarsis*, 1840, 227. — *rugata*, 1840, 234. — *sanguinolenta*, 1840, 223. — *Spinolæ*, 1840, 223. — *subcostata*, 1840, 231. — *submetallica*, 1840, 224. — *subreticulata*, 1840, 234. — *subsulcata*, 1840, 224. — *sulcata*, 1840, 235. — *tibialis*, 1840, 225.

**PRAOCITES**, SOLIER, Collaptérides, 1840, 207.

**Prasocuris (helodes) marginella**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 99. — *violacea*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686.

**Pria palliduta**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 167.

**Prinobius**, CHEVROLAT, Note monogr. sur ce genre, 1859, CXXXIV et CCXXVII. — *atropos*, 1859, CXXXVI et CCXXX. — *Gaubilii*, 1859, CXXXV

et CCXXVIII. — *Germari*, 1859, CCXXIX. — *Goudotii*, 1859, CCXXX. — *lethifer*. LALLEMANT, Note sur les mœurs de cette esp., 1859, CXXXVII. — *id.*, FAIRMAIRE, Descr. de cette esp., 1859, CXXXVIII et CXLIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Communic de deux individus sortis de morceaux de bois de Lentisque, 1859, CXCI. — *Myardi*, CHEVROLAT, 1859, CXXVI et CCXXIX. — *scutellaris*, 1859, CXXXV et CCXXVII.

**Prionopterus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 200. — *flavipennis*, 1832, 201. — *staphylinus*, 1832, 200.

**PRIONIENS**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 120.

**Prionognathus**, DE LA FERTÉ, Appendice de la revue des Patellimades, 1851, 288.

**Prionothea**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 39. — *coronata*, 1836, 41. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvée en l'oasis d'Ouargla, 1859, CXCI.

**Prionus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 191. — *id.*, LHERMINIER, Le Prione du fromager vit dans le tronc pourri des *Bombax* et *Adansonia*, 1837, 504. — *arcuatus*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 658. — *barbatus*, 1851, 657. — *Besikanus*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv. de la faune méditerranéenne, 1855, 318. — *buphthalmus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 194. — *canaliculatus*, CHEVROLAT, 1851, 658. — *coriarius*, AUD.-SERVILLE, 1832, 192. — *forficatus*, FAIRMAIRE, Col. provenant de Tanger, 1851, XXI. — *imbricornis*, AUD.-SERVILLE, 1832, 192. — *pictus*, BUQUET, Communic de cet Ins., 1846, LIV. — *rostratus*, CHEVROLAT, 1851, 657. — *serripes*, 1851, 658. — *sulcatus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 156.

**Prionychus**, SOLIER, Xystropides, 1835, 237. — *ater*, 1835, 238. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 370. — *fuscus*, SOLIER, 1835, 238.

**Pristolephus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 151. — *Gougeletii*, FAIRMAIRE, Descr. de qqes esp. nouv., 1859, CLI. — *melancholicus*, LATREILLE, 1834, 151.

**Pristonychus**, AZAMBRE, Communic. d'une esp. nouv. de Malte, 1854, XXXII. — *id.*, FAIRMAIRE, Nouv. esp. trouvée dans une caverne du Lot, 1858, CLX. — *algerinus*, GORY, Centurie de Carabiques, 1833, 232. — *angustatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 122. — *id.*, FAIRMAIRE, reçu des Pyrénées orientales, 1856, LXXXI. — *balmae*, DELAROUZÉE, Descr. de deux nouv. esp., 1860, XXVI. — *chilensis*,



GORY, 1833, 232. — *hypogeus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 517. — *Jacquelinii*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv., 1859, 461. — *latebricola*, DAT, Réclam. sur son habitat, 1858, CCXLVI. — *mauritanicus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 780. — *melittensis*, FAIRMAIRE, Esp. nouv. de la faune méditerranéenne, 1855, 308. — *id.*, AZAMBRE, pris à Malte, 1856, xvii. — *nigritus* (lisez *nigratus*), REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 599 et 1858, 58. — *id.*, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 370. — *oblongus*, GHILIANI, 1847, 122. — *parallelocollis*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 596. — *parviceps*, FAIRMAIRE, Esp. nouv. de Corse, 1859, 270. — *planicollis*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 597. — *punctatostriatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 780. — *pyrenæus*, FAIRMAIRE, Grottes de l'Ariège, 1859, cxi. — *quadricollis*, PEYRON, 1858, 371. — *venustus*, GHILIANI, 1847, 88.

**Procas** *Saulcyi*, REICHE, Col. d'Orient, 1857, 677. — *Steveni*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 731.

**Procerus** *scabrosus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 358.

**Prochoma** SOLIER, Collaptérides, 1835, 393. — *Audouini*, 1835, 395.

**Procrustes**, *asperatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 357. — *coriaceus*, AUD.-SERVILLE, Qques faits sur son accouplement, 1849, LXXXII. — *Duponcheli*, BARTHELEMY, Descr. d'une nouv. esp., 1837, 245. — *id.*, Lettre au sujet de cet Ins., 1837, LXXV. — *id.*, DUPONT, L'auteur présente des obs. sur le même Ins., 1838, iv. — *impressus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 566. — *id.*, REICHE, M. de Saulcy l'a retrouvé en Palestine, 1856, XLVI. — *mopsucrenæ*, PEYRON, 1858, 537. — *pisidicus*, Descr. d'une nouv. esp., 1854, 669. — *punctulatus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 565.

**Prodotes**, THOMSON, Descr. de qqes Col. nouv. ou peu connus, 1856, 332.

**Podontia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 64. — *dimidiata*, 1834, 65. — *plagiata*, BUQUET, Descr. de Longicornes, 1860, 622.

**Prognatha** *4-cornis*, DE BAULNY, Larves trouvées sous l'écorce d'un peuplier mort, 1859, CCXIX.

**Promeces** AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 27. — *clavicornis*, *longipes*, 1834, 27. — *longipes*, *nitens*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 658. — *violacea*, AUD.-SERVILLE, 1834, 28.

**Prenommata rostrata**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 413.

**Presceporhinus**, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 868. — *Amyoti*, 1860, 869.

**Presopocera fronticornis**, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 661.

**Prosternon**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 151. — *bipustulatus*, *holosericeus*, *æruginosus*, 1834, 152.

**Prestomus mandibularis**, FAIRMAIRE, trouvé récemment à Marly sous des écorces de châtaignier, 1857, CII.

**Protæcia acuminata**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 277. — *ærata*, 1844, 384. — *alboguttata*, 1844, 383 et 1849, 278. — *ambigua*, *chlorotica*, 1849, 279. — *confusa*, *cupripes*, 1844, 383. — *Dalmanni*, 1844, 384. — *ferruginea*, 1849, 1849, 278. — *Francolina*, *Guerini*, 1844, 384. — *leprosa*, 1849, 287. — *mandarinea*, 1844, 382 et 1849, 278. — *manillarum*, 1844, 383. — *marmorea*, 1844, 382. — *obscurælla*, *regalis*, 1849, 278. — *resplendens*, 1844, 382. — *speculifera*, 1849, 277. — *taciturna*, 1844, 383. — *Whitehousei*, 1849, 287.

**Protophysus** (*Cryptocephalus*) *lobatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 113.

**Prypnus artensis**, MONTROUZIER, Col. de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 887.

**Psalidium forcipatum**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 663. — *Levratii*, 1857, 665. — *maxillosum*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 110. — *pactolum*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 662.

**Psalidognathus**, REICHE, Mémoire sur les genres *Psalidognathus* et *Chiasognathus*, 1850, 263. — *cacicus*, *erythrocerus*, *Friendii*, 1850, 265. — *Friendii*, ROJAS, Col. de Vénézuéla, 1857, 335. — *modestus*, REICHE, 1850, 265. — *id.*, WESTWOOD, Communic. de trois indiv., 1850, LIX. — *Sallei*, THOMSON, Diagnose spécifique, 1858, CCXLVI.

**Psalidestomus**, REICHE, Il fallait conserver le nom *Psalicerus* Dej., 1853, 77. — *erythrocnemus*, Ce n'est pas celui de Dejean, 1853, 77. — *ibex*, C'est le *complanatus*, coll. Dej., 1853, 78. — *morio*, C'est le *Luc. melanarius* Hope, 1853, 77. — *polyodontus*, C'est celui de Hope et non celui de Dejean, 1853, 78. — *triangularis*, On doit dire *niger*, 1853, 78.

- Psammotenus**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 35.—*id.*, DOUË, Communiqué de 5 esp. de ce genre, 1857, CLXIII. — *costatus*, SOLIER, 1838, 35.
- Psammodius** *porcicollis*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *vulneratus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 93.
- Psammœchus**, BOUDIER, Descr. de ce genre, 1834, 367. — *bipunctatus*, 1834, 370. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97.
- Psectrascelis**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 311. — *brevis*, 1836, 316. — *discicollis*, 1836, 320. — *id.*, LACORDAIRE, Rectific. d'habitat, 1837, 252. — *id.*, SOLIER, Réponse à M. Lacordaire, 1837, 486. — *glabratus*, Collaptérides, 1836, 322. — *Guerini*, 1836, 317. — *mamilloneus*, 1836, 323. — *id.*, LACORDAIRE, 1837, 253.—*id.*, SOLIER, 1837, 486. — *pilipes*, 1836, 314. — *subdepressus*, 1836, 318.
- PSÉLAPHIENS**, AUBÉ, Note sur cette famille, 1833, 502, et révision, 1844, 73.— *id.*, REICHE, Communiqué d'une monogr. des États-Unis, 59 esp. décrites, 1850, xxxi.
- Pselaphus**, SALLÉ, Trouvé des esp. de grande taille dans l'Amérique méridionale, 1848, LII. — *id.*, AUBÉ, Notes sur les Psélaph. et révision de cette famille, 1833, 505 et 1844, 100. — *id.*, FAIRMAIRE, Communiqué d'esp. de Mers-el-Kébir, 1857, xxxiii. — *acuminatus*, AUBÉ, 1844, 102. — *dresdensis*, 1833, 506, et 1844, 100. — *Heizei*, 1833, 506, et 1844, 101. — *Herbstii*, *longicollis*, 1833, 506. — *longipalpis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 401. — *nigricans*, AUBÉ, 1833, 506. — *Sencieri*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 794.
- Pseudagrilus** *granulosus*, *zonatus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 96.
- Pseudochina** *bubalus*, FAIRMAIRE, Diagnoses, 1860, 631.
- Pseudolycus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Mém. sur deux nouv. genres, 1833, 155. — *atratus*, 1833, 158. — *cinctus*, 1833, 157. — *hæmopterus*, 1833, 158. — *marginatus*, 1833, 156.
- PSEUDOTRIMÈRES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Annonce d'un travail de M. Redtenbacher sur cette famille, 1844, xli.
- Psilocnemis** *leucosticta*, *polita*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 397.
- Psilodema**, TRUQUI, Synonyme du genre *Amphicoma*, 1855, xviii.

**Psiloptera**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 709. — *id.*, SOLIER, Buprestides, 1833, 283. — *angulicollis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 710. — *attenuata*, SOLIER, 1833, 283. — *Buqueti*, *Decaisnei*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 711. — *Guerinii*, THOMSON, Descr. de Col. nouv. ou peu connus, 1856, 328. — *speciosa*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 712. — *verrucifera*, 1858, 713.

**Psiloscelis**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 539. — *Harrisii*, 1853, 542.

**Psoc italica**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, III. — *id.*, COQUEREL, trouvée à Hyères, 1850, XLIV. — *id.*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 532.

**Psylliodes**, ALLARD, Monogr. des Altises, 1860, 796. — *ærea*, 1860, 804. — *affinis*, 1860, 807. — *algorica*, 1860, 829. — *id.*, Diagnoses de quatre esp. nouv., 1859, CCLXI. — *alpina*, 1860, 823. — *attenuata*, 1860, 805. — *chalconera*, 1860, 800. — *chrysocephala*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *id.*, ALLARD, 1860, 810. — *circumdata*, 1860, 818. — *crassicollis*, 1860, 803. — *id.*, FAIRMAIRE, Col. nouv., 1857, 641. — *cucullata*, ALLARD, 1860, 819. — *cuprea*, 1860, 803. — *cupreata*, 1860, 805. — *cupronitens*, 1860, 815. — *cyanoptera*, 1860, 809. — *cypricolor*, 1860, 811. — *dulcamaræ*, 1860, 799. — *fusiformis*, 1860, 813. — *gibbosa*, 1860, 820. — *Gougeleti*, 1859, CCLX et 1860, 821. — *hyoscyami*, 1860, 801. — *inflata*, 1860, 820. — *instabilis*, 1860, 824. — *Kunzei*, 1860, 816. — *lævata*, 1860, 814. — *Lethierryi*, 1860, 808. — *luteola*, 1860, 829. — *marcida*, 1860, 802. — *id.*, REICHE, trouvée aux env. de Granville, 1858, CLXXII. — *melanophthalma*, ALLARD, 1860, 826. — *minima*, 1860, 824. — *napi*, 1860, 812. — *nigricollis*, 1860, 817. — *nigripennis*, 1860, 827. — *nucea*, 1860, 828. — *pallidipennis*, 1860, 817. — *picina*, 1860, 825. — *picipes*, 1860, 822. — *rufilabris*, 1860, 806. — *thlaspis*, 1860, 813. — *vicina*, BOIELDIEU, Col. nouv., 1859, 479. — *id.*, ALLARD, C'est une variété de *Ps. cucullata* Ill., 1859, CCXLI.

**Psennidium pusillum**, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 413.

**Ptericoptus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 60. — *dorsalis*, 1835, 61.

**Pterobothris**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 714. — *corrosus*, 1858, 714.

**Pterolasia**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 66. — *distincta*, 1836, 69.—  
*squalida*, 1836, 68.

**Pteroplus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 65. — *acuminatus*,  
*mutifer*, 1835, 66.

**Pterostichus bicolor.** GHILLIANI, Col. du Piémont, 1847, 116. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, Remarque sur divers Col. de France, 1858, LXVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Rapporté des Basses-Alpes, 1856, LXXV. — *Aspinus*, GAUTIER DES COTTES, Descr. d'un Col. nouv., 1858, LXVIII. — *id.*, Cet Ind. est un *Steropus* venant après *S. Illigeri*, 1859, CCXL — *cribratus*, GHILLIANI, 1857, 138. — *id.*, GAUTIER DES COTTES, 1858, LXVIII. — *dilatatus*, GHILLIANI, 1847, 117. — *Dorotii*, 1847, 116. — *externopunctatus*, 1847, 126. — *id.*, HURLER, Renflement à l'extrémité supérieure de l'antenne gauche, 1832, LXX. — *fasciculopunctatus*, GHILLIANI, 1847, 140. — *femoratus*, 1847, 122. — *parafemoratus*, 1847, 136. — *Hemimorotii*, 1847, 126. — *impressivus*, 1847, 122. — *impressus*, 1847, 123. — *Jurini*, 1847, 116. — *metallicus*, 1847, 138. — *multipunctatus*, DELABOUE, Descr. diagnostiques, 1855, CVI. — *montipunctatus*, GHILLIANI, 1847, 142. — *niger*, 1847, 89. — *id.*, FAURRAIE, Armoire singulière, 1851, LIII. — *Pavetti*, GHILLIANI, 1847, 136. — *parapunctatus* DE PAVETTI, trouve dans la Lucerne, 1854, 257. — *id.*, GHILLIANI, 1847, 104. — *parvipes*, FAURRAIE, Mém. sur Ph. Lucerne, 1854, 274. — *pergandii*, GHILLIANI, 1847, 151. — *Pyrenaei*, MARCHETRI, trouve près de Rome, 1855, CII. — *reclusi*, DUPONCHEL, trouve dans la Lucerne, 1854, 257. — *reclusus*, GHILLIANI, 1847, 130. — *robustus*, 1847, 104. — *rossi*, 1847, 122. — *signatus*, 1847, 126. — *labialis*, RECLUS, Armoire grande Indurque, 1859, LXXX. — *Tronci*, GHILLIANI, 1847, 136.

**Pterotarsus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 149. — *bimaculatus*, Eschscholtzii, 1843, 196. — *histrion*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 132. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 194. — *rugosus*, 1843, 196. — *tuberculatus*, LATREILLE, 1834, 132. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843, 194. — *Walcknaerii*, 1843, 196.

**Pullinus** *costatus*, JACQ. DU VAL, trouvé sur le quai de la Râpée, 1853, XLVI. — *flabellicornis*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *pecticornis*, LUCAS, ♂ pris au vol le 24 mars, 1848, XXVIII.

**Ptilium**, AUBÉ, Nouv. esp. prise dans une fourmilière à Saint-Germain, 1849, LIII. — *angulicollis*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1857, 733. — *apterum*, AUBÉ, Cet Ins. est un *Trichopteryx*, 1844, X. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Réponse à M. Aubé, 1844, XI. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 586. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, retrouvé aux env. de Paris, 1854, LXVIII. — *id.*, FAIRMAIRE, pas rare dans les Landes, 1854, LXVIII. — *denticollis*, Miscell. entom., 1857, 732. — *gracile*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *marginatum*, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 327. — *punctipenne*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 32. — *trisulcatum*, AUBÉ, Descr. de deux Col. nouv. 1833, 94.

**Ptilodactyla** *elaterina*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 166.

**Ptilophyllum** *Godeyi*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Lucanide nouv. de la Nouvelle-Zélande, 1845, XCVI.

**PTINIORES**, BOIELDIEU, Liste des esp. et diagnoses des nouv. esp., 1854, LXXVIII. — *id.*, Monogr. de Ptiniors, 1856, 285. — *id.*, Catalogue des esp. américaines, 1856, 685. — *id.*, Explication des planches, 1856, 686.

**Ptinus**, BOIELDIEU, Ptiniors, 1856, 296. — *abbreviatus*, 1854, LXXIX et 1856, 313. — *advena*, 1856, 683. — *albicomus*, 1856, 503. — *alboscuteatus*, 1854, LXXX et 1856, 493. — *alpinus*, 1854, LXXVIII et 1856, 300. — *Aubei*, 1854, LXXXI et 1856, 501. — *id.*, ANDRÉE, Habitat de cet Ins., 1857, CXI. — *bicinctus*, BOIELDIEU, 1856, 639. — *bidens*, 1856, 657. — *id.*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rare aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *bivittatus*, BOIELDIEU, 1854, LXXX, et 1856, 494. — *brunneus*, 1856, 649. — *id.*, GIRARD, trouvé dans des nids de pigeons, 1859, CXX. — *carinatus*, BOIELDIEU, 1856, 308. — *crenatus*, AUBÉ, trouvé dans des boîtes de coll., 1836, IV. — *id.*, BOIELDIEU, 1856,

656. — *Dawsonii*, 1856, 683. — *dilophus*, 1856, 297. — *dubius*, 1856, 502. — *Duvali*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729. — *id.*, LAREYNIE, Descr. de trois nouv. esp., 1852, xc et 1853, 127. — *id.*, BOIELDIEU, 1856, 489. — *elegans*, 1856, 640. — *exulans*, 1856, 499. — *farinosus*, 1854, LXXVIII, et 1856, 302. — *fossulatus*, 1856, 306. — *foveolatus*, 1854, LXXIX, et 1856, 309. — *fragilis*, 1856, 685. — *frigidus*, 1854, LXXXII, et 1836, 650. — *fur*, AUDOUIN, trouvé en grande quantité dans des farines, 1836, LXII. — *id.*, PAUL LAMBERT, Monstruosité, 1851, LXXXVIII. — *id.*, BOIELDIEU, 1856, 641. — *germanus*, 1856, 487. — *gibbicollis*, 1856, 312. — *hirticollis*, 1856, 655. — *hololeucus*, REICHE, trouvé à Calais dans un appartement, 1855, CII. — *imperialis*, ROUZET, Communic. de larves vivant dans des branches de Marronnier, 1855, LIII. — *intermedius*, BOIELDIEU, 1854, LXXXII, et 1856, 646. — *irroratus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 622. — *id.*, BOIELDIEU, 1856, 299. — *italicus*, 1856, 629. — *latro*, AUD.-SERVILLE, Trouvé une larve et quatre Ins. parfaits dans des boîtes de coll., 1836, IV. — *id.*, BOIELDIEU, 1856, 652. — *id.*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 261. — *lepidus*, BOIELDIEU, 1856, 634. — *longicornis*, 1856, 684. — *Lucasii*, 1856, 636. — *lusitanicus*, 1856, 303. — *murinus*, 1856, 682. — *muscorum*, CHEVROLAT, trouvé dans une coquille d'*Helix*, 1855, CX. — *nigerrimus*, BOIELDIEU, 1854, LXXXIII, et 1856, 660. — *nigricornis*, MELLIE, Peut être variété du *Cis setiger*, 1848, 387. — *nigripennis*, BOIELDIEU, 1856, 682. — *nitidus*, 1856, 314. — *niveicollis*, 1856, 661. — *nobilis*, 1854, LXXXII, et 1856, 659. — *nodulus*, 1856, 684. — *obesus*, 1856, 638. — *id.*, AZAMBRE, trouvé en Italie, 1856, XVIII. — *orbatus*, BOIELDIEU, 1856, 684. — *ornatus*, 1856, 633. — *phlomidis*, 1854, LXXX, et 1856, 497. — *piceus*, MELLIE, 1848, 390. — *pilosus*, BOIELDIEU, 1856, 648. — *pilula*, 1856, 684. — *pinguis*, 1856, 683. — *pulchellus*, 1854, LXXXI, et 1856, 635. — *pulverulentus*, 1854, LXXVIII, et 1856, 304. — *pusillus*, 1856, 643. — *pyrrhocephalus*, MELLIE, 1848, 388. — *4-signatus*, BOIELDIEU, 1856, 681. — *regalis*, GHILIANI, 1847, 92. — *Reichei*, BOIELDIEU, 1854, LXXIX, et 1856, 305. — *rhododactylus*, MELLIE, 1848, 387. — *rufipes*, BOIELDIEU, 1856, 631. — *rufus*, 1856, 681. — *scutellaris*, 1856, 682. — *6-punctatus*, 1856, 500. — *6-pustulatus*, AZAMBRE, Faits relatifs à ses mœurs, 1855, LII. — *6-signatus*, BOIELDIEU, 1856, 681. — *spinicollis*, 1856, 496. — *Spitzyi*, 1856, 647. — *subpilosus*, 1856, 644. — *sulcatus*, 1856, 497. — *suturalis*, 1856, 682. — *tectus*, 1856, 652. — *testaceus*, 1856, 654. — *tomentosus*,

1854, LXX, et 1856, 492. — *variegatus*, 1856, 490. — *xylopertha*, 1856, 310. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 185.

**Plesima**, SOLIER, Buprestides, 1833, 277. — *9-maculata*, 1833, 278. — *id.*, LABOULBÈNE, Elle a pour parasite la *Chrysis ignita*, 1849, XVIII.

**Ptychodes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 74. — *politus*, 1835, 75.

**Ptycholaemus**, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp. de Col., 1858, 322. — *Troberti*, 1858, 324.

**Ptychophorus** *fluctiger*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 418. — *undatus*, 1844, 395.

**Ptyocerus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 168 et 260. — *id.*, DE LAPORTE, Rhipicérides, 1834, 260. — *attenuatus*, 1834, 263. — *brunneus*, 1834, 265. — *Goryi*, 1834, 264. — *mystacinus*, 1834, 262. — *id.*, LATREILLE, 1834, 169.

**Purpuricenus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 568. — *ætnensis*, BASSI, Descr. de Col. d'Italie, 1834, 471. — *affinis*, CHEVROLAT, Le même que *P. barbarus* LUC., 1850, LXVI. — *barbarus*, LUCAS, Réponse à M. Chevrolat, 1851, x. — *budensis*, AUD.-SERVILLE, 1833, 569. — *Dumeritii*, LUCAS, 1851, xi. — *Desfontainii*, AUD.-SERVILLE, 1833, 568. — *ferrugineus*, FAIRMAIRE, Nouv. esp. de Col., 1850, xvi. — *id.*, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 91. — *halodendri*, AUD.-SERVILLE, 1833, 570. — *Kæhleri*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *id.*, AUD.-SERVILLE, 1833, 569. — *Lorcy*, DUPONCHEL, Descr. d'une nouv. esp. de Col., 1837, 309. — *id.*, BUQUET, Obs. relatives à cette espèce, 1841, 325. — *id.*, E. BLANCHARD, Notice sur cet Ins., 1842, 49. — *Servillei*, AUD.-SERVILLE, 1833, 569.

**Pygora** *erythroderes*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 416.

**Pylades** (*Leptomastax*), FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 526. — *Coquereli*, 1856, 528.

**Pyrochroa** *Kiesenwetteri*, FAIRMAIRE, Descr. de Col. d'Europe et de France, 1859, 424.

**Pyrodes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 186. — *æneus*, BUQUET, Descr. de Longicornes nouv., 1860, 618. — *angulatus*, *bifasciatus*, *caruleus*, *nitidus*, *speciosus*, AUD.-SERVILLE, 1832, 187.

**Pyrophorus**, MOCQUERYS, Obs. recueillies au Brésil, 1844, LXIII. — *ignitus*, *noctilucus*, *phosphoreus*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 144.



**Pytho depressus**, REICHE, rapporté des Pyrénées par M. Delarouze 1854, LV. — *id.*, DELAROUZÉE, Communic. de la larve jusqu'ici incomplètement décrite, 1854, LXVIII et 1855, XCVIII.

## Q.

**Quedius attenuatus**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *auricomus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 420. — *boops*, 1851, 421. — *bovinus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 154. — *brevipennis*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 41. — *crassus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 153. — *curtus*, LAREYNIÉ, Détails intéressants, 1851, LIII. — *fimbriatus*, KIESENWETTER, 1851, 419. — *frontalis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 154. — *fulgidus*, FAIRMAIRE, Var. à abdomen rouge, env. de Paris, 1846, LV. — *fulgidus, fuliginosus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 428. — *fulgidus, fuliginosus, impressus*, KIESENWETTER, 1851, 419. — *impressus, infuscatus*, PEYRON, 1858, 428. — *Kraatzii*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. d'esp. nouv. de France, 1859, CCXXXI. — *lateralis*, KIESENWETTER, 1851, 419. — *longicornis*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CXXXI. — *lucidulus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 723. — *marginalis, modestus*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CXXXI. — *molochinus*, KIESENWETTER, 1851, 419. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 154. — *monspeliensis*, FAIRMAIRE, Col. nouv., 1857, 636. — *nigriceps*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1859, CXXXI. — *obliteratus*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LX. — *peltatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 154. — *præcox*, PEYRON, 1858, 428. — *punctatellus*, KIESENWETTER, 1851, 419. — *scintillans*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 570. — *scitus*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *umbrinus*, PEYRON, 1858, 428.

## R.

- Rachidion**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 54. — *nigritum*, 1834, 55.
- Ramphus flavicornis**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685.
- Ranzania splendens**, THOMSON, Col. nouv. ou peu connus, 1856, 320.
- Redotus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 443. — *rufulus*, 1860, 444.
- Rembus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1852, 278. — *ægyptiacus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 358. — *Goryi*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 238.
- Rhagium**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 205. — *bifasciatum*, *indagator*, 1835, 207. — *indagator*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1859, 469. — *inquisitor*, AUD.-SERVILLE, 1835, 206. — *id.*, BAYLE, Monstruosité, 1851, LXXXII. — *lineatum*, AUD.-SERVILLE, 1835, 207. — *minutum*, CHEVROLAT, Longicornes de la coll. de Banks, 1851, 664. — *mordax*, AUD.-SERVILLE, 1835, 206. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 131. — *ornatum*, CHEVROLAT, 1851, 664.
- Rhagedactylus brasiliensis**, DE CHAUDOIR, Genres et esp. de Caraïques nouv., 1835, 431.
- Rhagonycha atricapilla**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 603. — *boops*, 1851, 602. — *concolor*, 1851, 605. — *femoralis*, 1851, 607. — *galiciiana*, GOUGELET et H. BRISOUT DE BARNEVILLE, Col. nouv. de Galice et d'Algérie, 1859, CCXXXVIII. — *læta*, KIESENWETTER, 1851, 601. — *maculicollis*, 1851, 607. — *Mærkelii*, 1851, 606. — *melanura*, 1851, 604. — *morio*, 1851, 609. — *nigripes*, 1851, 605. — *planicollis*, 1851, 601. — *punctipennis*, 1851, 600. — *4-collis*, 1851, 607. — *Redtenbacheri*, 1851, 601. — *signata*, 1851, 602. — *testacea*, 1851, 607.
- Rhamnusium**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 204. — *salicis*, 1835, 205.

**Rhaphipodus** AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 168. — *suturalis*, 1832, 169.

**Rhina** *nigra*, COQUEREL, Obs. recueillies à Madagascar, 1848, 181. — *scrutator*, CHEVROLAT, rapporté de Saint-Domingue, 1851, LXXXVII.

**Rhinocyllus** *antiodontalgicus*, LABOULBÈNE, De la larve décrite par Gerbi, 1858, CCXLVI. — *Lareynii*, JACQ. DU VAL, Descr. de genres nouv. et d'esp. de France, 1852, 714 et 733. — *latirostris*, GOUREAU, Ins. qui vivent dans le Chardon penché, 1845, 77.

**Rhinomacer** *attelaboïdes*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI.

**Rhinonchus** *castor*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *inconspectus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII.

**Rhinosimus** *planirostris*, *roboris*, *ruficollis*, CHEVROLAT, trouvés à Fontainebleau, 1833, 471.

**Rhinotragus** AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 549. — *analis*, *dorsiger*, *suturalis*, 1833, 550.

**Rhipicera**, DE LAPORTE, Rhipicériles, 1834, 228. — *id.*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 168. — *abdominalis*, DE LAPORTE, 1834, 238. — *cyanea*, 1834, 237. — *femorata*, 1834, 240. — *fulva*, 1834, 236. — *id.*, DE CASTELNAU, Obs. entom., 1842, XIII. — *marginata*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 168. — *id.*, DE LAPORTE, Rhipicériles, 1834, 233. — *mystacina*, 1834, 235.

**RHIPICÉRIDES**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 167.

**RHIPICÉRITES**, DE LAPORTE, Monog. de ce groupe, 1834, 225.

**Rhipiphorus** *bimaculatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 110. — *id.*, JACQ. DU VAL, Descr. de genres et d'esp. nouv. de la France, 1852, 730. — *flabellatus*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288.

**Rhizopertha**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Classific. des Bostrichides, 1845, XVII.

**Rhizophagus** *depressus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 599.

**Rhizotrogus** *amphytus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 436. — *araneipes*, 1860, 428. — *barbarus*, 1860, 432. — *carduorum*, 1860, 437. — *castaneus*, BASSI, Monstruosité, 1834, 373. — *id.*, AUDOUIN, Rem. sur la note de Bassi, 1834, VIII. — *crassus*,

FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 433. — *decoloratus*, 1860, 432. — *deserticola*, 1860, 429. — *dispar*, 1860, 425. — *euphytus*, 1860, 432. — *fastidiosus*, 1860, 436. — *fissipes*, 1860, 442. — *gabalus*, 1860, 426. — *gonoderus*, 1860, 427. — *grossus*, 1860, 433. — *gulosus*, 1860, 438. — *Guyonii*, LUCAS, Nouv. esp. d'Algérie, 1857, LXXXVI. — *id.*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, trouvé en l'oasis d'Ouargla (Algérie), 1859, CICI. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 432. — *Henonii*, 1860, 430. — *hirticollis*, 1860, 441. — *ignavus*, 1860, 437. — *inflatus*, 1860, 429. — *lanatus*, 1860, 436. — *Lejeunii*, 1860, 434. — *leptopoda*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 269. — *litigiosus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 441. — *lobatus*, 1860, 440. — *maculicollis*, 1860, 431. — *magagnoscii*, 1860, 425. — *marginipes*, LABOULBÈNE, trouvé récemment à Alfort 1847, XXVIII. — *nigratus*, ~~sub~~midicus, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 429. — *pallidipennis*, 1860, 439. — *parallelus*, 1860, 440. — *pini*, 1860, 443. — *Prophettii*, 1860, 434. — *punctatissimus*, MONTROUZIER, 1860, 271. — *punctiventris*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 426. — *punicus*, 1860, 439. — *rufulus*, 1860, 444. — *scutellaris*, *serraticollis*, 1860, 437. — *sinuatocollis*, 1860, 425. — *stupidus*, 1860, 435. — *subopacus*, 1860, 427. — *suturalis*, LUCAS, Note sur cette espèce, 1857, XVII. — *id.*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1860, 443. — *thoracicus*, JACQ. DU VAL, Obs. recueillies à Prades, 1850, XXIV. — *tusculus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 434. — *varians*, MONTROUZIER, 1860, 271. — *vicinus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 101.

**Rhomborhina**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 246. — *apicalis*, 1849, 246. — *clypeata*, 1844, 350. — *hyacinthina*, *japonica*, Mellyi, *opalina*, 1849, 246 et 247. — *opalina*, 1844, 349. — *pilipes*, 1844, 350. — *resplendens*, 1849, 247.

**Rhopalomerus**, CHEVROLAT, *Clytus* du Mexique, 1860, 457. — *angusticollis*, THOMSON, Communic. de cette esp. de Natal, 1858, CCXVII.

**Rhopalopachys**, CHEVROLAT, *Clytus* mexicains, 1860, 457.

**Rhopalopalpus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 262. — *pæciloides*, 1851, 262.

**Rhopalophora**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 100. — *rubida*, *sanguinicollis*, 1834, 101.

**Rhynchites** *ancovirens*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 626. — *auratus*, GOUREAU, Note sur ses mœurs,

1860, v. — *Bacchus*, AUDOUIN, Dégâts causés aux Pommiers, 1837, LVI. — *id.*, DE CASTELNAU, Mêmes observations, 1837, LVI. — *cæruleocephalus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 115. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 626. — *conicus*, BOISDUVAL, Détails sur ses mœurs, 1859, XCVI. — *germanicus*, KIESENWETTER, 1851, 626. — *megacephalus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *ruber*, Diagnoses de Col. d'Europe, 1859, CIV. — *splendidulus*, KIESENWETTER, 1851, 626.

**Rhyncolus angustus**, FAIRMAIRE, Diagnoses, 1859, CLXIV. — *id.*, On doit lui rapporter le *Rh. filum* Rey et Muls., ainsi que le *Phlæophagus populi* Chevr., 1860, XLVI. — *brachyrhinus*, *longicollis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 913. — *porcatus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 247. — *strangulatus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734. — *id.*, PERRIS, 1856, 249.

**Rhypochares**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 494. — *saprinoides*, 1853, 497.

**Rhysodes europæus**, AUBÉ, Lettre de M. Waga sur les mœurs de cet Ins., 1841, v. — *trisulcatus*, FAIRMAIRE, Esp. nouv. méditerranéenne, 1855, 314.

**Rhysophagus colon**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472. — *parallelcollis*, ROUGET, Esp. trouvée en obondance près de Paris, 1856, LII. — *pini*, CHEVROLAT, 1833, 472.

**Rhyssonotus cancellatus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 283.

**Rhytidophlœus**, COQUEREL, Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 252. — *albipes*, 1859, 253.

**Rhythyphora**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 37. — *rugicollis*, 1835, 38.

**Rhytirhinus annulipes**, LUCAS, Rectific. de synonymie, 1859, xcix. — *atticus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 686. — *horridus*, 1857, 684, et 1858, 60. — *humilis*, LUCAS, Var. d'*annulipes*, 1859, xcix. — *Linderi*, FAIRMAIRE, Col. du midi de la France, 1852, 87. — *læsirostris*, Descr. d'esp. nouv., 1859, 278.

**Rhytonomus murinus**, LEFEBVRE, trouvé dans les bouches sulfureuses du Vésuve, 1832, 312.

**Neopaledontus perforatus**, MELLIE, Monographie du genre *Cis*, 1848, 233. — *id.*, Détails sur ses larves, 1849, XL. — *perforatus*, 1848, 234.

**Neosalia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 561. — *alpina*, 1833, 561. — *id.*, BARTHELEMY, reçue de Tunis, 1835, LXXXII. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 124. — *id.*, FAIRMAIRE, reçue de Sicile, 1852, LXIII.

**Neugilus fragilis**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 468.

**Neutela**, BUQUET, Monstruosité, 1846, LXIII. — *id.*, Communic. d'une esp. du Brésil, 1845, LXXXVI. — *cyanitarsis*, GORY, Descr. de deux Col. nouv., 1833, 67. — *gracilis*, Deux esp. nouv., 1834, III. — *granulata*, 1834, 112. — *marginicollis*, FAIRMAIRE, Larves et nymphes recueillies à la Guadeloupe, 1856, LXXXV. — *pulchella*, SPINOLA, Monstruosité, 1835, 587. — *id.*, LEFEBVRE, Critique de l'opinion de M. Spinola, 1835, XL.

## S.

**Salpingus denticollis**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI. — *piceæ*, FAIRMAIRE, env. de Paris, 1846, LVI.

**Sandalus**, DE LAPORTE, Rhipicérites, 1834, 269. — *petrophia*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 168. — *id.*, DE LAPORTE, 1834, 267. — *Sichelii*, FAIRMAIRE, Descr. d'une nouv. esp., 1852, 693.

**Saperda**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 45. — *analis*, CHEVROLAT, Coll. de Banks, 1851, 663. — *cærulea*, JACQ. DU VAL, paraît identique à la *rufimana*, 1857, 95. — *carcharias*, AUD.-SERVILLE, 1835, 47. — *clavicornis*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *cylindrica*, AUD.-SERVILLE, 1835, 48. — *erythrocephala*, 1835, 46. — *fasciata*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *gracilis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ins. qui nuit aux moissons, 1847, XVII. — *grisea*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *lateralis*, 1851, 663. — *linearis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 48. — *longicornis*, CHEVROLAT, 1851, 663. — *luctuosa*, AUD.-SERVILLE, 1835, 46. —

*lyncea*, CHEVROLAT, 1851, 663. — *marmorea*, AUD.-SERVILLE, 1835, 47. — *modesta*, CHEVROLAT, 1851, 663. — *multipunctata*, AUD.-SERVILLE, 1835, 47. — *oculata*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 289. — *id.*, AUD.-SERVILLE, 1835, 48. — *Phoca*, JAVET, env. de Nîmes, 1848, XLVI. — *id.*, CHEVROLAT, trouvé dans la forêt de Compiègne, 1850, XXXIV. — *populnea*, AUD.-SERVILLE, 1835, 46. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *punctata*, PERRIS, Obs. sur les larves, 1847, 549. — *id.*, CHEVROLAT, se nourrit des branches mortes de l'orme, 1859, CXXX. — *scalaris*, DUPONCHEL, 1834, 289. — *id.*, AUD.-SERVILLE, 1835, 46. — *id.*, GOUREAU, Note pour son hist., 1844, 431. — *Seydlii*, WENCKER, prise à Haguenau (Bas-Rhin), 1858, CCXXXVIII. — *senegalensis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 48. — *smaragdina*, DUPONCHEL, 1834, 289. — *tristis*, CHEVROLAT, 1851, 659. — *unicolor*, 1851, 660. — *virescens*, AUD.-SERVILLE, 1835, 46.

**Saphanus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 81. — *cylindraceus*, FAIRMAIRE, Descr. de Col. d'Europe et de France, 1849, 426. — *spinosus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 81. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 107. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé en juin, sur la neige, dans la vallée de Fénestrelle, 1847, CVII. — *id.*, DOÛÈ, trouvé près de Besançon, 1853, LXIII. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans les Basses-Alpes, 1856, XCVI.

**Saprinus**, DE MARSEUL, Histerides, 1855, 327. — *ægyptiacus*, 1855, 455. — *æmulus*, 1855, 687. — *æneicollis*, 1855, 424. — *æneus*, 1855, 413. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 409. — *æratus*, DE MARSEUL, 1855, 737. — *algericus*, 1855, 405. — *alienus*, 1855, 742. — *amœnus*, 1855, 681. — *id.*, PEYRON, 1858, 412. — *antiquulus*, DE MARSEUL, 1855, 732. — *apricarius*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 577. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 724. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 725. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 787. — *arenarius*, DE MARSEUL, 1855, 691. — *areolatus*, 1855, 447. — *arrogans*, 1855, 487. — *artensis*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Cal., 1860, 266. — *assimilis*, DE MARSEUL, 1855, 431. — *aterrimus*, 1855, 738. — *atronitidus*, 1855, 483. — *auricollis*, 1855, 390. — *azurescens*, 1855, 423. — *azureus*, 1855, 426. — *barbipes*, 1857, 448. — *bicolor*, 1855, 439. — *bigemmeus*, 1855, 707. — *biguttatus*, 1855, 366. — *bipartitus*, 1855, 752. — *bisignatus*, 1855, 369. — *bistrigifrons*, 1855, 729. — *Blanchardi*, 1855,

368. — *Blanchii*, 1855, 461. — *blandus*, 1855, 475. — *Blissonii*, 1855, 454. — *bonariensis*, 1855, 429. — *boudista*, 1857, 446. — *brasiliensis*, 1855, 726. — *breviusculus*, 1855, 757. — *brunnivestis*, 1855, 440. — *Buqueti*, 1855, 696. — *campechianus*, 1855, 474. — *canalisticus*, 1855, 471. — *cavalieri*, 1855, 452. — *chalcites*, 1855, 445. — *chiliensis*, 1855, 500. — *ciliatus*, 1855, 746. — *cærulescens*, 1855, 748. — *concinus*, 1855, 484. — *conformis*, 1855, 484. — *conjugens*, 1855, 694. — *id.*, PEYRON, 1858, 412. — *connectens*, DE MARSEUL, 1855, 432. — *consputus*, 1855, 708. — *convexiusculus*, 1855, 494. — *corsicus*, 1855, 688. — *crassipes*, 1855, 717. — *crenatipes*, 1855, 753. — *cribellatus*, 1855, 442. — *cruciatus*, 1855, 354. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *cubæcola*, DE MARSEUL, 1855, 467. — *cupreus*, 1855, 448. — *curtus*, 1855, 751. — *cyanellus*, 1855, 387. — *cyaneus*, 1855, 385. — *decoratus*, 1855, 370. — *dentipes*, 1855, 728. — *desertorum*, 1855, 715, et 1857, 442. — *detersus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 396. — *dimidiatipennis*, 1855, 713. — *dimidiatus*, KIESENWETTER, 1851, 577. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 730. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *diptychus*, DE MARSEUL, 1855, 418. — *discoïdalis*, 1845, 375. — *disjunctus*, 1855, 731. — *distinguendus*, 1855, 441. — *elegans*, 1855, 383. — *elegantulus*, 1855, 698. — *equestris*, 1855, 358. — *Erichsonii*, 1855, 363. — *erythropleurus*, 1855, 472. — *erythropterus*, 1855, 434. — *estriatus*, 1857, 166. — *externus*, 1855, 365. — *ferrugineus*, 1855, 712. — *figuratus*, 1855, 509. — *fimbriatus*, 1855, 495. — *flexuosopunctatus*, 1857, 167. — *fraternus*, 1855, 701. — *frontistrius*, 1855, 450. — *fugax*, 1857, 445. — *fulgidicollis*, 1855, 392. — *fulvipes*, 1855, 680. — *fulvopterus*, 1855, 479. — *fulvus*, 1855, 406. — *gangeticus*, 1855, 398. — *gilvicornis*, 1855, 456. — *Godeti*, 1855, 734. — *granarius*, KIESENWETTER, 1851, 577. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 693. — *granatensis*, 1855, 481. — *grossipes*, 1855, 718. — *guyanensis*, 1855, 453. — *herbeus*, 1855, 689. — *hypocrita*, 1855, 473. — *ignotus*, 1855, 496. — *immundus*, 1855, 407. — *imperfectus*, *impressus*, 1855, 744. — *incisus*, 1855, 741. — *infaustus*, 1855, 745. — *innubus*, 1855, 464. — *insertus*, 1855, 746. — *insularis*, 1855, 492. — *interceptus*, 1855, 742. — *interruptus*, 1855, 362. — *interstitialis*, *intricatus*, 1855, 742. — *Javeti*, 1855, 709. — *Lacordairei*, 1855, 421. — *lætus*, 1855, 388. — *laridus*, 1855, 747. — *lautus*, 1855, 459. — *lepidus*, 1855, 371. — *longistrius*, 1855, 684. — *lubricus*, 1855, 410. — *lucidulus*, 1855, 749. — *lugens*, 1855, 395. — *maculatus*, JACQ.



DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 355. — *mancus*, 1855, 706. — *Marseulii*, PEYRON, 1858, 410. — *mediocris*, DE MARSEUL, 1855, 679. — *id.*, PEYRON, 1858, 412. — *mersinæ*, DE MARSEUL, 1857, 441. — *id.*, PEYRON, 1858, 409. — *metallescens*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 686. — *metallicus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 722. — *milium*, 1855, 476. — *minutus*, 1855, 486. — *modestior*, 1855, 493. — *modestus*, 1855, 477. — *multistriatus*, REICHE, Revue de l'ouv. du Dr Roth, 1852, 97. — *natalensis*, DE MARSEUL, 1855, 756. — *neglectus*, 1855, 491. — *nitidulus*, 1855, 402. — *id.*, DE MOTSCHULSKY, Ces espèces ne sont pas des *nitidulus*, 1859, CCVII. — *id.*; PEYRON, 1858, 409. — *nitidus*, DE MARSEUL, 1855, 364. — *obductus*, 1855, 746. — *obscurus*, 1855, 743. — *optabilis*, 1855, 438. — *orbiculatus*, 1855, 497. — *oregonensis*, 1855, 397. — *ornatus*, 1855, 360. — *ovalis*, 1855, 382. — *pæminosus*, 1855, 743. — *pastoralis*, JACQ. DU VAL, Deux genres nouv. et plusieurs esp. de France, 1852, 704. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 463. — *patagonicus*, 1855, 420. — *patruelis*, 1855, 711. — *pavidus*, 1855, 482. — *pectoralis*, 1855, 743. — *pecuinus*, 1855, 391. — *perinterruptus*, 1855, 359. — *pensylvanicus*, 1855, 435. — *Pharao*, 1855, 399. — *piceus*, 1855, 505. — *placidus*, 1855, 739, et 1857, 444. — *plenus*, 1855, 748. — *portus-magni*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *posthumus*, DE MARSEUL, 1855, 460. — *præcor*, 1855, 685. — *prasinus*, 1855, 414. — *id.*, PEYRON, 1858, 409. — *procerulus*, DE MARSEUL, 1855, 737. — *pseudobicolor*, 1855, 436. — *pseudocyanus*, 1855, 416. — *pulchellus*, 1855, 374. — *pullus*, 1855, 750. — *punctatissimus*, 1855, 394. — *puncticollis*, 1855, 755. — *4-guttatus*, 1855, 357. — *4-striatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 703. — *radiosus*, 1855, 724. — *rasselas*, 1855, 379. — *rotundatus*, 1855, 503. — *ruber*, 1855, 373. — *rubriculus*, 1855, 489. — *rufipes*, 1855, 692. — *rugifer*, 1855, 733. — *rugifrons*, FAIRMAIRE, 1852, 683. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 721. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 577. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *rugipennis*, DE MARSEUL, 1855, 417. — *russatus*, 1855, 466. — *id.*, PEYRON, 1858, 412. — *rutilus*, DE MARSEUL, 1855, 741. — *sabuleti*, 1855, 749. — *sabulosus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683 et 688. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 714. — *scissus*, 1855, 747. — *sculpturifer*, 1855, 697. — *semipunctatus*, 1855, 377. — *id.*, PEYRON, 1858, 408. — *semistriatus*, DE MARSEUL, 1855, 735. — *serri-*

*pes*, 1855, 677. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 787. — *specillum*, DE MARSEUL, 1855, 700. — *speciosus*, 1855, 381. — *specularis*, 1855, 704. — *speculifer*, 1855, 411. — *sphæroides*, 1855, 719. — *Spinolæ*, 1855, 754. — *splendens*, 1855, 380. — *spretulus*, 1855, 682. — *strigil*, 1855, 444. — *subnitidus*, 1855, 404. — *subrotundatus*, PEYRON, 1858, 410. — *subustus*, DE MARSEUL, 1855, 389. — *subvicinus*, 1855, 480. — *subvirescens*, 1855, 736. — *syriacus*, 1855, 469. — *tasmanicus*, 1855, 386. — *tenuistrius*, 1855, 458. — *triangulifer*, 1855, 462. — *tridens*, JACQ. DU VAL, Deux genres nouv. et plusieurs esp. de France, 1852, 703. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *id.*, DE MARSEUL, 1855, 501. — *turcicus*, Descr. d'un genre nouv. et de plusieurs esp. nouv., 1857, 438. — *tyrius*, 1857, 439. — *vafer*, Histérides, 1855, 398. — *venustus*, 1855, 740. — *versicolor*, 1855, 376. — *vescus*, 1855, 488. — *vestitus*, 1855, 547. — *viator*, 1855, 499. — *vinctus*, 1855, 746. — *violaceipennis*, 1855, 428. — *violaceus*, 1855, 736. — *virescens*, 1855, 440. — *viridulus*, 1855, 448. — *vitiosus*, 1855, 748.

**Sarrotrium** *muticum*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 114. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI.

**Scaphidium** *immaculatum*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *id.*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, pris au pied de l'Atlas dans des tiges mortes de *Cactus*, 1846, CIV. — *4-maculatum*, CHEVROLAT, 1833, 469.

**Scaphisoma** *agaricinum*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 413.

**Scapomegas**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 129. — *auritus*, *gibbus*, 1855, 132.

**Scaptobius** *aciculatus*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 420.

**Scarabæus**, DUPONT, Corselet perforé, 1846, xciv. — *Hector*, GORY, Esp. nouv., 1836, 514. — *id.*, CHEVROLAT, publié déjà sous le nom d'*anubis*, 1836, xx. — *Hercules*, LHERMINIER, Obs. sur ses habitudes, 1857, 503. — *id.*, MOUFFLET, La manœuvre prêtée à cet Insecte n'a été observée par personne, 1858, xv. — *id.*, ROJAS, Études entomologiques, 1857, 336. — *hybridus*, JACQ. DU VAL, est sans aucun doute l'*Onthophagus Lemur*, 1857, 95. — *Jupiter*, BUQUET, Note sur son identité avec le *Dynastes Jupiter Hope*, 1842, iv. — *Neptunus*, ROJAS, 1857, 335. — *punctatus*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834,

288. — *Serresii*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 274.  
— *tridens*, 1860, 277.

**Scarites**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 669. — *arenarius*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 87. — *compressus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 758. — *costulatus*, 1858, 757. — *Doquerau*, GORY, Centurie de Carabiques, 1833, 207. — *encephalus*, LUCAS, Col. envoyés d'Algérie, 1858, CLXXVIII. — *Hope*, GORY, 1833, 209. — *lævigatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 386. — *marginatus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 236. — *planus*, COQUEREL, pris à Hyères, 1850, XLIV. — *punctato-striatus*, PEYRON, 1858, 386. — *pyracmon*, AUDOUIN, Monstruosité, 1833, XLV. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 757. — *striatus*, REICHE, Col. algériens, 1848, XCII.

**SCARITITES**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 668.

**SCAURITES**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 159.

**Scaurus**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 161. — *id.*, LEFEBVRE, trouvé dans un vase égyptien, 1835, LXII. — *ægyptiacus*, SOLIER, 1838, 170. — *atratus*, 1838, 183. — *barbarus*, 1838, 165. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 233. — *carinatus*, SOLIER, 1838, 176. — *distinctus*, 1838, 173. — *dubius*, 1838, 181. — *hespericus*, 1838, 178. — *punctatus*, 1838, 182. — *puncticollis*, 1838, 172. — *rugulosus*, 1838, 174. — *Sancti-Amandi*, 1838, 177. — *striatus*, 1838, 180. — *id.*, AZAMBRE, trouvé à Civita-Vecchia, 1836, XIII. — *tristis*, SOLIER, 1838, 167. — *id.*, F. DE BEAUREGARD, pris à Grenade, deux mois vivant, 1852, IV. — *Varvasi*, SOLIER, 1838, 175. — *vicinus*, 1838, 171.

**Scelosodis**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 283. — *castaneus*, 1835, 284.

**Schizonycha hova**, COQUEREL, Obs. recueillies à Madagascar, 1852, 380.

**Schizorhina bifida**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 389.

**Sciaphilus costulatus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 629. — *giganteus*, FAIRMAIRE, Diagnoses de Col. d'Algérie, 1860, XXXI. — *muricatus*, Baie de la Somme, 1852, 685.

**Scimballium grandiceps**, JACQ. DU VAL, Genres et plusieurs esp. nouv., 1852, 699. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 723. — *planicollis*, PEYRON, Col. des env. de

**Tarsons**, 1858, 429. — *pubipenne, testaceum*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 159.

**Scleron** ou **Sclerum abbreviatum**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 260. — *algericum, fossulatum*, CHEVROLAT, Appartiennent au genre *Cnemaplatia*, 1855, CXII.

**.SCLÉROPTÉRIDES**, SOLIER, Hétéromères, 1834, 487.

**Sclerostomus costatus**, REICHE, C'est le *L. costatus* Dej., 1853, 84.

**Scolytus**, AUDOUIN, Résumé du résultat de recherches sur leurs ravages, 1837, II. — *id.*, FEISTHAMEL, Causes de ces ravages, 1837, v. — *id.*, DIVERS MEMBRES, Discussion sur les expériences de M. le D<sup>r</sup> Robert, 1845, XXIII. — *id.*, AMYOT, Les Scolytes attaquent les Pins malades, 1851, CXVIII. — *id.*, CHEVROLAT, Obs. faites sur les Scolytes des Pins, 1851, CXIX. — *id.*, BUQUET et DESMAREST, La décortication n'est pas un préservatif, 1860, LI. — *id.*, FEISTHAMEL, Détails sur les ravages d'une larve dans la forêt de Vincennes, 1836, XI. — *amygdali*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Remarque sur un nouv. Ins. qui attaque l'Amandier, 1847, XLVI. — *destructor*, DE LAPORTE, Lecture sur l'identité de cette esp. avec le *Sc. pygmaeus*, 1834, v. — *id.*, SPENCE, Ses ravages à Dunkerque et Calais, 1836, LI. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur ses mœurs et son anatomie, 1846, LXIX et LXXVII. — *multistriatus*, FAIRMAIRE, Dans les bois de Marly, 1854, XXXII. — *pruni*, LEFEBVRE, Dégâts causés à un Chêne, 1847, LXXXII. — *id.*, GOUREAU, Nuisible aux Pommiers, 1852, LXXXI. — *pygmaeus*, FEISTHAMEL, Ravages dans la forêt de Vincennes, 1835, LXXXI et XC. — *id.*, AUDOUIN, Larve qui a fait périr beaucoup de Chênes à Vincennes, 1836, xv et xxx. — *id.*, FEISTHAMEL, Cause de la mortalité des arbres à Vincennes, 1837, 393. — *id.*, AL. PIERRET, Dégâts causés dans le bois de Meudon, 1842, xxvi.

**Scopæus minutus**, KIESENWETTER, Col du midi de la France et de Catalogne, 1851, 423.

**Scortizus vittatus**, REICHE, Ajoutez à la synonymie *L. variolosus*, 1853, 84.

**Scotinus**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 496. — *brasiliensis*, 1836, 500. — *crenicollis*, 1836, 499. — *quadricollis*, 1836, 501.

**Scotobius**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 51. — *armentarius*, 1838, 65. — *costatus*, 1838, 64. — *crispatus*, 1838, 60. — *elongatus*, 1838, 59.

— *Gayi*, 1838, 62. — *granosus*, 1838, 56. — *Kirbyi*, 1838, 61. — *muricatus*, 1838, 58. — *pilularius*, 1838, 55. — *porcatus*, 1838, 57. — *rugosulus*, 1838, 63. — *substriatus*, 1838, 66.

**Scraptia fusca**, ROUGET, Monstruosité, 1849, 437.

**Scydmænus**, SALLÉ, Esp. de grande taille trouvée dans l'Amérique méridionale, 1848, LII. — *abditus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 148. — *angustatus*, 1860, 149. — *antidotus*, 1860, 148. — *conicicollis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 397. — *id.*, DE BARAN, trouvé à Fontainebleau, 1856, LXXV. — *cordicollis*, KIESENWETTER, 1851, 397. — *distinctus*, DE SAUSSURE, Diagnoses, 1859, XCVII. — *id.*, DESMAREST, Cette diagnose est de M. Tournier, 1859, CLXIII. — *elongatus*, KIESENWETTER, 1851, 398. — *Ferrarii*, 1851, 399. — *furtivus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 147. — *Helpferi*, 1860, 146. — *id.*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LV. — *hirticollis*, KIESENWETTER, 1851, 400. — *intrusus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 148. — *Kiesenwetteri*, 1851, 399. — *laticollis*, AUBÉ, Col. nouv., 1841, 233. — *Lævii*, KIESENWETTER, 1851, 398. — *minutissimus*, AUBÉ, 1841, 234. — *Motschulskyi*, FAIRMAIRE, Esp. nouv. pour la France, 1857, LII. — *Pandellei*, Miscell. entom., 1859, 33. — *promptus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 148. — *protervus*, 1860, 146. — *Schiodtei*, KIESENWETTER, 1851, 398. — *semipunctatus*, FAIRMAIRE, Diagnoses de Col. d'Europe et d'Algérie, 1859, CCXXXVI. — *spissicornis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 147. — *subcordatus*, FAIRMAIRE, 1859, CCXXXV. — *tritomus*, KIESENWETTER, 1851, 400. — *truncatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 145.

**Scymnus Ahrensii**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 735. — *biverrucatus*, JACQ. DU VAL, trouvé sur le quai de la Rapée, 1853, XLVI. — *saxatilis*, CHEVROLAT, Fontainebleau, 1833, 469.

**Scytropus squamosus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 631.

**Selenophorus confusus**, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 237. — *cupreus*, 1883, 238. — *cupripennis*, 1833, 239. — *fulvipes*, 1833, 237. — *scaritides*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 127. — *id.*, JACQ. DU VAL, trouvé aux env. de Toulouse, 1850, xxv.

**Selonodon**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 163. — *bicolor*, 1834, 164.

**Semiotus caracasanus**, ROJAS, Nouv. esp, de Vénézuéla, 1856, 694.

**Sepidium Pradieri**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr., 1858, LXIX.

**Sericoderus lateralis**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 413.

**Sericsomus brunneus**, CHEVROLAT, Fontainebleau, 1833, 468.

**SERRICORNES** LATREILLE, Distribution méthodique, 1834, 113.

**Serropalpus barbatus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137. — *Vaudoueri*, CHEVROLAT, Fontainebleau, 1833, 470, et Paris, 1848, XL.

**Stagona**, SOLIER, Obs. sur le genre *Ditomus*, 1834, 670. — *Dejeanii*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 754. — *europæa*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 389. — *longula*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 584.

**Sibylla**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 487. — *cæmeterii*, 1859, 487. — *flavisognata*, 1859, 489. — *integra*, 1859, 488.

**Sibynes attalicus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 643. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 41. — *parallelus*, KIESENWETTER, 1851, 642. — *potentillæ*, 1851, 643. — *silenes*, PERRIS, Col. pris dans les Landes, 1855, LXXVIII.

**Silaria Mulsanti**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Esp. nouv. de France, 1859, CCXXXIV.

**Silenus**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 128. — *brunneus*, 1834, 129.

**Silpha**, MULSANT, Larves que l'on croyait exclusivement carnassières, 1844, LXIX. — *alpina*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 133. — *carinata*, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 469. — *cribrata*, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 413. — *dispar*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *formosa*, DE LAPORTE, Esp. nouv. ou peu connues, 1832, 400. — *granulata*, *lævigata*, *nigrita*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 392. — *nigrita*, DESBROCHERS DES LOGES, Détails sur ses mœurs, 1859, CCLIX. — *obscura*, BLISSON, Descr. de la larve, 1846, 69. — *opaca*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, La larve vit des feuilles de betterave, 1846, LXXII. — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 682. — *id.*, CUSSAC, Dégâts causés par la larve dans les cultures de betteraves, 1857, LXXIII. — *puncticollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 791. — *4-punctata*, GHILIANI, 1847, 133. — *reticulata*, JACQ. DU VAL, trouvée en grande quantité aux env.

de Paris, champs de blé, 1857, xxxix. — *ruficornis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 791. — *rugosa, sinuata*, PEYRON, 1858, 413. — *sinuata*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 791. — *Souverbiï*, FAIRMAIRE, Descr. de Col. nouv., 1848, 168. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 392. — *thoracica*, GHILIANI, 1847, 92. — *unicostata*, DE LAPORTE, 1832, 400. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Anomalie singulière, 1851, xxx.

**SILVANIDES**, JACQ. DU VAL, Note sur cette fam., 1857, 102.

**Silvanus**, LEPRIEUR, trouvé dans des grains de café de Cayenne, 1847, LXXIV. — *bidentatus*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI. — *frumentarius* (indiqué par erreur sous le nom générique de *Sitophilus*), CHEVROLAT, trouvé dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII. — *6-dentatus*, BLISSON, Descr. de la larve et de la nymphe, 1849, 163. — *id.*, COQUEREL, Ses métamorphoses, 1849, xxxv et 172. — *unidentatus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 627.

**Simpliocaria** *semistriata*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683.

**Singilis**, SCHAUM, Note sur ce genre, 1860, 633. — *id.*, REICHE, Réponse à quelques points de cette note, 1860, 640. — *fuscipennis*, REICHE, C'est un *Phlæozeteus*, 1859, CXLIII. — *id.*, SCHAUM, nie cette proposition, 1859, CCLI. — *mauritanicus*, REICHE, C'est un *Phlæozeteus*, 1859, CXLIII. — *id.*, SCHAUM, conteste, 1859, CCLI. — *id.*, REICHE, maintient, 1859, CCLV. — *soror*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 753.

**Sinodendron** *cylindricum*, FAIRMAIRE, reçu de Sicile, 1852, LXIII.

**Sisyphus** *ocellatus*, REICHE, Revue du travail du D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *Schæfferi*, CHEVROLAT, Fontainebleau, 1833, 470. — *setiger*, REICHE, 1852, 97.

**Sitaris** *apicalis*, FAIRMAIRE, pris à la Teste et à Saumur, 1854, XLVII. — *humeralis, muralis*, AUDOUIN, Sa manière de vivre, 1835, LXXVII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, pris en grand nombre au bois de Boulogne, 1848, LIV. — *id.*, MULSANT, Détails sur ses mœurs, 1848, LIV. — *id.*, LUCAS, Notes sur ses mœurs, 1860, XVIII. — *id.*, SICHEL, Obs. sur la note de M. Lucas, 1860, XIX. — *id.*, AUDOUIN, Obs. sur les habitudes de ces Ins., 1839, XVII. — *Solieri*, PECCHIOLI, Esp. nouv., 1839, 527. — *id.*, Obs. au sujet de cette esp., 1839, XLVII. — *thoracica*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 96.

**Stones bispæricus**, REICHE et DE SAULCY, 1857, 669. — *gressorius*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 630. — *griseus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730. — *id.*, CHEVROLAT, Fontainebleau, 1833, 471. — *hispidulus*, *humeralis*, KIESENWETTER, 1851, 631. — *regensteiniensis*, 1851, 630. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685.

**Stophilus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, magnifique esp. attaquant les *Smilax*, 1857, CXIV. — *frumentarius* (c'est le *Silvanus frumentarius*), CHEVROLAT, trouvé dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII. — *granarius*, *orizæ*, AZAMBRE, pris à Rome, 1856, XVIII. — *orizæ*, LUCAS, grains de maïs dévorés par la larve, 1846, CX.

**Smaragdina**, *concolor*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 113.

**Smicorhina** *Sayi*, SCHAU, Lamell. mélit., 1849, 253.

**Smicronyx** *fulvipes*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 10. — *opacus*, GOUGELET et H. BRISOUT DE BARNEVILLE, Esp. nouv., 1860, 335.

**Solenophorus** *strepens*. LUCAS, Monstruosité remarquable, 1848, XIX.

**Solenoptera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 183. — *id.*, MOUFFLET, larves trouvées dans un giroflier en fleurs, 1858, XIV. — *canaliculata*, AUD.-SERVILLE, 1832, 184. — *femorata*, SALLÉ, Col. de la Répub. dominicaine, 1855, 270. — *lineata*, *4-lineata*, AUD.-SERVILLE, 1832, 184. — *4-lineata*, FAIRMAIRE, Larves et nymphes recueillies à la Guadeloupe, 1856, LXXXV. — *Taslei*, BUQUET, Descr. de cette esp. 1841, XXXIX.

**Sophrorhina** *Duvernoyi*, ROUZET, Descr. d'une nouv. esp., 1855, 79.

**Spathoptera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 50. — *albilatera*, 1835, 51. — *amicta*, *ampliata*, *ciliaris*, *dasycera*, *palliata*, *togata*, 1835, 52.

**Spercheus**, SOLIER, Hyprophiliens, 1834, 317. — *cmarginatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 101. — *id.*, LEPRIEUR, Mœurs et métam., 1850, XXXIV. — *id.*, CRESSAC, Mœurs et métam., 1852, 617, et 1853, XL. — *senegalensis*, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1838, 398.



- Spermophagus cardui**, BLANCHARD, Ins. trouvé en Sicile, 1844, LXXXIV. — *semifasciatus*, LUCAS, Note sur une esp. trouvée dans des haricots de la Plata, 1858, XXVIII. — *termaculatus*, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 867.
- Sphæridium bipustulatum, scarabæoides**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 406. — *sulcatum*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 269.
- Sphærites glabratus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 132.
- Sphæroderma**, ALLARD, Monogr. des Altises, 1860, 415. — *cardui*, 1860, 417. — *ocularia*, 1860, 416. — *rubida*, 1860, 417. — *testacea*, 1860, 415.
- Sphæroderus niagarensis**, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 390.
- Sphærorhinus Mac-Leayi**, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 879.
- Sphærosoma**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 162. — *ovum*, 1855, 164.
- Sphaniscus Chevrolatii**, ROJAS, Nouv. esp. de Vénézuëla, 1856, 695.
- Sphenognathus**, REICHE, Notes synonymiques, 1853, 69.
- Sphenophorus hemipterus**, MOUFFLET, Détails sur ses mœurs, 1858, XIV. — *liratus*, COQUEREL, Note sur ses métamorphoses, 1849, 445. — *id.*, MOUFFLET, 1858, XIV. — *meridionalis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIÉ, Col. des env. de Montpellier, 1852, 734. — *palmarum*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 911. — *pumilus*, 4-guttatus, 1860, 910. — *Testardi*, 1860, 909.
- Sphenoptera**, SOLIER, Buprestides, 1833, 299. — *diffinis, diversa, gemellata, geminata, lapidaria, litigiosa, lobicollis, thalassina*, 1833, 300. — *trisulcata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 413.
- Sphenura chrysoccephala**, COQUEREL, Obs. recueillies à Madagascar, 1852, 400. — *guttula*, 1852, 399.
- Sphingnotus**, CHEVROLAT, N'est autre que le genre *Pascoea* White, 1859, v.
- Sphodrus algerinus**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 22. — *atrocyaneus*, 1859, 24. — *australis*, 1859, 23. — *Denevui*, FAIRMAIRE et

COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 779. — *latebricola*, FAIRMAIRE, 1859, 23. — *leucophthalmus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1848, 371.

**Sphaeroderus niagarensis**, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 390.

**Sphyracus**, DE MARSEUL, Histérides, 1853, 489. — *omalodellus*, 1853, 492. — *uncipes*, 1853, 493.

**Spirachtha eurymedusa**, LUCAS, Viviparité, 1856, LXXXVIII.

**Spondylis buprestoides**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 131. — *id.*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 440.

**Stagnicola**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 246. — *foveicollis*, 1860, 247.

**Stalagmesoma albella**, SCHAU, Lamell. mélit., 1849, 266. — *alterna*, 1844, 375.

**STAPHYLINIENS**, PERRIS, Généralités sur les larves, 1853, 579. — *id.*, LEPRIEUR, Esp. trouvées aux env. de Bone, 1853, LVIII. — *id.*, KRAATZ, Communic. d'un nouv. genre provenant de Guinée, 1858, LXXXIX. — LABOULBÈNE, Gésier revêtu intérieurement de séries de poils très-distincts, 1850, XLVIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larve trouvée dans des pommes de terre malades, 1845, LXXXVI. — *id.*, DE SAULCY, Note contenant des détails sur divers Col., 1860, LXVII. — *id.*, DE MOTSCHULTSKY, Indic. des esp. de France et d'Algérie parmi celles décrites de l'auteur, 1860, XCII.

**Staphylinus alpicola**, CHEVROLAT, Env. de St-Germain, 1843, XL. — *chalcocephalus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXI. — *chloropterus*, FAIRMAIRE, trouvé à Fontainebleau, 1846, LV, et 1859, CX. — *chrysocephalus*, *cæsareus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 422. — *cæsareus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1854, 413. — *latebricola*, FAIRMAIRE, pris à Saint-Germain, 1849, LIV. — *lutarius*, pris auprès d'Orléans, 1848, XXXVI. — *id.*, PEYRON, 1858, 422. — *marginellus*, JACQ. DU VAL, C'est le *Quedius impressus*, 1857, 95. — *maxillosus*, PEYRON, 1858, 422. — *medioxinus*, FAIRMAIRE, Esp. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 73. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 156. — *Mulsanti*, GODART, trouvé dans les montagnes de

l'Aude, 1850, LV. — *id.*, AUBÉ, L'auteur le croit identique avec le *St. meridionalis*, Rosenh., 1851, XXI. — *olens*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 337. — *piceus*, JACQ. DU VAL, Identique à l'*Oxytelus rugosus*, 1857, 95. — *rupicola*, KIESENWETTER, 1851, 413. — *sanguineus*, JACQ. DU VAL, paraît se rapporter au *Philonthus corruscus*, ou plutôt au *varius*, 1857, 95. — *sculpticollis*, GAUBIL, Esp. nouv., 1852, VII. — *id.*, REICHE et LABOULBÈNE, C'est le *medioximus* Fairm., 1852, XXXVII.

**Steatoderus ferrugineus**, BLISSON, Descr. de la larve, 1846, 65. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 90.

**Steirastoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 24. — *acutipenne*, SALLÉ, Col. de la république dominicaine, 1856, 691. — *brevis*, AUD.-SERVILLE, 1835, 25. — *depressus*, ROJAS, Col. de Vénézuëla, 1857, 329.

**Stelenus**, BUQUET, Mémoire sur divers Col., 1859, 621. — *ichneumoneus*, 1859, 622.

**Stenaspes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 51. — *verticalis*, 1834, 52.

**Stenholma**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 412. — *tentyrioides*, 1835, 413.

**Stenidea Foudrasei**, Troberti, DELAROUZÉE, trouvées aux env. d'Hyères, 1858, CV. — *id.*, Vivent toutes les deux dans le chêne-liège, 1858. CXLVI.

**Stenocara**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 553. — *Bonellii*, 1835, 565. — *cavifrons*, 1835, 568. — *conifera*, 1835, 559. — *Fabricii*, 1835, 560. — *gracilipes*, 1835, 562. — *laevicollis*, 1835, 561. — *longipes*, 1835, 557. — *morbillosa*, 1835, 564. — *rotundata*, 1835, 558. — *ruficornis*, 1835, 569. — *6-lineata*, 1835, 366. — *Winthemi*, 1835, 567.

**Stenocerus Dufouri**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 867.

**Stenocheila**, SOLIER, Sur qqes Carnassiers terrestres, 1836, 589. — *Salzmanni*, 1836, 592.

**Stenochia saracena**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 270.

**Stenocnemus Mannerrheimii**, DE CHAUDOIR, Monogr. du genre *Colpodus*, 1859, 360.

**Stenocorus fasciatus**, CHEVROLAT, Coll. de Banks, 1851, 663. — *inquisitor*, L. DUFOUR, Ses métamorphoses, 1840, 63. — *spinicornis*, CHEVROLAT, 1851, 659.

**Stenocrates holomelanus**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 8.

**Stenoderus suturalis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 210.

**Stenodontes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 173. — *damicornis*, 1832, 174. — *mandibularis*, 1832, 173.

**Stenogaster**, SOLIER, Buprestides, 1833, 305. — *atomaria*, 1833, 306.

**Stenolophus discophorus, grandis**, PEYRON, Col. de Tarsous, 1858, 380. — *marginatus*, 1858, 381. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 764. — *proximus*, PEYRON, 1858, 381. — *Skrimshiramus, vaporariorum*, 1858, 380. — *vaporariorum*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 764.

**Stenomera Blanchardii**, LUCAS, Sur un nouveau genre du nord de l'Afrique, 1850, 31.

**Stenomorpha**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 487. — *blapsoides*, 1836, 491. — *costata, subpilosa*, 1836, 490.

**Stenopterus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 545. — *cyaneus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 107. — *mauritanicus*, LUCAS, Sorti d'une bûche d'arbre rapportée d'Afrique depuis quatre ans, 1846, LIII. — *id.*, Note sur cet Ins., 1848, LXIII. — *molorchoides*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 498. — *rufus*, AUD.-SERVILLE, 1833, 546.

**Stenorhopalus gracilis**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 502.

**Stedosida**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 281. — *tenuicollis*, 1835, 282.

**Stenosides**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 484. — *graciliformis*, 1836, 486.

**Stenostola nigripes**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 108.

**Stenostoma rostrata**. JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730.

**Stenotarsia scapulata**, COQUEREL, Observ. recueillies à Madagascar, 1852, 375.

**Stenura aurulenta**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 135.

**Stenus**, THION, Descr. des organes de la manducation, 1835, 153. — *id.*, AUDOUIN, Obs. sur le mémoire de M. Thion, 1835, 166. — LEPRIEUR, Méthode dichotomique appliquée à ce genre, 1851, 191, et CXVII. — *ærosus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 426. — *asphaltinus*, CHEVROLAT, trouvé à Rouen, 1850, XXI. — *ater*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 424. — *biguttatus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 431. — *bipunctatus*, KIESENWETTER, 1851, 423. — *bipunctatus, canaliculatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *carinifrons*, JACQ. DU VAL, Paraît identique avec le *St. impressipennis*, 1857, LIV. — *id.*, FAIRMAIRE, Accepte la rectification indiquée, 1857, LX. — *cicindeloides*, KIESENWETTER, 1851, 427. — *circularis*, 1851, 425. — *cordatus*, 1851, 426. — *decipiens*, LEPRIEUR, 1851, 201. — *id.*, REICHE, pris dans la forêt de Bondy, 1852, XXV. — *declaratus*, KIESENWETTER, 1851, 425. — *elegans*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 163. — *eumerus*, KIESENWETTER, 1851, 425. — *ferruginea* (genre *Margus*), GUÉRIN-MÉNEVILLE, Col. trouvés dans la racine de *Squine*, 1845, XVI. — *fossulatus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *fuscipes*, KIESENWETTER, 1851, 425. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *geniculatus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *guttula*, KIESENWETTER, 1851, 423. — *Guynemeri*, JACQ. DU VAL, Genre nouv. et esp. nouv., 1850, 51. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé il y a plus de quatre ans dans les Pyr.-Or., 1850, VI. — *id.*, JACQ. DU VAL, pris dans les Pyr.-Or., 1855, LXXX. — *hospes*, KIESENWETTER, 1851, 424. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 724. — *humilis*, PEYRON, 1858, 431. — *impressipennis*, JACQ. DU VAL, Genre et esp. nouv. de France, 1852, 701. — *Leprieuri*, CUSSAC, Desc. de cette nouv. esp., 1851, XXIX. — *lustrator*, KIESENWETTER, 1851, 424. — *muscorum*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 42. — *nigritulus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *nitidus*, KIESENWETTER, 1851, 424. — *id.*, PEYRON, 1858, 431. — *oculatus*, KIESENWETTER, 1851, 427. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *id.*, PEYRON, 1858, 431. — *orcophilus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 43. — *plantaris, pusillus*, PEYRON, 1858, 431. — *pusillus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 724. — *id.*, FAIR-

MAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *rugosus*, KIESENWETTER, 1851, 424. — *rusticus*, L. DUFOUR, Note sur une énorme agglomération de cette esp., 1856, xci. — *speculator*, KIESENWETTER, 1851, 424. — *subæneus*, 1851, 426, — *id.*, FAIRMAIRE, 1852, 682. — *subfasciatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 167. — *subimpressus*, PEYRON, 1858, 431. — *tarsalis*, FAIRMAIRE, 1852, 632, — *tempestivus*, KIESENWETTER, 1851, 426.

**Stenygra**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 95. — *coarctata*, 1834, 96. — *histrion*, 1834, 97. — *ibidionoides*, 1834, 98. — *tricolor*, 1834, 97.

**Stenaspis**, SOLIER, Buprestides, 1833, 267. — *id.*, SPINOLA, Sur les esp. de ce genre, 1838, 303. — *Boyeri*, SOLIER, 1833, 269. — *brevicornis*, SPINOLA, 1838, 339. — *scabra*, SOLIER, 1833, 268. — *id.*, SPINOLA, 1838, 337. — *semigranosa*, SOLIER, 1833, 269. — *id.*, SPINOLA, 1838, 337. — *speciosa*, 1838, 330. — *squamosa*, 1838, 336. — *triangularis*, 1838, 333.

**Stenacanthus undatus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 172.

**Stenocera**, SOLIER, Buprestides, 1833, 273. — *castanea*, *chrysis*, 1833, 274. — *interrupta*, SOLIER, 1833, 274. — *oryssa*, BUQUET, Commun. des deux sexes, 1837, LXXVI. — *sternicornis*, SOLIER, 1833, 274.

**Stenocnemus**, *Mannerheimii*, DE CHAUDOIR, Monogr. du genre Colpodes, 1859, 360.

**Stenodontes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 173. — *damicornis*, 1832, 174. — *mandibularis*, 1832, 173.

**Sternolophus rufipes**, SOLIER, Hydrophiliens, 1834, 307. — *Solieri*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 357. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 403.

**Sternotomis Thomsonii**, BUQUET, Descr. d'une nouv. esp., 1835, 77.

**STERNOXES**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 120.

**Steropus æthiops**, LUCAS, pris dans les env. de Phalsbourg, 1847, xiv. — *concinus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 130.

**Stethodesma hæmatopus**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 263. — *melanoptera*, 1844, 366.

**Stethoxus ater**, SOLIER, Hydrophiliens, 1833, 307.

**Sthelenus**, BUQUET, Deux genres nouv. de Longicornes, 1859, 621. — *ichneumoneus*, 1859, 622.

**Stibara trilineata**, CHEVROLAT, coll. Banks, 1851, 663.

**Stictosomus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 153. — *semicostatus*, 1832, 154.

**Stigmodera**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 720. — *ampliocollis*, 1858, 724. — *bivittata*, 1858, 721. — *chalybeiventris*, 1858, 732. — *chiliensis*, 1858, 733. — *confusa*, 1858, 723. — *conjuncta*, 1858, 724. — *costipennis*, 1858, 734. — *cribricollis*, 1858, 722. — *cruentata*, MURRAY, Descr. de deux Buprestides nouv., 1852, 253. — *cupricollis*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 725. — *hastaria*, 1858, 728. — *macularia*, SOLIER, Buprestides, 1833, 294. — *minor*, FAIRMAIRE et GERMAIN, 1858, 721. — *picta*, 1858, 726. — *Rouletii*, 1858, 725. — *Rousselii*, 1858, 728. — *semivittata*, 1858, 727. — *Souverbii*, *viridiventris*, 1858, 730. — *vittata*, 1858, 723.

**Stillicus rufipes**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 429. — *similis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 423.

**Stomis rostratus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 116.

**Strangalia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 220. — *calcarata*, *luteicornis*, 1835, 221. — *4-fasciatus*, LUCAS, prise en juillet dans les îles d'Asnières, 1849, LXV. — *id.*, CHEVROLAT, prise au même lieu, ainsi que sa larve et sa nymphe, 1849, LXV. — *id.*, LAROULBÈNE, Elle se rencontre aussi dans les Pyrénées, 1849, LXV. — *id.*, FAIRMAIRE, prise récemment au Mont-Dore, 1849, LXV. — *suturata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 22.

**Strategus alæus**, *antæus*, *Jugurtha*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 11. — *julianus*, 1859, 12. — *mormon*, 1859, 11. — *syphax*, 1859, 12.

**Streptocerus speciosus**, FAIRMAIRE, Nouveau genre de Lucanide, 1850, 53.

**Strigoderma fulgicollis**, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 304. — *insignis*, 1844, 305.

**Stringophorus Horsfieldii**, *longipes*, SCHAUM, Lamell, mélit., 1844, 399.

**Stromatium barbatum**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 80. — *strepens*, LUCAS, Note sur plusieurs Col. nouv. du nord de l'Afrique, 1843, XXIV.

**Strophosomus albarius**, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 668. — *hibisci*, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 882. — *lineolatus*, FAIRMAIRE, Diagnoses, 1859, CIV. — *subnudus*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 537. — *id.*, Esp. rare en France, 1857, LII. — *id.*, Controverse sur cette espèce entre MM. JACQ. DU VAL et FAIRMAIRE, 1857, LIII, LIX et LXXVII.

**Stylosomus ericeti**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 653. — *ilicicola*, SUFFRIAN, Monogr. des espèces européennes, 1850, 297. — *id.*, KIESENWETTER, 1851, 653. — *minutissimus*, *tamaricis*, SUFFRIAN, 1850, 297. — *tamaricis*, KIESENWETTER, 1851, 653.

**Styphlus cuneipennis**, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 341. — *muscorum*, FAIRMAIRE, Descr. de Col. nouv., 1848, 170. — *setiger*, AUBÉ, trouvé près de Paris dans une sablière, 1854, xxx. — *ulcerosus*, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 341. — *unguicularis*, 1850, 340. — *verrucosus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 646.

**SUBPENTAMÈRES**, REICHE, Qques observ. sur l'ouvrage de M. Lacordaire, 1845, XLV.

**Sunius augustatus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 423. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 430. — *ater*, AUBÉ, Col. d'Europe et l'Algérie, 1850, 337. — *bimaculatus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 723. — *id.*, PEYRON, 1858, 430. — *diversus*, AUBÉ, 1850, 318. — *diversus*, *filiformis*, KIESENWETTER, 1851, 423. — *id.*, PEYRON, 1858, 430. — *filum*, AUBÉ, 1850, 317. — *intermedius*, PEYRON, 1858, 430. — *latus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1850, 164. — *pulchellus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 723. — *pulcher*, AUBÉ, 1850, 319. — *id.*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LX. — *uniformis*, JACQ. DU VAL, Genre nouv. et plusieurs esp. de France, 1852, 700. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 723.

**Symbiotes**, AUBÉ, Genre trouvé à Fontainebleau, 1850, xxiv.

**Sympiezocera Laurasii**, LUCAS, Esp. nouv., 1851, cvi.

**Synaptus filiformis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 159.

**Syncalypta setigera**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 683.

**Syndesus**, REICHE, Notes synonymiques, 1853, 68.



**Synechita juglandis**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE. Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *lævicollis*, *variegata*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 472.

**Synthliborhynchus**, FAIRMAIRE, Notes synonymiques, 1856, 547.

**Synthomium æneum**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 682. — *id.*, trouvé dans les bois de Marly, 1854, XXXII.

## T.

**Tachinus collaris**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *finetarius*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 413. — *humeralis*, PERRIS, Des métam., 1846, 331 et 335. — *pictus*, FAIRMAIRE, Col. nouv. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 71. — *id.*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LX. — *id.*, FAIRMAIRE, Esp. nouv. de la faune médit., 1855, 312.

**Tachygonus phalangium**, BUQUET, Magnifique esp. de Cayenne, 1852, LIX.

**Tachyporus**, AZAMBRE, Nouv. esp. prise en Italie, 1856, XVII. — *brunneus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 420. — *cellaris*, PERRIS, Ses métam., 1846, 331. — *discus*, REICHE et DE SACLAY, Col. d'Orient, 1856, 359. — *elegantulus*, 1856, 360. — *hypnorum*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LX. — *id.*, PEYRON, 1858, 420. — *meridionalis*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 40. — *ruficollis*, Baie de la Somme, 1852, 681. — *saginitus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 413. — *scitulus*, PEYRON, 1858, 420.

**Tachyusa atra**, *balteata*, *coarctata*, *constricta*, *ferialis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 404. — *ferialis*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722. — *id.*, LEPRIEUR, Env. de Bone, 1853, LIX. — *forticornis*, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 36. — *lata*, Baie de la Somme, 1852, 680. — *id.*, LEPRIEUR, 1853, LIX. — *sulcata*, KIESENWETTER, 1851, 404.

**Tæniodera malabariensis**, *picta*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 369.

**Tæniotes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 90 — *pulverulentus*, *subocellatus*, 1835, 91.

**Tagenia**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 11. — *id.*, AZAMBRE, Esp. trouvée à Rome, 1856, XVIII. — *affinis*, SOLIER, 1838, 26. — *angustata*, 1838, 15. — *id.*, AZAMBRE, 1856, XVIII. — *comata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 230. — *corsica*, SOLIER, 1838, 33. — *elongata*, 1838, 24. — *filiformis*, 1838, 27. — *frioli*, 1838, 19. — *fulvipes*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 232. — *grandis*, SOLIER, 1838, 23. — *græca*, 1838, 23. — *hesperica*, 1838, 29. — *hispanica*, 1838, 25. — *intermedia*, 1838, 17. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729. — *lævicollis*, SOLIER, 1838, 19. — *minuta*, 1838, 32. — *obliterata*, 1838, 30. — *orientalis*, 1838, 20. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 231. — *pilifera*, SOLIER, 1858, 21. — *pubescens*, 1838, 22. — *id.*, REICHE, retrouvé en Palestine, 1855, XLVII. — *pumila*, SOLIER, 1838, 33. — *sicula*, 1838, 18. — *smyrnensis*, 1838, 31. — *subcostata*, 1838, 34.

**TAGÉNITES**, SOLIER, Collaptérides, 1838, 6.

**Talasius Douei**, BUQUET, Communic. des deux sexes. 1859, CXXXVIII.

**Talæpora nana**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 522. — *pusilla*, 1859, 521.

**Tanymerus palliatus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 630. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *siculus*, TOURNIER, Diagnoses, 1860, LXXXI.

**Tapeina**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 23. — *americana*, DE LAPORTE, 50 espèces nouv. ou peu connues, 1832, 411. — *bicolor*, *coronata*, *dispar*, *Fichtelii*, *picea*, AUD.-SERVILLE, 1835, 24.

**Tapina** (voyez *Tapeina*).

**Taphria vivalis**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 88.

**Taphrocerus**, SOLIER, Collaptérides, 1833, 314. — *alboguttata*, 1833, 315.

**Taranistes**, KRAATZ, Communic. d'un indiv. de ce genre venant de Ceylan, 1858, LXXXIX.

**Tellus Thomsonii**, THOMSON, Col. nouv. ou peu connus, 1856, 325.

**Teinodactyla**, ALLARD, Monogr. des Altises, 1860, 87. — *abdomina-*

*lis*, 1860, 119. — *albinea*, 1860, 833. — *anchusæ*, 1860, 98. — *apicalis*, 1860, 102. — *atricapilla*, 1860, 117. — *atricilla*, 1860, 108. — *ballotæ*, 1860, 133. — *brunnea*, 1860, 129. — *brunniceps*, 1860, 138. — *circumsepta*, 1860, 105. — *consociata*, TAPPES, prise dans le département du Cher, 1858, CCXIV. — *corynthia*, ALLARD, 1860, 93. — *curta*, 1860, 832. — *dorsalis*, 1860, 104. — *echii*, 1860, 90. — *elongata*, 1860, 94. — *femoralis*, 1860, 123. — *flavicornis*, 1860, 136. — *fuscoænea*, 1860, 92. — *holsatica*, 1860, 101. — *lævis*, 1860, 121. — *lateralis*, 1860, 110. — *lateripunctata*, 1860, 116. — *latifrons*, 1860, 130. — *Linnæi*, 1860, 91. — *lurida*, 1860, 135. — *lycopi*, 1860, 832. — *medicaginis*, 1860, 124. — *megaloleuca*, 1860, 122. — *melanocephala*, 1860, 111. — *nasturtii*, 1860, 115. — *nigra*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *id.*, ALLARD, 1860, 95. — *obliterata*, 1860, 96. — *ochroleuca*, 1860, 131. — *parvula*, 1860, 99. — *pectoralis*, 1860, 833. — *pratensis*, 1860, 137 et 832. — *pusilla*, 1860, 125. — *4-pustulata*, 1860, 103. — *Reichei*, 1860, 132. — *rubenticollis*, 1860, 118. — *rutila*, 1860, 131. — *Sen-cieri*, 1860, 106. — *sisymbrii*, 1860, 112. — *subrotunda*, 1860, 100. — *succinea*, 1860, 833. — *suturalis*, 1860, 114. — *tabida*, 1860, 126. — *testacea*, 1860, 127. — *teucrii*, 1860, 139. — *thapsi*, 1860, 113. — *thoracica*, 1860, 107. — *verbasci*, 1860, 120.

**Telephorus** *albomarginatus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 592. — *apicalis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 176. — *ater*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 684. — *bicolor*, KIESENWETTER, 1851, 597. — *brevicornis*, 1851, 595. — *clypeatus*, CHEVROLAT, Un *Malthinus*, nouv. esp., dévoré par cet Ins., 1834, XI. — *dimidiatipes*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 172. — *dispar*, KIESENWETTER, 1851, 590. — *fibulatus*, 1851, 593. — *flavilabris*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *fulvicollis*, *fuscicollis*, 1851, 598. — *fuscus*?, TYZENHAUS, Une pluie d'Ins. en Lithuanie, 1849, XXVII. — *Guerinii*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 307. — *hæmorrhoidalis*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 173. — *lateralis*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *lineatus*, KIESENWETTER, 1851, 594. — *lividus*, 1851, 596. — *marginiventris*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 171. — *nigricans*, KIESENWETTER, 1851, 590. — *obscurus*, 1851, 595. — *ochropus*, AUBÉ et REICHE, trouvé à Compiègne, 1852, XXXII. — *opacus*, KIESENWETTER, 1851, 595. — *paludosus*, *pellucidus*, FAIRMAIRE, 1852, 684. — *pellucidus*, KIESENWETTER, 1851, 590. — *prolixus*, 1851, 598. — *rufus*, 1851, 596. — *sulcifrons*, 1851, 599. — *tri-*

*punctatus*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 175. — *tristis*, KIESENWETTER, 1851, 592. — *ustulatus*, 1851, 596. — *xantholoma*, 1851, 590.

**Temnochila** *cærulea*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1853, 604.

**Temnopsis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 90. — *tæniatus*, 1834, 91.

**Temnopterus** *aculeatus*, SOLIER, Hydrophiliens, 1834, 307.

**Temnorhynchus** *Baal*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 369. — *Diana*, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 13.

**Temognatha** (voyez *Themognatha*) *trifasciata*, MURRAY, Deux Buprestides nouv., 1852, 254.

**Tenebrio** *cancellatus*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 296. — *pachysoma*, 1860, 292.

**Tentyria**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 314. — *id.*, E. BLANCHARD, Moyens propres à faire distinguer les esp. de ce genre, 1845, XXIII. — *id.*, LUCAS, Nouv. esp. de l'Algérie, 1856, 697. — *acuminata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 209. — *acuminipennis*, LUCAS, 1856, 703. — *ægyptiaca*, SOLIER, 1835, 334. — *angulata*, 1835, 347. — *angusticollis*, 1835, 328. — *barbara*, 1835, 340. — *Basii*, 1835, 356. — *bipunctata*, 1835, 336. — *collatina*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 207. — *cribrata*, GÉNÉ, Phrases spécifiques, 1836, III. — *cylindrica*, SOLIER, 1835, 353. — *Dejeanii*, 1835, 345. — *discicollis*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 207. — *Duponti*, SOLIER, 1835, 323. — *excavata*, 1835, 364. — *Fischeri*, 1835, 355. — *Floresii*, GÉNÉ, 1836, III. — *gallica*, SOLIER, 1835, 333. — *gibbicollis*, LUCAS, 1856, 707. — *glabra*, SOLIER, 1835, 338. — *id.*, LUCAS, prise au milieu de septembre et encore vivante, 1852, LXIX. — *Godartiana*, Esp. du nord de l'Algérie, 1856, 700. — *Goudoti*, SOLIER, 1835, 360. — *grandis*, 1835, 343. — *grossa*, 1835, 361. — *Herculeana*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 204. — *incerta*, SOLIER, 1835, 359. — *interrupta*, 1835, 331. — *italica*, 1835, 348. — *lævicollis*, 1835, 329. — *lævis*, 1835, 358. — *Latreillei*, 1835, 339. — *ligurica*, 1835, 324. — *longicollis*, LUCAS, 1856, 706. — *Maillei*, SOLIER, 1835, 350. — *marocana*, 1835, 333. — *mucronata*, 1835, 320. — *id.*, major BLANCHARD, trouvée à Fours (Charente-Inférieure), 1853, IV. — *Mulsanti*, LUCAS, 1856, 704. — *nitida*, SOLIER, 1835, 323. — *nomas*, 1835, 349. — *oblonga*, 1835, 321. — *Olivieri*, 1835, 368. — *orbicollis*, 1835, 362. — *Ottii*, LUCAS, 1856, 701. — *Peiroleri*, SOLIER, 1835, 357. — *punctato-*

*striata*, 1835, 337. — *pygmaea*, GÉNÉ, 1836, III. — *Ramburti*, SOLIER, 1835, 327. — *rugosa*, GÉNÉ, 1836, III. — *Salzmanni*, SOLIER, 1835, 351. — *sardea*, 1835, 340. — *scabripennis*, 1835, 366. — *scabrinuscula*, 1835, 365. — *senegalensis*, 1835, 326. — *sicula*, 1835, 342. — *Solieri*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 206. — *subcostata*, SOLIER, 1835, 325. — *subdepressa*, 1835, 346. — *subfossulata*, 1835, 369. — *subrugosa*, 1835, 352. — *substriata*, 1835, 332. — *subtruncata*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 203. — *taurica*, SOLIER, 1835, 354. — *tristis*, 1835, 249.

**TENTYRITES**, SOLIER, Coléoptérides, 1835, 249.

**Tephrea morosa**, SCHAU, Lamell. mélit., 1849, 287.

**Tetanus nitidulus**, CHEVROLAT, Larves trouvées dans le Chêne, 1846, LXXIV. — *nitidus*, FAIRMAIRE, Env. de Paris, 1846, LVI.

**Teretinus**, DE MARSEUL, Hétéridés, 1856, 129. — *mozambicus*, 1856, 138. — *pillmanus*, 1856, 134. — *picipes*, 1856, 136. — *id.*, LEPRÉUR, Parasites des *Xylopertha*, 1859, CXCIII. — *id.*, PETRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 412. — *punctulatus*, DE MARSEUL, 1856, 140. — *rufulus*, 1856, 139. — *sègnis*, 1856, 135. — *virens*, 1856, 136.

**Tessarodon**, REICHE, Coprophages, 1842, 73. — *hollandiae*, 1842, 75.

**Tetracha algeriana**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur une Mégacéphale trouvée en Algérie, 1846, CII.

**Tetragonoderus** Baz, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 242. — *Lepricor*, 1833, 244. — *4-maculatus*, 1833, 243.

**Tetralobus australasiae**, GORY, *Tetralobus* et *Scarabæus* nouv., 1836, 513. — *cinereus*, Description d'un *Tetralobus* nouv., 1832, 220. — *flabellicornis*, *gigas*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 147.

**TÉTRAMÈRES**, CHEVROLAT, Chrysomèles exotiques, 1834, III.

**Tetraopes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 68. — *arator*, *tornator*, 1835, 69.

**Tetraophthalmus lobicollis**, CHEVROLAT, Coll. de Banks, 1851, 663.

**Tetraphyllus**, COQUEREL, Obs. recueillies à Madagascar, 1852, 382. — *acertus*, *acidiperus*, 1852, 386. — *balteatus*, 1852, 387. — *Buquetii*, 1852, 389. — *cuprinus*, 1852, 392. — *Deyrollei*, 1852, 385. — *formosus*, 1852, 383. — *mirificus*, 1852, 384. — *purpuratus*, 1852,

390. — *smaragdinus*, 1852, 391. — *splendidus*, 1852, 386. — *thoracicus*, 1852, 394.

**Tetratoma variegatum**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 131.

**Thalpophila**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 370. — *abbreviata*, 1835, 372. — *polita*, 1835, 374.

**Thamnophilus violaceus**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137.

**Thanasimus formicarius**, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 602. — *4-maculatus*, 1854, 607. — *id.*, BUQUET, pris le jour même aux Champs-Élysées, 1860, LX.

**Thaneroclerus**, LEFEBVRE, Nouv. genre de Clérites, 1838, XVIII.

**Thareps melasioides**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 174.

**Thaumusus gigas**, REICHE, Esp. nouv. formant un genre nouv., 1853, 417. — *id.*, A. DEYROLLE, Communic. d'un indiv. ♂ de Vénézuëla, 1856, LXXXIV.

**Theano cruciatus**, CHEVROLAT, Esp. nouv. de Térédiles, 1843, 33.

**Themognatha** (voyez *Temognatha*) *variabilis*, SOLIER, Buprestides, 1838, 291.

**Thereva nobilitata**, FAIRMAIRE, prise dans la forêt de St-Germain, 1849, LX.

**Thinobatis**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 406. — *rufipes* 1835, 407.

**Thinobius brevipennis**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 432. — *ciliatus*, JAVET, pris en Irlande, 1850, XXIV. — *longipennis*, KIESENWETTER, 1851, 432.

**Thereetes marginatus**, *puncticollis*, LUCAS, Note sur plusieurs Col. algériens, 1856, IV. — *rotundatus*, Synonymie, 1853, XI.

**Thoriectus**, GAUBIL, pris à Marseille, 1850, XXXIX. — *id.*, PEYRON, Note monographique sur ce genre, 1857, 697, — *castaneus*, 1857, 701. — *dimidiatus*, 1857, 707. — *gallicus*, 1857, 713. — *Germari*, FAIRMAIRE, Esp. curieuses trouvées aux env. de Mers-el-Kébir, 1857, XXXIII. — *grandicollis*, PEYRON, 1857, 709. — *laticollis*, 1857, 712. — *id.*, DE MOTSCHULSKY, Diffère du *Xylonotrogus lateralis* de l'auteur, 1859, CCVI. — *loricatus*, PEYRON, 1857, 710. — *mauritanicus*, 1857, 703. — *id.*, FAIRMAIRE, 1857, XXXIII. — *id.*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 170. — *orientalis*, PEYRON, 1857,

706. — *Peyroni*, DE MOTSCHULTSKY, L'auteur appelle ainsi le *Th. lateralis* de Caramanie, 1859, CCVII. — *pilosus*, PEYRON, 1857, 702. — *puncticollis*, 1857, 705. — *stricticollis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1860, 170.

**Thriptera**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 48. — *asphaltidis*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 218. — *crinita*, SOLIER, 1836, 51. — *Maillei*, 1836, 50. — *Varvasi*, 1836, 52. — *villosa*, 1835, 53.

**Thronistes Rouxii**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 13.

**THROSCIDES**, DE BONVOULOIR, Descr. de plusieurs esp. de cette famille, 1860, 351. — *id.*, Tableau de concordance synonymique, 1860, 365.

**Throscus calocerus**, DE BONVOULOIR, Descr. de plusieurs esp. nouv. de cette famille, 1860, 354. — *constrictor*, 1860, 355. — *dermestoides*, LATREILLE, Serricornes, 1834, 134. — *pusillus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 728. — *Schawunii*, DE BONVOULOIR, 1860, 352.

**Thylacites fritillum**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 101. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 730. — *Guinardi*, JACQ. DU VAL, Genre nouv., plusieurs esp. nouv. de France, 1852, 708. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 730. — *id.*, FAIRMAIRE, Commun. d'un indiv. vivant, 1854, LVII. — *insidiosus*, FAIRMAIRE, Descr. d'esp. nouv., 1859, CLI. — *oblongus*, GRAELLS, Faune centrale de l'Espagne, 1851, 22. — *scripunctatus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'orient, 1857, 666.

**Thymalus limbatus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, AUBÉ, Nymphé trouvée dans l'aubier pourri du chêne, 1841, XIX. — *id.*, GOUREAU, trouvé dans de vieux sapins pourris, 1841, XIX. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 112.

**Thyrna**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 179. — *lateralis*, 1832, 180.

**Tilloidea**, DE LAPORTE, 50 esp. nouv. ou peu connues, 1832, 398. — *senegalensis*, *unifasciata*, 1832, 199.

**Tillomorpha**, CHEVROLAT, *Clytus* propres au Mexique, 1860, 458. — *lineoligera*, *myrmicaria*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 503.

- Tillus ambulans**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 132. — *Boscii*, CHEVROLAT, Descr. de 24 nouv. esp. de Térédiles, 1843, 31. — *elegans*, REICHE, Revue de l'ouvrage de M. le D<sup>r</sup> Roth, 1852, 97. — *elongatus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, FAIRMAIRE, pris dans la forêt de Sénart, 1848, XLIV. — *mutillarius*, FAIRMAIRE, trouvé à Fontainebleau, 1859, CX. — *ruficollis*, CHEVROLAT, L'auteur le croit le même que le *T. Weberi* de Fabr., 1837, LIV. — *tricolor*, GHILIANI, 1847, 100. — *id.*, PERRIS, Parasite des *Apate 6-dentata* et *sinuata*, 1850, 565. — *unifasciatus*, Note pour servir à son histoire, 1847, 32. — *id.*, GHILIANI, 1847, 109. — *id.*, PERRIS, Parasite des *Apate 6-dentata* et *sinuata*, 1850, 565.
- Timarcha coriaria**, PAUL LAMBERT, Cas de parasitisme par une Muscide, 1851, XXII. — *id.*, DE BARAN, Accouplement avec la *lævigata*, 1853, XLI. — *Gougeletii*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes Col. européens, 1859, CCXVI. — *italica*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 99. — *lævigata*, DE BARAN, Accouplement avec la *coriaria*, 1853, XLI. — *insignis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. de qqes esp. de l'Algérie, 1859, CXC. — *maritima*, PERRIS, Signalement de sept Col. nouv. des Landes, 1855, LXXIX. — *metallica*, GHILIANI, 1847, 124. — *sicelidis*, REICHE, Esp. recueillies en Sicile, 1860, 736. — *tenebricosa*, FAIRMAIRE, Accouplée avec une *Chr. hæmoptera*, 1855, XCVIII.
- Tipus (Trigonogenius) albopictus**, BOIELDIEU, Ptiniores, 1856, 671. — *exiguus*, 1856, 672. — *gibboides*, 1856, 669. — *niveus*, 1856, 670. — *ptinoides*, 1856, 668. — *squalidus*, 1856, 667.
- Titanus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 133. — *giganteus*, 1832, 134.
- Titubæa 8-signata**, LUCAS, Obs. sur ses métamorphoses, 1851, 29, et 1852, 463.
- Tmesisternus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 72. — *lineatus*, *sulcatus*, 1834, 73. — *variegatus*, 1834, 72.
- Tmesorrhina concolor**, Thoreyi, SCHAUW, Lamell. mélit., 1844, 350, et 1849, 244.
- Tolyphus granulatus**, *punctulatus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 165. — *subsulcatus*, 1860, 166.
- Tomicephalus sanguinicollis**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 146.
- Tomicus** (voir *Bostrichus*) *bidens*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856,



187. — *chalcographus*, MOCQUERYS, Traces et perforations nombreuses sur une écorce d'arbre, 1858, LXVII. — *coryli*, PERRIS, Sept Col. nouv. des Landes, 1855, LXXVIII. — *decolor*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv., 1859, 473. — *id.*, AUBÉ, Ne serait-il pas le ♂ du *T. dryophagus* d'Erichs.? 1859, CCXL. — *dispar*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Ins. rares aux env. de Paris, 1859, CXXXII. — *curygraphus*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1856, 194. — *laricis*, 1856, 184. — *ramulorum*, 1856, 191. — *stenographus*, 1856, 173.

**Tomochilus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 253. — *id.*; Nom générique changé en celui de *Dilobochilus*, 1851, 293. — *Westermanni*, 1851, 253 et 293.

**Tomoderus compressicollis**, KRIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 625. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729.

**Tomoglossa luteipes**, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de qqes Col. propres à la faune française, 1859, CXXXI.

**Tomopterus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1833, 544. — *staphylinus*, 1833, 545.

**Toxicum Berardi**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 289.

**Toxotus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 241. — *cinctus*, *cursor*, 1835, 242. — *cursor*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137. — *dispar*, AUD.-SERVILLE, 1835, 242. — *id.*, GHILIANI, 1847, 137. — *humeralis*, *meridianus*, AUD.-SERVILLE, 1835, 243. — *meridianus*, GHILIANI, 1847, 137.

**Trachelia**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 25. — *macuticollis*, *8-lineata*, 1834, 26. — *pustulata*, 1834, 25.

**TRACHÉLIDES**, SOLIER, Essai d'une division des Col. hétéromères, 1834, 495.

**Trachelizus**, SOLIER, Mémoire sur quatre genres de la famille des Car-nassiers terrestres, 1836, 598. — *rufus*, 1836, 600.

**Trachodes ? penicillatus**, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 888. — *tristis*, 1860, 889.

**Trachyderes**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 45. — *id.*, MOUR-FLET, Larves trouvées sur un giroflier en fleurs, 1858, xv. — *bicolor*, *dimidiatus*, AUD.-SERVILLE, 1834, 47. — *moria*, *rufipes*, 1834, 46.

— *signatus*, 1834, 47. — *striatus, succinctus*. 1834, 46. — *succinctus*, ROJAS, Études entomologiques, 1857, 335.

**Trachyderma**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 32. — *angustata*, 1836, 37. — *Genei*, 1836, 38. — *gomorrhana*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 215. — *hispida*, SOLIER, 1836, 34. — *Latreillei*, 1836, 36. — *philistina*, REICHE et DE SAULCY, 1857, 214.

**Trachyphloeus** *scabriculum, setarius*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *setiger*, SCHAUM, Réponse à M. Jekel, 1857, LXXIX.

**Trachys**, SOLIER, Buprestides, 1833, 311. — *ænea, minuta*, 1833, 312. — *nana*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvée aux env. de Rouen, 1848, x. — *Pandellei*, FAIRMAIRE, Col. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 79. — *pumila*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 727. — *pygmaea*, SOLIER, 1833, 312.

**Trachyseellus** *rufa*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729.

**Trachysomus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 40. — *id.*, BUQUET, Notice monographique sur ce genre, 1852, 349. — *Camelus*, 1852, 352. — *Dromedarius*, 1852, 353. — *Elephas*, 1852, 351. — *id.*, Cette espèce doit être rapportée au *Cerambyx verrucosus*, 1859, CLXXXV. — *fragifer*, AUD.-SERVILLE, 1835, 40. — *id.*, BUQUET, 1852, 350. — *gibbosus*, 1852, 354.

**Tragidion**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 89. — *lynceum*, 1834, 90.

**Tragischoschema** *gracilicornis*, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp., 1858, 326. — *id.*, ♀ déjà décrite par M. Perroud, sous le nom de *Tragocephala amabilis*, 1859, v.

**Tragocephala** *formosa*, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp., 1858, 328.

**Tragocerus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 60. — *australis*, 1834, 61.

**Tragosoma**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1832, 159. — *depsarium*, 1832, 160. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 137. — *id.*, REICHE, rapporté des Pyrénées par M. Delarouzée, 1854, LV. — *id.*, DELAROUZÉE, Larve trouvée dans les Pyrénées, 1855, xcviII. — *id.*, REICHE, trouvé à Calais dans un chantier de bois venus de Norwège, 1855, cII. — *id.*, FAIRMAIRE, obtenu à Paris d'éclosion par M. Delarouzée, 1856, xcvi.

**Trechus** *amplicollis*, FAIRMAIRE, Diagnoses de deux nouv. Col. d'Europe, 1859, CXLIX. — *angusticollis*, KIESENWETTER, Col du midi de la France et de Catalogne, 1851, 386. — *areolatus*, JACQ. DU VAL, De Bembidiis europæis, 1852, 223 et 225. — *discus*, BUQUET, trouvé dans le département de la Somme, 1839, XIX. — *id.*, GHILIANI, Col du Piémont, 1847, 89. — *distigma*, KIESENWETTER, 1851, 388. — *distinctus*, FAIRMAIRE, Est-il identique ou var. d'*angusticollis*? 1860, XLV. — *Lallemantii*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 783. — *latebricola*, *minutus*, KIESENWETTER, 1851, 387. — *minutus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 370. — *pinguis*, KIESENWETTER, 1851, 389.

**Tretus**, CHEVROLAT, Descr. de deux genres nouv. de Curculionites, 1833, 63. — *loripes*, 1833, 64.

**Trilammatus** *Saundersii*, THOMSON, Remarque sur ce genre, 1857, 107.

**Triarthron** *Mærkelii*, CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, pris dans le bois de Meudon, 1855, LXXVI. — *id.*, FAIRMAIRE, trouvé près de Saint-Germain-en-Laye, 1857, XCII.

**Tribalus**, DE MARSEUL, Histérides, 1855, 151. — *agrestis*, 1855, 155. — *americanus*, 1855, 159. — *capensis*, 1855, 156. — *lævigatus*, 1855, 161. — *minimus*, 1855, 158. — *mixtus*, 1857, 437. — *scaphidiformis*, 1855, 157.

**Tribolium** *castaneum*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Rectific. de la synonymie du genre *Margus*, 1845, CXVII. — *id.*, LUCAS, Note sur la larve et la nymphe, 1854, LI, et 1855, 249. — *id.*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 293.

**Tricheops** *ephippiger*, LUCAS, Esp. trouvée vivante à l'exposition universelle, 1855, CVI.

**Trichius** *abdominalis*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 105. — *affinis*, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 293. — *bidens*, 1844, 400, et 1849, 292. — *fasciatus*, ROUZET, trouvé au bois de Bondy, 1847, LVIII. — *id.*, AL. PIERRET, rencontré plusieurs fois dans les env. de Paris, 1847, LVIII. — *fasciolatus*, GÉNÉ, Col. de Sardaigne, 1836, III. — *gallicus*, GHILIANI, 1847, 105. — *id.*, SCHAUM, 1844, 400, et 1849, 291. — *piger*, 1849, 292. — *viridulus*, 1849, 293. — *zonatus*, 1844, 400.

**Trichodes** *affinis*, CHEVROLAT, Nouv. esp. de Térédiles, 1843, 38. — *atrecarius*, FAIRMAIRE, Cas particulier de pathologie, 1852, XXX. —

*id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1854, 611. — *id.*, JACQ. DU VAL, Glanures entomologiques, 1857, 93. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvé dans les nids de l'Abeille maçonne, 1858, CXI. — *angustus*, CHEVROLAT, 1843, 41. — *apiarius*, DOÛÉ, Élytres présentant des dissemblances remarquables, 1848, xv. — *id.*, JACQ. DU VAL, 1857, 93. — *Carcelei*, CHEVROLAT, 1843, 39. — *fulgens*, 1843, 41. — *Lafertei*, 1843, 39. — *laminatus*, 1843, 40. — *8-punctatus*, DUPONCHEL, trouvé dans la Lozère, 1834, 287. — *Olivieri*, CHEVROLAT, 1843, 38. — *viridifasciatus*, 1843, 40.

**Trichonyx sulcicollis**, DE BARAN, trouvé à Fontainebleau, 1856, LXXV.

**Trichophilus pilicornis**, AUBÉ, capturé près de Paris dans une sablière, 1854, XXX.

**Trichophorus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 17. — *lippus*, *obliquus*, 1834, 18.

**TRICHOPTERYGIDÆ**, FAIRMAIRE, M. Mathews envoie une note sur qqes esp. d'Angleterre, 1860, LVIII.

**Trichopteryx**, PERRIS, Note pour servir à leur histoire, 1846, 465. — *id.*, Ins. du Pin maritime, 1853, 588. — *aptera*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Réponse au reproche de M. Aubé sur l'absence d'ailes chez cette esp., 1844, xvi. — *id.*, AUBÉ, L'auteur reconnaît avoir pris à tort cette esp. pour la *T. testacea*, 1844, xvii.

**Trichostetha capensis**, SCHAU, Lamell. mélit., 1844, 375. — *tibialis*, 1849, 287.

**Trichothorax**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 235. — *cyaneus*, 1860, 235.

**Tricoxys**, CHEVROLAT, *Clytus* propres au Mexique, 1860, 454.

**Trientoma**, SOLIER, Collaptérides, 1835, 256. — *varvasi*, 1835, 257.

**Trigonogenius**, BOIELDIEU, Monogr. des Pliniores, 1856, 667. (Voir, pour les espèces, le genre *Tipnus*.)

**Trigonopeltastes linca**, SCHAU, Lamell. mélit., 1849, 264. — *4-guttatus*, 1844, 400.

**Trigonophorus gracilipes**, SCHAU, Lamell. mélit., 1849, 253.

**Trigonops dispar**, SAUNDERS et JEKEL, Descr. de Curculionites, 1855, 295.

- Trigenoscelis**, SOLIER, Collaptérides, 1836, 21. — *deplanata*, 1836, 26.  
— *nodosa*, 1836, 23.
- Trigenostoma**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Genre observé en Algérie, 1857, XVIII.
- Trigonurus Mellyi**, AUBÉ, récolté à Batoum, 1850, XXII.
- Trimium**, AUBÉ, Révision des Psélaphiens, 1844, 138. — *brevicorne*, Psélaphiens, 1833, 508, et 1844, 139. — *leiocephalum*, 1844, 139.
- Trinodes australis**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 264.  
— *hirtus*, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 469. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 131.
- Triodonta cribellata**, FAIRMAIRE, Esp. nouv. de Corse, 1859, 277.
- Triogulinus**, LABOULBÈNE, Ils seraient le premier âge des *Meloe*, 1851, LXVII.
- Triphyllus punctatus**, PERRIS, Qques mots sur les métam. de Col. mycétophages, 1851, 39.
- Triplax ensa**, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 473. — *nigripennis*, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1842, 191.
- Trirammatius fulgidus**, DE CHAUDOIR, Genres et esp. de Carabiques nouv., 1835, 446.
- Tritoma piligerum**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 473.
- Trochalus meridionalis**, GENÉ, 1836, 11.
- Trocholdens Desjardinsii**, COQUEREL, Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 256.
- Trogischoschema gracilicornis**, CHEVROLAT, Descr. de nouv. esp., 1858, 326.
- Troglops albicans**, JACQ. DU VAL, trouvé sur le quai de la Rapée, 1853, XLVI. — *luteus*, *megacephalus*, REICHE, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 96. — *signatus*, 1852, 97.
- Troglorhynchus anophthalmus**, FAIRMAIRE, Curculionite aveugle des grottes d'Adelsberg, 1855, LXXIII. — *id.*, KRAATZ, Grottes de la Carniole, 1858, LXXXIX.
- Trogederma**, JACQ. DU VAL, Pris à Paris une esp. de ce genre, que l'auteur croit nouvelle, 1853, XLVI.

- Trogophloeus corticinus**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 430. — *exiguus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 434. — *fuliginosus*, KIESENWETTER, 1851, 430. — *halophilus*, 1851, 432. — *lathrobioides*, PEYRON, 1858, 433. — *nitidus*, KIESENWETTER, 1851, 430. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 724. — *id.*, PEYRON, 1858, 434. — *obesus*, KIESENWETTER, 1851, 430. — *omalinus*, *plagiatus*, 1851, 428. — *politus*, *punctipennis*, 1851, 431. — *riparius*, 1851, 430. — *id.*, PEYRON, 1858, 434. — *Rosenhaueri*, *scrobiculatus*, KIESENWETTER, 1851, 428.
- Trogosita armata**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 293. — *mauritanica*, REICHE, trouvée dans des haricots venant de Chine, 1856, LXXV.
- Tropideres albirostris**, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 96. — *ephippium*, *niveirostris*, CHEVROLAT, trouvés à Fontainebleau, 1833, 471.
- Tropinota Fatima**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 446. — *vittula*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 374.
- Tropinotus mercurialis**, FAIRMAIRE, trouvé dans les bois de Marly, 1854, XXXII. — *id.*, dans les env. de Vernon, 1855, XLVII.
- Tropisternus**, SOLIER, Hydrophiliens, 1834, 308. — *ebenus*, *glaber*, *lateralis*, *lineatus*, *striolatus*, 1834, 310.
- Trotomma**, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 623. — *pubescens*, 1851, 624. — *id.*, FAIRMAIRE et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729.
- Trox cribrum**, GÈNÈ, Phrases spécifiques, 1836, III. — *granulatus*, REICHE, Note sur cet Ins., 1853, 89. — *granuliferus*, FAIRMAIRE, Col. provenant de Tanger, 1851, XXI. — *granulipennis*, Col. nouv. du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 83. — *italicus*, REICHE, Description, 1853, 89. — *squamiger*, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 99. — *transversus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 405. — *verrucosus*, 1856, 404.
- Trypanæus**, DE MARSEUL, Histerides, 1856, 103, et supplément, 1860, 835. — *amabilis*, 1856, 117. — *bicaudatus*, 1856, 127, et 1860, 837. — *bimaculatus*, 1856, 115, et 1860, 837. — *bispinus*, 1856, 122. — *breviculus*, 1857, 401, et 1860, 837. — *carinirostris*, 1856, 123. — *carthagenus*, 1857, 402. — *Deyrollei*, 1856, 127, et 1860, 838. — *ensifer*, 1856, 113, et 1860, 837. — *fallax*, 1856, 125. — *flum*, 1860,

846. — *flavipennis*, 1856, 117. — *luteivestis*, 1860, 842. — *miles*, 1860, 844. — *nasutus*, 1856, 121. — *noxius*, 1860, 838. — *pallidipennis*, 1860, 841. — *pictus*, 1856, 116, et 1860, 837. — *proboscideus*, 1856, 128, et 1860, 838. — *prolixus*, 1856, 109, et 1860, 836. — *punctinotus*, 1860, 840. — *4-collis*, 1856, 114, et 1860, 837. — *4-tuberculatus*, 1856, 120. — *spiniger*, 1856, 119. — *teres*, 1856, 111, et 1860, 836. — *thoracicus*, 1856, 110. — *trigonalis*, 1860, 845. — *tuberculifrons*, 1856, 126, et 1860, 837. — *unituberculatus*, 1856, 124. — *volvulus*, 1856, 112, et 1860, 836.

**Trypocladius**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Classific. des Bostrichides, 1845, XVII.

**Trypopitys phœnicis**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 53. — *id.*, DELAROUZÉE, Rectific., 1859, CXXXIX.

**Tychius amplicolis**, AUBÉ, Col. d'Europe et d'Algérie, 1850, 342. — *aureolus*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 640. — *centromaculatus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 97. — *cinnamomeus*, KIESENWETTER, 1851, 639. — *cretaceus*, 1851, 638. — *procerulus*, 1851, 641. — *5-punctatus*, 1851, 638. — *striatulus*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 733. — *strigosus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 8. — *thoracicus*, KIESENWETTER, 1851, 641. — *tomentosus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 686. — *venustus*, KIESENWETTER, 1851, 638.

**Tychus**, AUBÉ, Révision de la tribu des Psélaphiens, 1844, 121. — *castaneus*, 1844, 124. — *ibericus*, 1844, 123. — *id.*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 402. — *Jacquelinii*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv., 1859, 463. — *niger*, AUBÉ, Fam. des Psélaphiens, 1833, 508, et 1844, 122. — *id.*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 680. — *strigosus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1858, 8. — *tuberculatus*, AUBÉ, 1844, 125. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722.

**Tylodes aspersus**, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 901. — *geophilus*, 1860, 900. — *hirsutus*, 1860, 902. — *lifuanus*, *minus*, 1860, 903. — *niger*, 1860, 901. — *oculatus*, 1860, 886. — *phascoli*, 1860, 902. — *pumilus*, 1860, 903.

**Tyndaris Gayi**, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1858, 736. — *guttulatus*, 1858, 738. — *marginellus*, 1858, 737.

**Typhlobium stagophitum**, KRAATZ, Col. des grottes de la Carniole, 1858, LXXXIX.

**Tyrus**, AUBÉ, Révision de la fam. des Psélaphiens, 1844, 89. — *mucronatus*, Note sur la fam. des Psélaphiens, 1833, 505, et révision, 1844, 90. — *id.*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 414.

## U.

**Ulema culinaris**, CHEVROLAT, trouvée à Fontainebleau, 1833, 470. — *emarginata*, MONTROUZIER, Faune de la Nouv.-Caléd., 1860, 294. — *ferruginea*, 1860, 295. — *lifuana*, 1860, 293. — *Perroudi*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 347. — *16-lineata*, MONTROUZIER, 1860, 295.

**Ulemascus caviventris**, FAIRMAIRE, Descr. de qqes Col. nouv., 1848, 173.

**Urodon suturalis**, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 685. — *Vielardi*, MONTROUZIER, Col. de la Nouv.-Caléd., 1860, 873.

**Uroxis cuprescens** Westw., REICHE, Est le même que le *Copris chærioides* Buquet, 1853, 425.

## V.

**Valgus canaliculatus**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1844, 398, et 1849, 289. — *hemipterus*, LUCAS, Le bruit et les secousses ne les empêchent pas de se métamorphoser, 1851, LXXXIII. — *seticollis*, 1844, 399, et 1849, 290. — *squamiger*, 1849, 399. — *Weberi*, 1844, 399.

**Vatellus grandis**, BUQUET, Descr. de plusieurs Col. nouv., 1840, 394.

**Velleius dilatatus**, CHEVROLAT, trouvé à Fontainebleau, 1833, 467. —



*id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 112. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, pris aux environs d'Abbeville, 1850, LVIII. — *id.*, DE BARAN, trouvé à Saint-Germain, 1856, LXXVI.

**Vertagus**, DE LA FERTÉ, Patellimanes, 1851, 233.

**Vesperus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 203. — *luridus*, 1835, 204. — *id.*, LUCCIANI, Détails sur cet Ins., 1845, CXI. — *strepens*, AUD.-SERVILLE, 1835, 204. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 111. — *Xatarti*, JACQ. DU VAL, Note sur le ♂, 1850, 347. — *id.*, LABOULBÈNE, pris dans le midi de la France, 1850, XXXIX.

**Vesta Chevrolatii**, DE LAPORTE, Révision du genre *Lampyris*, 1833, 132 et 133.

**Vulda**, JACQ. DU VAL, Genres nouv. et esp. nouv. de France, 1852, 695. — *gracilipes*, 1852, 698. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 722.

## X.

**Xanthochroa carniolica**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1856, 535. — *id.*, PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1857, 387.

**Xantholinus amissus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 158. — *collaris*, PERRIS, Ins. du pin maritime, 1853, 566. — *Cordieri*, BOIELDIEU, Descr. d'esp. nouv., 1859, 464. — *fulgidus*, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 420. — *hebraicus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1856, 362. — *id.*, PEYRON, 1858, 422. — *lentus*, *linearis*, 1858, 422. — *pilosus*, REICHE, Revue du travail de M. le docteur Roth, 1852, 96. — *punctulatus*, FAIRMAIRE, Baie de la Somme, 1852, 681. — *radiosus*, *rufipennis*, PEYRON, 1858, 421.

**Xanthosphæra**, FAIRMAIRE, Miscell. entom., 1859, 29. — *Barnevillei*, 1859, 30.

**Xenillus clypeator**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur cet Ins. cru un Col., 1839, 455. — DEMARY et AUTRES, Discussion au sujet de cet Acarien, 1839, 463, XII, XX et XXX.

**Xenoderus**, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 296. — *Janus*, 1844, 297.

**Xenostrogylus hirsutus**, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1860, 167. — *histrion*, 1860, 168.

**Xestia**, AUD.-SERVILLE, 1834, 16. — *spinipennis*, 1834, 17.

**Xiphonotus**, DE MARSEUL, Histerides, 1856, 141. — *Chevrolati*, 1856, 143.

**Xyletinus**, AUBÉ et REICHE, Esp. non déterminée, trouvée à Compiègne, 1852, xxxii. — *id.*, LABOULBÈNE, Larves vivant dans un champignon, 1860, xciii. — *id.*, Belle esp. trouvée dans le midi de la France, 1853, xli. — *hæmorrhoidalis*, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1854, 623. — *hederæ*, L. DUFOUR, Hist. de ses métamorphoses, 1843, 321. — *lævis*, KIESENWETTER, 1851, 623. — *rufithorax*, LAREYNIE, Descr. de trois nouv. esp., 1852, xc, et 1853, 129. — *sanguineo-cinctus*, FAIRMAIRE, Diagnoses de qqes nouv. esp. de Col. d'Europe, 1859, cv. — *serricornis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Synonymie et détails de mœurs, 1846, lxvii. — *striatipennis*, FAIRMAIRE, Col. nouv., 1857, 638. — *subrotundatus*, LAREYNIE, 1852, xci, et 1853, 130. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Col. des env. de Montpellier, 1852, 729. — *testaceus*, 1852, 729.

**Xylobius alni**, LATREILLE, Serricornes, 1834, 124. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Eucnémides, 1843, 175.

**Xylocharis**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 47. — *oculata*, 1834, 48.

**Xylographus**, MELLIÉ, Monogr. et revue de l'ancien genre *Cis* des auteurs, 1848, 218. — *anthracinus*, 1848, 222. — *bostrichoides* et la var. *Aubei*, 1848, 231 et 232. — *id.*, L. DUFOUR, Note sur cet Ins. et ses métam., 1850, 549. — *contractus*, MELLIÉ, 1848, 227. — *corpulentus*, 1848, 225. — *gibbus*, 1848, 228. — *hypocritus*, 1848, 221. — *madagascariensis*, 1848, 224. — *punctatus*, 1848, 230. — *Richardi*, 1848, 226.

**Xylonotrogus**, SCHAUM, Note sur ce genre, 1860, 636. — *laticollis*, DE MOTSCHULSKY, diffère du *Thorictus laticollis* de Caramanie, 1859, ccvi.

**Xylopertha**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Bostrichides, 1845, xvii. — *minuta*,

Sa larve attaque les *Smilax*, 1857, cxiv. — *id.*, PERRIS, Idées sur cette famille et les réformes qu'elle exige, 1850, 566.

**XYLOPHILES**, REICHE, Notes synonym. sur le 5<sup>e</sup> vol. de l'Handbuch der Entomologie, 1859, 5.

**Xyloteles lynceus**, CHEVROLAT, Coll. de Banks, 1851, 663.

**Xylotrechus**, CHEVROLAT, *Clytus* propres au Mexique, 1860, 456.

**Xylotribus**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1835, 80. — *heterocerus*, 1835, 80.

**Xylotrupes Phorbanta**, REICHE, Notes synonymiques, 1859, 18.

**Xyphoscellis Schuckardi**, SCHAUM, Lamell. mélit., 1849, 284.

**Xystrocera**, AUD.-SERVILLE, Longicornes, 1834, 69. — *globosa*, 1834, 70. — *id.*, COQUEREL, Obs. recueillies à Madagascar, 1848, 180. — *nigrita*, AUD.-SERVILLE, 1834, 70.

**Xystronia**, SOLIER, Xystropides, 1835, 238. — *cærulea*, 1835, 239.

**XYSTROPIDES**, SOLIER, Prodrome de cette famille, 1835, 229.

**Xystropus**, SOLIER, Xystropides, 1835, 241. — *Dejeanii*, 1835, 242. — *pilosus*, 1835, 241.

## Z.

**Zabrus caramaniæ**, PEYRON, Col. des env. de Tarsous, 1858, 378. — *contractus*, FAIRMAIRE et COQUEREL, Col. de Barbarie, 1858, 774. — *curtoides*, PEYRON, 1858, 378. — *damascenus*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1855, 624. — *gibbosus*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 235. — *gibbus*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 100. — *globosus*, GORY, 1833, 235. — *græcus*, AZAMBRE, capturé à Athènes, 1856, xviii. — *id.*, PEYRON, 1858, 378. — *helopioides*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 625. — *longulus*, 1855, 627. — *ovalis*, FAIRMAIRE et COQUEREL, 1858, 775. — *rotundipennis*, *semipunctatus*, 1858, 773. — *tumidus*, REICHE et DE SAULCY, 1855, 623.

**Zengophora**, LABOULBÈNE, Détails sur ce genre, 1849, XLIX.

**Zodina abyssinica**, REICHE, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 98.

**Zonitis Bellicri**, REICHE, Esp. nouv. recueillies en Sicile, 1860, 731. — *immaculata*, *mutica*, PEYRON, Col. nouv. et observ. diverses, 1857, 723. — *nigripennis*, LUCAS, Var. curieuse trouvée dans les env. de Misserghin, 1849, LXIII. — *id.*, JACQ. DU VAL, N'est qu'une var. de *præusta*, 1857, 95. — *præusta*, DUPONCHEL, trouvée dans la Lozère, 1834, 288. — *id.*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 96. — *id.*, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, 1852, 730. — *puncticollis*, REICHE, Esp. déjà décrite et figurée dans l'Iconographie du règne animal, 1852, LIX. — *4-punctata*, GHILIANI, 1847, 96.

**ZOPHÉRITES**, SOLIER, Collaptérides, 1841, 29.

**Zopherus**, SOLIER, Collaptérides, 1841, 39. — *Bremei*, DE BRÈME, Col. nouv. ou peu connus, 1844, 307. — *Jourdanii*, SALLÉ, Col. nouv. de l'Amérique, 1839, 301. — *lævicollis*, SOLIER, 1841, 46. — *mexicanus*, 1841, 44. — *nervosus*, 1841, 42. — *nodulosus*, 1841, 43.

**Zophosis**, SOLIER, Collaptérides, 1834, 598. — *abbreviata*, 1834, 606. — *acuta*, 1834, 621. — *algeriana*, 1834, 613. — *barbara*, 1834, 608. — *bicarinata*, 1834, 617. — *Boei*, 1834, 606. — *carinata*, 1834, 620. — *complanata*, 1834, 626. — *curta*, 1834, 611. — *Delalandi*, 1834, 608. — *depressipennis*, LUCAS, Descr. de Mélanosomes nouv. du nord de l'Afrique, 1858, CCXXII. — *Dytiscoides*, SOLIER, 1834, 623. — *errans*, 1834, 614. — *Germari*, 1834, 631. — *gibbicollis*, 1834, 612. — *Goryi*, 1834, 624. — *Linnæi*, 1834, 618. — *Maillei*, 1834, 613. — *minuta*, 1834, 615. — *muricata*, 1834, 620. — *nitidula*, 1834, 619. — *oblonga*, 1834, 625. — *plana*, 1834, 627. — *punctata*, 1834, 609. — *pygmæa*, 1834, 611. — *4-costata*, 1834, 628. — *id.*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1855, LXXXVII. — *4-lincata*, SOLIER, 1834, 604. — *Rcaumuri*, 1834, 630. — *Schænhherri*, 1834, 629. — *submetallica*, 1834, 614. — *suborbicularis*, 1834, 616. — *testudinaria*, 1834, 622. — *trilincata*, 1834, 603.

**ZOPHOSITES**, SOLIER, Collaptérides, 1834, 597.

**Zuphium**, BARTHELEMY, Descr. d'une nouv. esp., 1837, LVII. — *Chevrolatii*, LABOULBÈNE, pris aux env. d'Agen, 1849, XXIII. — *cilicium*, REICHE, Nouv. esp. de Caramanie, 1856, LXXI. — *id.*, PEYRON, Col.

des env. de Tarsous, 1858, 389. — *Pleuriasi*, GORY, Centurie de Carabiques nouv., 1833, 184. — *mauritanicum*, FAIRMAIRE, Identique avec la *Z. Chevrolatii* Brullé, 1847, CXII. — *id.*, LABOULBÈNE, pris aux env. d'Agen sous des détritrus laissés par la Garonne, 1849, XXIII. — *olens*, GHILIANI, Col. du Piémont, 1847, 99. — *id.*, LEPRIEUR, Note sur l'habitat de cette esp., 1857, XXIX. — *id.*, LUCAS, pris aux env. d'Alger, 1856, LXXXII.

***Zygia oblonga***, KIESENWETTER, Col. du midi de la France et de Catalogne, 1851, 622. — *rostrata*, REICHE et DE SAULCY, Col. d'Orient, 1857, 184.

***Zygocera picturata***, FAIRMAIRE et GERMAIN, Col. du Chili, 1859, 518.



## Articles généraux.

(Appendice au chapitre des Coléoptères.)

### Anatomie.

L. DUFOUR, Note sur la composition segmentaire de qqques larves de Col., 1843, 253. — *id.*, GOUREAU, Rép. à la note de M. L. Dufour, 1843, 257. — *id.*, Organisation céphalique des larves de Longicornes, 1844, 433. — *id.*, Position de la première paire de stigmates, 1844, 441. — L. DUFOUR, Encore une notice sur la composition segmentaire de qqques larves et sur la position des stigmates thoraciques, 1845, 493. — GIRARD, *Goliath* préparé comme pièce anatomique pour l'enseignement de l'histoire naturelle, 1859, CXXI.

### Catalogues.

CHEVROLAT, Annonce de la publication d'un Catalogue général par MM. Cristofori et San, de Milan, 1832, 424. — BUQUET, Liste des Col. qui se trouvent à la fois en Algérie, en France, en Espagne, en Sicile et en Sardaigne, 1840, 396. — REICHE, Proposition adoptée à l'égard du Catalogue de M. Gaubil, 1849, LXXXVII. — FAIRMAIRE, Obs. sur le Tableau méthodique et synonymique des Col. des env. d'Abbeville, 1852, 690. — BUQUET, Analyse de celui du Musée Britannique, 1853, XLIII. — DOHRN, Notice sur le Catalogue de Stettin, 1858, XXIV. — SCHAUUM, Réponse à la notice de M. Dohrn, 1858, LXXXVII. — DOHRN, La discussion avec M. Schaum devenant plus personnelle que scientifique, l'auteur croit inutile de la continuer, 1858, CXCVII. — PEYRON, Catalogue des Col. des env. de Tarsous, 1858, 353.

### Chasses entomologiques.

CHEVROLAT, Mémoire sur celles faites à Fontainebleau, 1833, 466. — FAIRMAIRE, Excursion dans la Baie de la Somme, 1852, 663. — LABOULBÈNE, Qques mots sur le résultat de celles par lui faites dans les Landes et le midi de la France, 1853, XLI.

### Classification.

E. BLANCHARD, Caractère à tirer de la lèvre inférieure pour la classification, 1845, xxxix. — CHEVROLAT, Note sur les Longicornes de la collection de Banks, 1851, 657. — Rappel aux genres actuels des Col. décrits par Palissot de Beauvois, 1852, 629. — LUCAS, Esp. devant former une coupe générique nouv., 1854, xlii. — JACQ. DU VAL, Rem. relative à divers points de la classif. des Col., 1854, lxv.

### Collections.

Coll. Latreille acquise par M. Noris, de Manchester, 1834, lxix. — Coll. de Madagascar : Pierret, celle rapportée par M. Goudot, achetée par M. Dupont, 1839, xviii. — *id.*, Audouin, une partie avait été achetée antérieurement par les Musées de Berlin et de Paris, 1839, xviii. — Coll. Levillant, M. Reiche en a fait l'acquisition, 1848, xcii. — Coll. de Californie, celle de M. Lorquin vient d'être achetée par le Muséum, 1853, xlii. — Coll. de M. J.-L. Le Conte, THOMSON, Qques mots sur les raretés qu'elle renferme, 1858, ccxvii. — Coll. du marquis de La Ferté, M. Reiche annonce la vente de plusieurs familles, 1859, cxliv. — *id.*, CHEVROLAT, Réclamation touchant les Longicornes de la même collection, 1859, cxliv.

### Congrès.

De Montpellier, FAIRMAIRE, Rapport de la session extraordinaire de juin 1857, 1857, 619. — de Grenoble, LABOULBÈNE, Rapport sur la session extraordinaire de juillet 1858, 1858, 819. — de Clermont-Ferrand, EMM. MARTIN, Rapport sur la session extraordinaire de juin et juillet 1859, 1859, 647. — de Besançon, EMM. MARTIN, Rapport sur l'excursion provinciale de juin 1860, 1860, 989.

### Détails entomologiques.

Comte DE MNISECK, Lettre à M. Buquet, 1854, xxiii.

### Entomologie appliquée.

REICHE, Col. trouvés dans des ballots de laine vendus comme de l'Australie, 1856, xlvii, et 1858, ccxiii. — *id.*, Remarques sur l'application de l'Entomologie au commerce, 1860, 331.

### Entomologie (Étude de l').

GODET, Qques obs. sur la manière de travailler en histoire naturelle, 1832, 34. — L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1851, 55.

**Entomologie française.**

AMYOT, Communic. d'un travail sous ce titre, 1850, xiv. — Obs. générales sur la nomenclature, 1854, xiv.

**Faunes locales.**

FAIRMAIRE et COQUEREL, Essai sur les Col. de Barbarie, 1858, 743; 1860, 145, 419. — FAIRMAIRE et GERMAIN, Révision des Col. du Chili, 1858, 709; 1859, 483. — REICHE et DE SAULCY, Esp. nouv. ou peu connues d'un voyage en Orient, 1855, 561; 1856, 353; 1857, 169 et 649; et 1858, v. — PEYRON, Catalogue des Col. des env. de Tarsous (Caramanie), 1858, 353. — MONTROUZIER, Essai sur la faune de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 229 et 867.

**Genera des Coléoptères.**

BUQUET, Analyse abrégée du I<sup>er</sup> volume du *Genera* de M. Lacordaire, 1854, ix.

**Genres (Noms de).**

REICHE, Critique d'un nouvel ouvrage de M. Gistel, 1856, xxxvi.

**Géographie entomologique.**

ABYSSINIE : REICHE, Revue de l'ouvrage du docteur Roth, 1852, 95.

ALGÉRIE : BUQUET, Catalogue des esp. algériennes qui se rencontrent aussi en Europe, 1840, 396. — DOUÉ, Col. provenant de Bouçada, 1854, xli. — LUCAS, Note sur ces esp. envoyées à M. Doué, 1858, clxxvii. — GUÉRIN-MÉNEVILLE, Les esp. de l'oasis d'Ouargla ont un faciès égyptien, 1857, cxv. — LEPRIEUR, Détails sur ses chasses aux env. de Bone, 1852, vii et li. — LUCAS, Esp. recueillies par le docteur Marès au Sahara algérien, 1857, lv.

ALPES (BASSES-) : BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Esp. récoltées aux env. de Larche, 1857, 597, et 1859, 194.

ALPES (HAUTES-) : LABOULBÈNE, Col. de ce département, (Congrès de Grenoble), 1858, 871.

ALPES DE PROVENCE : GUÉRIN-MÉNEVILLE, Esp. de cette région qui se rapportent souvent à celles du nord de l'Europe, 1855, lxxxiii.

AUVERGNE : EMM. MARTIN, Col. recueillis aux env. de Clermont-Ferrand et au mont Dore, 1859, 670.

BARBARIE : FAIRMAIRE et COQUEREL, Essai sur les Col. de ce pays, 1858, 743; 1860, 145, 419.



**BELGIQUE** : LEFEBVRE, Extrait du travail de M. Wesmœl sur les Col. carnassiers de ce pays, 1835, xxxviii.

**CALÉDONIE (NOUVELLE-)** : MONTROUZIER, Faune, 1860, 229 et 867. — *id.*, DOUË, Communic. d'esp. de ce pays, 1856, xxxiii. — GUÉRIN-MÉNEVILLE, Communic. de Col. du même pays, 1856, xxxiv.

**CALIFORNIE** : BUQUET, Note sur les esp. recueillies par M. Lorquin, 1852, xx. — DOUË, Communic. d'esp. recueillies par le même, 1857, xix.

**CARNIOLE** : KRAATZ, Communic. de plusieurs esp. des grottes de ce pays, 1858, lxxxviii.

**CATALOGNE** : KIESENWETTER, Esp. du midi de la France et de la Catalogne, 1854, 385 et 577.

**CHILI** : GAY, Lettre sur les Ins. de cette contrée, 1836, xxi. — *id.*, FAIRMAIRE et GERMAIN, Révision des Coléoptères de ce pays, 1858, 709, et 1859, 483.

**COLONIES** : GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur des Col. vivant dans des denrées coloniales, 1857, cxiv.

**CORSE** : BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur le résultat de ses chasses, 1860, lxx. — *id.*, LAREYNIE, Insectes par lui récoltés, 1859, 266.

**EUROPE** : KRAATZ, Communic. de plusieurs esp. très-rares ou nouv.. 1860, liii.

**FRANCE** : Abbeville, FAIRMAIRE, Note sur le tableau méthodique et synonymique de M. Marcotte, 1852, 690. — Bitche (Env. de), LUCAS, Espèces prises par le capitaine Gaubil, 1847, xcii. — Bouray et Lardy, FAIRMAIRE, Col. récoltés lors de l'excursion annuelle, 1856, lvii. — Charente-Inférieure, major BLANCHARD, Quelques Ins. de ce département, 1853, iii. — Compiègne, AUBÉ et REICHE, Détails d'une chasse entomologique, 1852, xxxi. — Fontainebleau, CHEVROLAT, Catalogue des esp. récoltées, 1833, 466. — *id.*, FAIRMAIRE, 65 esp. fort rares trouvées à Fontainebleau, 1846, liv. — Franche-Comté, EMM. MARTIN, Esp. recueillies pendant l'excursion de 1860, 1860, 1004. — Grenoble, LABOULBÈNE, Esp. des env. de Grenoble, de la Grande-Chartreuse et des Hautes-Alpes (Congrès de Grenoble), 1858, 871. — Lardy (voyez Bouray). — Lozère, DUPONCHEL, Catalogue des Col. trouvés dans ce département, 1834, 286. — Paris et env., CH. BRISOUT DE BARNEVILLE, Esp. recueillies par l'auteur, 1857, xcii; 1859, cxx et cxxxii. — *id.*, LUCAS, Ins. rares trouvés sous des souches rejetées par l'inondation, 1856,

**LVIII. —** Somme, FAIRMAIRE, Excursion dans la baie de cette rivière, 1852, 663.

**FRANCE MÉRIDIONALE :** KIESENWETTER, Espèces du midi de la France et de la Catalogne, 1854, 385 et 577. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Esp. du nord de l'Europe trouvées dans les Alpes de Provence, 1855, LXXXIII. — Hyères, DELAROUZÉE, Détails sur les Ins. de ce pays, 1858, cv. — Montpellier, JACQ. DU VAL et LAREYNIE, Esp. des env. de cette ville, 1852, 719, et 1854, XXXVIII. — *id.*, FAIRMAIRE, Esp. recueillies pendant la session extraordinaire de 1857, 1857, 627. — Pyrénées, LINDER, Lettre sur une excursion dans les Pyrénées et aux env. d'Auch, 1858, CLVIII. — *id.*, PANDÈLLÉ, Esp. trouvées aux env. de Tarbes et dans les Hautes-Pyrénées, 1857, LII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Col. recueillis dans les Pyrénées-Orientales, 1856, 149. — *id.*, BIGOT, Col. récoltés dans la même partie des Pyrénées, 1856, LXXXI.

**GRÈCE :** AZAMBRE, Esp. de ce pays, 1856, XII et XVII. — *id.*, KRAATZ, Communic. de plusieurs esp., 1860, LXII.

**GUINÉE :** BUQUET, Col. provenant de ce pays, 1848, XXI.

**GUYANE FRANÇAISE :** LACORDAIRE, Entomologie de ce pays, 1832, 348 et 447.

**HAÏTI :** SALLÉ, Descr. de dix nouv. esp. recueillies dans la République dominicaine, 1855, 263.

**ITALIE :** AZAMBRE, Esp. signalées par l'auteur, 1856, XII et XVII.

**LIFU :** MONTROUZIER, Notice sur cette Ile, 1860, 231.

**ORIENT :** VESCO, Esp. recueillies par l'auteur, 1855, XXXI. — *id.*, PEYRON, Catalogue des Col. des env. de Tarsous, 1858, 353. — *id.*, REICHE et DE SAULCY, Esp. nouv. ou peu connues recueillies par M. de Saulcy dans son voyage en Orient, 1855, 561 ; 1856, 353 ; 1857, 169 et 649, et 1858, 5.

**PIÉMONT :** GHILIANI, Mémoire sur la station de qques Col., 1847, 83.

**PORTUGAL :** COQUEREL, Qques esp. prises dans ce pays, 1850, XLIV.

**SAHARA ÉGYPTIEN :** GAUTIER DES COTTES, Indication de plusieurs esp. des limites du désert, 1860, CXII.

**SÉNÉGAL :** REICHE, Ins. trouvés dans la cale des navires venant de ce pays, 1855, LXXIV. — *id.*, BUQUET, Communic. d'esp. de la même provenance, 1847, LXXVIII.

**SICILE :** REICHE, Esp. recueillies par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 717.

TERRES AUSTRALES : GIRARD, Col. du voyage de Péron, 1857, CLIV.

VÉNÉZUÉLA : M.-A. ROJAS, Obs. sur qqes Col. de cette République, 1857, 329.

### Larves et Nymphes.

AUDOUIN, Galeries creusées par une larve dans des tiges de Poirier, 1836, LXX. — LE MAOUT, Larve vivante rejetée en vomissant par un enfant malade, 1836, LXXIV. — L. DUFOUR, Note sur la composition segmentaire des larves de Col., 1843, 253. — GOUREAU, Réponse à la note de M. L. Dufour, 1843, 257. — Organisation céphalique des larves de Longicornes, 1844, 433. — Position de la première paire de stigmates, 1844, 441. — DE BRÈME, Cartouches de soldats perforées par des larves, 1844, XX. — GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larve de grande taille voisine de celles des *Drilus*, 1844, LXXXVII. — L. DUFOUR, Encore une notice sur la composition segmentaire de qqes larves et sur la position des stigmates thoraciques, 1845, 493. — DESMAREST, Bois fossile perforé par des larves, 1845, XXVI. — CHEVROLAT, Larves trouvées dans les bois de Hêtre, de Chêne et de Pin maritime, 1846, LXXIV. — GUÉRIN-MÉNEVILLE, Plusieurs esp. de larves trouvées dans des pommes de terre malades, 1845, LXXXVI. — MACQUART, Qques mots sur certaines larves nuisibles à l'agriculture, 1847, XLIV. — Larve nuisible à la Betterave, 1847, LXXXI. — REICHE, Cette larve est probablement celle de l'*Agriotes segetis*, 1847, LXXXI. — PAUL DE SAINT-MARTIN, Nymphe trouvée dans des pommes de terre malades, 1849, XLV. — PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1852, 491 ; 1853, 555 ; 1854, 85 et 593 ; 1856, 173 et 423 ; 1857, 341. — REICHE, Annonce du Catalogue des larves connues, par MM. Candèze et Chapuis, 1852, LXXVIII. — BOISDUVAL, Longévité constatée, 1854, LII. — Larve continuant à vivre depuis plus de cinq ans sans se métamorphoser, 1856, v. — FAIRMAIRE, Larves recueillies à la Guadeloupe par M. Moufflet, 1856, LXXXV. — DELAROUZÉE, Note sur les habitudes naturelles de qqes larves, 1858, CXLVI. — LEPRIEUR, Larve remarquable d'Hydrocanthare trouvée dans une mare à Meudon, 1860, LXVII. — REICHE, Annonce d'une nouvelle édition de l'ouvrage de M. Candèze, 1860, c.

### Mélanges entomologiques.

FAIRMAIRE, Miscellanea entomologica, 1856, 517 ; 1857, 725 ; 1859, 21. — SCHAUM, Communic. d'une note intitulée : Mélanges entomologiques, 1857, LXXVIII. — L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1851, 55 ; 1852, 413.

**Métamorphoses.**

GOURAU, Note pour servir à l'histoire de celles des Col., 1842, 173.

**Mœurs.**

LEFEBVRE, Sur les Col. carnassiers de Belgique, d'après Wesmaël, 1835, XXXVIII. — WESMAEL, Mode de respiration dans l'eau des *Elmis*, *Dryops* et *Georyssus*, 1835, XXXIX. — LHERMINIER, Obs. sur les habitudes des Ins. de la Guadeloupe, 1837, 497. — BUQUET, Destruction de 14,000 kilog. de biscuit par des Ins., 1837, LIX. — DE BRÈME, Cartouches de soldats entamées par des larves, 1844, XX. — AUBÉ, Note sur l'habitat de certains Ins. myrmécophiles, 1844, XXXVII. — GUÉRIN-MÈNEVILLE, Larve de Taupin trouvée dans des pommes de terre malades, 1845, LXXXVI. — PERRIS, Ins. du Pin maritime, 1852, 491 ; 1853, 555 ; 1854, 85 et 593 ; 1856, 173 et 423 ; 1857, 341. — LACORDAIRE, Annonce de la prochaine publication par M. J. Le Conte d'un Dytiscien qui vit sur terre, 1852, LIX. — AUBÉ, Réflexions sur un mémoire de M. Focillon, intitulé : Ins. nuisibles aux colzas, 1852, LXXXIII. — REICHE, Ins. trouvés dans la calle des navires venant du Sénégal, 1855, LXXIV. — MOCQUERYS, Ins. nuisibles et utiles, 1856, 731. — ROJAS, Sur qqes Ins. de Vénézuéla, 1857, 329. — BUQUET, Ins. qui rongent et perforent le plomb, 1857, CI.

**Monographies.**

GODET, Qques obs. sur la manière de travailler en hist. naturelle, et en particulier sur les monographies, 1832, 34.

*Acmæodera* (genre), M. SPINOLA, Essai sur les esp. de ce genre, 1833, 303.

Barbarie; FAIRMAIRE et COQUEREL, Essai sur les Col. de ce pays, 1858, 743 ; 1860, 145, 419.

BEMBIDIITES, JACQ. DU VAL, De Bembidiis europæis, 1851, 441 ; 1852, 101, 523 ; 1855, 647.

BUPRESTIDES, SOLIER, Essai sur cette famille, 1833, 261.

Calédonie (Nouvelle-), MONTROUZIER, Faune entomologique de ce pays, 1860, 229, 867.

*Calochromus* (genre), GUÉRIN-MÈNEVILLE, Mémoire sur deux nouv. genres de Col., 1833, 155.

*Calyptribium* (genre), AUBÉ, Note sur ce genre, 1843, 241.

*Chalcas* (genre), FAIRMAIRE, Description de ce genre, 1849, 5.

**CHRYSOMÈLES**, SUFFRIAN, Monographie de celles d'Europe, traduction de M. L. Fairmaire, 1853, 91 ; 1854, 343 ; 1858, 531.

*Cis* (genre), MELLIÉ, Monographie de cet ancien genre des auteurs, 1848, 343.

**CLÉRITES**, AUD.-SERVILLE, Analyse de l'Essai de M. Spinola, 1845, 227.

**COLLAPTÉRIDES**, SOLIER, Essai monographique sur cette famille, 1834, 479 ; 1835, 249 et 509 ; 1836, 5, 303, 403 et 635 ; 1837, 151 ; 1838, 5 et 159 ; 1840, 207, et 1841, 29.

*Colpodes*, DE CHAUDOIR, Monographie de ce genre, 1859, 287.

*Cryptocephalus*, SUFFRIAN, Monographie des esp. européennes, traduction de M. L. Fairmaire, 1848, 285 ; 1849, 143, et 1850, 271.

*Gtenoscelis*, BUQUET, Monographie du genre, 1843, 231.

*Cyrtonus*, FAIRMAIRE, Monographie du genre, 1850, 535.

*Elaphocera*, RAMBUR, Monographie du genre, 1843, 329.

**GALÉRUCITES ANISOPODES**, ALLARD, Essai monographique sur cette famille, 1860, 39, 369, 539 et 785.

**HISTÉRIDES**, DE MARSEUL, Essai monogr. sur cette famille, 1853, 131, 447 ; 1854, 161, 525, 671 ; 1855, 83, 327, 677 ; 1856, 97, 259, 549 ; 1857, 109, 397 ; 1860, 581, 835.

*Hybalus*, LUCAS, Rem. synonymique sur ce genre, 1855, 535.

*Lampyris*, DE LAPORTE, Essai d'une révision de ce genre, 1833, 122.

*Lonchophorus*, CHEVROLAT, Mémoire sur deux genres nouv. de Col., 1832, 210.

**LONGICORNES**, AUD.-SERVILLE, Nouv. classif. de cette famille, 1832, 118 ; 1833, 528 ; 1834, 5 ; 1835, 5 et 197.

*Macrodonia*, GORY, Note monogr. sur ce genre, 1839, 124.

**MONOMMIDES**, THOMSON, Monogr. de cette famille, 1860, 5.

*Monotoma*, AUBÉ, Essai sur ce genre, 1837, 453.

*Notiophygus*, GORY, Monographie du genre, 1834, 453.

**Orient**, REICHE et DE SAULCY, Esp. nouv. ou peu connues d'un voyage en Orient, 1855, 561 ; 1856, 353 ; 1857, 169, 649 ; 1858, 5.

*Otidoccephalus*, CHEVROLAT, Monogr. d'un genre nouv. dans la famille des Curculionites, 1832, 98.

*Orycorhinus*, CHEVROLAT, Deux genres nouv., 1832, 210.

*Pin maritime*, PERRIS, Histoire des Ins. de cet arbre, 1852, 491; 1853, 555; 1854, 85, 593; 1856, 173, 423; 1857, 341.

*Pseudotycus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Mémoire sur deux nouv. genres de Col., 1833, 155.

PTINIORES, BOIELDIEU, Monogr. de cette famille, 1856, 285, 487 et 629.

RHIPICÉRITES, DE LAPORTE, Monographie de ce groupe, 1834, 225.

*Steraspis*, M. SPINOLA, Essai sur les esp. de ce genre, 1838, 303.

*Thorictus*, PEYRON, Note monogr. sur ce genre, 1857, 697.

*Trachysomus*, BUQUET, Note monographique sur ce genre, et descr. de cinq *Criodion* nouv., 1852, 349.

### **Muscardine.**

AUDOUIN, Communiquée à des larves de *Saperda carcharias*; 1837, LXXI.

### **Nomenclature.**

AMYOT, Obs. générales, 1854, xiv. — De la nomenclature entomologique, 1859, 571. — REICHE, Note sur la nomenclature entomologique, 1859, 607. — FAIRMAIRE, REICHE et DESMAREST, Ces auteurs signalent l'irrégularité qui existe dans la dénomination des familles, 1860, LXIII.

### **Organes génitaux.**

ORMANCEY, Caractères à en tirer, 1852, III. — Remarques de plusieurs membres à ce sujet, 1852, LV. — GODART, Remarques sur les différences spécifiques des organes mâles de la génération dans les esp. françaises du genre *Cetonia*, 1851, 665.

### **Organisation (voyez Anatomie et Stridulation).**

E. BLANCHARD, Importance de la lèvre inférieure pour la classification, 1845, XXXIV. — GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 31. — REICHE, Esp. à élytres soudées, volant comme les Cétoines, 1840, XVIII. — LEPRIEUR, Col. variant considérablement de taille, 1860, LXXXVII. — JACQ. DU VAL et THOMSON, Discussion sur la pièce basilaire des palpes labiaux, 1856, XCIV.

### **Parasitisme.**

LAMBERT, Est-il aussi fréquent chez les Coléoptères que chez les Lépidoptères ? 1851, XXII.

**Poussière cryptogamique.**

COQUEREL, Note de l'auteur niant la nature cryptogamique de cette substance, 1850, 13. — LABOULBÈNE, Note en réponse à celle de M. Coquerel, 1850, 17. — Réflexions sur la nature de cette poussière, 1854, xvii.

**Rectifications.**

PEYRON, Note contenant qqes rectifications spécifiques, 1857, cix.

**Stigmates.**

GOUREAU, Position de la première paire, 1844, 441. — L. DUFOUR, Notice sur la composition segmentaire de qqes larves et la position des stigmates thoraciques, 1845, 493.

**Stridulation** (voyez *Organisation*).

GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 31. — SOLIER, Obs. sur qqes particularités de la stridulation des Ins., 1837, 199. — GOUREAU, Note sur les sons insensibles produits par les Ins., 1837, 407. — Note sur la stridulation des Ins., 1838, 401.

**Synonymie.**

REICHE, Notes synonymiques sur la famille des Pectinicornes, 1853, 67. — CHEVROLAT, Note sur celle de qqes Col. exotiques, 1856, cv. — THOMSON, Réponse à la note de M. Chevrolat, 1856, cvi. — JACQUELIN DU VAL, Glanures entomologiques, remarques et notes diverses, 1857, 94. — REICHE, Note sur les citations synonymiques, 1858, 311. — Notes synonymiques sur l'*Handbuch der Entomologie* par M. Burmeister, 1859, 5. — FAIRMAIRE, Réponse aux notes de MM. Schaum, Kiesenwetter, Kraatz, etc., 1860, xlv.

**Vol.**

REICHE, Action du vol chez qqes esp. à élytres soudées, 1840, xviii.



## II.

### ORTHOPTÈRES.

#### A.

**Aelnipe** *hesperica*, LUCAS, Qques remarques géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 359. — *microptera*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Diagnoses de trois Orthoptères nouv., 1850, LXIII. — *id.*, LUCAS, 1851, 360. — *monticola*, 1851, 359. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée en 1850 en Algérie, 1851, XLVIII. — *nigropunctata*, LUCAS, 1851, 359. — *4-dentata*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE Descr. de deux Orthopt. nouv., 1852, LXVII.

**ACRIDIDÈS**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Catal. de ceux des env. de Paris, 1848, 411. — *id.*, Supplém. au Catal. de ceux des env. de Paris, 1849, LXXIX.

**ACRIDIENS**, FISCHER DE WALDHEIM, Trois esp. nouv. de la Daourie, 1839, XXIV.

**ACRIDITES**, DUPONCHEL, Esp. qui pendant qqes jours a couvert les murs du centre de Paris, 1834, XL, — *id.*, LUCAS, Qques remarques géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 349.

**Acridium**, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 50. — *albolineatum*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Communic. de plusieurs Orthopt. de la France méridionale, 1851, LXXXV. — *amænum*, Descr. d'une nouv. esp. d'Algérie, 1850, LVI. — *biguttatum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 423. — *biguttulum*, 1848, 419.



— *id.*, L'auteur en décrit les appendices sexuels, 1849, LXXX. — *bisignatum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 413. — *brevipenne*, Descr. d'une nouv. esp., 1848, LXXXIII. — *id.*, LABOULBÈNE, Qques détails sur cet Ins., 1849, XXIV. — *cærulans*, *cærulescens*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE. Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 412. — *crucigerum*, de la France méridionale, 1851, LXXXV. — *declivum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 420. — *id.*, de la France méridionale, 1851, LXXXV. — *id.*, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, xc. — *dispar*, pris les deux sexes dans la forêt de Saint-Germain, 1848, XLIII. — *id.*, Cas d'hermaphrodisme, forêt de Sénart, 1848, LIV. — *id.*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 423. — *id.*, Supplém. à ce Catal., 1849, LXXX. — *id.*, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, LXXXIX. — *dorsatum*, FISCHER DE WALDHEIM, Trois esp. nouv. de la Daourie, 1839, XXIV. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 418. — *id.*, 2<sup>e</sup> Supplém. au même Catal., 1851, LXXXIX. — *id.*, Il habite la France, 1851, xciii. — *elegans*, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, LXXXIX. — *gabonense*, Descr. de cette esp., 1851, LXVIII. — *germanicum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 412. — *gibbosum*, FISCHER DE WALDHEIM, 1839, XXIV. — *giornæ*, LUCAS, 1851, 362. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvé en 1850 en Algérie, 1851, XLVIII. — *grossum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 414. — *id.*, Supplém. à ce Catal., 1849, LXXX. — *hispanicum*, de la France méridionale, 1851, LXXXV. — *italicum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 412. — *id.*, Supplém. à ce Catal., 1849, LXXIX. — *lætum*, trouvé aux env. de Toulon, 1850, LVII. — *id.*, de la France méridionale, 1851, LXXXV. — *id.*, habite la France, 1851, xciii. — *id.*, trouvé aux env. de Paris, 1853, LIV. — *lineatum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 415. — *id.*, Supplém. à ce Catal., 1859, LXXX. — *id.*, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, LXXXIX. — *lineola*, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orthoptères, 1833, 486. — *id.*, LUCAS, 1851, 361. — *longicorne*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, xc. — *Lucasii*, Descr. de trois Orth. nouv., 1850, LXIII. — *migratorium*, pris dans une prairie près de Sceaux, 1848, LIV. — *id.*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 413. — *id.*, LUCAS, pris en septembre aux env. de Montrouge, 1849, LXX. — *id.*, ROUZET, pris à Paris même par M. Lorain, 1849, LXXIX. — *id.*, LACORDAIRE, pris en

Belgique, 1849, LXXIX. — *id.*, ED. DE SELYS-LONGCHAMPS, rencontré près de la ville de Liège, 1849, LXXIX. — *id.*, LUCAS, trouvé entre Vanvres et Paris, par M. Bagriot, 1849, LXXIX. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Supplém. au Catalogue des Acrididés des env. de Paris, 1849, LXXX. — *id.*, BRUAND D'UZELLE, Discussion sur les larves et nymphes qui ravagent le bourg d'Oysans, 1858, CXL. — *id.*, LABOULBÈNE, Communic. de qqes-uns de ceux pris au bourg d'Oysans, 1858, CLX. — *id.*, DOR, de Vevey, Note sur une apparition en Suisse, 1858, CCXXIV. — *montanum*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, xc. — *nigrofasciatum*, trouvé aux env. de Paris, 1853, LIII. — *parallelum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 422. — *parapleurum*, trouvé au bord de la Durance et dans les Pyrénées, 1850, XXXVIII. — *peregrinum*, LUCAS, Trois indiv. envoyés de Constantine, note à ce sujet, 1845, XXXI. — *id.*, Nouv. note sur cet Ins., 1845, XXXIX. — *id.*, Nouv. obs. sur son habitat, 1845, L. — *id.*, VACHEROT, Envoi d'Alger d'un dessin de ses divers états et métam., 1845, CXV. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Notice sur les métam. des Orth. sauteurs, 1849, XLIII. — *id.*, LUCAS, Communic. et descr. de nids de l'*Acridium peregrinum*, 1849, XCIV. — *id.*, Qques rem. géographiques sur les Acrididés du nord de l'Afrique, 1851, 361. — *petræum*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, communic. de cette esp. prise à Lardy, 1855, CXIV. — *reticulatum*, FISCHER DE WALDHEIM, Trois esp. nouv. de la Daourie, 1839, XXIV. — *rufipes*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1851, xc. — *id.*, Habite la France, 1851, XCIII. — *rufum*, Catal., des Acrididés des env. de Paris, 1848, 424. — *scalare*, trouvé par M. Guérin-Méneville sur la montagne de Lure (Hautes-Alpes), 1851, LXVII. — *id.*, de la France méridionale, 1851, LXXXVI. — *sitifense*, Communic. et descr. de deux esp. nouv. d'Algérie, 1854, LXXI. — *smilaccum*, Note relative à cet Ins., 1845, LXXXV. — *id.*, Rectif. de sa synonymie, 1848, XXXVIII. — *stigmaticum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 416. — *id.*, 2<sup>e</sup> Supplém. au Catal., 1851, LXXXIX. — *syriacum*, Communic. et descr. d'un Acridien nouv. de Syrie, 1854, LXXIII. — *thalassinum*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 413. — *id.*, 2<sup>e</sup> Supplém. audit Catal., doute au sujet de cette espèce, 1851, LXXXIX. — *Velasquesii*, LUCAS, Communic. d'une planche représentant cette espèce, 1856, LXVII. — *id.*, Dépôt d'une note de M. Niéto sur cette nouv. esp., 1856, LXXXIII. — *ventrale*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1858, 419.

**Anostostoma**, COQUEREL, Présentation d'un Orthopt. de Madagascar appartenant à ce genre, 1848, x. — *cuniculator*, Descr. d'un Orthopt. appartenant à ce genre, 1848, 282.

## B.

**Bacillus gallicus**, LABOULBÈNE, Détails anatomiques, 1857, cxxxvi. — *Rossii*, YERSIN, Note sur plusieurs Orthopt. nouv. ou peu connus d'Europe, 1860, 514.

**Barbitistes bætica**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée à Aumale, en Algérie, 1855, xcvi. — *id.*, LUCAS, trouvée dans l'ouest de l'Algérie, 1858, clxiii. — *serricauda*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Commun. de cette esp., trouvée dans les Hautes-Alpes par M. Guérin-Méneville, 1853, viii.

**Blatta acervorum**, AUDOUIN, trouvée en août dans une fourmilière près Paris, 1835, lxi. — *decipiens*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée en Algérie en 1850, 1851, xlviii. — *id.*, habite la France, 1851, xciii. — *ericetorum*, trouvée aux env. de Paris, 1853, liii. — *niccensis*, Descr. de deux Orth. nouv., 1852, lxviii.

**BLATTES**, DOUMERC, Obs. sur les habitudes de plusieurs esp., 1837, xlvi. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Notice sur la variation du nombre des articles des tarsi, 1848, xix.

**BLATTES ANTÉDILUVIENNES**, BERENDT, Mém. pour servir à leur histoire, 1836, 539.

**BLATTIDE**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Nouv. note sur la variation du nombre des articles des tarsi, 1849, xxx.

**Blepharis mendica**, LUCAS, prise dans le sud-est de l'Algérie, 1851, iv.

**Bradyporus**, FISCHER DE WALDHEIM, Lettre sur qqes genres d'Orth., 1833, 317. — *dasypus*, *macrogaster*, *obesus*, 1833, 318.

## C.

**Callimenus obesus**, FISCHER DE WALDHEIM, Extrait d'une lettre à M. Aud.-Serville, 1833, 318.

**Calliptamus italicus**, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 489. — *italicus*, *marginellus*, LUCAS, Quelques remarques géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 363.

**Conocephalus mandibularis**, LUCAS, Communic. d'un indiv. et d'une planche le représentant, 1834, LX.

**Copicerus**, STAL, Descr. de ce genre, 1857, 337. — *irroratus*, Swartzii, 1857, 338.

**CRIQUETS**, MONTROUZIER, Détails sur leurs apparitions en Nouv.-Caléd., 1859, CXLV.

## D.

**Decticus albifrons**, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 489. — *bicolor*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvé aux env. de Paris, 1853, LIV. — *brachypterus*, habite la France, 1851, XCIV. — *griseus*, *verrucivorus*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 337.

## E.

**Empusa mendica**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée par M. Bigot aux env. de Constantinople, 1849, LIX.

**Ephippiger macrogaster**, FISCHER DE WALDHEIM, Lettre sur quelques genres d'Orth., 1833, 318. — *pachygaster*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvé à Aumale, en Algérie, 1855, xcviII. — *vitis*, FISCHER DE WALDHEIM, Établissement de sous-genres de Locustes, 1839, xxv.

**Ephippigera** *costaticollis, laticollis*, LUCAS, Communic. d'indiv. et de planches les représentant, 1845, LX. — *maculata*, YERSIN, Note sur qqes Orthopt. nouv. ou peu connus d'Europe, 1860, 517. — *nigromarginata, pachygaster*, LUCAS, 1845, LX. — *pachygaster*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée à Aumale, en Algérie, 1855, xcvi. — *vitium*, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 489.

**Eremiaphila**, LEFEBVRE et AUTRES, Discussion à l'occasion de la monogr. de ce genre et du nombre des articles des tarsi, 1833, LXVIII. — *id.*, LUCAS, Note sur les caractères à tirer du développement des organes du vol, 1857, 321. — *id.*, LEFEBVRE, Nouv. genre d'Orth. de la famille des Mantides, 1835, 468. — *barbara*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Communic. et descr. de deux esp. nouv. d'Algérie, 1854, LXX. — *id.*, LUCAS, serait à retrancher de la liste des espèces de ce genre, 1855, xi. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Réponse à la note de M. Lucas, 1855, xi. — *id.*, Lecture d'une nouv. note en réponse à celle de M. Lucas, 1855, xv. — *Bové*, LEFEBVRE, Nouv. groupe d'Orth. de la famille des Mantides, 1835, 492. — *Cerisy*, 1835, 484. — *denticollis*, LUCAS, Note sur le mâle de cette esp., 1855, xi et LVIII. — *Géné*, LEFEBVRE, 1835, 486. — *Hralil*, 1835, 497. — *Khamsin*, 1835, 496. — *Kheych*, 1835, 498. — *Luxor*, 1835, 491. — *Petit*, 1835, 500. — *Savigny*, 1835, 494. — *Typhon*, 1835, 499. — *Zetterstedt*, 1835, 489.

**Eremobia** *Clavelii*, LUCAS, Nouv. esp. des env. de Boghar, 1850, LX. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, reçue de Bouçada, 1850, LXI. — *id.*, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 364. — *Jamini*, Diagnose de cette esp., 1853, LXV. — *id.*, Note sur une nouv. esp. d'Orth., 1854, 709.

## F.

**Forficella** *annulipes*, LUCAS, Note sur cette esp. et sa descr., 1845, LXXXIV.

**Forficula** *acanthopygia*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée aux env. de Paris, 1853, LXX. — *arachidis*, YERSIN, Note sur qqes Orth. nouv. ou peu connus, 1860, 509. — *auricularia*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE.

placée dans un bocal avec une Blatte qu'elle a dévorée, 1848, XLII. — *decipiens*, prise à Toulon, 1850, XLI. — *gigantea*, FAIRMAIRE, trouvée dans les env. d'Orléans, 1851, XLIII. — *id.*, LABOULBÈNE, rencontrée près d'Agen, 1851, XLIV. — *pedestris*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée aux env. de Paris, 1853, LIII. — *pubescens*, trouvée à Toulon, en juin, 1853, LXV.

**FORFICULAIRES**, GÉNÉ. L'auteur persiste à réunir cette tribu en un seul genre, 1834, VI. — *id.*, AUD.-SERVILLE, Réclam. contre la réunion des *Forficula* avec les *Forficesila*, 1834, VI.

## G.

**Gryllus**, LUCAS, Morceau de succin renfermant un Ins. de ce genre, 1845, CI. — *id.*, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 34. — *burdigalensis*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvé en Algérie en 1850, 1851, XLVIII. — *domesticus*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 335. — *id.*, LUCAS, Note sur une nuée de cet Ins., 1858, XCVI. — *Heydenii*, YERSIN, Obs. sur cet Ins., 1857, 761. — *megacephalus*, LEFEBVRE, n'a point été rencontré en Sardaigne par M. Géné, 1835, LXXVII (1). — *squamiger*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, M. Yersin l'a trouvé aux env. d'Hyères, 1856, xxx.

## H.

**Heteronutarsus ægyptiacus**, LEFEBVRE, Nouv. genre d'Orth. de la famille des Mantides, 1835, 501.

**Hetrodes**, FISCHER DE WALDHEIM, Extrait d'une lettre à M. Aud.-Serville, 1833, 318. — *id.*, Établissement d'un sous-genre de Locustes, 1839, xxv. — *Guyonii*, LUCAS, Communic. d'un indiv. et de la planche le représentant, 1845, LX. — *id.*, Détails sur deux indiv. gigantesques, 1851, IV. — *id.*, Note sur ce rare Orth., 1860, XLVI. — *pupa*, FISCHER DE WALDHEIM, Extrait d'une lettre à M. Aud.-Serville, 1833, 318.

**Hymenotes Servillei**, FAIRMAIRE, décrit par erreur comme un Hémiptère de la tribu des Membracides, 1848, IX.

(1) La pagination du texte est fautive, et le chiffre romain devrait être LXXXVII.

## L.

**Locusta cantans**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée dans la vallée de Baréges en 1832, 1850, XIII. — *id.*, G. DE BARAN, Communic. d'un indiv. provenant des Vosges, 1854, LXVI. — *dorsalis*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Habite la France, 1851, XCIII. — *ephippiger*, D'HOMBRES-FIRMAS, Note relative aux dégâts qu'elle cause sur les mûriers, 1839, XXVII. — *id.*, Note détaillée sur cette esp., 1839, XXX. — *id.*, Envoi de plusieurs indiv., 1839, XLIV. — *lineata*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. d'une nouv. esp. des env. de Paris, 1849, LXXX. — *id.*, Rectific. synonymique de la *L. mandibularis* Touss.-Charp., 1851, LXXVI. — *mandibularis*, trouvée aux env. de Paris, 1853, LIV. — *viridissima*, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 489.

**LOCUSTES**, FISCHER DE WALDHEIM, Établissement de sous-genres dans les esp. apt., 1839, XXIV.

## M.

**Mante religiosa**, GOUREAU, Note sur cette espèce, 1844, XVII.

**MANTIDES**, LEFEBVRE, Nouv. genre d'Orth. de cette famille, 1835, 449.

**Mantis brevipennis**, YERSIN, Note sur plusieurs Orth. nouv. ou peu connus d'Europe, 1860, 511. — *pustulata*, COQUEREL, Obs. entomol. sur divers Ins. de Madagascar, 1856, 505. — *religiosa*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Larve prise entre Montlhéry et Marcoussis, 1848, LIV. — *id.*, LUCAS, prise en grande quantité dans les env. du Havre, 1850, LVII.

**Meconema brevipennis**, YERSIN, Note sur plusieurs Orth. nouv. ou peu connus, 1860, 519. — *varia*, JACQ. DU VAL, Obs. sur ses mœurs, 1850, XLIX. — *id.*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 336.

**Megoplites brunneus**; L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Communic. de cette esp. trouvée dans le département du Var, 1856, LXIII.

## O.

**Oecanthus pellucens**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Communic. de cette esp. trouvée aux env. de Saint-Germain-en-Laye, 1856, CXIV.

**Oedipoda albolineata**, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 380. — *algeriana*, 1851, 374. — *amaena*, 1851, 379. — *arenaria*, 1851, 376. — *azurescens*, Note sur cette esp., 1856, xxxvii. — *biguttula*, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 381. — *bisignata*, 1851, 377. — *cærulans*, 1851, 375. — *cærulescens*, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 489. — *cruciata*, *crucigera*, LUCAS, 1851, 378. — *flava*, SOLIER, 1833, 489. — *id.*, LUCAS, 1851, 373. — *fuscocincta*, 1851, 373. — *hispanica*, 1851, 375. — *insignis*, 1851, 370. — *insubrica*, 1851, 374. — *longipes*, prise près d'Alger ; qqes détails, 1850, LX. — *id.*, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 376. — *Lucasii*, 1851, 381. — *mauritanica*, 1851, 374. — *id.*, Communic. d'une var. de cette esp., 1856, LXVI. — *migratoria*, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 377. — *stridula*, SOLIER, 1833, 489. — *thalassina*, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 378.

**Olynthocells aptera**, *autumnalis*, *denticauda*, *serricauda*, FISCHER DE WALDHEIM, Établissement de sous-genres de Locustes, 1839, xxv.

**Ommexea**, EM. BLANCHARD, Monogr. de ce genre, 1836, 603. — *angustum*, 1836, 624. — *Audouinii*, 1836, 611. — *cyanopterum*, 1836, 608. — *gracile*, 1836, 619. — *homalodenum*, 1836, 615. — *latum*, 1836, 624. — *liaspis*, 1836, 620. — *lugubre*, 1836, 616. — *micropterum*, 1836, 610. — *oxypterum*, 1836, 622. — *pallidum*, 1836, 623. — *Savigny*, 1836, 624. — *trachypterum*, 1836, 618. — *virgens*, 1836, 612.

**Onchonotus Laxmanni**, FISCHER DE WALDHEIM, Établissement de sous-genres de Locustes, 1839, xxv.



**Opsonoma sicula**, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 356.

**Organes sexuels des Orthoptères**, LUCAS, Communic. d'une note à ce sujet, 1855, xvi. — *id.*, Un mot sur la distinction des états parfaits ou non parfaits, 1855, 759.

**ORTHOPTÈRES**, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 486. — *id.*, LEFEBVRE, Détails sur un passage d'Orth. dans l'Inde, 1833, x. — *id.*, Nuée d'Orth. en Espagne, 1833, xlv. — *id.*, AMYOT, Lettre de M. Joseph Li sur leurs ravages en Chine, 1836, xli. — *id.*, AUDOUIN, Brochure de M. Kollar sur qqes Orth., 1837, xliv. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Notice sur les métam. des Orth. sauteurs, 1849, xliii. — *id.*, Catal. de ceux des env. d'Agen, 1849, viii. — *id.*, Note sur leur classific. parallélique, 1850, 59. — *id.*, AMYOT, Dépôt d'un mém. sur ceux de la faune française, 1851, xxiii. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, L'auteur en a reconnu cent onze espèces de France, 1851, cxx. — *id.*, Lecture d'une lettre de M. Yersin, 1855, cv. — *id.*, LUCAS, Envoi par M. de Saussure d'une notice sur qqes esp. nouv. ou peu connues, 1860, lxxx. — *id.*, Communic. de plusieurs esp. décrites précédemment, provenant du sud de l'Algérie, 1857, cv. — *id.* des Basses-Alpes, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Liste de ceux rapportés par M. Bellier de la Chavignerie, 1856, xxvii et 27. — *id.* de Bourbon et de Madagascar, COQUEREL, 1860, xlix. — *id.* d'Hyères en Provence, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Extrait d'une lettre de M. Yersin sur ces Ins., 1856, 737. — *id.* des env. de Larche, Envoi d'une note sur ceux recueillis par MM. Berce et Bellier de la Chavignerie, 1857, lvii. — *id.*, Catal. de ceux recueillis par ces deux Messieurs, 1857, 599. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Liste de ceux trouvés en juin, juillet et août 1858 aux env. de Larche, 1859, 200. — *id.*, Liste de ceux rapportés par l'auteur des Pyrénées orientales, 1858, 157. — *id.* de Sicile, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Catal. de ceux recueillis par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 714. — *id.* de Syrie, LUCAS, Communic. de plusieurs esp. rapportées par M. de Saulcy, 1856, lix.

**ORTHOPTÈRES SAUTEURS**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Note sur leurs métamorphoses, 1849, xliii.

## P.

**Pamphagus numidicus**, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 358.

**Peltastes hastatus**, *specularis*, *venosus*, FISCHER DE WALDHEIM, Établissement de sous-genres de Locustes, 1839, xxv.

**Phaneroptera falcata**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, habite la France, 1851, xciii.

**Phoraspis**, E. BLANCHARD, Mononogr. de ce genre, 1837, 271. — *alomaria*, 1837, 287. — *cassidea*, 1837, 295. — *conspersa*, 1837, 228. — *fastuosa*, 1837, 293. — *flavipes*, 1837, 291. — *leucogramma*, 1837, 294. — *lutcola*, 1837, 290. — *nigra*, 1837, 297. — *pallens*, 1837, 286. — *pantherina*, 1837, 292. — *picta*, 1837, 296.

**Phyllium magdelainci**, LUCAS, Note et descr. de cette esp., 1857, cxlvi.

**Phylloptera marginella**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Rectific. de son habitat, 1851, lxviii.

**Podisma pedestris**, SOLIER, Note sur des apparitions d'Orth. dans les env. de Marseille, 1833, 489.

**Porthetis Raulinii**, YERSIN, Note sur qqes Orth. nouv. ou peu connus d'Europe, 1860, 529. — *simillima*, 1860, 532.

**Pterolepis alpina**, YERSIN, Note sur un Orth. nouv., 1858, 111. — *Brisoutii*, Note sur qqes Orth. nouv. ou peu connus d'Europe, 1860, 520. — *Raymondii*, 1860, 524.

## S.

**Saga serrata**, FISCHER DE WALDHEIM, Extrait d'une lettre sur qqes genres d'Orth., 1833, 319. — *id.*, Établissement de sous-genres de Locustes, 1839, xxv.

**SAUTERELLES**, LEFEBVRE, 337 kilog. d'œufs recueillis par des paysans des env. de Marseille, 1832, 314. — *id.*, Concordance possible de leurs apparitions avec les maladies pestilentiellles ou épidémiques, 1832, 314. — *id.*, Passage d'une grande quantité dans le district de Tirhoût (Inde), 1833, x. — *id.*, Une nuée a fondu en Espagne dans les premiers jours de juin, 1833, XLV. — *id.*, SOLIER, Nouv. renseignements sur leur apparition, 1836, XLVII. — *id.*, ANYOT, Lecture de la traduction d'une lettre en chinois sur leurs ravages en Chine, 1836, XLI. — *id.*, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 44. — *id.*, COQUEREL, Commun. de jeunes Sauterelles trouvées à Hyères dans un vieux chêne, 1850, XLIV. — *id.*, REICHE, Lecture d'un article d'un journal de Boston sur un passage de Sauterelles, 1860, LXXIX. — *id.*, DE WAGA, Obs. sur div. migrations de Sauterelles, 1860, xc.

**Scellimena harpago, producta, uncinata**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Note sur le *Tetrix harpago*, 1848, XXXIV.

## T.

**Tetrix**, G. DE BARAN, Note sur une esp. d'Orth. observée aux env. de Paris, 1854, XLIV. — *acuminata*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Descr. de trois Orth. nouv., 1850, LXIII. — *id.*, Habite la France, 1851, xciii. — *bipunctata*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 425. — *brachyptera*, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 382. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée en 1850 en Algérie, 1851, XLVIII. — *id.*, LUCAS, L'auteur avait déjà signalé cette esp. à la Société, 1851, XLVIII. — *depressa*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 424. — *id.*, Supplém. au Catal. sus-énoncé, 1849, LXXX. — *id.*, Habite la France, 1851, xciii. — *harpago*, REICHE, Cet Ins. est aquatique et nage avec facilité, 1848, XXXIII. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Note sur cet Ins., 1848, XXXIV. — *meridionalis*, LUCAS, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 382. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Habite la France, 1851, xciii. — *subulata*, Catal. des Acrididés des env. de Paris, 1848, 424.

**Thamnotrizon fallax**, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, Communic. de celui trouvé à Hyères, 1855, CXII. — *id.*, YERSIN, Note sur qqes. Orth. nouveaux ou peu connus d'Europe, 1860, 526.

**Thrinchns**, FISCHER DE WALDHEIM, Extrait d'une lettre à M. Aud.-Serville, 1833, 319. — *campanulatus*, *muricatus*, *turritus*, 1833, 320.

**Toxodera denticulata**, AUD.-SERVILLE, Nouv. genre d'Orth. de la famille des Mantides, 1837, 25.

**Trigonidium cicindeloides**, LUCAS, Détails synonymiques, 1851, XIX.

**Tryxalis grandis**, LUCAS, trouvée en Algérie, 1857, XL. — *miniata*, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1831, 355. — *nasuta*, 1851, 354. — *procera*, Détails sur cet Ins., 1849, LXIX, et 1857, XL. — *id.*, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 355. — *id.*, trouvée en Algérie, 1857, XL. — *rosacea*, Rem. géographiques sur les Acridites du nord de l'Afrique, 1851, 355. — *variabilis*, 1851, 354. — *id.*, L. BRISOUT DE BARNEVILLE, trouvée en 1850 en Algérie, 1851, XLVIII.

## X.

**Xerophyllum Servillei**, FAIRMAIRE, Rectific. d'une erreur de l'auteur, 1848, IX. — *id.*, AMYOT, très-voisin du genre *Coriphyllum* de M. Aud.-Serville, 1848, LV.

**Xyphidium fuscum**, DOUÉ, Lecture de l'extrait d'une lettre de M. Bouteiller, de Provins, qui envoie les œufs et les larves par lui recueillis, 1857, LXXXVI.





### III.

## HÉMIPTÈRES.

### A.

**Acanalonia** *Servillei*, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 447.

**Acanthia** *rotundata*, SIGNORET, Mém. sur qqes Hémiptères nouv. ou peu connus, 1852, 540.

**Acanthicus**, DE LAPORTE, Mém. sur qqes genres nouv. d'Homop., 1832, 227. — *Desmarestii*, *Stolii*, 1832, 228.

**Acanthocoris** *tibialis*, SIGNORET, Faune des Hémipt. de Madagascar, 1860, 945.

**Acanthosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 456. — *agathinus*, *griseus*, *hæmorrhoidalis*, SIGNORET, trouvés à Compiègne, 1852, xxxii et xxxviii.

**Acanthothorax** *siculus*, COSTA, Hétéroptères des Deux-Siciles, 1841, 302.

**Acestrops**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 178.

**Achilius**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 319. — *bicinctus*, 1839, 321. — *flammeus*, 1839, 320.

**Achillaphis** AMYOT, Rhynchotes, 1847, 474.

**Acocephalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 204. — *madagascariensis*,

SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 205. — *rusticus*, Rectification d'une énonciation au Bulletin des séances du 10 mai 1854, 1854, LII.

**Aconophora** *flavipes*, FAIRMAIRE, Revue de la tribu des Membracides, 1846, 294. — *imbellis, incumbens*, 1846, 295. — *laminata*, 1846, 294. — *pugionata*, 1846, 295. — *pugnax*, 1846, 294. — *teilgera*, 1846, 295.

**Acostemma** SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 204. — *marginalis, viridipennis*, 1860, 205.

**Aeromecia**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 440.

**Aerometopus** *punctipes*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 202.

**Aeroschizus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 443.

**Aerostigmus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 226,

**Acutalis** *anticonigra*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 498. — *balteata*, 1846, 496. — *biguttula*, 1846, 498. — *binaria, flavipennis, flavonata*, 1846, 497. — *fusconervosa, litterata*, 1846, 498. — *tripunctata*, 1846, 497,

**Acylocerus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 470.

**Æglretes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 133.

**Ælla**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 447.

**Æthalion**, SIGNORET, Note sur le groupe des Eurymélides, 1851, 670. — *albinervosum*, 1851, 675. — *curvatum*, 1851, 678. — *Latreillei*, 1851, 672. — *multicolor*, 1851, 675. — *nervosopunctatum*, 1851, 679. — *nigrum, parallelum*, 1851, 667. — *parviceps*, 1851, 671. — *reticulatum*, 1851, 676. — *semiannulatum*, 1851, 673. — *Servillei*, 1851, 678. — *simile*, 1851, 674. — *unicolor*, 1851, 672. — *vicinum*, 1851, 674.

**Æthus**, SIGNORET, Faune des Hémipt. de Madagascar, 1860, 922. — *impressicollis*, 1860, 923. — *madagascariensis*, 1860, 922. — *rufirostrum*, 1860, 923.

**Aglena**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 222.

**Agonosoma** *bigatum*, SIGNORET, Descr. de nouvelles esp. d'Hémipt., 1851, 330. — *dichroum, flavolineatum, lineatum*, 1851, 329. — *h-guttatum*, 1851, 330. — *Reichei*, 1851, 329. — *spectabile*, Identique avec

*l'A. flavocinctum*, Herr.-Schæf., 1848, xxi. — *trivittatum*, Descr. de nouv. espèces d'Hémipt. 1851, 330.

**Agramma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 189.

**Albiger**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 205.

**Aleurodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 454.

**Aleyrodes chelidonii**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Descr. des Pucerons des env. d'Aix, 1841, 198.

**Alydus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 472. — *Fabrici, madagascariensis*, SIGNORET, Faune des Hémipt. de Madagascar, 1860, 940.

**Amblycephallus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 234.

**Amblyottus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 429.

**Ammethus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 98.

**Ampeloccecis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 502.

**Ancyrosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 407.

**Aneurus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 360. — *bilobus, tenuicornis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 958.

**Anisops**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 452. — *vitreus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 971.

**Anisosecellis membranacea**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 939.

**Anomaleptera**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 190.

**Anomus reticulatus**, FAIRMAIRE, Tribu des Membracides, 1846, 521.

**Anotia**, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 384. — *Bonnetii, coccinea*, 1839, 385.

**Anthemethus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 441.

**Anthecoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 378. — *fuscus*, GOUREAU, Note sur les Insectes, qui vivent dans le chardon penché, 1845, 82.

**Aphæna**, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 240. — *atomaria*, 1839, 248. — *discolor*, 1839, 242. — *farinosa*, 1839, 244. — *hæmoptera*, 1839, 248. — *nigromaculata*, 1839, 243. — *nigropunctata*, 1839, 248. — *pulchella*, 1839, 249. — *rosea*, 1839, 248. — *variegata*, 1839, 247.



**Aphanosoma italicum**, ACH. COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 294.

**Aphanus geniculatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 949.

**Aphelochirus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 430.

**Aphis**, MORREN, Rapport sur un mém. sur les Pucerons et le genre *Aphis*, 1836, LXXVII. — *id.*, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 474. — *id.*, GOU-REAU, Rem. sur divers parasites qui ont blessé des *Aphis*, et des *Coccus*, 1855, XXXVII. — *aceris*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Pucerons des env. d'Aix, 1841, 173. — *artemisiæ*, 1841, 161. — *aurantii*, 1841, 178. — *bursaria*, 1841, 193. — *cardui*, 1841, 170. — *cerasi*, 1841, 173. — *corni*, 1841, 188. — *fagi*, 1841, 194. — *flaginis*, 1841, 188. — *genistæ*, 1841, 168. — *hibernaculorum*, 1841, 181. — *isatidis*, 1841, 165. — *lactucæ*, 1841, 178. — *laniger*, AUDOUIN, Grands ravages dans le jardin du Muséum d'Hist. naturelle, 1832, 423. — *longicaudus*, P. MILLIÈRE, Obs. relatives à l'empreinte d'un Hémipt. fossile, 1853, 9. — *loniceræ*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Pucerons des env. d'Aix, 1841, 167. — *nerii*, 1841, 179. — *nymphææ*, 1841, 156. — *onobrychis*, 1841, 169. — *papaveris*, 1841, 162. — *persicæ*, 1841, 175. — *pini*, 1841, 186. — *pistaciæ*, 1841, 192. — *populi albæ*, 1841, 187. — *pruni mahaleb*, 1841, 175. — *pyri*, 1841, 189. — *quercus*, SIGNORET, trouvé dans le bois de Meudon, 1853, LXVI. — *radicum*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1841, 195. — *rhamni*, 1841, 177. — *roboris*, 1841, 183. — *rosæ*, 1841, 168. — *salicis*, 1841, 176. — *scabiosæ*, 1841, 179. — *tiliæ*, 1841, 182. — *id.*, LUCAS, Communic. d'un grand nombre trouvés sur les Tilleuls du Jardin-des-Plantes, 1860, LXXIV. — *tuberosæ*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1841, 180. — *tulipæ*, 1841, 167. — *ulmi*, 1841, 190. — *urticæ*, 1841, 180. — *verbasci*, 1841, 181. — *viminalis*, 1841, 184. — *ææ*, BONAFOUS, Descr. d'une nouv. espèce de Pucerons, 1835, 657.

**Apherogrammus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 446.

**Aphrophora**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 190.

**Aptenia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 427.

**Apterogena**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 424.

**Aradus**, L. DUFOUR, Rem. sur les Hémipt. de ce genre, 1844, 447. — *id.*, COSTA, Rem. sur les caractères généraux des espèces du royaume

- de Naples, 1847, LXXXVII. — *id.*, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 362. — *betulae, corticalis, depressus*, COSTA, 1847, LXXXVII. — *dilatatus*, L. DUFOUR, 1844, 452. — *dissimilis*, COSTA, 1847, LXXXVIII. — *ellipticus*, L. DUFOUR, 1844, 453. — *Perrisi*, Nouv. espèce d'*Aradus*, 1845, 225.
- Aræopus crassicornis**, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 336.
- Aretecoris**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 419.
- Argostagum**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 204.
- Arma**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 422. — *custos*, SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, xxxii.
- Arocatns**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 80.
- Areocera acroleuca**, SIGNORET, Descr. de nouv. espèces d'Hémipt., 1851, 338. — *circumcincta*, 1851, 339.
- Aschoenia**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 451,
- Asiraca**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 168, — *clavicornis*, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 337.
- Asopus Genei**, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 299.
- Aspidiotus**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 503.
- Aspongopus affinis**, COSTA, Diagnoses de deux espèces de Java, 1847, XXVII. — *castaneus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 937. — *marginatus*, COSTA, 1847, XXVII.
- Astemma**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 169. — *Mulsanti*, SIGNORET, qqes Hémipt. nouv. ou peu connus, 1852, 541.
- Atelocera femoralis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 925. — *vicina*, 1860, 926.
- Athysanus**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 237. — *stylatus*, SIGNORET, recueilli dans le bois du Vésinet, 1852, LV.
- Atractacrus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 467.
- Atractophora 4-punctata**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 948.
- Atypa gibba**, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homopt., 1832, 225. — *id.*, FAIRMAIRE, Tribu des Membracides, 1846, 306.
- Aulacetrus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 434.
- Aulacomus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 98.

## B.

**Beosus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 90.

**Betenia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 91.

**Berytus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 477.

**Bisplius**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 455.

**Bizus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 398.

**Blaptomerus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 120.

**Bocydium**, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homopt., 1832, 229. — *id.*, FAIRMAIRE, tribu des Membracides, 1846, 507. — *anchora*, 1846, 509. — *galcritum*, DE CASTELNEAU, Rectific. des Homopt. de M. Lesson, 1836, VIII. — *Germari*. FAIRMAIRE, 1846, 509. — *globulare*, *globulifera*, *glomeriferum*, *rufiglobum*, *tintinnabuliferum*, 1846, 508. — *tintinnabuliferum*, DE CASTELNEAU, c'est le *Centrotus globularis* de Fabr., 1836, VII.

**Bolbonota**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 257. — *auripennis*, 1846, 259. — *flavicans*, 1846, 258. — *globosa*, 1846, 257. — *inæqualis*, 1846, 259. — *melæna*, 1846, 258. — *Nisus*, 1846, 259. — *pictipennis*, *pusilla*, 1846, 258. — *pusio*, *tuberculata*, 1846, 260.

**Brachelytrops**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 395.

**Brachyolmus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 95.

**Brachypelta**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 425.

**Brachyplatys** *hemisphærica*, *unicolor*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 920.

**Brachystethus** *cribrum*, SIGNORET, Descr. de nouv. espèces d'Hémipt., 1851, 344. — *geniculatus*, 1851, 345. — *marginatus*, 1851, 344. — *rubromaculatus*, 1851, 345. — *vicinus*, 1851, 344.

**Bryocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 171.

**Bythoscopus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 207.

## C.

**Cacosmus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 483.

**Cadasus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 101.

**Cadruthus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 428.

**Cæloglossa lyncea**, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 307.

**Calemia**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 217.

**Caliscellis Bonellii**, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 369. — *heterodora*, DE LAPORTE, Note sur un nouv. genre et un nouv. Insecte Homopt., 1833, 251.

**Calosecellis**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 167.

**Calnthus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 102.

**Calypso proctus**, SPINOLA, Essai sur les Fulgorelles, 1839, 266. — *elegans*, 1839, 269. — *heteroscelis*, 1839, 273. — *luctuosus*, 1839, 272. — *lugubris*, 1839, 270. — *lystroides*, 1839, 269. — *marmoratus*, 1839, 271.

**Camaremus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 408.

**Camptoccecis**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 503.

**Camptopus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 471.

**Cantacader**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 188.

**Capsus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 164. — *ætneus*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 285. — *betuleti*, SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiii. — *Fairmairei*, Notice sur qqes Hémipt. nouv. ou peu connus, 1852, 542. — *flavomaculatus*, *mutabilis*, *Paykullii*, *variabilis*, trouvés à Compiègne, 1852, xxxiii.

**Cardiaspis**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 158.

**Carenoscaptus maculipes**, SIGNORET, Descr. de nouv. espèces d'Hémipt., 1851, 341.

**Carpasus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 160.

**Carphograptus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 170.

**Cassassus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 205.

**Catachilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 191.

**Catagrammus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 192.

**Catamianus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 149.

**Catocelis**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 440.

**Catoplatys**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 184.

**Cecolepis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 503.

**Centrocnemis Deyrollei**, SIGNORET, Notice sur un nouv. genre d'Hémipt. de Java, 1852, 545.

**Centrotus**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 509. — *id.*, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 182. — *acanthaspis*, FAIRMAIRE, 1846, 515. — *aculecolus*, 1846, 512. — *assamensis*, 1846, 517. — *australis*, 1846, 518. — *brunnipennis*, 1846, 512. — *capensis*, 1846, 514. — *chloroticus*, Descr. d'une nouv. espèce, 1851, LXXXVI. — *cornutus*, Membracides, 1846, 514. — *curvidens*, 1846, 515. — *Dama*, 1846, 510. — *fasciatus*, *flavidus*, 1846, 519. — *flexuosus*, 1846, 516. — *fuscipennis*, 1846, 514. — *Gazella*, 1846, 510. — *genistæ*, 1846, 520. — *id.*, COSTA, Lecture de la Descr. de la larve et de la nymphe, 1847, LXXXVIII. — *hamifer*, FAIRMAIRE, 1846, 512. — *havanensis*, 1846, 516. — *javanensis*, 1846, 517. — *maculiscutum*, 1846, 519. — *magellani*, 1846, 513. — *neuter*, 1846, 517. — *nodicornis*, 1846, 511. — *obesus*, 1846, 518. — *paria*, 1846, 513. — *Poeyi*, 1846, 518. — *proximus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 202. — *pubipennis*, FAIRMAIRE, 1846, 511. — *pusillus*, 1846, 512. — *scutellaris*, 1846, 510. — *senegalensis*, 1846, 511. — *subspinosus*, 1846, 519. — *tasmanicæ*, 1846, 513. — *Taurus*, 1846, 510. — *trispinifer*, 1846, 515. — *Urus*, 1846, 516. — *virescens*, 1846, 515.

**Cephalocteus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 430, — *histeroides*, L. DUFOUR, Descr. de trois Hémipt. nouv. ou mal connus, 1834, 341.

**Cephaloxys hemelytra**, SIGNORET, Descr. de deux Hémipt. Homopt., 1847, 295. — *viridis*, 1857, 294.

**Cerataulax 4-vittatus**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 335.

**Cereope écumeuse**, GOUDOT, Détails sur une espèce de grande taille de Madagascar, 1833, xxxvi.

**Ceresa**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 283. — *aculeata*, 1846, 283. — *affinis*, 1846, 284. — *aurantiaca*, 1846, 288. — *axillaris*, 1846, 285. — *bifasciata*, 1846, 286. — *borealis*, 1846, 284. — *brunnicornis*, 1846, 285. — *chlorotica*, 1846, 289. — *ciliata*, 1846, 287. — *colon*, 1846, 286. — *diceros*, 1846, 285. — *discolor*, 1846, 286. — *femorata*, 1846, 289. — *flaccida*, *incrassata*, 1846, 288. — *malina*, 1846, 285. — *morio*, 1846, 287. — *nervosa*, 1846, 289. — *spinifera*, 1846, 284. — *terminata*, 1846, 287. — *testacea*, 1846, 284. — *tigrina*, 1846, 287. — *uniformis*, 1846, 289. — *ustulata*, 1846, 285. — *Vitulus*, 1846, 283.

**Cestocephala**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 232.

**Cethera diadema**, SIGNORET, Hém. de Madagascar, 1860, 962.

**Chærommatus farinosus**, SIGNORET, Hém. de Madagascar, 1860, 945.

**Chalacus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 483.

**Chalea**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 190.

**Chanithus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 160.

**Chathaphus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 405.

**Chermes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 499.

**Chironosus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 92.

**Chlamydatus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 170.

**Chloapala**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 231.

**Chloraspida**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 156.

**Chlorochria**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 217.

**Chlorocoris**, *complanatus*, *distinctus*, *tau*, SIGNORET, Descr. de nouv. espèces d'Hém. de Madagascar, 1851, 330.

**Chloroplegma**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 230.

**Chloroscotus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 146.

**Chlorostactus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 129.

**Chlorotus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 120.

**Chorosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 484.

**Chortophilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 237.

**Cicada**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 150. — *aperta*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 179. — *Guerinii*, 1860, 180. — *maculigena*, 1860, 181. — *maculipennis*, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. d'Ins. nouv. ou peu connus, 1832, 412. — *orni*, COSTA, Lecture de l'anatomie des parties de la bouche, 1847, LXXXVIII. — *punctipes*, SIGNORET, 1860, 180. — *4-tuberculata*, Descr. de deux Cigales de Java, 1847, 297. — *septemdecim*, WILD, Lettre de Baltimore relative aux mœurs de cette esp., 1852, XVIII. — *id.*, GOUREAU, Qques obs., 1852, XIX. — *tuberosa*, SIGNORET, Descr. de deux Cigales de Java, 1847, 299.

**Cicadæ**, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 60.

**Cicadatra**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 153.

**Cicadetta**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 156.

**Cicado**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 154.

**Cidarus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 182.

**Cigale**, SOLIER, Obs. sur qqes particularités de la stridulation des Ins., 1837, 199.

**Cigales**, DOYÈRE, Obs. sur les organes de perforation chez les Ins., 1837, XVII. — *id.*, Obs. sur les organes générateurs, 1837, XXXIX. — *id.*, GOUREAU, Stridulation des Cigales, 1839, 551. — *id.*, AL. PIERRET, trouvées dans les env. de Gavarni (Pyrénées), 1847, LXXIV.

**Cimex**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 366.

**Cixius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 164. — *albicinctus*, *cumbriformis*. SIGNORET, trouvés à Compiègne, 1852, XXXIII. — *centralis*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 186. — *contaminatus*, trouvé à Compiègne. 1852, XXXIII. — *5-costatus*, Note sur l'habitat de qqes Hémipt., 1853, XXXIII. — *Servillei*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 323. — *varia*. SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, XXXIII.

**Cladodiptera** *macrophthalma*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 316.

**Clavigralla** *annulipes*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 943. — *elongata*, 1860, 944. — *flavipennis*, 1860, 945. — *similis*, *spiniceps*. 1860, 944.

**Cleptria** *tarsalis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 961.

**Clethrapsis alni, maculata**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 480.

**Clethropsylla alni**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 459.

**Clidocerus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 108.

**Cnaphalodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 460.

**Cnidopsylla urticæ**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 459.

**Coccenaccia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 496.

**Coccellacea**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 495.

**Coccinilla**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 493.

**Cocconidia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 494.

**Coccopon**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 494.

**Coccopsidia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 496.

**Coccoptella** AMYOT, Rhynchotes, 1847, 495.

**Coccus**, AUDOUIN, Fragment d'écorce de chêne couvert de *Coccus*, 1836, XXIX. — *id.*, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 493. — *id.*, SIGNORET, Moyen de découvrir les ♀ des *Coccus* du laurier rose et du rosier, 1852, LVI. — *id.*, GOUREAU, Rem. sur divers parasites qui ont blessé des *Aphis* et des *Coccus*, 1855, XXXVII. — *id.*, LUCAS, Macules sur des feuilles de *Ziziphus pinnachristi*, 1853, XXVIII. — *id.*, Note sur plusieurs *Coccus* vivant dans les serres du Muséum, 1855, CVII. — *id.*, FAIRMAIRE, Nouv. esp. rapportée de Savoie, 1856, LXXVI. — *id.*, Communic. de petites boules de cire de Montevideo, 1860, LXV. — *buxi*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Descr. des Kermès des env. d'Aix, 1834, 218. — *capreæ*, 1834, 213. — *caricæ*, 1834, 205. — *cassiæ*, CHAVANNES, Notice sur deux *Coccus* cérifères du Brésil, 1848, 139. — *citriferus*, 1848, 144. — *cratægi*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1834, 214. — *crispus*, 1834, 204. — *festucæ*, 1834, 216. — *fimbriatus*, 1834, 209. — *fraxini*, CHAVANNES, 1848, 143. — *hesperidum*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1834, 208. — *hirticornis*, 1834, 203. — *ilicis*, 1834, 210. — *laccæ*, *manniparus*, CHAVANNES, 1848, 143 et 145. — *oleæ*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1834, 206. — *id.*, 2<sup>e</sup> Mém. sur les Ins. qui attaquent l'olivier, 1840, 109. — *Pe-là*, CHAVANNES, 1848, 145. — *persicæ*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1834, 207. — *picridis*, 1834, 201. — *prunastri*, 1834, 211. — *psidii*, CHAVANNES, 1848, 139. — *radicum-graminis*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1834, 212. — *rorismarinis*, 1834, 217. — *salicis*, MACQUART, Lecture d'une notice sur cet Ins., 1847, LXXV. —



*id.*, Note sur une nouv. espèce de Gallinsecte, 1849, 47. — *ulmi*. BOYER DE FONSCOLOMBE, 1834, 215. — *variegatus*, 1834, 210. — *vitis*, 1834, 214. — *id.*, nov.-sp., CHAVANNES, 1848, 145.

- **Cochenille**, LEFEBVRE, Communic. sur sa culture en Algérie, 1834, LXVI. — *id.* de la fève, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques mots sur cet Ins., 1856, LXXIV. — *id.* du nopal, AUDOUIN, Considérations sur cette Cochenille, 1839, XLVI.

**Cochenilles**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, trouvées en grand nombre sur un *Cactus* des serres du Muséum, 1836, LXVII. — *id.*, AUDOUIN, celles vues au Muséum y sont élevées par l'auteur, 1836, LXVIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Communic. de plusieurs vivant sur des fèves de marais, 1855, LXVIII.

**Combophora** *Beskii*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 504. — *carinata*, *consentanea*, *Laporti*, *maculata*, 1846, 505.

**Commestignus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 163.

**Conchyoptera**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 184. — *unicolor*, 1860, 185.

**Conorhinus** *Stalii*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 967.

**Copicerus**, STAL, Descr. de ce genre, 1857, 337. — *irroratus*, 1857, 338. — *Swartzii*, 1857, 338 et LXI.

**Coptosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 417. — *maculatum*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 919.

**Coquerella**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 934. — *pectoralis*, 1860, 934.

**Coreomelas**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 417.

**Coreus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 479. — *phyllomorphus*, Le nom d'une esp. ne doit pas être appliqué à un genre, 1842, LXI.

**Corisus**, SIGNORET, Monogr. de ce genre, 1858, XLVI, et 1859, 75. — *abutylon*, 1859, 77. — *annulatus*, 1859, 98. — *anticus*, 1859, 99. — *aurantiacus*, 1859, 96. — *Bohemanii*, 1859, 86. — *capensis*, 1859, 91. — *capitatus*, 1859, 82. — *Coquerelii*, 1859, 78. — *id.*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 946. — *crassicornis*, Monogr. du genre *Corisus*, 1859, 79. — *dilatipennis*, 1859, 89. — *fenestratus*, 1859, 93. — *flavo-*

*maculatus*, 1859, 89. — *fulcratus*, 1859, 102. — *gemmatus*, 1859, 103. — *gracilis*, 1859, 88. — *guttatus*, 1859, 83. — *jactatus*, 1859, 81. — *javanensis*, 1859, 90. — *lateralis*, 1859, 97. — *ledi*, 1859, 94. — *lineatoven-tris*, 1859, 90. — *lugens*, 1859, 92. — *maculatus*, 1859, 93. — *maculiventris*, 1859, 105. — *magnicornis*, 1859, 80. — *mexi-canus*, 1859, 95. — *microtomus*, 1859, 105. — *natalensis*, 1859, 87. *nebulosus*, 1859, 98. — *nigristernum*, *nigromaculatus*, 1850, 100. — *novæboracensis*, 1859, 97. — *parumpunctatus*, 1859, 85. — *parvi-cornis*, 1859, 101. — *pilosicollis*, 1859, 76. — *pilosus*, 1859, 101. — *proximus*, 1859, 96. — *punctatus*, 1859, 81. — *4-lineatus*, 1859, 90. — *robustus*, 1859, 103. — *rubescens* Spin., 1859, 95. — *rubescens* Colen., 1859, 104. — *rubicundus*, 1859, 86. — *sanguineus*, 1859, 104. — *siculus*, 1859, 91. — *sidæ*, 1859, 95. — *Stålîi*, 1859, 78. — *striatus*, 1859, 102. — *tigrinus*, 1859, 84. — *tricostatus*, 1859, 104. — *varie-gatus*, 1859, 89. — *ventralis*, 1859, 92. — *Vincentii*, 1859, 103.

**Corixa**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 444.

**Cornifex corni**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483.

**Corylaphis coryli**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

**Corylocecis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 502.

**Cosmemma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 135.

**Craccifex craccæ**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Crambaphis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Craspedum**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 478. — *phyllomorphus*, RAMBUR, 1842, LXI.

**Crocoderus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 160.

**Cydms**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 426.

**Cyllocoris agilis**, SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiii.

**Cymodema**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 110.

**Cymus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 109.

**Cyphonia** DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homoptères, 1832, 229. — *id.*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 501. — *braccata*, 1846, 503. — *capra*, 1846, 502. — *clavata*, 1856, 503. — *clavatus*, *claviger*, DE LAPORTE, 1832, 230. — *clavigera*, FAIRMAIRE, 1846, 503. — *flava*, 1846, 502. — *furcata*, 1846, 502. — *hirta*, 1846, 503. — *ornata*,

DE LAPORTE, 1832, 230. — *proxima, rectispina, trifida*, FAIRMAIRE, 1846, 502. — *trifidus*, DE LAPORTE, 1832, 230.

**Cyphopterum**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 176.

**Cyrtechioris**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 148.

**Cyrtesoma**, *Saundersii*, LUCAS, Hémipt. fort curieux de la Nouv.-Holl., 1846, ci.

## D.

**Dahlmannius**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 490.

**Dalagus**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 214.

**Daipada** *vittata*, SIGNORET, Faune des Hémipt. de Madagascar, 1860, 924.

**Darbanus** *insipidus*, SIGNORET, Faune des Hémipt. de Madagascar, 1860, 966.

**Darnis**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 479. — *acutula*, 1846, 481. — *adusta, affinis*, 1846, 480. — *apicalis*, 1846, 483. — *bipunctata*, 1846, 480. — *brevis*, 1846, 483. — *capitastra*, 1846, 481. — *convoluta*, 1846, 482. — *cruenta*, 1846, 481. — *cyclops*, 1846, 479. — *flaviceps, lateralis*, 1846, 480. — *laticauda, limacodes*, 1846, 483. — *limbata, olivacea, pallescens*, 1846, 483. — *præcox*, 1846, 480. — *prasina*, 1846, 482. — *scutelligera*, DE CASTELNEAU, appartient au genre *Hemiptycha* Germ., 1836, VIII. — *squarus*, FAIRMAIRE, 1846, 482. — *strigifrons, tricineta, trifasciata*, 1846, 481.

**Darnoides**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 495. — *brunnea*, 1846, 496. — *limbata*, 1846, 495.

**Delphax**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 170. — *id.*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 329. — *bicarinata*, 1839, 334. — *elegans*, SIGNORET, Note sur l'habitat de qqes Hémipt., 1853, XXXIII. — *elegantula*, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIII. — *limbata*, SPINOLA, 1839, 333. — *lineola, minuta, mæsta, mutabilis*, SIGNORET, trouvées à Compiègne, 1852,

XXXIII. — *notula*, SPINOLA, 1839, 333. — *pellucida*, *pteridis*, 1839, 334. — *unicolor*, 1839, 333.

**Deitecephalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 236.

**Demahia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 156.

**Dentator**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 480.

**Derammm**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 128.

**Deraulax**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 191. — *versicolor*, 1860, 191.

**Derbe**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 377. — *costata*, *hæmorrhoidalis*, *nervosa*, 1839, 380. — *pallida*, 1839, 379.

**Deribia** *Signoreti*, COQUEREL, Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 258. — *id.*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 186.

**Dermatinus** *aurantiacus*, *centralis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 952.

**Derophysia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 177.

**Desfontainulus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 406.

**Desmoechlæna**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 154.

**Diadesmia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 221.

**Diargetænia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 167.

**Diaspidius dilatatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 962.

**Diastictus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 140.

**Diatæniops**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 205.

**Diangopterus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 130.

**Dianthaphis dianthi**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 477.

**Dichoptera hyalinata**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 286.

**Dietyesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 181.

**Dietyophora unicolor**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 184.

**Dilobopterus**, SIGNORET, Commun. de plusieurs esp. de l'Amérique méridionale devant constituer ce nouv. genre, 1850, XIII. — *id.*, Revue iconographique des Tettigonides, 1853, 26.

**Dilobura corticina**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 254.

**Dionysius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 165.

- Dipyxidum**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 380.
- Dirhaphia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 462. — *limbata*, WAGA, Novum Insectorum genus, Livie proximum, 1842, 275.
- Discocephala complanata**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 334. — *humilis*, 1851, 335. — *marmorea*, 1851, 332. — *ovata*, 1851, 334. — *polita*, 1851, 333. — *scutellata*, 1851, 334. — *unbraculata*, *vicina*, 1851, 332.
- Disparganum**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 159.
- Displodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 147.
- Distactus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 432.
- Distagonum**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 139.
- Doryderes**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 436.
- Dorydium**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 201. — *lanceolatum*, SIGNORET, pris près de Lardy, 1854, LIII.
- Dryaphis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 481.
- Drymophilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 92.
- Dryoecis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 501.
- Dryocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 442.
- Dytlophora**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 290. — *affinis*, 1839, 299. — *cyrnea*, 1839, 294. — *distinguenda*, 1839, 301. — *europæa*, 1839, 298. — *pannonica*, 1839, 297. — *proboscidea*, 1839, 292. — *senegalensis*, 1839, 295. — *virescens*, 1839, 300.
- Dysdercus fasciatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 954. — *flavidus*, 1860, 955.

## E.

- Echinops**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 391.
- Elæochrosus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 153.
- Elasmocelis cimicoides**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 388.
- Elatiptus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 484.
- Elatocelis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 502.

**Elidiptera**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 304. — *advena*, 1839, 307. — *callosa*, 1839, 305. — *cincticeps*, 1839, 310. — *Genei*, 1839, 308. — *madagascariensis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 199. — *marginicollis*, SPINOLA, 1839, 309.

**Emesa domestica**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvé aux env. de Paris, 1849, XCII.

**Emesodema**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 410. — *domestica*, JACQ. DU VAL, trouvée à Toulouse, 1849, XVI. — *id.*, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, déjà trouvée en France, 1849, XVI.

**Encophora**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 221. — *Dufourii*, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1858, 497. — *fuscata*, SPINOLA, 1839, 229. — *recurva*, 1839, 222. — *Servillei*, 1829, 227. — *variata*, *viridipennis*, 1839, 225.

**Enithara blandula**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 971.

**Enoplops**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 466.

**Enrhodesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 447.

**Enstagonia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 107.

**Enstictus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 424.

**Euthæniotbes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 166.

**Entyllia**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 299. — *bactriana*, 1846, 300. — *concava*, 1846, 301. — *corniculata*, *gemmata*, *sinuata*, 1846, 300.

**Epidedera alternata**, *annulipes*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 959.

**Eplæmata**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 186.

**Epimiltia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 227.

**Epiplagia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 179.

**Eppirrhæna**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 214.

**Episcius Guerinii**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 249.

**Epistictia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 216.

**Eplænia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 195.

**Eriattus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 170.

**Ericerus ceriferus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Communic. d'entomol. appliquée sur cet Ins. de Chine, 1858, LXVII.

**Erythrochilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 74.

**Erythromelas**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 135.

**Erythropeltus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 161.

**Erythrophthalma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 180.

**Eucerochoris**, SIGNORET, Note sur les Hémipt. Hétéropt., 1858, 501. — *nigriceps*, 1858, 501.

**Eupelix**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 201. — *cuspidata*, *producta*, SIGNORET, recueillies dans le bois du Vésinet, 1852, LV.

**Eurybrachys**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 367. — *abbreviata*, *Lepelletierii*, *spinosa*, 1839, 369.

**Eurycera**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 183.

**Eurydema**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 437.

**Eurygaster**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 409.

**Eurymeia**, SIGNORET, Notice sur le groupe des Eurymélides, 1850, 502. — *adpersa*, *bicincta*, 1850, 510. — *bicolor*, 1850, 503. — *discoïdalis*, 1850, 505. — *distincta*, 1850, 506. — *erythrocnemis*, 1850, 507. — *fenestrata*, 1850, 505. — *lineata*, 1850, 509. — *marmorata*, *maura*, 1850, 507. — *ocellata*, 1850, 511. — *porriginosa*, 1850, 512. — *pulchra*, 1850, 508. — *punctata*, 1850, 511. — *rubrovittata*, 1850, 504. — *ruficollis*, 1860, 506. — *trifasciata*, 1850, 512. — *vicina*, 1850, 506.

**EURYMÉLES**, AMYOT, Note à l'occasion du travail de M. Signoret, 1850, 513.

**EURYMÉLIDES**, SIGNORET, Notice sur ce groupe 1850, 497, et 1851, 669.

**Eurysaspis transversalis**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 342.

**Eusarcoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 448.

**Euschistus nigromarginatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 927.

**Evacanthus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 233.

**Evalassus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 169.

**Evonymaphis evonymi**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Exorhinus**, Amyot, Rhynchotes, 1846, 379.

**Exphora**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 195. — *Guerinii*, 1860, 196.

## F.

**Flammigera**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 230.

**Flata**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 412. — *aurora*, 1839, 416. — *floc-cosa*, 1839, 418. — *limbata*, 1839, 415. — *malgacha*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 200. — *postica*, SPINOLA, 1839, 420. — *rubra*, SIGNORET, 1860, 200. — *Stollii*, SPINOLA, 1839, 418.

**Flatoides** *cicatricosus*, *eburneus*, *hyalinipennis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 198. — *sinuatus*, 1860, 199. — *tortrix*, *vicinus*, 1860, 197.

**Forda**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 486.

**Fulgora**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 206. — *affinis*, *apicalis*, WESTWOOD, Obs. sur la famille des Fulgorides, 1838, XXXVIII. — *castresii*, SPINOLA, 1839, 215. — *cognata*, WESTWOOD, 1838, XXXIX. — *cyanirostris*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. d'une nouv. esp. de Java, 1845, xcvi. — *decorata*, WESTWOOD, 1838, XXXVIII. — *dilatata*, 1838, XXXIX. — *europæa*, ROBINEAU-DESVOIDY, se trouve aux env. de Paris, 1849, VIII. — *laternaria*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 213. — *id.*, BECKE, A l'état parfait elle ne luit pas dans l'obscurité, 1848, XIV. — *nobilis* WESTWOOD, 1838, XXXIX. — *obliqua*, L. DUFOUR, Note sur cette esp., 1846, XLV (voyez *Tettigometra*). — *oculata*, WESTWOOD, 1838, XXXVIII. — *Servillei*, SPINOLA, 1839, 214.

**Fulgore porte lanterne**, WESTMAEL, Obs. sur sa phosphorescence 1837, LXVII.

**FULGORELLES**, SPINOLA, Essai sur cette famille, 1839, 133.

**Fulgores**, LEFEBVRE, M. Hancock leur dénie la faculté d'être phosphorescentes, 1834, LXIII. — *id.*, LACORDAIRE, Obs. sur leur faculté phosphorescente, 1834, LIII. — *id.*, WESTWOOD, Obs. sur les Fulgorides, 1838, XXXVIII.



## G.

**Gabisa**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 445.

**Gargara**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 181.

**Gastrodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 96.

**Geneonymus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 468.

**Genistifex** (*Genistæ* Scop.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Germaria cucullata**, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Hémopt., 1832, 222. — *id.*, SIGNORET, Revue des Tettigonides, 1853, 13, 1855, 765, et 1860, 177.

**Gerris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 423. — *lacustris*, LUCAS, Note sur ces Ins., 1850, LI. — *pallipes*, LEFEBVRE, M. Hahn donne à cette esp. le nom générique d'*Ochetopus*, 1833, LXXI.

**Globiceps**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 167.

**Glaeochromus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 93.

**Glymmatophora**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 961.

**Goniospilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 143.

**Gonocerus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 482, — *clavatus*, *lanciger*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 943. — *lineatus*, 1860, 942. — *ochraceus*, 1860, 943.

**Gozara** AMYOT, Rhynchotes, 1846, 381.

**Grammomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 123.

**Graphosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 412.

**Gryllomorphus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 177.

## H.

**Hacodus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 141.

**Hadoeratus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 128.

**Hæmatogaster**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 456.

**Hagamia**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 172.

**Halobates**, FAIRMAIRE, Note sur ce genre, 1848, XXVI. — *sericeus*,  
SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 969.

**Halticus pallicornis**, LUCAS, Dégâts causés par cet Hémipt. aux pois et  
haricots, 1854, XXXI.

**Halys pulchra**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851,  
331.

**Hammatoscells**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 966. —  
*annulipes*, 1860, 966.

**Harmecoris**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 381.

**Harpactor**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 404. — *madagascariensis*, *sub-*  
*flaviceps*, *sulcicollis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860,  
965.

**Hebrus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 174. — *pusillus*, WESTWOOD, Mém.  
sur ce genre, 1834, 652. — *id.*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-  
Siciles, 1841, 303.

**Helenotus fasciatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 964.

**Helopeltis**, SIGNORET, Note sur les Hémipt. Hétéropt., 1858, 502. —  
*Antonii*, 1858, 502.

**HÉMIPTÈRES**, LEFEBVRE, Fluide nutritif découvert dans les pattes  
de qqes Hémipt. par M. le D<sup>r</sup> W. Behn, de Kiel, 1835, LV. — *id.*,  
L. DUFOUR, Expériences sur cettedécouverte, 1835, LXXIII. — *id.*,  
DOYÈRE, Obs. sur qqes genres d'Hémipt., 1837, 261. — *id.*, GOUREAU,  
Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 65. — *id.*, SIGNORET, l'auteur

vient d'acquérir la collection de M. Serville, 1851, xxxiii. — *id.*, Note rectificative du travail sur de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, cviii. — *id.*, Liste des esp. trouvées dans une chasse à Compiègne, 1852, xxxii. — *id.*, BOIELDIEU, Morceau de schiste contenant des débris d'Hémipt., 1853, xii. — *id.*, SIGNORET, Grand nombre trouvés aux env. de La Teste, dont qqes nouv., 1853, xlii. — *id.*, YERSIN, Qques esp. des env. d'Hyères et de Provence, 1856, 737. — *id.*, Liste de ceux recueillis aux env. de Cette et de Montpellier, 1857, 642. — *id.*, SIGNORET, Lecture du Catalogue de ceux recueillis en Corse, par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, xcvi. — *id.*, AMYOT, L'auteur sollicite la communic. des esp. d'Europe, recueillie par les entomologistes, 1844, lxiv. — *id.*, AMYOT, Lecture de la préface de l'ouvrage de l'auteur.

**Hémiptères-Hétéroptères**, SIGNORET, Lecture d'une note sur une nouv. famille de cette division, 1858, xxxiii. — *id.*, Dépôt d'un Mém. sur les Hémipt.-Hétéropt. de Madagascar, 1860, xxx.

**Hémiptères nouveaux**, SIGNORET, communic. de plusieurs esp. de la Guinée portugaise, 1849, xv. — *id.*, Esp. provenant du Silhet (Inde), 1850, xxxviii. — *id.*, pris aux env. de Paris, 1854, xxx.

**Hémiptères de Pologne**, SIGNORET, Communic. d'un assez grand nombre d'espèces au nom de M. de Waga, 1860, lxxxviii.

**Hémiptères de Sieile**, SIGNORET, Catal. de ceux recueillis par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 738.

**Hémiptères de Syrie**, SIGNORET. Communic. de qqes esp. rares publiées par M. Kolenati, 1855, x.

**Hemistitus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 413.

**Hemiptycha**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 312. — *alata*, 1846, 317. — *apicalis*, 1846, 315. — *asphaltina*, 1846, 319. — *bimaculata*, 1846, 315. — *brunniventris*, 1846, 316. — *camelus*, 1846, 319. — *centrotoides*, 1846, 317. — *compressicornis*, 1846, 313. — *cuneata*, 1846, 319. — *expansicornis*, 1846, 317. — *flava*, 1846, 314. — *flavomarginata*, 1846, 315. — *furcata*, 1846, 314. — *globiceps*, 1846, 319. — *lævigata*, 1846, 318. — *longicornis*, 1846, 315. — *marginata*, 1846, 312. — *picea*, 1846, 316. — *placida*, 1846, 318. — *punctata*, 1846, 313. — *punctum*, 1846, 318. — *rotundicornis*, 1846, 314. — *xantographa*, 1846, 316.

**Hemizomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 431.

**Hemestaris**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 492. — *Spinolæ*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 304.

**Hephathus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 215.

**Heraria**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 106.

**Hericus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 179.

**Heterochromus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 94.

**Heterogaster**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 106. — *resedæ*, SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiii.

**Heteronotus**, DE LAPORTE, Notice sur un nouv. genre de l'ordre des Homopt., 1832, 95. — *id.*, Addenda à la notice de l'auteur, 1832, 441. — *id.*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 499. — *abbreviatus*, 1846, 500. — *armatus*, DE LAPORTE, 1832, 97. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, 501. — *flavolineatus*, DE LAPORTE, 1832, 96. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, 499. — *fuscus*, DE LAPORTE, 1832, 98. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, 501. — *inermis*, DE LAPORTE, 1832, 97. — *nigricans*, 1832, 96. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, 500. — *nodosus*, 1846, 501. — *h-nodosus*, 1846, 499. — *spinosus*, DE LAPORTE, 1832, 96. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, 501. — *tridens*, 1846, 501. — *vulnerans*, 1846, 500.

**HÉTÉROPTÈRES**, COSTA, Hémipt.-Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 279.

**Heterotomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 165.

**Hexarabdus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 445.

**Hieroglyphica**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 446.

**Hiracia Coquerelii**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 201.

**Holomesus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 410.

**Holosecytus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 111.

**Holotrichus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 406.

**Holothrichus Cyrilli**, COSTA, Hémipt.-Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 283. — *dendatus*, 1841, 281.

**HOMOPTÈRES**, DE CASTELNEAU, Rectific. de ceux des illustrations de zoologie de M. Lesson, 1836, vii. — *id.*, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 143. — *id.*, SIGNORET, une Notice de M. Stål indique un nouv. genre de cet ordre, 1858, xxxviii. — *id.*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 177.

**Hemescotus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 146.

**Hoplophora**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 269. — *cinerea*, *corrosa*, *cribrum*, 1846, 272. — *gigantea*, 1846, 269. — *granadensis*, 1846, 273. — *lineata*, 1846, 270. — *monogramma*, 1846, 271. — *ornata*, 1846, 274. — *pertusa*, 1846, 271. — *punctum*, 1846, 272. — *4-lineata*, *sagittata*, 1846, 273. — *sanguinosa*, 1846, 270. — *sordida*, 1846, 271. — *triangulum*, *tuberculata*, 1846, 273. — *variegata*, 1846, 271. — *vicina*, 1846, 270. — *vittata*, 1847, 271.

**Heriela**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 492, — *ferruginea*, 1846, 493. — *lineolata*, *picta*, 1846, 492.

**Humulifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 477.

**Huphus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 472.

**Hyalesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 163.

**Hyalostactus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 88.

**Hydara** *gracilicornis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 942.

**Hydroessa**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 428.

**Hydrometra**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 413. — *stagnorum*, SIGNORET, Larve avec des ailes complètes, 1852, LV.

**Hylophila**, WESTWOOD, Mém. sur ce genre, 1834, 639. — *id.*, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 378.

**Hyodochrotus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 90.

**Hypapterus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 210.

**Hypaulacla**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 210.

**Hypomius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 193.

**Hyposcopus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 209.

**Hyposticta**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 228.

**Hypostilba**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 230.

**Hypotmetus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 177.

**Hypsauchenia**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 520. — *bifoliatus*, 1846, 521. — *Hardwickii*, 1846, 520. — *Westwoodii*, 1846, 521.

**Hysteropterum**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 176.

## I.

**Icterocephalus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 149.

**Idiocerus**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 208.

**Idopeltus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 145.

**Iedidia**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 228.

**Insidiator**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 481.

**Iracon**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 113.

**Irochrotus**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 403.

**Ischnopus**, Amyot, Rhyncholes, 1846, 99.

**ISSITES**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 339.

**Issus**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 343. — *id.*, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 175. — *apterus*, SPINOLA, 1839, 362. — *coleoptratus*, 1839, 352. — *compressus*, 1839, 354. — *conspurcatus*, 1839, 363. — *difformis*, 1839, 364. — *dilatatus*, 1839, 353. — *Dufourii*, 1839, 361. — *grylloides*, 1839, 358. — L. DUFOUR, Note sur cet Ins., 1851, 57. — *herbaceus*, SPINOLA, 1839, 357. — *longipennis*, 1839, 348. — *pectinipennis*, 1839, 347. — *prasinus*, 1839, 349. — *rubrocostatus*, 1839, 357. — *Servillei*, 1839, 351. — *smyrnensis*, 1839, 363. — *tendinosus*, 1839, 349.

## J.

**Jacelfex** (*Jaceæ* Linné), AMYOT, Rhyncholes, 1847, 475.

**Jalla**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 423.

**Jassarus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 86.

**Jassus**, AMYOT, 1847, 216. — *assimilis*, *notatus*, *ocellatus*, *subfuscus*, SIGNORET, trouvés à Compiègne, 1852, xxxiii.

**Javesa**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 172.

**Juglandifex** (*Juglandis* Frich.), AMYOT, Rhyncholes, 1847, 481.

**Juniperifex** (*Juniperi* De Géer), AMYOT, Rhyncholes, 1847, 481.

## K.

**Kermès**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 499. — *vitis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Grands dégâts dans les vignes des env. de Clichy, 1854, XLII.

## L.

**Lachnaphis** (*Lanigera* Hausm.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483.

**Lachnececis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 503.

**Lachnodaphis** (*Lanuginosa* Hart.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483.

**Lachnus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 480.

**Lagenifer**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 75.

**Lamproptera**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 527. — *capreolus*, *vacca*, 1846, 528.

**Laricethus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 485.

**Lecanium**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 500.

**Ledra**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 198. — *marmorata*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 204,

**Leptareya**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 163.

**Lepterus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 389.

**Leptochloris**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 232.

**Leptocoris annulicornis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 941.

**Leptogaster flavipes**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 967.

**Leptolobus Murrayi**, SIGNORET, Desc. d'une nouv. esp. faisant genre, 1855, 61.

**Leptopus**, L. DUFOUR, Révision du genre, 1833, 107. — *id.*, WESTWOOD, Mém. sur ce genre, 1834, 644. — *id.*, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 390. — *id.*, L. DUFOUR, Note sur le genre *Leptopus* et descr. avec fig. d'une nouv. esp., 1834, 352. — *echinops*, Révision du genre *Leptopus*, 1833, 113. — *lanosus*, *littoralis*, Note sur le genre *Leptopus* et descr. avec fig. d'une nouv. esp., 1834, 354. — *littoralis*, Révision du genre *Leptopus*, 1833, 109.

**Leptestasis**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 133.

**Leptyphus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 170.

**Lepyronia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 194.

**Lethæus marginatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 948.

**Leucarmia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 381.

**Leucocephalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 160.

**Leucospilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 209.

**Leucostigmus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 168.

**Leucotomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 363.

**Libyssa madagascariensis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 917.

**Limenattus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 219.

**Livia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 462.

**Lophocephala vicina**, SIGNORET, Hémip. de Madagascar, 1860, 968.

**Lophops Servillei**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 387.

**Lopus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 136.

**Lucasocles**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 365.

**Lycoderes**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 522. — *anchora*, 1846, 524. — *Burmeisteri*, 1846, 525. — *folium*, 1846, 527. — *fronditia*, 1846, 526. — *furca*, *fuscus*, *Gaffa*, 1846, 524. — *galerites*, *gladiator*, 1846, 523. — *lævipennis*, *melanopetalus*, 1846, 527. — *mitratus*, 1846, 523. — *petasus*, 1856, 525. — *pileolum*, *squamiger*, 1846, 526. — *unicolor*, 1846, 525.

**Lygæus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 76. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, prise le 4 novembre, à 10 lieues de Toulon, 1846, CIV. — *bipartitus*,



*bitransversus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 947. — *crassicornis*, pris aux env. de Dijon, par M. Tarnier, 1852, xxxv. — *discoidalis*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 947. — *Fairmairii*, 1860, 946. — *familiaris*, JACQ. DU VAL, Vit en société, 1849, xvi. — *incomptus*, SIGNORET, 1860, 947. — *spinipes*, 1860, 946. — *unimaculatus*, 1860, 947.

**Lygæesoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 79.

**Lygus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 148.

**Lypocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 145.

**Lystra hypoleuca**, SIGNORET, Note sur plusieurs esp. intéressantes de la fam. des Fulgorites 1855, v. — *lanata*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 263. — *pulverulenta*, 1839, 266. — *punctata*, SIGNORET, Descr. d'une nouv. esp., 1850, 65.

**Lythraphis** (*Lythri* Schrank), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 477.

## M.

**Maceevethus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 487.

**Machsacus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 436.

**Macrocerata**, LEFEBVRE, Réclam. au sujet du nom de ce genre, 1848, 199.

**Macrocoris flavicollis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 970.

**Maphus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 180.

**Mazora**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 186.

**Mearus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 457.

**Mecdaria**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 213.

**Mechassavus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 408.

**Meconaphis** (*Papaveris* Fabr.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Mecosoma Coquerelii**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar. 1860, 922.

**Mecynaphis** (*Oblonga* Heyd.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 480.

**Megarhynchus vittatus**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 347.

**Mehophus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 95.

**Melampiestus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 365.

**Melampsalta**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 155.

**Melancephalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 443.

**Melanchloa**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 198.

**Melanderus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 234.

**Melandiscus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 81.

**Melanemma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 145.

**Melaneura**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 198.

**Melanaphrus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 193.

**Melcachus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 192.

**MEMBRACIDES**, LEFEBVRE, Système ptérogaphique appliqué à leur classif., 1842, XX. — *id.*, FAIRMAIRE, Lecture de la préface de leur monogr., 1845, XVIII. — *id.*, Revue de cette tribu, 1846, 235. — *id.*, Tableau des genres de la tribu, 1846, 240.

**Membracis**, Revue de la tribu des Membracides, 1846, 143. — *albidorsa*, 1846, 251. — *altissima*, 1846, 252. — *ambigua*, 1846, 249. — *arcuata*, 1846, 247. — *bicristata*, 1846, 256. — *binotata*, 1846, 251. — *C.-album*, 1846, 244. — *carbonaria*, 1846, 257. — *carinata*, 1846, 244. — *cingulata*, 1846, 248. — *concolor*, 1846, 253. — *confusa*, 1846, 247. — *cruentata*, 1846, 250. — *decipiens*, 1846, 254. — *ensata*, 1846, 250. — *fasciata*, 1846, 245. — *foliata*, 1846, 245. — *fulica*, 1846, 251. — *fusca*, 1846, 244. — *fuscata*, 1846, 247. — *gracilis*, 1846, 253. — *intermedia*, 1846, 249. — *lanceolata*, 1846, 251. — *latipes*, 1846, 252. — *Lefebvrei*, 1846, 246. — *Luçonica*, 1846, 255. — *lunata*, 1846, 244. — *maculosa*, 1846, 254. — *malleonotata*, 1846, 247. — *mexicana*, 1846, 248. — *minans*, 1846, 252. — *monoceros*, 1846, 253. — *monstrosa*, 1846, 257. — *nigra*, 1846, 247. — *nigrovittata*, 1846, 255. — *nutans*, 1846, 252. — *ophthalmica*, 1846, 255. — *periphæria*, 1846, 245. — *peruviana*, 1846, 249. — *pæcila*, 1846, 256. — *5-maculata*, 1846, 250. — *rosea*, 1856, 246. — *sanguinolenta*, 1846, 255. — *stolida*, 1846, 248. — *tectigera*,

1846, 246. — *torva*, 1846, 256. — *tricolor*, 1846, 249. — *tricotata*, 1846, 254. — *trimaculata*, 1846, 245. — *truncata*, 1846, 253. — *zonata*, 1846, 248.

**Menocria**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 160.

**Mephissus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 186.

**Meriopterus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 165.

**Mesostactus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 150.

**Messozus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 427.

**Metacanthus punctipes**, SIGNORET, Note sur l'habitat de qqes Hémipt., 1853, xxxiii.

**Metastemma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 396.

**Metochria**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 387.

**Metulla**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 74.

**Mezagus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 363.

**Mezammira**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 157.

**Mezihomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 94.

**Mezira**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 359. — *crassicornis*, *rugosa*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 957. — *sulcicornis*, 1860, 956.

**Mlaenesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 165.

**Micrelytra**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 473. — *fossularum*, JACQ. DU VAL, trouvée à Toulouse, 1849, xvii.

**Microphysa**, WESTWOOD, Mémoire sur ce genre, 1834, 642.

**Micropus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 104. — *id.*, SIGNORET, Essai monogr. sur ce genre, 1857, 23. — *agilis*, 1857, 28. — *brunni-pennis*, 1857, 32. — *collaris*, 1857, 24. — *falicus*, 1857, 27. — *fulvipes*, 1857, 26. — *id.*, STÅL, Descr. de cette esp., 1858, xxxi. — *Gayi*, SIGNORET, 1857, 27. — *Genei*, 1857, 30. — *id.*, JACQ. DU VAL, trouvé à Toulouse, détails sur cet ins., 1849, xvi. — *leucopterus*, SIGNORET, 1857, 31. — *pusillus*, 1857, 32. — *sabuleti*, 1857, 29. — *Sallei*, 1857, 25. — *Spinolæ*, 1857, 30. — *Stalii*, Note rectificative, cette esp. étant nouv., 1858, xxx. — *variegatus*, Essai monogr. du genre *Micropus*, 1857, 26.

**Microvella pulchella**, WESTWOOD, Mém. sur ce genre, 1834. 647.

- Miletis cinctus**, SIGNORET, Descr. d'une nouv. esp. d'Hémipt., 1850, 70.  
— *curvipes*, *madagascariensis*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 938.
- Miltemma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 151.
- Miltochlæna**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 142.
- Miris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 121. — *striatellus*, SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiii. — *tunicatus*, trouvé à Paris sur les chatons naissants du noisetier, 1850, li.
- Mirzaea**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 220.
- Misbeca**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 163.
- Mispachathus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 194.
- Mogbissus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 444.
- Moualouion**, SIGNORET, Note sur les Hémipt. de la fam. des Uniculules, 1858, 500. — *annulipes*, *parviventre*, 1858, 500.
- Monanthia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 181. — *flavipes*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 956. — *nigriceps*, 1860, 955.
- Monocophora bipunctata**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 182. — *dimidiata*, 1860, 183. — *vicina*, 1860, 182.
- Mononymique (Système)**, Discussion : la Société n'admet pas les opinions de M. Amyot, son auteur. 1848, xvi.
- Mononyx sordidus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 969.
- Monopsis tabida**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 302.
- Montina nodosipes**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 963.
- Mermidea**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 448. — *abdominalis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 929. — *annulicornis*, 1860, 927. — *decorata*, *melacanthus*, 1860, 928. — *vittatus*, 1860, 929.
- Mossur**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 86.
- Mothachrus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 383.
- Mycterodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 174.
- Mycterodus nasutus**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 341.
- Myrmus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 485.
- Myzægirus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.
- Myzoxylus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 481.

## N.

- Nabis**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 399. — *subaptera*, JACQ. DU VAL, trouvée à Toulouse, 1849, xvii.
- Nacassus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 126.
- Nacia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 218.
- Nassir**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 86.
- Naucoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 435. — *humeralis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 969. — *parvulus*, 1860, 970. — *rugosa*, J. DESJARDINS, Note sur un ins. nouv. de l'île Maurice, 1837, 239. — *id.*, AUD.-SERVILLE, Rapport sur le mém. de M. J. Desjardins, 1837, 243.
- Nauptera**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 434.
- Nebiza**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 399.
- Necudum**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 99.
- Neggechus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 105.
- Nehigia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 171.
- Neldes**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 477.
- Nepa**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 436.
- Nephesa antica**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 199. — *suturalis*, 1860, 200.
- Nesmia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 144.
- Nessorhinus vulpes**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 295.
- Nevelus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 84.
- Nezara**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 450. — *acutus*, *flavopunctata*, *prasinus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 935.
- Niemarus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 164.

**Nienahia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 379.

**Nicodia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 382.

**Nithecus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 108.

**Noharus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 186.

**Noms spécifiques**, AMYOT, Question soumise à la Société sur leur changement en noms génériques, 1842, LXI.

**Notonecta**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 451.

**Nymphæifex** (*Nymphææ* Linné), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

## O.

**Ochrocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 131.

**Ochrophara**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 162.

**Ochrotypus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 145.

**Ochthetha**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 388.

**Ochthephila**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 386.

**Odontoptera**, CARRENO, Descr. d'un nouv. genre de l'ordre des Hémipt., 1841, 275. — *Carrenoi*, SIGNORET, Descr. d'une nouv. esp. d'Hémipt. Homopt., 1849, 177. — *spectabilis*, CARRENO, Descr. d'un nouv. genre d'Hémipt., 1841, 277.

**Odontopus** *bipunctatus*, *madagascariensis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 953.

**Odontoscellis**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 418.

**Odontotarsus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 403. — *Coquerelii*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 918.

**OEcopteris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 156.

**OEda**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 505. — *inermis*, *inflata*, 1846, 506. — *informis*, 1846, 507.

**OEdobrachium**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 97.

**Omalocephala**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 259. — *cincta*, 1839, 262. — *festiva*, 1839, 261.

**Ommatidiotus**, SIGNORET, trouvé dans le bois de Meudon, 1853, LXVI.  
— *dissimilis*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 365.

**Oncopygia**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 405.

**Oncopsis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 210.

**Ophiderma salamandra**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 493.

**Ophthalmicus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 113. — *ater*, SIGNORET, Erratum de la page LIII du Bulletin, 1854, LXXVII. — *boops*, L. DUFOUR, Sur qqes esp. algériennes du genre *Ophthalmicus*, 1857, 69. — *celer* (*ater*), SIGNORET, pris près de Lardy, 1854, LIII. — *dispar*, WAGA, Descr. d'une nouv. esp., 1839, 523. — *id.*, Note sur cette espèce, 1848, VI. — *erythropus*, L. DUFOUR, 1857, 69. — *grylloides*, WAGA, Note sur cette espèce, 1848, VI. — *id.*, AMYOT, Les *dispar* et *grylloides* forment en effet deux esp., 1848, VIII. — *occipitalis*, L. DUFOUR, 1857, 70.

**Opostigmus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 227.

**Orthezia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 489.

**Osriodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 439.

**Otiocerus Stollii**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 380.

**Oxyacanthaphis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Oxygonia**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 301. — *alliacea*, *atroaptera*, 1846, 304. — *chrysura*, *conica*, 1846, 302. — *cultrata*, 1846, 304. — *dorsalis*, *erythropus*, 1846, 303. — *galeata*, 1846, 304. — *maculicornis*, 1846, 303. — *militaris*, *nimbata*, 1846, 304. — *pacifica*, 1846, 302. — *rufipes*, 1846, 301. — *rufiventris*, *signata*, 1846, 304. — *viridula*, *zebrina*, 1846, 305.

**Oxypristis Leroyi**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 937.

**Oxyrhachis**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 267. — *Delalandei*, *furcicornis*, 1846, 268. — *gambix*, 1846, 269. — *tarandus*, 1846, 268.

## P.

**Pacechia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 212.

**Pachycoris** *hirta*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 306.

**Pachymerus** *parallelus*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 290. — *suberythropus*, 1841, 292.

**Pachypeltis**, SIGNORET, Note sur les Hémipt. Hétéropt., 1858, 501. — *chinensis*, 1858, 501.

**Pachytoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 170. — *minor*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 288.

**Padifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 477.

**Panimius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 207.

**Parachilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 149.

**Paracletius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 487.

**Parmula** *bistrigata*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 490. — *gibbula*, *vertebralis*, 1846, 491.

**Paroedma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 187.

**Paropia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 202. — *scanica*, *scutata*, SIGNORET, recueillies dans le bois du Vésinet, 1852, LV.

**Paryphesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 138.

**Paryphomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 138.

**Pasatus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 97.

**Paykulonymus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 150.

**Pedematia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 236.

**Pediopsis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 212.

**Peirates** *niger*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 960.



- Pelldnus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 422.
- Pelogonus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 428.
- Peltagopus flavomarginatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 936.
- Peltephlyctis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 218.
- Peltospila**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 232.
- Pemphigus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 484.
- Pentalonia**, COQUEREL, Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 259. — *nigronervosa*, 1859, 260. — *id.*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 178.
- Pentastigmops**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 226.
- Pentastira**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 167.
- Pentatoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 441. — *affinis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 931. — *confusa*, 1860, 932. — *fimbriata*, *subflava*, *viridissima*, 1860, 931.
- Penthesthetus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 144.
- Penthimia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 199.
- Penthimum**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 167.
- Pentholæphus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 129.
- Penthopitta**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 219.
- Penthotænia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 206.
- Persiocecis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 501.
- Persiotrocha**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 501.
- Pesclus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 132.
- Petascellis bilobus**, SIGNORET, Descr. d'Hémipt. nouv. de la Guinée portugaise, 1850, 69. — *dilatatus*, 1850, 68. — *remipes*, Descr. d'un Hémipt. Hétéropt., type d'un nouv. genre, 1847, 301. — *id.*, Descr. d'Hémipt. nouv. de la Guinée portugaise, 1850, 69. — *spinosus*, Descr. d'une nouv. esp. d'Hémipt. Hétéropt., 1851, 121. — *tribulus*, Descr. d'Hémipt. nouv. de la Guinée portugaise, 1850, 70.
- Phænax reticulata**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 311.
- Phegirus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 480.

**Phelochromus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 142.

**Pheloderes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 121.

**Phenice bivittata**, COQUEREL, Note sur qqes Ins. de Madagascar et de Bourbon, 1859, 258. — *id.*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 186.

**Philammus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 428.

**Philyriptus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

**Philyrocecis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 502.

**Phimodera**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 413.

**Phlegmatoptera prasina**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 283.

**Phlogospila**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 229.

**Phlogothænia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 231.

**Phonectonus grandis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 962.

**Phorphyrendya**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 452.

**Phricodus fasciatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 924. — *histris*, Obs. sur cet Hémipt. Hétéropt., 1849, 327.

**Phrictus diadema**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 216. — *ocellatus*, SIGNORET, Note sur plusieurs esp. intéressantes de la famille des Fulgorites, 1855, IV.

**Phrissoceranus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 467.

**Phyllocephala dilatatus**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 346.

**Phyllemorpha algerica**, *capicola*, *erinaceus*, *lacerata*, *laciniata*, *Latreillei*, *madagascariensis*, COQUEREL, Note sur des esp. nouv. de ce genre, 1848, 184 et 185. — *madagascariensis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 942. — *paradoxa*, *persica*, COQUEREL, 1848, 184.

**Phylloxera**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 485. — *longirostris*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Descr. des Pucerons des env. d'Aix, 1841, 197. — *quercus*, 1841, 196.

**Phylliphanta nivea**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 200.

**Phylus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 127.

**Phymata**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 172.

**Physanealus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 87.

**Physantochila**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 184.

**Physomerus dilaticornis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 939.

**Phytocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 152. — *biguttatus*, SIGNORET, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiii. — *chlorizans*, Note sur l'habitat de qqes Hémipt., 1853, xxxiii. — *flavomarginatus*, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 286. — *Passerinii*, 1841, 288.

**Plecechus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 415.

**Picridifex** (*Picridis* Fabr.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 475.

**Picromerus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 421. — *flavirostrum*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 921.

**Piesma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 192.

**Piestosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 364.

**Piozedera**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 953. — *rubra* 1860, 954.

**Piggulus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 162.

**Pilematia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 185.

**Pilophorus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 166.

**Pirates**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 393.

**Pitedia**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 445.

**Pittesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 179.

**Pittostigma**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 165.

**Pityaphis** (*Pini* Linné), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 481.

**Pityopsylle**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 461.

**Placoderes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 131.

**Plæaria**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 411.

**Plagiops**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 112.

**Plantaginifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Platanaphis**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 475.

**Platycephala coccinelloides**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 920. — *nigrita*, *variegatus*, 1860, 921.

- Platymecus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 117.
- Platymetopius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 203.
- Piatystus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 409.
- Platypieura guttulata**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 178.
- Plectoderes collaris**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 328.
- Pleuroedma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 185.
- Plinthisus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 102.
- Ploa**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 448.
- Plociomerus nabizoides, triguttatus**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 951.
- Plecaria**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 411.
- Ploiaria uniannulata**, SIGNORET, Notice sur qqes Hémipt. nouv. ou peu connus, 1852, 544.
- Pocharica**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 192. — *ocellata*, 1860, 192.
- Pochazia biperforata**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 189. — *flavescens*, 1860, 191. — *nigropunctata*, 1860, 189. — *oculata*, 1860, 190. — *5-costatus, tibialis*, 1860, 190.
- Pochazoides**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 193. — *maculatus*, 1860, 193. — *vicinus*, 1860, 194.
- Podochrius**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 85.
- Podops**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 415. — *siculus*, COSTA, Rem. sur la synonymie de div. esp. de *Podops*, 1847, LXXXVIII. — *id.*, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 301. — *sinuatus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 918. — *tibialis*, 1860, 919.
- Pœcilopectera**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 420. — *acuminipennis*, 1839, 445. — *aspericollis*, 1839, 434. — *brasiliensis*, 1836, 438. — *candida*, 1839, 431. — *coromandelica*, 1839, 440. — *dominicensis*, 1839, 439. — *falcata*, 1839, 430. — *fodipennis*, 1839, 428. — *maculata*, 1839, 425. — *marginella*, 1839, 433. — *melanaria*, 1839, 424. — *ocellata*, 1839, 441. — *phalænoides*, 1839, 423. — *producta*, 1839, 432. — *ricanioides*, 1839, 442. — *septentrionalis*, 1839, 436. — *subquadrata*, 1839, 426. — *truncaticornis*, 1839, 429.

**Polocera**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 274. — *flavopunctata*, 1839, 279. — *lepida*, 1839, 281. — *Luczoti*, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homopt., 1832, 221. — *id.*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 279. — *maculata*, 1839, 278. — *pallida*, 1839, 279. — *perspicillata*, 1839, 277. — *Servillei*, 1839, 280.

**Polliothrix**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 154.

**Polyacanthus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 83.

**Polyglypta**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 296. — *bogotensis*, 1846, 297. — *costata*, 1846, 296. — *dorsalis*, 1846, 297. — *lineata*, 1846, 298. — *maculata*, 1846, 297. — *nigella*, 1846, 298. — *nigriventris*, 1846, 297. — *pallipes*, 1846, 298. — *pilosa*, 1846, 296. — *13-costata*, 1846, 299. — *viridimaculata*, 1846, 298.

**Polymerus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 159.

**Porphyrendya**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 452.

**Porphyrochrosus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 122.

**Porphyrophora**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 503. — *gallica*, SIGNORET, Commun. d'un indiv. trouvé dans les dunes de Saint-Quentin, 1854, LII.

**Precopops**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 446.

**Proderus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 95.

**Prodesmia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 222.

**Proleucopus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 169.

**Proomoxys**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 414.

**Prostemma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 395. — *brachelytrum*, L. DUFOUR, Descr. d'un Hémipt. européen nouv. ou mal connu, 1834, 348. — *guttula*, Identique avec le *brachelytrum*, 1834, 356. — *id.*, DE LAPORTE, Réponse verbale au mém. de M. L. Dufour, 1834, VII.

**Prestictops**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 221.

**Prostigmoderus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 210.

**Protænia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 225.

**Pruisfex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 476.

**Psacasta**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 404.

**Psammophilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 93.

- Pseudophana**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 160. — *europæa*, AUD.-SERVILLE, trouvée près de Coulommiers, 1847, xcvi.
- Pseudophlæus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 489. — *id.*, SIGNORET, trouvé dans le bois de Meudon, 1853, lxvi.
- Psimmythimas**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 220.
- Psorodaphis** (*Scabiosæ* Schrank), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.
- Psylla**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 458. — *id.*, LACORDAIRE, L'auteur signale une monogr. de ce genre par M. Forster, 1849, lxxix. — *oleæ*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Pucerons des env. d'Aix, 1840, iii.
- PSYLLIDES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Obs. sur des dégâts causés aux oliviers par une esp. de ce genre, 1847, ciii.
- Pteleococcus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 502.
- Pteridetha**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 173.
- Pterotmetus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 103.
- Pterygia** *arietina*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 263. — *bifida*, 1846, 265. — *brachycera*, 1846, 265. — *capitata*, 1846, 267. — *crassicornis*, *cruciata*, 1846, 264. — *hispida*, 1846, 1846, 265. — *Macquarti*, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homopt., 1832, 226. — *id.*, FAIRMAIRE, 1846, 265. — *pileata*, 1846, 266. — *4-dens*, 1846, 264. — *5-tuberculata*, 1846, 266. — *Satanas*, 1846, 264. — *tripodia*, 1856, 263. — *tuberosa*, 1846, 266.
- Ptyelus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 192. — *mirabilis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 183.
- Puceron**, FAIRMAIRE, Note relative aux mœurs d'une nouv. esp. d'Hémipt., 1851, cvii. — *lanigera*, AUDOUIN, Obs. sur les effets produits par cet Ins. sur les pommiers, 1835, ix. — *id.*, GOUREAU, au nombre des principaux Ins. nuisibles aux pommiers, 1852, lxxxix.
- Pucerons**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Desc. de ceux qui se trouvent aux env. d'Aix, 1841, 157. — *id.*, LABOULBÈNE, leur génération alternante, 1852, lvi. — *id.*, Rapport à l'Acad. des sciences de Bruxelles sur un mém. de M. Morrin, 1836, lxxvi. — *id.*, DOUË, Note sur une nuée de Pucerons verts observée à Paris, 1847, lxxiv.
- Punaises aquatiques**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Extrait d'un mém. sur trois espèces dont les œufs servent à faire du pain au Mexique, 1857, calviii.

**Pyena strix**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 178.

**Pygolampls**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 409.

**Pyrops**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 231. — *albipennis*, 1839, 238. — *annularis*, 1839, 240. — *id.*, SIGNORET, Note sur plusieurs esp. intéressantes de la fam. des Fulgorites, 1855, IV. — *candelaria*, SPINOLA, 1839, 233. — *madagascariensis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 183. — *obscurata. punctata*, SPINOLA, 1839, 237. — *serrata*, 1839, 235. — *id.*, SIGNORET, Note sur plusieurs esp. intéressantes de la fam. des Fulgorites, 1855, IV. — *Servillei*, SPINOLA, 1839, 237. — *tenebrosa*, 1839, 235.

**Pyrotaenia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 224.

**Pyrrhocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 114. — *egyptiaca*, JACQ. DU VAL, trouvée à Perpignan, 1849, XVII.

## R.

**Raglius**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 89.

**Ramamus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 123.

**Ramea**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 476.

**Ranatra**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 439. — *bicornis*, DE CASTELNAU, Nom du genre appliqué par Lesson avec raison au genre *Heteronotus* Cast., 1836, IX. — *glandifera*, n'est qu'une var. de l'*Heter. nigricans*, 1836, X. — *parviceps*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 970.

**Raphirhinus**, DE LAPORTE, Mém. sur 50 esp. nouv. ou peu connues d'Ins., 1832, 413. — *ascendens, cupriventris*, 1832, 414. — *obliquatus*, 1832, 415.

**Rasahus flaviceps**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 960.

**Rhaphigaster**, *incerta*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 935. — *transversus*, 1860, 936.

**Reduvius**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 400. — *serratus*, DE LAPORTE, Doutes sur sa faculté électrique, 1833, XIII.

**Resomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 211.

**Rhabdesthes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 134.

**Rhaphigaster**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 453.

**Rhinaulax callosipennis**, *limbata*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 182.

**Rhinocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 403.

**Rhizobius**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 486.

**Rhombospilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 83.

**Rhopalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 488.

**RHYNCHOTES**, AMYOT, Commun. d'un travail intitulé : *Rhynchotes de France*, 1841, XIX. — *id.*, Préface de l'Entomologie française, 1845, 369. — *id.*, Entomologie française, 1845, 369; 1846, 75, 359; 1847, 143, 453. — *id.*, Tableau de classif. générale, 1845, 387. — *id.*, Généralités, 1845, 389. — *id.*, Ordres, tribus, divisions, subdivisions, etc., 1845, 395. — *id.*, Tableau général des tribus, 1847, 504. — *id.*, Errata et addenda, 1847, 507. — *id.*, Table alphabétique des auteurs cités, 1847, 511. — *id.*, Table alphabétique des noms méthodiques et spécifiques, 1847, 517.

**Rhyparochromus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 93. — *annulatus*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 949. — *brachiidens*, L. DUFOUR, Descr. d'une nouv. esp. de *Lygeites*, 1851, 327. — *proderus*, SIGNORET, Note sur qqes Hémipt. nouv. ou peu connus, 1852, 539. — *raptorius*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 950. — *Rolandri*, JACQ. DU VAL, vit en société, 1849, XVI. — *transversus*, SIGNORET, 1860, 950.

**Riancia**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 196. — *longirostrum*, 1860, 197.

**Ribifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 476.

**Ricania albizona**, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 391. — *Donovanii*, 1839, 397. — *fasciata*, 1839, 410. — *Klugii*, 1839, 408. — *oculata*, 1839, 407. — *pæcilopteroides*, 1839, 398. — *parnopæpennis*, 1839, 402. — *pellucida*, 1839, 401. — *planipennis*, 1839, 396. — *punctifrons*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 195. — *articulata*, SPINOLA, 1839, 403. — *rosca*, 1839, 400. — *Servillei*, 1839, 404. — *splendida*, 1839, 406. — *trimaculata*, 1839, 409.

**Rithecus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 187.



## S.

**Sabceus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 164.

**Sahius**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 89.

**Salda**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 387. — *grylloides*, COSTA, Hémipt. Héréropt. des Deux-Siciles, 1841, 303.

**Salicetifex** (*Saliceti* Schrank), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

**Salicifex** (*Salicis* Linné), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 480.

**Sambucifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 477.

**Sanaehus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 218.

**Saranus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 458.

**Sassarus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 187.

**Sastrapada incerta**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 968.

**Scærophyla**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 171.

**Scaphula**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 494. — *alutacea*, *contromaculata*, 1846, 495. — *flavicans*, *semiatra*, 1846, 494.

**Scaris tristis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 205.

**Schizia Servillei**, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homopt., 1832, 223.

**Schizoneura**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483. — *id.*, FAIRMAIRE, Nouv. esp. de Puceron trouvée dans la racine d'une graminée, 1851, CVII.

**Schizops**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 460,

**Sciocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 435.

**Sciodopterus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 385.

**Scolymaphis** (*Cardui* Linné), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

**Scotarpax**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 405.

- Scotembrechus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 380.
- Scotethus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 427.
- Scotenotus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 155.
- Schyzoneura rotundiventris**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 178.
- Schirus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 431.
- Senelocephalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 206.
- Senuma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 476. — *id.*, SIGNORET, Note sur l'habitat de qqes Hémipt., 1853, XXXIII.
- Sepina**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 930. — *urolaboides*, 1860, 930.
- Serenthia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 189. — *læta*, L. DUFOUR, Habitat de cette esp., 1851, 56.
- Serinctha lateralis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 939.
- Sigara**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 447. — *minuta*, L. DUFOUR, Un mol sur cette esp., 1846, XCIII. — *sulcata*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 971.
- Sirion**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 112.
- Smilia**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 291. — *brunneofaciata*, *campestris*, 1846, 292. — *dorsata*, *formicata*, 1846, 293. — *nigrofasciata*, *prasina*, *vaginata*, 1846, 292. — *vittatipennis*, 1846, 293.
- Smillorachis**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 290. — *binotata*, 1846, 291. — *bipunctata*, *bispina*, 1846, 290. — *variegata*, 1846, 291.
- Sodus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 77.
- Solenostethium**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 402.
- Sonchifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 475.
- Sopherus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 139.
- Sophio**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 102.
- Sphærocoris punclarius**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 917.
- Sphæronotus globularis**, DE LAPORTE, Mém. sur qqes nouv. genres d'Homopt., 1832, 229.
- Sphegiformis**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 163.

- Sphongophorus ballista**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 260. — *Bennetii*, *biclavatus*, 1846, 262. — *clavaria*, 1846, 261. — *Guerinii*, 1846, 262. — *mirabilis*, *paradoxa*, 1846, 261. — *spatulatus*, 1846, 262.
- Sphragidimum**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 88.
- Spillaphria**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 190.
- Spiloderes**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 124.
- Stactogala**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 217.
- Stactopeltus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 228.
- Stagonomus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 444.
- Stenocephalus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 469. — *neglectus*, JACQ. DU VAL, trouvé à Toulouse, 1849, xvii.
- Stenogaster**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 107. — *lavateræ*, JACQ. DU VAL, Obs. sur des Hémipt., 1849, xv.
- Stenolemus spiniventris**, SIGNORET, Descr. d'un nouv. genre de la tribu des Longicoxes, 1858, 251 et xix.
- Stictospirus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 130.
- Stigmocratus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 213.
- Stigmophorus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 78.
- Stigmorhanis**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 79.
- Strachia fasciata**, SIGNORET, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 337. — *madagascariensis*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 933. — *mirabilis*, 1860, 932. — *picta*, 1860, 933. — *4-punctata*, Descr. de nouv. esp. d'Hémipt., 1851, 337.
- Strichnocera**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 179.
- Stridulation**, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 60. — *id.*, Stridulation des Ins., 1839, 551. — *id.*, SOLIER, Obs. sur qqes particularités de la stridulation des Ins., 1837, 199.
- Sycanus harpactoides**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 964.
- Syromastes**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 465.
- Synonymie**, SIGNORET, Plusieurs rectif. relatives à div. Hémipt., 1858, xxxii. — *id.*, L'auteur communique plusieurs autres rectif., 1858, xxxviii.

## T.

**Tænidionotus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 87.

**Tæniolachnus** (*fasciatus* Burm.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 481.

**Tænioma**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 146.

**Taleus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 98.

**Tanacetifex**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 476.

**Tarisa**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 416.

**Tetraneura**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 484.

**Tetraspilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 127.

**Tetrastactus**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 225.

**Tetratoma senegalensis**, SIGNORET, Descr. de deux nouv. Hémipt., 1851, 339.

**Tetroxia femoralis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 960.

**Tettigetta**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 156.

**Tettigia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 152.

**Tettigometra**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 178. — *impressopunctata*, L. DUFOUR, Note sur la *Fulgora obliqua*, 1846, XLV.

**Tettigonia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 197. — *id.*, SIGNORET, Revue iconographique des Tettigonides, 1853, 323. — *actiosa*, 1855, 807. — *acuminata*, 1855, 803. — *æqualis*, 1854, 20. — *æstuans*, 1853, 331. — *adpersa*, 1855, 767. — *affinis*, 1855, 227. — *albida*, 1853, 663. — *albigena*, 1853, 372. — *albigutta*, 1853, 339. — *albinervosa*, 1854, 25. — *albipennis*, 1855, 526. — *albomarginata*, 1853, 347. — *alboparallela*, 1855, 784. — *albostrata*, 1853, 366. — *alternata*, 1855, 795. — *amæna*, 1853, 686. — *Amblardii*, 1855, 53. — *angulifera*, 1854, 727. — *aréolata*, 1853, 355. — *argyrops*, 1853, 678. — *assimilis*, 1853, 340. — *atomaria*, 1855, 57. — *atra*, 1854, 492. — *atropunctata*, 1854, 354. — *attenuata*, 1854, 345. — *Aubei*, 1855, 771. — *aurantiaca*, 1855, 225. — *aurea*, 1855, 514. — *auroguttata*, 1853, 373. — *aurulenta*, 1853, 325. — *basalis*, 1855, 60. —

*basimacula*, 1853, 368. — *bella*, 1854, 10. — *bicolor*, 1854, 725. —  
*bifasciata*, 1853, 329. — *bigibbosa*, 1855, 510. — *bigutta*, 1854, 6.  
— *bilimitata*, 1855, 770. — *billosa*, Hémipt. de Madagascar, 1860,  
203. — *bilunata*, Revue des Tettigonides, 1855, 771. — *bimaculata*,  
1853, 26, et 1854, 362. — *binaria*, Hémipt. de Madagascar, 1860,  
204. — *biscuta*, Revue des Tettigonides, 1853, 684. — *bituberculata*,  
1855, 528, — *Blanchardii*, 1855, 788. — *blandula*, Hémipt. de Mada-  
gascar, 1860, 203. — *brevis*, Revue des Tettigonides, 1855, 523. —  
*Burmeisteri*, 1853, 28. — *canaliculata*, 1855, 230. — *cara*, 1853, 665.  
— *cardinalis*, 1853, 686. — *Caternaultii*, 1855, 768. — *caudata*, 1844,  
366. — *centrolineata*, 1855, 239. — *Chevrolatii*, 1855, 778. — *cincta*,  
1854, 363, — *circularis*, 1853, 357. — *circumcincta*, 1855, 775. —  
*circumducta*, 1854, 360. — *clathrata*, 1855, 795. — *clypeata*, 1855,  
234. — *cæruleopennis*, *cærulescens*, 1853, 672. — *collaris*, 1854, 346.  
— *colorata*, 1853, 353. — *columbica*, 1855, 236. — *comes*, 1855,  
804. — *communis*, 1854, 730. — *compressa*, 1855, 516. — *concinna*,  
1853, 335. — *confusa*, 1855, 58. — *congregata*, 1854, 358, — *cons-  
persa*, 1855, 226. — *contaminata*, 1853, 341. — *Coquerelii*, 1853,  
352. — *id.*, Hémipt. de Madagascar, 1860, 203. — *coronata*, Revue  
des Tettigonides, 1853, 348. — *corticata*, 1855, 226. — *cosmo-  
polita*, 1853, 364. — *costalis*, 1854, 359. — *costata*, 1853, 372.  
— *crassa*, 1853, 341. — *crocipennis*, 1853, 351. — *cruciata*, 1853,  
361. — *cruenta*, 1854, 7. — *caspidata*, 1855, 525. — *cyanes-  
cens*, 1854, 355, — *Dallasi*, 1853, 367. — *Danais*, 1855, 801. —  
*decora*, 1853, 327. — *demissa*, 1853, 29. — *diadema*, 1854, 719. —  
*dilecta*, 1853, 370. — *dimidiata*, 1853, 680. — *discoidea*, 1853, 30.  
— *dispar*, 1853, 27. — *distincta*, 1854, 27. — *diversa*, 1855, 49. —  
*divisa*, 1853, 354. — *dorsalis*, 1853, 349. — *dorsovittata*, 1855, 517.  
— *dubia*, 1853, 343. — *Dufourii*, 1855, 55. — *12-punctata*, 1853,  
337. — *Edwardsii*, 1855, 780. — *elegantissima*, 1853, 337. — *elegan-  
tula*, 1853, 352. — *elongata*, 1854, 495. — *episcopalis*, 1853, 332. —  
*erythrocephala*, 1855, 234. — *exaltata*, 1853, 82. — *excavata*, 1855,  
518. — *extrema*, 1853, 663. — *Fabricii*, 1855, 521. — *facialis*,  
1854, 489. — *Fairmairei*, 1853, 685. — *farinosa*, 1853, 670. —  
*fasciata*, 1853, 359. — *fastuosa*, 1853, 37. — *fenestrata*, 1854, 9. —  
*ferruginea*, 1853, 676. — *fervens*, 1853, 35. — *Fitchii*, 1855, 230.  
— *flammea*, 1855, 50. — *flava*, 1855, 799. — *flaveola*, 1854, 353.  
— *flavicollis*, *flavifrons*, 1853, 350. — *flavipes*, 1854, 22. — *flavo-  
guttata*, 1854, 356. — *flavolimbata*, 1854, 360. — *flavolineata*, 1855,  
791. — *flavomaculata*, 1853, 359. — *flavopunctata*, 1855, 773. —

*flavoscutellata*, 1855, 509. — *flavosparsa*, 1853, 674. — *fossulata*, 1855, 237. — *foveolata*, 1853, 347. — *frontalis*, 1853, 329. — *fulvopunctata*, 1854, 484. — *funebri*, 1854, 490. — *fusca*, 1854, 494. — *fuscata*, 1855, 802. — *fusiformis*, 1853, 687. — *gaudens*, 1853, 331. — *Gayi*, 1855, 786. — *gelida*, 1853, 666. — *geniculata*, 1853, 351. — *geographica*, 1855, 780. — *geometrica*, 1854, 12. — *Germari*, 1853, 359. — *glaucomaculata*, 1853, 333. — *gothica*, 1854, 345. — *grandis*, 1853, 365. — *gratiosa*, 1853, 343. — *grossa*, 1854, 24. — *Guerinii*, 1855, 51. — *guttata*, 1854, 355. — *hectica*, 1854, 20. — *herbida*, 1854, 18. — *herpes*, 1855, 796. — *hexaptera*, 1853, 33. — *hieroglyphica*, 1855, 805. — *histrion*, 1853, 670. — *humeralis*, 1853, 369. — *ichthyocephala*, 1854, 494. — *icterica*, 1855, 781. — *ignicolor*, 1854, 8. — *ignifer*, 1855, 238. — *ignota*, 1854, 731. — *illustris*, 1854, 11. — *imbricata*, 1854, 719. — *impressifrons*, 1854, 16. — *impudica*, 1853, 677. — *incarnata*, 1853, 684. — *indistincta*, 1853, 679. — *inspergata*, 1855, 770. — *intensa*, 1854, 348. — *interrupta*, 1855, 785. — *intersecta*, 1855, 229. — *interstitialis*, 1855, 789. — *irregularis*, 1855, 232. — *irrorata*, 1855, 59. — *jucunda*, 1853, 355. — *Klugii*, 1853, 31. — *Laboulbenii*, 1855, 52. — *lactea*, 1853, 663. — *læta*, 1855, 802. — *laminata*, 1855, 794. — *latifasciata*, 1855, 55. — *latipennis*, 1854, 496. — *lepida*, 1855, 775. — *leucampix*, 1853, 340. — *leucomelas*, 1853, 349. — *limitata*, 1853, 344. — *limpida*, 1855, 512. — *lineata* Fabr., 1855, 802. — *lineata* Sign., 1854, 21. — *lineatocollis*, 1854, 728. — *id.*, Hémipt. de Madag., 1860, 204. — *lineiceps*, Tettigonides, 1855, 786. — *longipes*, 1855, 801. — *Lucasii*, 1855, 778. — *lucernaria*, 1855, 238. — *luciola*, 1855, 239. — *lugubris*, 1854, 13. — *lunata*, 1854, 389. — *lurida*, 1853, 662. — *lutea*, 1855, 773. — *macroptera*, 1853, 661. — *maculicollis*, 1855, 776. — *maculipes*, 1855, 791. — *madagascanensis*, 1854, 344. — *id.*, Hémipt. de Madag., 1860, 204. — *magna*, Tettigonides, 1854, 364. — *major*, 1854, 491. — *marginata* Walk., 1854, 487. — *marginata* Pal. Beauv., 1855, 803. — *marginella*, 1854, 346. — *marmorata*, 1855, 766. — *melanocephala*, 1854, 341. — *mexicana*, 1855, 789. — *micans*, 1855, 800. — *mirabilis*, 1853, 344. — *modesta*, 1853, 324. — *mæsla*, 1853, 358, et 1855, 777. — *mollipes*, 1854, 726. — *monstruosa*, 1853, 335. — *multicolor*, 1853, 363. — *mutabilis*, 1853, 683. — *mutans*, 1855, 228. — *myopa*, 1853, 31. — *nebulosa*, 1854, 343. — *nervosa*, 1855, 524. — *nigra*, 1855, 513. — *nigriceps*, 1855, 508. — *nigrifrons*, 1853, 671. — *nigripennis*, 1854, 491. — *nigripes*, 1853, 370. — *nigriventris*,

1855, 784. — *nigrocincta*, 1855, 774. — *nigroguttata*, 1855, 772.  
 — *nigropunctata*, 1855, 527. — *nitida*, 1855, 799. — *norma*, 1853,  
 671. — *noveboracensis*, 1854, 19. — *obsoleta*, 1854, 15. — *obtecta*,  
 1855, 798. — *obtusa*, 1854, 488. — *occatoria*, 1854, 353. — *8-lineata*,  
 1855, 804. — *oculata*, 1853, 344. — *opponens*, 1853, 667. — *opu-*  
*lenta*, 1853, 333. — *orbona*, 1854, 485. — *ornata*, 1855, 519. —  
*pallipes*, 1854, 730. — *pauperata*, 1853, 374. — *Pavo*, 1853, 675.  
 — *pellucida*, 1853, 373. — *Perrisii*, 1855, 779. — *personata*, 1854,  
 364. — *philippina*, 1853, 674. — *phænicea*, 1853, 353. — *phos-*  
*phorea*, 1855, 522. — *physocephala*, 1854, 720. — *pilipennis*, 1854,  
 342. — *plana*, 1854, 729. — *plumbea*, 1853, 683. — *proxima*, 1853,  
 361. — *pruinina*, 1853, 342. — *pruinosa*, 1853, 681. — *pubescens*,  
 1854, 721. — *pudica*, 1854, 352. — *pulchella*, 1853, 360. — *pul-*  
*chra*, 1853, 326. — *punctatissima*, 1854, 16. — *punctulata*, 1853,  
 345. — *purpurata*, 1853, 325. — *pustulata*, 1855, 240. — *4-gut-*  
*tata*, 1853, 356. — *4-lineata*, 1853, 669. — *4-maculata*, 1854, 495.  
 — *4-plagiata*, 1853, 358. — *4-punctata*, 1855, 233. — *4-vittata*,  
 1854, 348. — *14-punctata*, 1855, 782. — *5-maculata*, 1853, 354. —  
*reflexa*, 1855, 524. — *Reichei*, 1855, 797. — *repanda*, 1854, 60. —  
*resecta*, 1853, 327. — *reticulata*, 1854, 12. — *rhienetta*, 1854, 352. —  
*robusta*, 1854, 10. — *rostrata*, 1855, 509. — *rubiginosa*, 1854, 491.  
 — *rubricauda*, 1854, 351. — *rubripennis*, 1854, 5. — *rubriventris*,  
 1855, 52. — *rubrolimbata*, 1854, 718. — *rubromaculata*, 1853, 668.  
 — *rubromarginata*, 1855, 793. — *rufa*, 1853, 373. — *rufipennis*,  
 1855, 797. — *rufipes*, 1853, 336. — *rugicollis*, 1855, 525. — *rugosa*,  
 1855, 522. — *rutilans* Walk., 1853, 351. — *rutilans* Fabr., 1855,  
 511. — *sagata*, 1854, 27. — *salamandra*, 1855, 787. — *sanguinea*,  
 1853, 686. — *sanguincovittata*, 1855, 777. — *sanguinicollis*, 1853,  
 371. — *sanguinolenta*, 1855, 50. — *Schaumii*, 1853, 327. — *scita*,  
 1853, 664. — *scutellata*, Hémipt. de Madag., 1860, 203. — *segmentalis*,  
*Tettigonides*, 1853, 345. — *semicircularis*, 1853, 348. — *semiclara*,  
 1853, 666. — *semiguttata*, 1853, 367. — *semivitta*, 1854, 7. — *sepa-*  
*rata*, 1855, 54. — *7-fasciata*, 1853, 332. — *7-guttata*, 1854, 727.  
 — *Servillei*, 1853, 330. — *6-guttata*, 1853, 357. — *6-lineata*, 1855,  
 792. — *Signoreti*, 1855, 807. — *similata*, 1855, 236. — *sinensis*,  
 1855, 806. — *solitarius*, 1853, 346. — *somptuosa*, 1853, 673. — *id.*,  
 Hémipt. de Madag., 1860, 203. — *sordida*, *Tettigonides* 1855, 781. —  
*sparsata*, 1855, 508. — *spatulata*, 1854, 722. — *speculifera*, 1854, 483.  
 — *Spinolæ*, 1853, 365. — *splendida*, 1854, 351. — *Stalii*, 1855, 787.  
 — *stellata*, 1853, 667. — *stipata*, 1854, 361. — *Stolli*, 1853, 33. —

*striata*, 1853, 682. — *stylata*, 1854, 344. — *subflava*, 1854, 724. — *sulcata*, 1855, 58. — *sulcicollis*, 1855, 56. — *suturalis*, 1855, 801. — *tarsalis*, 1855, 769. — *terminalis*, 1854, 365. — *tessellata*, 1855, 790. — *Titonii*, 1855, 783. — *transversa*, 1853, 342. — *13-punctata*, 1855, 231. — *triangularis*, 1855, 507. — *trifasciata*, 1855, 805. — *trilineaticeps*, 1853, 338. — *trinotata*, 1853, 39. — *tripunctata*, 1854, 23. — *triquetra*, 1855, 240. — *trita*, 1854, 362. — *tristis*, 1853, 665. — *trivittata*, 1854, 349. — *truncatipennis*, 1854, 717. — *typhlocyboides*, 1854, 725. — *ulcerata*, 1854, 722. — *undata*, 1854, 486. — *unifasciata*, 1853, 328. — *uniguttata*, 1854, 24. — *unimaculata*, 1854, 26. — *variabilis*, 1854, 14. — *varicolor*, 1854, 15. — *variegata*, 1854, 723. — *variolosa*, 1854, 341. — *venosa*, 1853, 334. — *ventralis*, 1854, 41. — *vermiculata*, 1855, 785. — *vernica*, 1853, 368. — *versuta*, 1854, 348. — *verticalis*, 1853, 369. — *vespiformis*, 1853, 38. — *vicina*, 1853, 35. — *victima*, 1853, 680. — *virginea*, 1854, 353. — *viridescens*, 1854, 729. — *viridicans*, 1855, 806. — *viridis*, 1854, 17. — *vittifacies*, 1855, 774. — *vitripennis*, 1854, 493. — *vulnerata*, 1855, 782. — *xanthocephala*, 1854, 486. — *xanthogramma*, 1854, 9. — *xanthonota*, 1854, 350. — *Walkeri*, 1853, 362. — *Westwoodi*, 1853, 364.

**TETTIGONIDES**, SIGNORET, *Revue iconographique*, 1853, 13, 325, 661; 1854, 5, 341, 483, 717; 1855, 49, 225, 506 et 765. — *id.*, Errata, 1855, 833. — *id.*, Table alphabétique des esp., 1855, 809.

**Thacharinus**, AMYOT, *Rhynchotes*, 1845, 407.

**Thamarucus**, AMYOT, *Rhynchotes*, 1845, 490.

**Thamnotettix** *Preysleri*, SIGNORET, trouvé dans le bois du Vésinet, 1852, LV.

**Thelia**, FAIRMAIRE, *Membracides*, 1846, 305. — *acuminata*, 1846, 310. — *antica*, 1846, 308. — *bimaculata*, 1846, 312. — *bracteata*, 1846, 309. — *camelus*, 1846, 308. — *citrina*, 1846, 309. — *cristata*, 1846, 311. — *cyrtops*, 1846, 310. — *ephippigera*, 1846, 311. — *excelsa*, 1846, 310. — *expansa*, *galeata*, *monticola*, 1846, 309. — *mitloglypta*, 1846, 306. — *pallida*, 1846, 308. — *planeflava*, *porphyrea*, 1846, 306. — *scalaris*, 1846, 311. — *sculpta*, *tuberosa*, 1846, 307. — *ursus*, 1846, 306.

**Therapha**, AMYOT, *Rhynchotes*, 1845, 486.

**Thrips** *physapus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, *Pucerons des env. d'Aix*, 1841, 161.



**Thunbergonymus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 151.

**Thystadus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 80.

**Tibicina**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 154.

**Tingis**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 177. — *pyri*, SIGNORET et BUQUET, Dégâts causés aux lauriers et aux pommiers, 1850, LI. — *unicolor*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 956.

**Tragopa**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 484. — *ænea*, 1846, 486. — *alacris*, 1846, 485. — *albimacula*, 1846, 489. — *annulata*, 1846, 487. — *auriculata*, 1846, 484. — *bajulus*, 1846, 486. — *bipartita*, 1846, 487. — *cimicoides*, 1846, 485. — *coccinella*, 1846, 486. — *cyanea*, 1846, 490. — *dimidiata*, DORHNI, 1846, 487. — *frontalis*, 1846, 489. — *fulvovaria*, *funerula*, 1846, 488. — *globus*, 1846, 489. — *involuta*, 1846, 490. — *marmorea*, 1846, 486. — *nitida*, 1846, 485. — *obliqua*, 1846, 489. — *ovalis*, 1846, 490. — *punctatissima*, 1846, 486. — *Satanas*, DE CASTELNAU, C'est le *Pterygia Macquarti*, 1836, IX. — *tripartita*, *xanthocephala*, FAIRMAIRE, 1846, 490.

**Tramia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 487.

**Tremulifex** (*Tremulæ* Linné), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483.

**Tremulinax**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483.

**Trichllechus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 124.

**Tricephora**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 185.

**Trienopa**, SIGNORET, Faune de Madagascar, 1860, 188. — *flavida*, 1860, 188.

**Trigonosoma**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 406.

**Triopsis**, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 187. — *fasciata*, 1860, 187.

**Tripheria**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 153.

**Triphlyctis**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 137.

**Triquetra**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 279. — *angustata*, Bos, 1846, 282. — *fastidiosa*, 1846, 281. — *grossa*, *inermis*, *nigrocarinata*, 1846, 280. — *testacea*, 1846, 281. — *tridentata*, 1846, 280. — *truncaticornis*, 1846, 282. — *ustulata*, *virescens*, 1846, 281. — *virgata*, 1846, 282.

**Triquetricornis**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 482.

**Trispilæma**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 187.

- Tristirops**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 161.
- Tristrangus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 129.
- Tritænia**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 157.
- Tritomacera**, COSTA, Hémipt. Hétéropt. des Deux-Siciles, 1841, 296.  
— *aphanoides*, 1841, 297.
- Tritomegas**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 432.
- Tropicoris**, AMYOT, Rhyncholes, 1845, 454.
- Tropidocephala** *brunnipennis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 185.
- Tropidochila**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 185.
- Tunbergonymus**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 151.
- Tynopteryx**, AMYOT, Rhyncholes, 1846, 103.
- Typhlocyba**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 223.

## U.

- Ugyops** *Percheronii*, SPINOLA, Fulgorelles, 1839, 321.
- Ulopa**, AMYOT, Rhyncholes, 1847, 195. — *decussata*, *trivia*, SIGNORET, trouvés dans le bois du Vésinet, 1852, LV.
- Umbonia**, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 274. — *amazili*, 1846, 277.  
— *ataliba*, 1846, 278. — *crassicornis*, *gladius*, 1846, 275. — *indicator*, 1846, 279. — *nigrita*, 1846, 275. — *orozimbe*, *pyramidalis*, 1846, 277. — *reclinata*, 1845, 276. — *Signoreti*, 1846, 278. —  
— *spinosa*, *turrita*, 1846, 276. — *venosa*. 1846, 278.
- UNICELLULES**, SIGNORET, Note sur les Hémipt. Hétéropt. de cette fam., 1858, 499.
- Urticifex** (*Urticæ* Schrank), AMYOT, Rhyncholes, 1847, 475.

## V.

**Vacuna**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 483.

**Velia**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 424. — *pulchella*, WESTWOOD, Mém. sur le genre *Velia*, 1834, 646. — *pygmæa*, L. DUFOUR, Descr. et fig. d'une nouv. esp. de *Velia*, 1833, 114.

**Verlusia**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 463.

**Viburnifex** (*Viburni* Scop.), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 478.

**Vitellinifex** (*Vitellinæ* Schrank), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

## W.

**Wagasodes**, AMYOT, Rhynchotes, 1848, VIII.

## X.

**Xanthapala**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 233.

**Xanthochilus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 84.

**Xanthochrea**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 235.

**Xanthogrammus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 413.

**Xantholues**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 217.

**Xerophyllum** *Servillei*, FAIRMAIRE, Membracides, 1846, 242. — *id.*, Rectif.; cet ins. étant un Orthopt. de genre *Hymanetes*, Westw., 1848, ix. — *id.*, AMYOT, très-voisin, sinon identique du *Coryphillum* de M. Aud.-Serville, 1848, lv.

**Xylocoris**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 382. — *id.*, L. DUFOUR, Mém. sur les genres *Xylocoris*, *Leptoptus* et *Velia*, 1833, 106. — *id.*, WESTWOOD, Mém. sur les genres *Xylocoris*, *Hylophila*, etc., 1834, 637. — *ater*, L. DUFOUR, Mém. sur les genres *Xylccoris*, *Leptopus* et *Velia*, 1833, 106. — *id.*, WESTWOOD, Mém. sur les genres *Xylocoris*, *Hylophila*, etc., 1834, 639. — *humeralis*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 952. — *rufipennis*, L. DUFOUR, 1833, 106. — *id.*, WESTWOOD, 1834, 638.

**Xylosthætius** (*Xylosthei* De Géer), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 484.

**Xylosthaphis** (*Xylosthei* Schrank), AMYOT, Rhynchotes, 1847, 479.

## Z.

**Zenabus**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 404.

**Zicrona**, AMYOT, Rhynchotes, 1845, 424. — *annulipes*, SIGNORET, Hémipt. de Madagascar, 1860, 921.

**Zinnevia**, AMYOT, Rhynchotes, 1847, 212.

**Zoophlæus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 364.

**Zosmcnus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 191.

**Zurus**, AMYOT, Rhynchotes, 1846, 162.





## IV.

### NÉVROPTÈRES.



## A.

**Æshna**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Monogr. des Libellulines des env. d'Aix, 1838, 76. — *affinis*, 1838, 91. — *annulata*, 1838, 98. — *forcipata*, 1838, 101. — *formosa*, 1838, 79. — *Irene*, 1838, 93. — *maculatissima*, 1838, 84. — *mixta*, 1838, 87. — *rufescens*, 1838, 96. — *unguiculata*, 1838, 104. — *vernalis*, 1838, 81.

**Æshnes**, BLISSON, Mém. sur la préparation des Æshnes et des Libellules, 1840, 413. — *id.*, Suppl. au mém. sur leur préparation, 1844, XLV.

**Agrion**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Libellulines des env. d'Aix, 1838, 547. — *Aglæ*, 1838, 567. — *aurantiaca*, 1838, 570. — *barbara*, 1838, 554. — *cærulescens*, 1838, 568. — *elegans*, 1838, 565. — *fusca*, 1838, 559. — *hæmorrhoidalis*, 1838, 552. — *Picteti*, 1838, 557. — *platypoda*, 1838, 560. — *puella*, 1838, 563. — *pulchella*, 1838, 561. — *rubella*, 1838, 574. — *sanguinea*, 1838, 572. — *virgo*, 1838, 549. — *viridis*, 1838, 556.

**Ascalaphe**, LEFEBVRE, Un seul trouvé en Sardaigne par M. Géné, 1835, LXXVII.

**Ascalaphes**, LEEEBVRE, Larve découverte par M. de Cérisy; obs., 1842, XVII.

**ASCALAPHIDES**, LEFEBVRE, Essai d'une diagnostique des ailes de cette tribu, 1833, LXXVII.

**Ascalaphus italicus**, AL. PIERRET, trouvé le 1<sup>er</sup> août dans les roches de Lardy, 1845, LXXV. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, C'est l'*Asc. longicornis* Linné, 1845, LXXV. — *id.*, DUPONCHEL, pris il y a longtemps aux env. de Paris et à Paris même, 1845, LXXX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, M. Duvernay l'a pris dans le département du Doubs, 1845, CVIII. — *longicornis*, La découverte de cet Ins. près de Paris est un fait très-intéressant, 1845, CVIII. — *id.*, AL. PIERRET, L'auteur rectifie le nom d'*italicus* qu'il lui avait donné, 1845, CXIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. d'un mâle pris à Chartres, 1846, CI. — *id.*, DE LAFRESNAY, Détails sur l'accouplement de cette esp., 1846, CXV. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Détails sur la larve, d'après M. de Cérisy, 1846, CXV. — *id.*, AL. PIERRET, Nouvel indiv. pris à Lardy, 1847, LXXIV.

## C.

**Cordulegaster annulatus, bidentatus**, DE SELYS-LONGCHAMPS, Note sur quelques Libellules d'Europe, 1843, 109.

## E.

**Embla mauritanica**, LUCAS, Oques rem. sur la larve de cette esp., 1859, 441.

**Ephemera albipennis**, LUCAS, Quantités innombrables sur les rives de la Seine, 1852, LI. — *culiciformis*, BOYER DE FONSCOLOMME, Note sur des esp. nouv. trouvées aux env. d'Aix, 1846, 49.

## F.

**Formicaleo**, L. DUFOUR, La larve est pourvue d'un anus avec canal intestinal, 1833, LXVII.

## H.

**Hemerobius**, GIRARD, Note sur une nouv. esp. de ce genre, 1859, 163. — *trimaculatus*, 1858, CCLIII, et 1859, 167.

## L.

**Libellula**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Libellulines des env. d'Aix, 1837, 129. — *bimaculata*, J. DESJARDINS, Extrait d'un rapport à la Société d'hist. natur. de l'île Maurice, 1835, IV. — *brunnea*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1837, 141. — *cancellata*, 1837, 135. — *cærulescens*, 1837, 137. — *depressa*, 1837, 130. — *ferruginea*, 1837, 142. — — *flaveola*, 1837, 144. — *limbata*, J. DESJARDINS, 1835, III. — *nitens*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1837, 146. — *Olympia*, 1837, 139. — *4-maculata*, 1837, 133. — *semihyalina*, J. DESJARDINS, 1835, IV. — *vulgata*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1837, 147.

**Libellules**, BLISSON, Mém. sur la préparation des *Æshnes* et Libellules, 1840, 413. — *id.*, Suppl. au mém. sur leur préparation, 1844, XLV.



**Libellules d'Europe**, DE SELYS-LONGCHAMPS, Annonce de l'impression de la revue de ces Ins., 1847, XCII.

**LIBELLULINES**, AUG. BRULLÉ, Obs. sur la bouche de cet Ins., 1833, 343. — *id.*, DE SELYS-LONGCHAMPS, Lettre au sujet du mém. de M. Boyer de Fonscolombe, 1837, LXXIII. — *id.*, RAMBUR, Obs. sur le même sujet, 1837, LXXIV. — *id.*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Libellules des env. d'Aix, 1837, 129, et 1838, 75.

**Lindenia tetraphylla**, DE SELYS-LONGCHAMPS, Note sur qqes Libellules d'Europe, 1843, 107.

## M.

**Macromia splendens**, DE SELYS-LONGCHAMPS, Note sur qqes Libellules d'Europe, 1843, 108.

**Myrmeleo formicarium**, DE ROMAND, Note relative à la larve de cet Ins., 1850, XLV. — *libelluloides*, DELAROUZÉE, Rem. sur cette esp., 1858, CLII. — *vulgaris*, VILLENEUVE, trouvé à Lardy, 1858, CLII.

## N.

**Névroptère fossile**, AUDOUIN, Qques détails sur une empreinte d'aile d'une esp. inconnue, 1833, VII.

**NÉVROPTÈRES**, AUG. BRULLÉ, Note sur une nouv. disposition de cet ordre, 1832, 239. — *id.*, LEFEBVRE et AUD.-SERVILLE, Commun. de l'Iconogr. des Névroptères, 1833, LXXII. — *id.*, PICTET, Extrait d'un travail général sur cet ordre, 1840, XX. — *id.*, HAGEN, Envoi d'une note sur ceux recueillis en Sicile, par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, XXX. — *id.*, DE SELYS-LONGCHAMPS, Des Névropt. Odonates, 1860, 741. — *id.*, HAGEN, Des Névropt. non Odonates recueillis en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 746.

## O.

**ODONATES**, DE SELYS-LONGCHAMPS, Prochaine public. de la revue des Odonates, 1847, XCII.

## P.

**PANORPATES**, KLUG, Mém. sur cette fam. lu à l'Acad. des Sc. de Berlin, 1836, LXXV.

**Panorpa lusitanica**, LABOULBÈNE, L'auteur n'y a pas trouvé trace de système nerveux, 1856, XCVII.

**Phrygane**, AUDOUIN, Fragment de granit renfermant des coques fabriquées par la larve, 1833, II.

**Phrygane fossile**, AL. PIERRET, Hommage d'un travail de M. Michelin, 1845, XXX.

**Phrygane** (Larve de), MONTROUZIER, Détails sur celles de la Nouv.-Calédonie, 1859, CXLVIII.

**Phryganea buccata**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur des esp. nouv. des env. d'Aix, 1846, 48. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, identique avec la *Sericostoma collaris*, 1846, 48.

## R.

**Raphidie**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Dépouille d'une nymphe, 1845, XXXIV.

## T.

**Termes fatalis**, LUCAS, Communic. relative à un Termite du Sénégal, 1847, 4.

**TERMITES**, DE BARAN, Communic. d'une lettre de M. Lespès contenant qques détails sur les mœurs et les différents états des Termites, 1856, VIII. — *id.*, LESPÈS, L'auteur a pu étudier ces Ins. plus complètement que ses devanciers, et il donne qques détails sur leurs mœurs, 1856, LXXIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Il en a vu par troupes nombreuses à cinq ou six lieues d'Oran (Algérie), 1860, cv. — *id.*, LESPÈS, Apparition nombreuse signalée il y a une quinzaine d'années à qque distance de Toulon ; détails sur l'anatomie et les mœurs de ces Névroptères, 1860, cvi. — *lucifugus*, LABOULBÈNE, Individu trouvé près d'Agen dans un vieux tronc d'amandier, 1860, cv.



## V.

### HYMÉNOPTÈRES.



## A.

**Abeilles**, DE BEAUVOYS, Note sur divers points de leur histoire naturelle, 1847, CXIV. — *id.*, ANDRÉ VALETTE, Détails communiqués par M. Gervais, 1849, LXXXIV. — *id.*, AUBÉ, Descr. d'un appareil qui sert à les nourrir, 1853, XXII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur le procédé de l'ensouissement des ruches, 1857, XXXVI. — *id.*, GIRARD, Détails sur l'influence du mauvais temps sur les Abeilles, 1860, LXXIX. — (Voyez *Apis*.)

**Abeilles maçonnes**, GOUREAU, Notes pour servir à leur histoire et à celle de leurs parasites, 1840, 117. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Obs. au sujet des parasites de cette espèce, 1858, CXI. — *id.*, SICHEL, Réaumur a trouvé un *Trichodes* dans les nids de cette espèce, 1858, CXIII. — (Voyez *Chalicodoma*.)

**Abeilles à miel**, MILNE-EDWARDS, Qques détails relatifs à l'existence des glandes cirières, 1843, LIV.

**Abia aurulenta**, SICHEL, Sa diagnose, 1856, LXXVII.

**Acoenites perlæ**, SICHEL, Examen du parasite de l'*Hemerobius perlæ*, 1855, LXXXVIII. — *id.*, LUCAS, Pris à Saint-Germain-en-Laye, 1855, LXXXIX.

**Agathis albitarsis**, SPINOLA, Hyménopt. recueillis à Cayenne, par M. Leprieur, 1840, 194. — *anceps*, 1840, 192. — *bætica*, Note sur qques

Hymén. peu connus recueillis en Espagne, 1843, 127. — *coralis*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 196. — *crudelis*, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. recueillis à Madagascar, 1856, 508. — *Esenbecki*, SPINOLA, 1840, 192. — *initiator*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur huit esp. nouv. d'Hymén. des env. d'Aix, 1846, 40. — *Latreillei*, SPINOLA, 1840, 191. — *major*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1846, 39. — *Wesmaeli*, SPINOLA, 1840, 193.

***Alomya nigra***, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1849, 239.

***Alysia cayennensis***, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 196. — *picta*, GOUREAU, Parasite des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 166. — *truncator*, Parasite de l'*Anthomyia platura*, 1849, 84. — *id.*, Parasite des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 134.

***Ammobates muticus***, SPINOLA, Hymén. peu connus recueillis en Espagne, 1843, 141.

***Ammophila armata***, L. DUFOUR, Note sur cette esp., 1838, 291. — *ebenina*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte par M. Fischer, 1838, 464. — *rubripes*, 1838, 465. — *sabulosa*, LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 344. — *Tydei*, LE GUILLOU, Catalogue des Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 319.

***Ampulex angusticollis***, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 108.

***Anclastrocerus Antilope***, WESMAEL, Suppl. à la Monogr. des *Odynerus* de Belgique, 1836, XVII. — *oviventris*, *parictum*, *trifasciatus*, 1836, XVIII.

***Andrena carbonaria***, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte par M. Fischer, 1838, 506. — *collaris*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 763. — *Doursana*, L. DUFOUR, Signalement de qqes esp. nouv. ou peu connues d'Hymén. algériens, 1853, 382. — *ephippium*, SPINOLA, 1838, 511. — *holomelana*, *hemimelana*, SICHEL, 1860, 763. — *lagopus*, L. DUFOUR, Recherches sur cet Ins., 1838, 281. — *id.*, DE ROMAND, Lettre à l'occasion des recherches de M. L. Dufour, 1840, XXVI. — *lanuginosa*, SPINOLA, Notes de qqes Hymén. peu connus recueillis en Espagne, 1843, 137. — *pilipes*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 506. — *rutila*, 1838, 510. — *Savignyi*, 1838, 512. — *thoracica*, 1838, 506.

**Anomalon mandibulator**, L. DUFOUR et PERRIS, Mém. sur les Hymén. des tiges sèches de la Ronce, 1840, 46.

**Anoplus uniocellatus**, L. DUFOUR, Obs. sur une nouv. esp. d'*Anoplus*, 1833, 483.

**Anthidium bilineolatum**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 141. — *coronatum*, L. DUFOUR, Signalements de qqes esp. nouv. ou peu connues d'Hymén. algériens, 1853, 381. — *costatum*, SPINOLA, 1841, 140. — *ferrugineum*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 515 et 521. — *Fischeri*, 1838, 519. — *Grohmanni*, 1838, 524. — *Lepeletieri*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur huit esp. d'Hymén. des env. d'Aix, 1846, 43. — *pulchellum*, SPINOLA, 1838, 515 et 526. — *siculum*, 1838, 525. — *thoracicum*, 1838, 515. — *Waltlii*, 1883, 520.

**Anthophora crassipes**, L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1853, 386. — *femorata*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 516. — *flavescens*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Lettre au sujet de cette esp., 1838, LXVII. — *mucorea*, SPINOLA, Synonymie, 1842, XXXVII. — *nigri-labris*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 546. — *parietina*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Qques obs. sur cette esp., 1838, LI. — *id.*, Rectification de la détermination de cette esp., 1845, xv. — *Passerinii*, SICHEL, Présentation et diagnose de cette esp., 1856, XIX. — *pilipes*, SPINOLA, 1838, 516. — *pubescens*, SICHEL, Communic. et diagnose de cette esp., 1854, LXXVI. — *pulverulenta*, SPINOLA, Synonymie, 1842, XXXVII. — *quadrinaculata*, SICHEL, Communic. et note sur cette esp., 1854, LXXV. — *rorida*, SPINOLA, 1842, XXXVII. — *rotundata*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 546. — *scopipes*, 1838, 545. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVIII. — *uniciliata*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 764.

**Aphidius rufus**, GOURAU, Parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 153.

**Aphænogaster testaceo-pilosus**, LUCAS, Note sur cette esp., 1856, XXXIV.

**Apis Gronovii**, LE GUILLOU, Catalogue des Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 323. — *ligustica*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 516. — *mellifica*, LUCAS, Parasites désignés sous le nom de *Braula* (voyez ce mot), 1850, LXVII. — *operaria*, SPINOLA, 1838, 516. — *Peroni*, LE GUILLOU, 1841, 323.

**Aporus sericeus**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 462.

**Apterogyna Olivieri, Savignyi**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 456.

**Arpactus Carceli**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Mém. sur le genre *Gorytes*, 1832, 78. — *concinus*, SPINOLA, Rectif. au sujet de qqes genres d'Hymén., 1836, XXIII. — *elegans*, *formosus*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1832, 79. — *lævis*, 1832, 74. — *tumidus*, 1832, 77.

**Astata Miegii**, L. DUFOUR, Envoi d'une notice sur cette nouv. esp., 1860, XLIX.

**Atta**, LUCAS, Communic. de deux ind. vivants rencontrés à Saint-Denis, 1849, LXXV.

**Aulacomerus Buquetii**, GOUREAU, Note sur les Abeilles maçonnes et leurs parasites, 1840, 137.

**Aulacus Patrati**, AUD.-SERVILLE, Notice sur une nouv. esp. d'Aulaque, 1833, 411.

## B.

**Bassus hispanicus**, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 118. — *ornatus*, SICHEL, Ne forme qu'une même esp. avec *B. rufipes*, 1856, LXXVIII.

**Bembex bipunctata**, L. DUFOUR, Envoi d'une notice sur cette nouv. esp., 1860, XLIX. — *chlorotica*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 469. — *Fischeri*, 1838, 470. — *galactina*, L. DUFOUR, Signalements de qqes esp. peu connues d'Algérie, 1853, 378. — *glauca*, *lusca*, SPINOLA, 1838, 467. — *undulata*, 1838, 468. — *Westermanni*, 1838, 470.

**Blacus Florus**, GOUREAU, Parasites de Diptères mineurs de feuilles, 1854, 137.

**Blepharipus**, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabo*, 1834, 728. — *annulipes*, 1834, 729. — *flavipes*, 1834, 736. — *maculatus*, 1834, 730. — *mediatus*, 1834, 734. — *nigrita*, 1834, 729. — *pau-peratus*, 1834, 733. — *5-maculatus*, 1834, 738. — *signatus*, 1834, 731. — *striatulus*, 1834, 737.

**Bombus agrorum**, DOUMERG, Note sur qqes monstruosités entomologiques, 1834, 171 (voyez à l'art. *Monstruosités*). — *Dahlbomii*, LE GUILLOU, Catalogue des Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 324. — *lapidarius*, SICHEL, Note sur un Hymén. hermaphrodite, 1858, CCXLVII. — *lapponicus*, Id., Plusieurs ind. trouvés aux env. de Paris, 1852, XLVI. — *sylvarum*, Id., Deux femelles blanches reçues des Basses-Alpes, 1855, LXXIII.

**Bothrioceros americanus**, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 761. — *europæus*, 1860, 759.

**Bourdons**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Obs. sur l'ouvrage de Dahlbom, 1832, 366.

**Bracon bæticus**, SPINOLA, Hymén. peu connus recueillis en Espagne, 1843, 125. — *barynoti*, BOUDIER, Obs. sur divers parasites, 1834, 333. — *bicolorator*, SPINOLA, 1843, 126. — *Buquetii*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 183. — *Esenbeckii*, 1840, 174. — *ichneumoniformis*, 1840, 186. — *immaculipennis*, 1840, 184. — *initiator*, Id., Parasite du Scolyte destructeur, 1837, LXVII. — *lanceolator*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 170. — *latiusculus*, 1840, 182. — *Leprieurii*, 1840, 179. — *melanoderes*, 1840, 173. — *nigrimanus*, 1840, 187. — *pachymerus*, 1840, 188. — *otiorhynchi*, BOUDIER, 1834, 334. — *simulator*, SPINOLA, 1840, 178. — *strigiventris*, 1840, 180. — *subcornutus*, 1840, 172. — *urinator*, GOUREAU, Ins. du Chardon penché, 1845, 90. — *Wesmaeli*, SPINOLA, 1840, 176.

**BRACONIDES**, PERRIS, Parasites de l'*Apate capucina*, 1850, 565. — *id.*, SICHEL, Larves de deux esp. écloses du *Timarcha tenebricosa*, 1854, LVII.

**Brachygastera bilineolata**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 126. — *dorsolineata*, 1841, 123. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVIII. — *velutina*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 126.

**Braula cæca**, frère MILHAU, Communic. d'un dessin sur bois de ce parasite des Abeilles, 1860, XLI. — (Voyez aux mots *Apis mellifica*.)



## C.

**Cælioxys** *caudata*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 535.  
 — *cayennensis*, Hymén. de Cayenne, 1841, 144. — *conica, conoidea*,  
 Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 534. — *decipiens, clytrura*, 1838,  
 532. — *rufiventris*, 1838, 531. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxvii.

**Callimone** *lissus*, WALKER, Descr. des Chalcidites de la Floride orientale, 1843, 150. — *Theon*, 1843, 149.

**Calyptus?**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ichneumonides parasites du *Ceutorhynchus sulcicollis*, 1845, xxxiv.

**Campoplex** *albidus*, GOUREAU, Ichneumonide parasite de la chenille de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, lxxx.

**Camptopæum** *frontale, interruptum*, SPINOLA, Note sur qqques Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 139.

**Camptoprium**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 134. — *Lepricurii*, 1840, 136.

**Cella** *Troglodytes*, GOUREAU, Communic. sur les mœurs de cet Hymén. 1856, cviii.

**Celonites**, LUCAS, Note sur le nombre des art. des antennes de ce genre, 1851, xcv. — *id.*, L. DUFUR, Encore *Masaris* et *Celonites*, 1852, 448. — *id.*, DE SAUSSURE, Résumé d'une note sur la tribu des Masariens, 1853, xvii. — *id.*, L. DUFUR, *Masaris, Celonites* et *Ceramius*, 1853, 385. — *dispar*, Sur une nouv. esp. de *Celonites*, 1851, 58. — *id.*, DE ROMAND, Réponse aux mélanges entomologiques de M. L. Dufour, 1851, li. — *id.*, SCHAUM, Note sur cet Ins. que l'auteur croit un *Ceramius*, 1852, lxxxvi. — *Fischeri*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 505.

**Cemonus** *lathifer*, GOUREAU, Note sur une esp. se trouvant dans les tiges de Chardon, 1855, vii.

**Cephus** *Bellieri*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 757. — *compressus*, GOUREAU, Communic. relative aux mœurs de cette esp., 1858, CCXXXI. — *flaviventer*, L. DUFOUR, Envoi d'une notice sur cette esp., 1860, XLIX. — *macilentus*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 438. — *nigripennis*, SICHEL, 1860, 757. — *Parreyssii*, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 116.

**Ceramius**, L. DUFOUR, *Masaris, Celonites et Ceramius*, 1853, 385. — *id.*, DE SAUSSURE, Résumé d'une note sur la tribu des Masarides, 1853, XVII. — *id.*, SCHAUM, Le *Celonites dispar* est plutôt un *Ceramius*, 1852, LXXXVIII. — *Fonscolombii*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Descr. de cette esp., 1835, 421.

**Ceratocolus**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 739. — *alatus*, 1834, 750. — *fasciatus*, 1834, 746. — *flavipennis*, 1835, 740. — *maurus*, 1834, 747. — *philanthoides*, 1834, 742. — *punctatus*, 1834, 749. — *reticulatus*, 1834, 747. — *rufipes*, 1834, 741. — *striatus*, 1834, 744. — *Ziegleri*, 1834, 748.

**Ceratina** *albilabris*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 515. — *id.*, L. DUFOUR et PERRIS, Mém. sur les Hymén. des tiges sèches de la Ronce, 1840, 16. — *chalcea*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 139. — *cærulea*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 15. — *læta*, SPINOLA, 1841, 138. — *punctulata*, 1841, 139.

**Cerceris** *binodis*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 117. — *chlorotica*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 496. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVI. — *cribrosa*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 119. — *dilatata*, 1841, 118. — *elegans*, L. DUFOUR, Signalement de qqes esp. nouv. d'Hymén. algériens, 1853, 379. — *Fischeri*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 493. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVI. — *flaviventris*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 495. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVI. — *major*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 484. — *nigrocincta*, L. DUFOUR, 1853, 380. — *rutila*, SPINOLA, 1838, 492. — *sabulosa*, 1838, 484. — *straminea*, L. DUFOUR, 1853, 388. — *tricolorata*, SPINOLA, 1838, 493. — *Waltlii*, 1838, 496.

**Ceropales** *flavicornis, interrupta*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 463.

**CHALCIDITES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Tronçons de Saule défigurés par des larves, 1845, XXIX. — *id.*, Nouv. détails sur les Ins. trouvés dans une branche de Saule, 1845, XLI. — *id.*, Les boursouflures de

cette branche de saule sont causées par ces larves, 1845, LXX. — *id.*, WALKER, L'auteur redemande son mém. sur cette famille, 1847, XXII. — *id.*, FAIRMAIRE, Larves sorties d'une *Chrysomela sanguinolenta*, 1848, XXXVI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Sortie des œufs du *Bombyx rubi*, 1852, LXXII. — *id.*, LABOULBÈNE, Parasites de deux Orchestes à larves mineuses de feuilles, 1856, XCVII.

**Chalcis Fonscolombei**, L. DUFOUR, Hist. des métam. des *Chalcis*, 1841, II. — *minuta*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 441.

**Challecodoma muraria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Le nid cru du *Pelopæus spirifex* est celui de l'Abeille maçonner, 1848, LXXXII. — *sicula*, LUCAS, Descr. d'un nid trouvé en Algérie, 1851, XLIV. — *id.*, LUCAS, Qques mots sur les parasites de cette espèce, 1858, CXII. — (Voyez aux mots Abeilles maçonnes.)

**Chlorion fuscicorne**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 466.

**Chrysantheda**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, L'appendice trouvé entre les yeux d'un ♂ est un Cryptogame, 1848, LXXXVI. — *subcornuta*, DE ROMAND, Note contenant de nouv. détails sur cet Ins., 1849, XXXVI.

**Chryselda superciliosa**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 198.

**Chrysis bihamata**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 450. — *crassimargo*, Note sur qqes Hymén. recueillis en Espagne, 1843, 127. — *cyanea*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges de la Ronce, 1840, 39. — *distinguenda*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 450. — *elegantula*, 1838, 451. — *episcopalis*, 1838, 449. — *fasciata*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 202. — *ignita*, LABOULBÈNE, Parasite du *Ptosima 9-maculata*, 1849, XXVIII. — *id.*, Parasite des Odyneres, 1858, CXIII. — *ignita*, LUCAS, Obs. sur ses mœurs, 1847, XC. — *incrassata*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 454. — *indigotea*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 38. — *obtusidens*, 1840, 37. — *pallidicornis*, SPINOLA, 1838, 451. — *palliditarsis*, 1838, 449. — *punctatissima*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 200. — *semicineta*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 446. — *singularis*, 1838, 452. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXV. — *spinigera*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 201. — *varicornis*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 449. — *violacca*, 1838, 446.

**Cimbex amerina**, LUCAS, Note sur l'habitat et les mœurs de cette esp., 1857, XXX. — *id.*, FAIRMAIRE, Coques trouvées sous des écorces

d'Érable, 1857, XL. — *id.*, LUCAS, Communic. de cet Ins. et de son cocon, du nord de l'Afrique, 1860, XXII. — *biguetina*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Descr. de trois nouv. esp. de *Cimbex*, 1833, 455. — *femorata*, DREWSSEN, Note sur cet Ins., 1835, 169. — *Laportei*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Descr. de trois nouv. esp. de *Cimbex*, 1833, 454. — *marginatus* AZAMBRE, Pris dans la cour du Louvre, 1857, LVII. — *nemoralis*, PIERRET, Coques trouvées dans des nids de chenilles processionnaires, 1838, XXXII. — *Viardi*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1833, 454.

**Cirrospilus** *Acasta*, SICHEL, Vit dans le nid de l'*Anthophora retusa*, 1854, LVIII. — *cyanops*, GOUREAU, Mém. sur les parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 150.

**Cladius** *difformis*, BRULLÉ, Sur ses transformations, 1832, 308.

**Clavella**, LUCAS, Caractères qui différencient ce genre du genre *Ctenocerus*, 1856, 349. — *id.*, LUCAS, Note sur une nouv. esp. des env. de Ponteba, 1853, XXXI. — *pompiliformis*, Détails sur un Hymén. fouisseur, 1851, LXXV — *id.*, Descr. d'un nouv. genre du nord de l'Afrique, 1852, 417. — *id.*, Note au sujet de cette esp., 1853, XIV. — *id.*, FAIRMAIRE, Communic. d'esp. curieuses d'Algérie, 1857, XXXIII. — (Voyez *Ctenocerus*.)

**Cleptes** *semiauratus*, SICHEL, Capture d'un grand nombre de ♂ et de peu de ♀, 1855, LXV.

**Clistopyga** *erythræa*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1854, 519. — *hæmorrhoidalis*, 1854, 517. — *rufescens*, 1854, 518.

**Cælinus** *Festus*, GOUREAU, Mém. sur les parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 153.

**Colletes** *fodiens*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 506. — *intricans*, *pilosa*, 1838, 507. — *pilosa*, Synonymie, 1842, XXXVII.

**CONOPIDES**, SICHEL, Sont parasites de plusieurs Mellifères, 1855, CXIII.

**Conops**, SICHEL, Trouvés en grand nombre dans des boîtes de *Bombus*, 1854, LVIII. — *id.*, LABOULBÈNE et LUCAS, Ils confirment que les *Conops* sont parasites des *Bombus*, 1854, LIX.

**Corynopus** *tibialis*, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 802.

**Crabro**, L. DUFOUR, Qques obs. critiques sur ce genre, 1838, 409. — *id.*, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 683. — *arthriticus*, 1834, 808. — *bicinctus*, 1834, 808. — *cephalotes*, 1834, 697. — *chrysargyrus*, 1834, 711. — *chrysostomus*, 1834, 704. — *cinctus*, 1834, 809. — *comptus*, 1834, 705. — *cornutus*, 1834, 807. — *flavipes*, 1834, 699. — *floralis*, *fossorius*, 1834, 808. — *fuscipennis*, 1834, 710. — *geniculatus*, 1834, 808. — *guttatus*, 1834, 809. — *labiatus*, 1834, 808. — *Laportei*, 1834, 712. — *litratus*, 1834, 702. — *maculatus*, 1834, 808. — *nitidulus*, *occultus*, 1834, 807. — *ornatus*, 1834, 709. — *pallipes*, 1834, 806. — *pygmæus*, 1834, 808. — *4-cinctus*, 1834, 807. — *5-notatus*, 1834, 809. — *rachiticus*, 1834, 808. — *semi-punctatus*, 1834, 711. — *serripes*, 1834, 810. — *sexcinctus*, 1834, 703. — *6-maculatus*, *signatus*, 1834, 809. — *sinuatus*, 1834, 807. — *striatus*, 1834, 707. — *tricinctus*, 1834, 807. — *vagabundus*, 1834, 809. — *varus*, 1834, 810. — *vespiformis*, 1834, 701. — *zonatus*, 1834, 700.

**CRABRONITES**, PERRIS, Note pour servir à leur histoire, 1840, 407.

**Crabrons**, GOUREAU, Qques traits de mœurs des Ins. fouisseurs, 1839, 543.

**Cremastogaster scutellaris**, LUCAS, Communication d'un travail de M. Gust. Mayr, intitulé *Formecina austriaca*, 1856, xx.

**Crocisa dimidiatipuncta**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 536. — *scutellaris*, SICHEL, Sur la rareté relative de certains Hymén., 1852, 568.

**Crossocerus**, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 763. — *affinis*, 1834, 781. — *annulatus*, 1834, 787. — *aphidum*, 1834, 789. — *bimaculatus*, 1834, 788. — *binotatus*, 1834, 771. — *chrysis*, 1834, 770. — *clongatulus*, 1834, 790. — *exiguus*, 1834, 791. — *gonager*, 1834, 785. — *lævipis*, 1834, 790. — *Lefebverci*, 1834, 771. — *leucostoma*, 1834, 777. — *luteicollis*, 1834, 769. — *luteipalpis*, 1834, 785. — *morio*, 1834, 781. — *niger*, 1834, 782. — *ornatus*, 1834, 774. — *ovalis*, 1834, 780. — *pallidipalpis*, 1834, 779. — *palmipes*, 1834, 765. — *podagricus*, 1834, 786. — *pusillus*, 1834, 778. — *rufipes*, 1834, 784. — *scutatus*, 1834, 764. — *striatulus*, 1834, 775. — *subpunctatus*, 1834, 766. — *varipes*, 1834, 773. — *varus*, 1834, 775. — *Wesmaeli*, 1834, 783.

**Crypturus argiolus**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1847, 418.

**Cryptus alternator**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1850, 383. — *analis*, 1850, 378. — *andalusiacus*, SPINOLA, Hymén. peu connus recueillis en Espagne, 1843, 120. — *armatorius*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1850, 369. — *bitinctus*, 1850, 381. — *bombycis*, BOUDIER, Obs. sur les habitudes de larves d'Ichneumons vivant aux dépens de la chenille du Bombyx du chêne, 1835, 357. — *cognatus*, Ichneumonologie provençale, 1850, 367. — *cyanator*? 1850, 363. — *Dianæ*, 1850, 375. — *femoralis*, 1850, 369. — *fibulatus*, 1850, 363. — *filiformis*, 1850, 380. — *flagitator*, 1850, 389. — *formosellus*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 142. — *fugitivus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1850, 370. — *gracilis*, 1850, 371. — *Gravenhorstii*, 1850, 382. — *incubitor*, 1850, 383. — *infimus*, 1850, 381. — *insinuator*, *intricator*, 1850, 371. — *italicus*, 1850, 378. — *lacteator*, 1850, 386. — *leucostictus*, 1850, 373. — *melanopus*, 1850, 375. — *migrator*, 1850, 384. — *myrmeleonidum*, BOUDIER, Obs. sur divers parasites, 1834, 330. — *nigerrimus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1850, 366. — *nuberculatus*, 1850, 384. — *obscurus*, 1850, 376. — *occisor*, 1850, 385. — *ornatus*, 1850, 386. — *perspicillator*, 1850, 369. — *proximus*, 1850, 374. — *pubescens*, 1850, 364. — *rubricans*, 1850, 389. — *scaber*, 1850, 387. — *seductorius*, 1850, 368. — *soccatus*, 1850, 372. — *spinosus*, 1850, 377. — *spiralis*, 1850, 365. — *tarsoleucus*, 1850, 364. — *tibialis*, 1850, 388. — *titillator*, 1850, 379. — *viduatorius*, 1850, 367.

**Ctenocerus**, SICHEL, Communic. d'une note de M. Dahlbom sur ce genre, 1856, XXVII. — *id.*, DAHLBOM, Note sur ce genre, 1856, 345. — *id.*, LUCAS, Communic. d'une note en réponse à celle de M. Dahlbom, 1856, XXIX. — *Klugii*, L. DUFOUR, Note sur cet Ins., 1852, LXXXVI. — (Voyez *Clavelia*.)

**Cynips**, BLISSON, Larves et nymphes dans des galles habitées par des chenilles de *Sesia* et autres, 1849, XXXVI. — *id.*, BRONGNIART, Altérations d'une branche de saule, 1845, LII. — *id.*, LABOULBÈNE, L'auteur n'a trouvé que des ♂ sur une centaine d'individus obtenus d'éclosion, 1852, LVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Galle trouvée dans les départements du Var et des Basses-Alpes, 1860, xciv. — *aptera*, Galles trouvées à Vincennes, 1860, xciii. — *id.*, LUCAS, Note au sujet des galles trouvées à Vincennes, 1860, civ. — *calycis*, Obs. sur les

galles du *Quercus pedunculata*, 1860, LXXXIII. — *flava*, GOUREAU, Mém. sur les parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 168. — *nitidula*, Ins. du chardon penché, 1845, 100. — *pallidus*, FAIRMAIRE, Excroissances d'une branche de saule, 1846, XXX. — *papaveris*, PERRIS, Ins. des galles du *Papaver dubium*, 1840, 97. — *rosæ*, GOUREAU, Trouvé en fauchant, notice à ce sujet, 1852, LXXIV. — *urticæ*, PERRIS, Ins. des galles de l'ortie dioïque, 1840, 404.

**Cyrtosoma** *papaveris*, PERRIS, Ins. des galles du *Papaver dubium*, 1840, 96.

## D.

**Dacnusa** *Chereas*, GOUREAU, Parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 155. — *flavipes*, 1851, 135, 146 et 157. — *incerta*, 1851, 138, 152. — *Lysias*, 1851, 150. — *maculata*, 1851, 144. — *punctum*, 1851, 139.

**Dasypoda** *albipila*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 510. — *bætica*, Qques Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 139. — *Panceri*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 508.

**Dasypoctus** *bipunctatus*, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 801.

**Dinetus** *niger*, L. DUFOUR, Qques esp. nouv. d'Hymén. algériens, 1853, 378.

**Diplolepis** *papaveris*, PERRIS, Ins. des galles du *Papaver dubium*, 1840, 95. — *penicillatus* et non *pericillatus*, LUCAS, Transformations d'un Hymén. gallicole, 1860, LIX. — *umbraculus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Les galles étoilées du chêne sont l'œuvre de ce Diplolèpe, 1860, CIII. — *id.*, LUCAS, Ces galles seraient dues à une esp. du genre *Cynips*; discussion, 1860, CIV.

**Diplorhoptum** *fugax*, LUCAS, Dégâts de cet Hymén. dans un magasin de chocolat, 1858, LXXAI.

**Dryudella** *Ghilianii*. SPINOLA, Note sur qques Hymén. peu connus recueillis en Espagne, 1843, 135.

## E.

**Elis** *asiatica*, DE SAUSSURE, Esp. nouv. ou peu connues du genre *Scolia*, 1858, 231. — *auraria*, 1858, 229. — *bicolor*, 1858, 233. — *brasiliانا*, 1858, 243. — *capensis*, 1858, 228. — *chilensis*, 1858, 247. — *columba*, 1858, 236. — *Drewseni*, 1858, 232. — *fossor*, 1858, 241. — *Gerstaeckeri*, 1858, 244. — *Godofredi*, 1858, 227. — *hirsuta*, 1858, 234. — *limosa*, 1858, 246. — *Lucasia*, 1858, 242. — *mansucta*, 1858, 227. — *nigra*, 1858, 238. — *phalerata*, 1858, 233. — *pilipes*, 1858, 245 et 246. — *plumipes*, 1858, 245. — *regina*, 1858, 237. — *Romandi*, 1858, 230. — *sabulosa*, 1858, 235. — *Talpa*, 1858, 241. — *terrestris*, 1858, 240. — *texensis*, 1858, 224. — *tolteca*, 1858, 238. — *tricincta*, 1858, 246 et 248. — *trifasciata*, 1858, 245. — *variegata*, 1858, 239. — *vespiformis*, 1858, 242. — *xanthura*, 1858, 226.

**Encyrtus** *cyanocephalus*, GOUREAU, Parasites de l'*Yponomeuta padella*, 1847, 244. — *fuscicollis*, Parasites de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, LXXX.

**Entedon**, GOUREAU, Ins. qui vit dans le chardon penché, 1845 97. — *coponices*, Parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 156. — *cyrinus*, 1851, 147. — *gracilis*, 1851, 159. — *gratus*, 1851, 143. — *Latreillei*, 1851, 145. — *lepidus*, 1851, 141.

**Epipona** *latua*, MILNE-EDWARDS, Descr. d'un nid, 1843, xxxiv.

**Epomidiopteron** *Julii*, DE ROMAND, Nouv. genre et nouv. esp. de la fam. des fouisseurs, 1835, 653.

**Erynnis**, DE SAUSSURE, Résumé d'une note sur la tribu des Masariens, 1853, xix. — *americana*, 1853, xx. — *Romandi*, 1853, xix.

**Eucera** *affinis*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 538. — *dubia*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 764. — *grisea*, L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1852, xlv. — *longicornis*, SPINOLA, 1838, 516. — *numida*, L. DUFOUR, 1852, xlvi. — *thoracica*, SPINOLA, 1838, 537.



**Euchalcis Miegii**, L. DUFOUR, Envoi d'une notice sur ce nouv. genre et cette nouv. esp. de Chalcidites, 1860, XLIX.

**Euchræus festivus**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 446.

**EULOPHITES**, GOUREAU, Leurs métamorphoses, 1853, LXIX.

**Eulophus**, GOUREAU, Parasites de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, LXXX.

— *id.*, DOUMERC, Notice sur leurs métamorphoses, 1859, 107. — *crinicornis*, PERRIS, Ins. de la galle de l'ortie dioïque, 1840, 405. — *ericæ*, L. DUFOUR, Mém. sur une galle du genêt à balais et de l'Ins. qui l'habitent, 1837, 89. — *ramicornis*, VALLOT, Obs. sur les larves qui dévastent le chanvre, 1834, LXIII. — *ulicis*, PERRIS, Ins. des galles de l'*Ulex nanus*, 1840, 91. — *verbasci*, L. DUFOUR, 1837, 91.

**Eumenes coangustata**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 504. — *coarctata*, GOUREAU, Obs. détachées pour servir à l'hist. de qqes Ins., 1839, 531. — *id.*, SPINOLA, 1838, 504. — *costata*, LUCIANI, Détails sur cet Ins., 1845, cx. — *infundibuliformis*, PERRIS, Note additionnelle sur ses habitudes et ses métamorphoses, 1852, 557. — *nigriceps*, Ins. de la galle de l'ortie dioïque, 1840, 405. — *pomiformis*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 504. — *Savignyi*, 1838, 503.

**Eurytoma abatos**, WALKER, Chalcidites trouvés dans la Floride orientale, 1843, 152. — *cretheis*, 1843, 150. — *hecale*, 1843, 151. — *pythcs*, 1843, 154. — *teredon*, 1843, 153. — *verticillata*, GOUREAU, Ins. qui vivent dans le chardon penché, 1845, 93.

**Euspongius albilabris**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, genre *Gorytes*, 1832, 70. — *laticinctus*, 1832, 66. — *vicinus*, 1832, 68.

**Evania affinis**, LE GUILLOU, Catalogue des Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 311. — *appendigaster*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 438. — *dimidiata*, 1838, 439. — *id.*, Synonymie 1842, XXXV.

**Exochus coronatus**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1849, 234. — *crythronotus*, 1849, 235. — *femoralis*, 1849, 236. — *frenator*, 1849, 233. — *gravipes*, 1849, 237. — *lentipes*, 1849, 235. — *mansuctor*, 1849, 234. — *prosopius*, 1849, 236.

## F.

**FIGITES**, GOUREAU, Parasites des Diptères de la fam. des Muscides, 1858, XVI.

**Formica** *affinis*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélee*, 1841, 314. — *aliena*, SICHEL, N'est qu'une var. de la *Formica flava*, 1856, XXXI. — *Amyoti*, *arcuata*, LE GUILLOU, 1841, 315. — — *armata*, 1841, 313. — *barbara*, L. DUFOUR, Note sur cet Ins., 1856, 341. — *cursor*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur huit esp. nouv. d'Hymén., 1846, 41. — *id.*, Rectification relative à cette esp., 1846, LXIX. — *flava*, SICHEL, Deux indiv. trouvés dans une boîte de Col., 1855, XIX. — *id.*, POUPILLIER et AUTRES, Exemples analogues, 1855, XX. — *graciliscens*, NYLANDER, Notice sur l'esp. communiquée par M. Fairmaire, 1856, XXVIII. — *grisea*, *macra*, LE GUILLOU, 1841, 314. — *pallens*, 1841, 316. — *rufa*, Journal de l'Institut, innombrable quantité de cette esp. trouvée sur le pavé de Mons, 1836, LXXVII. — *rubiginosa*, LE GUILLOU, 1841, 316. — *sexspinosa*, *samaragdina*, 1841, 313. — *truncata*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 49. — *vividula*, SICHEL, Communic. sur les Fourmis des serres du Jardin des Plantes, 1856, XXIII.

**FORMICIDES**, LUCAS, Note sur celles que l'on ne connaissait que comme d'Europe, 1856, XXIX. — *id.*, NYLANDER, Quelques détails sur les esp. françaises et d'Algérie, 1857, XLIX. — *id.*, Note sur celles du mont Dore, 1856, LXXVIII.

**Formicina** *austriaca*, LUCAS, Communic. d'un travail de M. Gust. Mayr, 1856, XIX.

**Formilla** *Chevrolatii*, DE ROMAND, Sur un Ins. nouv., 1846, XXXII.

**Fourmis**, SPENCE, Invasion des maisons de Brighton et de Londres par une myriade de petites Fourmis, 1834, LXVI. — *id.*, DE VILLERS, Propriété phosphorescente de petites Fourmis jaunes, 1842, XIII. — *id.*, SICHEL, Il fait connaître un mém. de M. Nylander sur celles de France et d'Algérie, 1856, XXXI.

## G.

**Gastrosericus** *Wallii*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 480.

**Glypta** *bifoveolata*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1854, 500. — *ceratites*, 1854, 499. — *incisa*, 1854, 500. — *provincialis*, *subcornuta*, 1854, 498. — *teres*, 1854, 497.

**Gorytes**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Mém. sur ce genre, 1832, 52. — *campestris*, 1832, 58. — *coarctatus*, SPINOLA, Rectif. au sujet de qqes genres d'Hymén., 1836, XXIII. — *mystaceus*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, 1832, 57.

## H.

**Haliectus**, GOUREAU, Accouplement de qqes Ins., 1839, 548. — *Lepriurii*, *nigromarginatus*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 137. — *pollinosus*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 763.

**Hedychrum** *aulicum*, SPINOLA, Note sur qqes Hymén. recueillis en Espagne, 1843, 129. — *cælestinum*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 454. — *minimum*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 39.

**Hemisla** *bombiformis*, *laticincta*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 148. — *Lepriurii*, 1841, 146. — *pyropyga*, 1841, 148.

**Hemiteles** *areator*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1852, 48. — *asperatus*, 1852, 36. — *bicolorinus*, 1852, 49. — *bipartitus*, 1852, 40. — *cingulator*?, 1852, 49. — *confusus*, 1852, 37. — *decipiens*?, 1852, 44. — *elongatus*, 1852, 40. — *erythrocerus*,

1852, 45. — *erythromelas*, 1852, 46. — *floriculator*?, 1852, 42. — *id.*, SICHEL, Rapporter à cette esp. l'Ins. envoyé par M. Doumerc, et que l'auteur avait cru être un *Cælonites*, 1857, xcvi. — *fulvipes*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1852, 34. — *intersectus*, 1852, 38. — *lucidulus*, 1852, 39. — *melanarius*, 1852, 31. — *Mulsantii*, 1852, 37. — *palpator*, 1852, 43. — *rubiginosus*, 1852, 34. — *ruficollis*, 1852, 48. — *rufocinctus*, 1852, 35. — *scrupulosus*, 1852, 41. — *similis*, *sordipes*, 1852, 33. — *spinosus*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 145. — *tristator*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1852, 32.

**Hockeria** *Onatas*, VALKER, Descr. des Chalcidites trouvés dans la Floride orientale, 1843, 146. — *xanticles*, 1843, 147.

**Hoplismenus** *dimidiatus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1850, 362. — *perniciosus*, 1850, 361.

**Hoplisus** *albidulus*, LEPELETIER DE SAINT-FARCEAU, Genre *Gorytes*, 1832, 65. — *cayennensis*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 116. — *ferrugineus*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 497. — *Lacordairei*, LEPELETIER DE SAINT-FARCEAU, 1832, 64. — *5-cinctus*, 1832, 61. — *scutellaris*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 115.

**Hylotoma** *leucocephala*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 132. — *metallica*, DOÛÉ, Trouvée dans le bois de Chaville, 1854, xxxii.

# I.

**Ichneumon**, GOUREAU, Esp. innommée, parasite du *Callidium sanguineum*, 1843, 104. — *id.*, Parasite de l'*Yponomeuta podella*, 1845, lxxv. — *albicaudatus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1847, 62. — *albicillus*?, 1847, 56. — *antennatorius*, 1847, 410. — *bilineatus*, 1847, 54. — *castigator*, 1847, 53. — *celerator*, 1847, 413. — *cerinthius*, 1847, 60. — *cingulatorius*, 1847, 64. — *cognatus*, 1847, 418. — *comitator*, 1847, 52. — *computatorius*, 1847, 59. — *coruscator*, 1847, 54. — *culpatorius*, 1847, 409. — *deceptor*, 1847, 63. — *dissectus*, 1847, 404. — *divisorius*, 1847, 401. — *equitarius*, 1847, 397. — *exscentorius*, 1847, 59. — *extensorius*, WESMAEL, Notice sur une nouv. esp., 1837, xxiii. — *fasciatorius*,

BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 69. — *fasciatus*, DOUMERC, Notice sur les mœurs de cette esp., 1860, 317. — *flavifrons*, LEFEBVRE, Obs. de M. Vallot sur les larves qui dévastent le chanvre, 1834, LXV. — *fossorius*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 55. — *frontator*, 1847, 64. — *fumigator*, 1847, 412. — *fusorius*, 1847, 400. — *glaucatorius*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 399. — *globatus*, GOUREAU, Parasite de la *Plusia festuæ* (Note sur le *Microgaster globatus*), 1845, 361. — *Gædarti*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 401. — *gracilicornis*, 1847, 60. — *Gravenhorstii*, 1847, 412. — *id.*, WESMAEL, Notice sur une nouv. esp., 1837, XXIII. — *gyrator*, L. DUFOR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 40. — *ignotus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847 409. — *illuminatorius*, 1847, 398. — *infestorius*, 1847, 58. — *infractorius*, 1847, 68. — *insidiator*, 1847, 66. — *ischiomelinus*, 1847, 416. — *lacrymator*, 1847, 403. — *lepidus*, 1847, 66. — *Leprieurii*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 166. — *id.*, BERCE, Indiv. provenant du *Papilio hospiton*, 1847, CXII. — *lincator*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 53. — *melanogaster*, 1847, 57. — *melanogonus*, 1847, 414. — *melanopterus*, SPINOLA, Qques Hymén. recueillis en Espagne, 1843, 120. — *messorius*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 411. — *monitorius*, 1847, 68. — *natatorius*, 1847, 398. — *neglectus*, 1847, 408. — *nigricornis*, SPINOLA, 1843, 121. — *nigripes*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 402. — *occisorius*, 1847, 70. — *odorifcrator*, L. DUFOR et PERRIS, 1840, 44. — *odynericidus*, 1840, 45. — *padella*, GOUREAU, Note pour servir à l'hist. de l'*Yponomeuta padella*, 1847, 239. — *palliatorius*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 69. — *partitorius*, 1847, 413. — *pisorius*, 1847, 400. — *prædator*, 1847, 61. — *prædunculus*, 1847, 416. — *4-fasciatus*, 1847, 397. — *4-maculatus*, 1847, 68. — *ramicornis*, VALLOT, Trouvé les larves sur le chanvre, 1834, LXIV. — *raptorius*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 60. — *repentinus*, 1847, 400. — *rubens*, 1847, 407. — *rudis*, 1847, 55. — *salutator*, 1847, 402. — *sanguinatorius*, 1847, 61. — *saturatorius*, 1847, 58. — *scanicus*, GOUREAU, Parasite de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, LXXX. — *sedulus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 407. — *separator*, 1847, 405. — *screnus*, 1847, 406. — *sexalbatu*, 1847, 65. — *stramentarius*, 1847, 59. — *tergenus*, 1847, 417. — *vadatorius*, 1847, 62. — *vaginatorius*, 1847, 67. — *vicinus*, 1847, 56. — *xanthorius*, 1847, 67. — *xanthozosmus*, 1847, 69.

**Ichneumonologie provençale**, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1847, 51 et 397; 1849, 211; 1850, 361; 1851, 103; 1852, 29, 427; 1854, 497. — *id.*, Errata des tomes V, 1847, CXLIII, et tome VII, 1849,

468. — *id.*, Subvention par l'auteur pour hâter l'impression de son travail, 1850, xxv. — *id.*, Note rectificative, 1852, xl.

**Ichneumonide de la Nouv.-Orléans**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1845, CIV.

**ICHNEUMONIDES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Grand parasite du *Bombyx cecropia*, 1845, CIV. — *id.*, LABOULBÈNE, Communic. d'Ichneumonides sorties d'une Araignée, 1856, xcvii. — *id.*, Parasites de deux *Orchestes*, 1856, xcvii.

**Ichneumonien**, LABOULBÈNE, Dépôt d'une notice sur une esp. provenant d'une larve à pseudopodes dorsaux, 1858, lxxxiii.

**Ichneumons**, PIERRET, Sortis de deux chrysalides de la *Thais médésiacae*, 1846, xxvi. — *id.*, sortis de deux chrysalides de *Nonagria typhæ*, 1846, xxviii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur diverses esp. obtenues de chenilles, 1847, xxiii. — *id.*, BRUAND, Détails sur ceux des chenilles du *Deilephila celerio*, 1847, liv. — *id.*, L. DUFOUR, Mode descriptif, mélanges entomologiques, 1852, 458.

**Ischnoceros purgator**, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 758 et 759.

**Ischnogaster**, DE SAUSSURE, Descr. de ce genre, 1852, 19. — *Dremseni*, Descr. de qqes Vespides nouv., 1857, 315. — *fulgipennis*, Descr. du genre *Ischnogaster*, 1852, 23. — *Melleyi*, 1852, 25. — *micans*, 1852, 24.

## J.

**Joppa picticollis**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 163.

## L.

**Lampretatus cyrnus**, WALKER, Descr. des Chalcidites de la Floride orientale, 1843, 157. — *habis*, 1843, 155. — *salemus*, 1843, 156. — *trypherus*, 1843, 158.

**Larra distinguenda**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 112.  
— *ichneumoniformis*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 474.

**Leachia**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Trois esp. nouv. communiquées par M. Ferraro, de Turin, 1833, xxxvii.

**Lestiphorus bicinctus**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Genre *Gorytes*, 1832, 70.

**Leucospis**, DESMAREST, Erreur typographique, c'est *Leucopsis* qu'il faut lire, 1858, cxi. — *bifasciata*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 442. — *Biguettina*, 1838, 443. — *costæ*, SCHEMBRI, Note contenant sa descr., 1847, lxxxvi. — *dorsigera*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Trouvée dans les nids de l'Abeille maçonne, 1858, cxi. — *Grohmanni*, SPINOLA, 1838, 444. — *intermedia*, 1838, 442. — *miniata*, *scutellata*, 1838, 441.

**Lindenius**, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 791. — *albilabris*, 1834, 795. — *apicalis*, 1834, 794. — *argentatus*, 1834, 792. — *armatus*, 1834, 793. — *brevis*, 1834, 800. — *curtus*, 1834, 799. — *Panzeri*, 1835, 798. — *pygmæus*, 1834, 797. — *subæneus*, 1834, 798. — *venustus*, 1834, 796.

**Lissonota bellator**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1854, 513. — *cognata*, 1854, 515. — *compar*, 1854, 510. — *cylindrator*, 1854, 512. — *decimator*, 1854, 509. — *dorsalis*, 1854, 505. — *exsculpta*, 1854, 509. — *heterodoxa*, 1854, 511. — *impressor*, 1854, 501. — *inæqualis*, *insignita*, 1854, 507. — *insignita*, SICHEL, Ne forme qu'une seule esp. avec le *L. verberans*, 1856, lxxviii. — *limbaria*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1854, 504. — *lineata*, 1854, 505. — *maculatoria*, 1854, 501. — *murina*, 1854, 511. — *perspicillator*, 1854, 506. — *proxima*, *pubescens*, 1854, 514. — *setosa*, 1854, 501. — *variegata*, 1854, 503. — *verberans*, 1854, 508.

**Lithurgus**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Notice sur ce genre, 1834, 219.  
— *chrysurus*, *cornutus*, 1834, 220.

**Lophyrus piceæ**, LUCAS, Plusieurs éclosions obtenues en septembre au laboratoire d'Entomologie, 1852, lxxii. — *pini?*, Larve et cocon rapportés avec doute à cette esp., 1852, xxxix.

**Lycisca raptoria**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 198.

**Lyrops chrysopyga**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 112.  
— *crythropus*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 479. — *geniculata*, 1838, 480. — *Leprieurii*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 111. —

*pompiliformis*, *rufipes*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 478. — *rufiventris*, 1838, 479. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxvi. — *Savignyi*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 477. — *tarsalis*, 1838, 478. — *tricolor*, 1838, 477.

## M.

**Macrocera** *grandis*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur huit esp. nouv. d'Hymén. et de Névroptères, 1846, 47. — *longicornis*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 516. — *ruficollis*, L. DUFOUR, Mélanges sur cette esp., 1852, xlv. — (Voyez au mot *Tetralonia*.)

**MASARIDES**, L. DUFOUR, Rem. sur cette fam., 1851, 61.

**Masariens**, DE SAUSSURE, Errata communiqués par l'auteur, 1853, LXXI.

**Masaris**, SCHAUM, Encore un mot sur le genre *Masaris*, 1853, 653. — *id.*, DE SAUSSURE, Résumé d'une note sur la tribu des Masariens, 1853, xvii. — *id.*, L. DUFOUR, *Masaris*, *Celonites* et *Ceramius*, 1853, 385. — *vespiformis*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 505. — *id.*, DE ROMAN, Rép. aux mélanges de M. L. Dufour, 1851, li. — *id.*, LUCAS, Note sur le nombre des art. des antennes, 1851, xciv. — *id.*, L. DUFOUR, Encore *Masaris* et *Celonites*, 1852, 448. — *id.*, SCHAUM, Note sur le *Masaris vespiformis*, 1852, lxxxvi. — *id.*, BLANCHARD, Comm. nommée pour étudier la question, 1853, vi. — *id.*, FAIRMAIRE, Rapport de la comm. sur le nombre des art. des antennes, 1853, xvi. — *id.*, DE SAUSSURE, Résumé d'une note sur la tribu des Masariens, 1853, xvii.

**Megachile** *conica*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 144. — *cristata*, Note sur huit esp. nouv. d'Hymén. et de Névropt., 1846, 46. — *flavipes*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 527. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxvii. — *Ghilianii*, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 142. — *gymnopygia*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 530. — *luctifera*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 142. — *nigripennis*, 1841, 143. — *nigripes*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 529. —



*id.*, Synonymie, 1842, xxxvii. — *patellimana*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 529. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxvii. — *sicula*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 516.

**Megilla**, L. DUFOUR, Recherches sur l'*Andrena lagopus*, 1838, 287. — *labiata*, 1838, 288.

**Megischus**, 1860, 761. — (Voyez au mot *Bothrioceros*.)

**Melecta cæsia**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 516.

**Melipones**, GHILIANI, Note sur leurs mœurs, 1847, xxxviii.

**Merismus**, GOUREAU, Parasite de l'*Yponomeuta padella*, 1845, lxxx. — *obscurus*, Note sur cet Ins., 1846, 477.

**Mesocheira ornata**, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 145.

**Mesochorus aggressor**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1852, 439. — *flavescens*, 1852, 437. — *melas*, 1852, 440. — *splendidulus*, 1852, 435. — *testaceus*, 1852, 439. — *id.*, LUCAS, Note sur ce parasite du *Cimbex amerinæ*, 1858, xvi. — *thoracicus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1852, 437.

**Mesoleptus cingulatus**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1849, 211. — *flicornis*, 1849, 215. — *fugax*?, 1849, 213. — *lævigatus*, 1849, 215. — *sticticus*, 1849, 212. — *sulphuratus*, 1849, 215. — *typhæ*, 1849, 214.

**Mesostenus albinotatus**?, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1852, 30. — *dorsostriatus*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1840, 152. — *flavofasciatus*, 1840, 153. — *gladiator*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1852, 31. — *grammicus*, 1852, 30. — *Gravenhorstii*, SPINOLA, 1840, 147. — *maculicollis*, 1840, 150. — *transfuga*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 1852, 29.

**Metæcus paradoxus**, SICHEL, Communic. de plusieurs indiv. pris dans des nids du *Vespa vulgaris*, 1854, liii. — *id.*, Deux nids de *Vespa vulgaris* ont fourni 9 *Metæcus*, 1854, l.viii.

**Metoplus dentatus**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de trois grands Ichneumons éclos de chenilles étrangères à la faune parisienne, 1860, lxxxix.

**Metopon Diephon**, WALKER, Descr. des Chalcidites trouvés dans la Floride orientale, 1843, 161.

- Microgaster globatus**, GOUREAU, Note sur cet Ins., 1845, 355. — *perlæ*, DOUMÈRC, Note sur ce parasite de l'Hémérobe perle, 1855, LXXXI.
- Micromelus Cyrenæ**, WALKER, Descr. des Chalcidites trouvés dans la Floride orientale, 1843, 154.
- Micromyrma pygmæa**, L. DUFOUR, Sur ce nouv. genre de Formicide, 1857, 60.
- Mischocyttarus Drucei**, DE SAUSSURE, Descr. de qqes Vespides nouv., 1857, 317.
- Misocampus stigmatisans**, L. DUFOUR, Notice sur cet Ins., 1847, 441.
- Mizyne cylindrica**, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 457. — *hispanica*, Note sur qqes Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 134.
- Mutilla angusticollis**, SPINOLA, Notes sur qqes Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 132. — *arenaria*, L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1852, XLIV. — *argyra*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 85. — *barbara*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 456. — *bitæniata*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 91. — *Chiesi*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 457. — *conata*, *continua*, *crassa*, 1838, 456. — *fasciaticollis*, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 131. — *Ghilianii*, 1843, 130. — *incerta*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 93. — *incompleta*, SICHEL, Sur la rareté relative de certains Hymén., 1852, 561. — *interrupta*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 456. — *id.*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 318. — *melana*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 87. — *nilotica*, *nitidiventris*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 456. — *8-maculata*, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 129. — *4-notata*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 456. — *rectangulum*, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 91. — *singularis*, 1841, 95. — *zonata*, 1841, 89.
- Myrmecocystus mexicanus**, LUCAS, Note sur une *Formica* des plus remarquables, 1855, LIV.
- Myrmica?**, LUCAS, Communic. d'une esp. de Cayenne habitant dans les serres chaudes du Muséum depuis six à huit ans, 1855, CXII.

## N.

**Nectanebus** *Fischeri*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 489.  
— *histerisnicus*, 1838, 491.

**Nematus** *Degeeri*, L. DUFOUR, Dissertation sur cette esp., 1847, 583.  
— *laticrus*, FOULQUES DE VILLARET, Mém. sur qqes nouv. esp. de Tenthredines, 1832, 307. — *latipes*, 1832, 306. — *ribis*, L. DUFOUR, Études pour servir à son hist., 1847, 571. — *varus*, FOULQUES DE VILLARET, 1832, 306.

**Nephridia** *xanthopus*, BRULLÉ, Mém. sur un Hymén. parasite, 1833, 408.

**Nemada** *fucata*, *striata*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 516.

**Nomla** *diversipes*, L. DUFOUR, Notice sur cette esp., 1839, 583. — *ruficornis*, *rufiventris*, SPINOLA, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 514.

**Norbanus**, WALKER, Chalcidites de la Floride orientale, 1843, 159. — *pisius*, 1843, 160.

**Nysson** *marginatus*, SPINOLA, Hymén. recueillis à Cayenne, 1841, 113.

## O.

**Odynerus**, LESPÈS, Communic. relative au nid et aux larves d'une esp. d'*Odynerus*, 1855, LVIII. — *id.*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Obs. sur les *Odynerus*, 1835, LXVIII. — *id.*, AUDOUIN, Annonce d'un supplément à la Monogr. de M. Wesmael, 1836. XVII. — *id.*, SPINOLA, Notice sur ceux des env. en Gènes, 1839, XXXVII. — *auctus*, 1839, XXXVIII. — *bifasciatus*, 1839, XXXIX. — *biglumis*, 1839, XXXVIII. —

*bistrigatus*, 1839, XXXIX. — *chloroticus*, Hymén. recueillis en Égypte, 1838, 500. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVII. — *cognatus, consobrinus, coralis*, Notice sur les Odynères des env. de Gênes, 1839, XL. — *Dantici*, 1839, XXXVIII. — *dimidiatus*, Hymén. d'Égypte, 1838, 502. — *Drewnski*, DE SAUSSURE, Descr. de qqes Vespides nouv., 1857, 318. — *elegans*, SPINOLA, Odynères des env. de Gênes, 1839, XL. — *Geoffroyanus*, 1839, XXXIX. — *hospes*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 25. — *impunctatus*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 503. — *industrius*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 23. — *Leprieurii*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 127. — *notatus*, Hymén. d'Égypte, 1838, 505. — *id.*, Odynères des env. de Gênes, 1839, XXXIX. — *oviventris*, 1839, XL. — *parietum*, Hymén. d'Égypte, 1838, 505. — *id.*, Odynères des env. de Gênes, 1839, XXXIX. — *Reaumuri*, 1839, XL. — *rhombiferus*, L. DUFOUR, Signalements de qqes esp. nouv. algériennes, 1853, 381. — *rubicola*, SPINOLA, Odynères des env. de Gênes, 1839, XL. — *id.*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 23. — *spinipes*, SPINOLA, 1839, XXXVIII. — *id.*, LABOULBÈNE, Obs. sur les parasites de cette esp., 1858, CXII. — *id.*, LUCAS, Obs. sur les mœurs de cette esp., 1847, XC. — *spiricornis, trifasciatus*, SPINOLA, 1839, XXXIX.

**Odontomachus** *chelifera, unispinosa*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'Astrolabe et de la Zélée, 1841, 318.

**Oecodoma** *cephalotes*, REICHE, Détails sur cet Ins., 1844, LXVII.

**Enone**, GOUREAU, Note pour servir à l'hist. des Diptères mineurs de feuilles, 1846, 232.

**Omphale** *palustris*, GOUREAU, Mém. pour l'hist. des parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 137. — *stigma*, 1851, 150.

**Ophion**, BECKER, Qques mots d'un grand Ichneumonien sorti d'un *Bombyx cecropia*, 1846, XXXVI. — *id.*, BERCE, Individ. provenant de la *Thais Cassandra*, 1847, CXII. — *id.*, GOUREAU, Parasite de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, LXXX. — *dosithea*, AUDOUIN, Obs. sur les métam. d'une chenille du genre *Dosithea*, 1834, 425. — *morio*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 168. — *Sphinx*, Hymén. d'Égypte, 1838, 439. — *undulatus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de trois grands Ichneumons, 1860, LXXXIX.

**Opius** *ambirius*, GOUREAU, Parasites des Diptères mineurs de feuilles, 1851, 155.

- Oplopus melanocephalus**, *reniformis*, *spinipes*, AUDOUIN, Supplément à la monogr. de M. Wesmaël, 1836, xviii.
- Oribates**, GERVAIS, Rapport sur un mém. de M. Langle, 1840, xxvii.
- Ormyrus labotus**, WALKER, Chalcidites de la Floride orientale, 1841, 148.
- Osmla acuticornis**, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 14. — *bætica*, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 142. — *bicolor*, GOUREAU, Note pour l'hist. des Abeilles maçonnes et de leurs parasites, 1840, 123. — *ferruginea*, Latreillei, *melanogaster*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 516 — *parvula*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 8. — *ruborum*, 1840, 13. — *tridentata*, 1840, 10. — *tunensis*, GOUREAU, Accoupl. de qqes Ins., 1839, 546.
- Oxybelus americanus**, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 114. — *andalusiacus*, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 136. — *Fischeri*, Hymén. d'Égypte, 1838, 484. — *Savignyi*, 1838, 483. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxvi.

## P.

- Pachynevron albutius**, WALKER, Chalcidites de la Floride orientale, 1843, 158. — *speciosum*, GOUREAU, Note sur la Mouche dont la larve mine la feuille de l'iris des marais, 1847, xli.
- Palarus histrio**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 474. — *humeralis*, L. DUFOUR, Signalements de qqes esp. nouv. d'Algérie, 1853, 379. — *rufipes*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 475.
- Paniscus glaucopterus**, DREWSSEN, Note sur le *Cimbex femorata*, 1835, 170.
- Panurgus nasutus**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 516. — (Voyez au mot *Camptopæum*.) — *id.*, Synonymie, 1842, xxxvii. — *unicolor*, Hymén. d'Égypte, 1838, 515.

- Paragia australis, bicolor**, DE SAUSSURE, Résumé d'une note sur la tribu des Masariens, 1853, XXI.
- Parnopes denticulata, Fischeri**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 455.
- Passalæcus gracilis**, GOUREAU, Note sur les mœurs de div. Hymén., 1857, CLVII.
- Paxylloma Cremieri**, DE ROMAN, Descr. d'une nouv. esp., 1838, 433.
- Pelopæus distillatorius, spirifex**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 466. — *spirifex*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur un nid fort remarquable, 1848, XXXII. — *violaceus*, SPINOLA, 1838, 466.
- Pemphredon unicolor**, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 36.
- PEMPHRÉDONIDES**, SICHEL, Détails sur leurs mœurs, 1855, VII.
- Pepsis fulvipennis**, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 319. — *viridisetosa*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 104.
- Pezomachus agilis, bicolor?**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1852, 430. — *Gravenhorstii*, 1852, 428. — *Hoffmannseggii*, 1852, 431. — *vagans*, 1852, 427. — *Wesmaelii*, 1852, 432.
- Philanthus apivorus**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 484. — *coarctatus*, 1838, 486. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVI. — *ecoronatus*, L. DUFOUR, Signalement de qqes Hymén. algériens, 1853, 380. — *petiolatus*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 121. — *id.*, Note supplémentaire sur les Hymén. de Cayenne, 1841, 309. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVIII. — *pulchellus*, 1842, XXXVI. — *rutilus*, Hymén. d'Égypte, 1838, 488. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVI. — *variegatus*, Hymén. d'Égypte, 1838, 484. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVI.
- Phileremus nivcatus**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 535. — *punctatus*, 1838, 516.
- Phygadeuon**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1851, 103. — *abdominator, bellator*, 1851, 117. — *cinctellus*, 1851, 105. — *digitatus*, 1851, 103. — *ensator*, 1851, 110. — *fumator*, 1851, 106. — *incertus*, 1851, 112. — *jejunator*, 1851, 115. —
- Phylloxera**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Notice sur ce genre, 1834, 222. — *quercus*, 1834, 223.

*minor*, 1851, 111. — *minutus*, 1851, 113. — *nigrescens*, 1851, 103. — *obscuratus*, 1851, 104. — *procerus*, 1851, 116. — *profligator*, 1851, 118. — *pugnator*, 1851, 115. — *quadrispinus*, 1851, 106. — *sericans*, 1851, 113. — *vagabundus*, 1851, 119. — *variabilis*, 1851, 114.

**Physoscelus** *pallipes*, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Craebro*, 1834, 806. — *rufiventris*, 1834, 804.

**Phytodietus** *grandis*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1852, 433, 434.

**Pimpla**, PIERRET, sortie d'une Chrysalide de *Cossus ligniperda*, 1846, XXVIII. — *id.*, GOUREAU, Parasite de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, LXXX. — *id.*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1854, 497. — *cphippiatoria*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 47. — *cxcavata*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 312. — *Fairmairei*, LABOULBÈNE, Hist. d'un Ichneumon parasite des Araignées, 1858, 797. — *Ghilianii*, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 119. — *marginellatoria*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 48. — *tricolor*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 141.

**Pison** *argentatus*, Peletieri, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 320.

**Plagiocera** *Leachii*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 134.

**Platygaster** *punctiger*, *scutellatus*, SICHEL, Parasites de la *Cecidomyia tritici*, 1856, XXXVIII.

**Polistes**, FAIRMAIRE, rencontré à Conflans, en Savoie, 1856, LXXVII. — *id.*, DE SAUSSURE, Note sur les Polistes américains, 1857, 309. — *Bernardii*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 321. — *biglumis*, SICHEL, Rem. sur trois esp. qui ne sont que des var. de la même esp., 1854, XII. — *gallica*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 504. — *gallicus*, *Geoffroyi*, SICHEL, 1854, XII. — *Lefebvrei*, *Romandi*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 322.

**Polycyrtus**, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 154. — *capitator*, 1840, 159. — *femoratus*, 1840, 160. — *histrion*, 1840, 155. — *Le-prieurii*, 1840, 157. — *4-sulcatus*, 1840, 162. — *rufiventris*, 1840, 161. — *sartor*, 1840, 158.

**Polysphincta** *pusilla, varipes*, BOYER DE FONSCOLMBE, Ichneumonologie provençale, 1854, 516.

**Pompilus**, GOUREAU, Esquisse de l'hist. d'un Ins. de la fam. des fouisseurs, 1839, 535. — *id.*, Qques traits de mœurs des Ins. fouisseurs, 1839, 538. — *ænigma*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 461. — *anticus*, 1838, 458. — *bituberculatus*, Hymén. de Cayenne, 1841, 104. — *castaneus*, Hymén. d'Égypte, 1838, 458. — *cingulatus*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 761. — *compressus*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 106. — *femoralis*, 1838, 458. — *femoratus*, Hymén. de Cayenne, 1841, 108. — *Fischeri*, Hymén. d'Égypte, 1838, 460. — *Grohmanni*, 1838, 459. — *nigripennis*, SICHEL, 1860, 762. — *ruficrus, rutilus, tibialis*, SPINOLA, 1838, 458. — *varicornis*, Hymén. de Cayenne, 1841, 106. — *vespiformis*, Hymén. d'Égypte, 1838, 458. — *Waltlii*, 1838, 462.

**Ponera** *arancoides, bispinosa*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 317. — *rugosa*, 1841, 318.

**Priocnemis** *Bellieri, Dahlbomii*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 762.

**Priomerus** *insidiosus*, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. de Madagascar, 1856, 507.

**Prosopis** *annulata*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 506. — *frontalis*, Synonymie, 1842, xxxvii, et 1843, 139. — *scutellata*, Hymén. d'Égypte, 1838, 506. — *signata*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 35.

**Psammæclus** *punctulatus*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Mém. sur le genre *Gorytes*, 1832, 72.

**Psithyrus**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Obs. sur les *Bombi Scandinaviæ* de M. Dahlbom, 1832, 366. — *æstivalis*, 1832, 378. — *arenarius*, 1832, 376. — *barbutellus*, 1832, 377. — *bellus, campestris*, 1832, 379. — *frutetorum*, 1832, 381, 382. — *inops*, 1832, 380. — *interruptus*, 1832, 381. — *leucoproctus*, 1832, 379. — *melaleucus*, 1832, 378. — *ornatus*, 1832, 381. — *pyrenæus*, 1832, 375. — *quadricolor*, 1832, 376. — *Rossiellus*, 1832, 380. — *rupestris*, 1832, 375, 376. — *sylvestris*, 1832, 377. — *varius*, 1832, 381. — *Vasco*, 1832, 375. — *vestalis*, 1832, 377, 378.

**Pyria** *Reichei*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 448. — *stilboides*, 1838, 446. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxv.



## R.

**Rhophites** *bifoveolatus*, SICHEL, Communic. et diagnose de cette esp., 1854, LXXIV.

**Rhygchium** (ou **Rhynchium**) *carbonarium*, DE SAUSSURE, Descr. de qqes esp. de Vespides nouv., 1857, 317. — *chloroticum*, SPINOLA, Synonymie, 1842, XXXVII.

## S.

**Saropoda** *humilis*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 544. — *latizona*, *nigrilabris*, 1838, 543.

**Schizocera** *axillaris*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 130. — *Peletierii*, FOULQUES DE VILLARET, Mém. sur quatre nouv. esp. de Tenthredines, 1832, 304.

**Schizopyga** *triangulata*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1854, 517.

**Scleroderma**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Consultation demandée à l'occasion de ce genre, 1836, LXXI.

**Scolia**, SICHEL, Communic. d'un travail de M. de Saussure sur diverses esp. de ce genre, 1858, LXXVII. — *id.*, DE SAUSSURE, Descr. de diverses esp. nouv. ou peu connues de ce genre, 1858, 193, — *abyssinica*, *alaris*, 1858, 203. — *anceps*, 1858, 221. — *azteca*, 1858, 218. — *bicornis*, 1858, 201. — *bilunata*, 1858, 212. — *brevicornis*, 1858, 198. — *carbonaria*, 1858, 210. — *carnifex*, COQUEREL, Obs. sur deux esp. vivant aux dépens des larves d'*Oryctes*, 1855, 173. — *cyanipennis*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 457. — *id.*, DE SAUSSURE, 1858, 209. — *Dreirseni*, 1858, 223. — *ebenina*, 1858, 200. — *Edwardsi*, 1858, 205. — *eliformis*, 1858, 215. — *eriophora*, SPINOLA, 1838, 457. — *erratica*, DE SAUSSURE, 1858, 211. — *flavicornis*, SPI-

NOLA, 1838, 457. — *funerea*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 319. — *guttata*, DE SAUSSURE, 1858, 218. — *hottentota*, 1858, 206. — *insignis*, 1858, 197. — *interstincta*, SPINOLA, 1838, 457. — *jucunda*, DE SAUSSURE, 1858, 222. — *madecassa*, 1858, 208. — *mendica*, SPINOLA, 1838, 457. — *mexicana*, DE SAUSSURE, 1858, 219. — *nitidula*, 1858, 215. — *nobilis*, 1858, 214. — *nobilitata*, 1858, 220. — *occulta*, 1858, 216. — *orientalis*, 1858, 202. — *oryctophaga*, COQUEREL, 1855, 170. — *otomita*, DE SAUSSURE, 1858, 223. — *polita*, 1858, 199. — *pubescens*, SPINOLA, 1838, 457. — *pygmæa*, DE SAUSSURE, 1858, 217. — *4-punctata*, SICHEL, Pris les deux sexes à Charenton, 1855, LXXXI. — *rufiventris*, DE SAUSSURE, 1858, 220. — *rutila*, SPINOLA, 1838, 457. — *senex*, DE SAUSSURE, 1858, 207. — *6-maculata*, DE ROMAN, Notice sur un hermaphrodite, 1835, 191. — *splendida*, DE SAUSSURE, 1858, 213. — *terminalis*, 1858, 207. — *tropica*, 1858, 205. — *unifasciata*, 1858, 205. — *vagans*, SPINOLA, 1838, 457. — *Westermanni*, DE SAUSSURE, 1858, 212.

**Scolobates** *crassitarsus*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1849, 237. — *nigripennis*, SICHEL, Diagnoses et descr. d'esp. nouv., 1860, 758.

**Seminota** *Leprieurii*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 198. — *id.*, Synonymie, 1842, XXXVIII. — (Voyez au mot *Trigonalys*.)

**Semlotus** *apionis*, GOUREAU, Ins. vivant dans les gousses du genêt épineux, 1847, 251. — *diversus?*, Ins. vivant dans le chardon penché, 1845, 96.

**Sirex** *gigas*, LUCAS, Deux indiv. trouvés dans le bois d'un métier à tisser, 1853, LXIII. — (Voyez *Urocerus*.)

**Smicra** *Leprieurii*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 198. — *side*, WALKER, Chalcidides de la Floride orientale, 1843, 145.

**Solenius**, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 713. — *cræsus*, 1834, 727. — *dives*, 1834, 716. — *fossorius*, 1834, 725. — *fuscipennis*, 1834, 714. — *grandis*, 1834, 718. — *interruptus*, 1834, 716. — *lapidarius*, 1834, 721. — *id.*, L. DUFOUR, Obs. sur qqes esp. de *Crabro*, 1838, 409. — *id.*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Rép. aux obs. de M. L. Dufour, 1838, 415. — *8-notatus*, LEPELETIER et BRULLÉ, 1834, 719. — *petiolatus*, 1834, 726. — *punctatus*, 1834, 720. — *rubicola*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 25. — *scaber*, LEPELETIER et BRULLÉ, 1834, 715.

— *vagus*, 1834, 722. — *id.*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 484.  
— *id.*, L. DUFOUR et PERRIS, 1840, 28.

**Sphecodes**, LEFEBVRE, Extrait des obs. de M. Wesmael sur les Hymén. de ce genre, 1835, LXV (1). — *collaris*, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 137. — *Geoffrellus*, *gibbus*, *hispanicus*, LEFEBVRE, 1835, LXVII (2). — *hispanicus*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 513. — *Latreillei*, *Olivieri*, *piceus*, LEFEBVRE, 1835, LXVII (2). — *rubripes*, SPINOLA, 1838, 512. — *rufiventris*, *similis*, 1835, LXVII (2).

**Sphex** *argentata*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 464. — *cærulescens*, LE GUILLOU, Hymén. du voyage de l'*Astrolabe* et de la *Zélée*, 1841, 320. — *flavipennis*, *hirtipes*, SPINOLA, 1838, 464. — *niveata*, L. DUFOUR, Signalement de qqes esp. nouv. d'Hymén. algériens, 1853, 377. — *occitanica*, *pubescens*, SPINOLA, 1838, 464. — *pubescens* L. DUFOUR, 1853, 375. — *trichargyra*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 466,

**Spintharis** *singularis*, SPINOLA, Synonymie, 1842, xxxv.

**Stelis** *minuta*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 33

**Stigmus** *ater*, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 35.

**Stilbum** *6-dentatum*, SPINOLA, Synonymie, 1842, xxxv. — *splendidum*, Hymén. d'Égypte, 1838, 446.

**Stilpnus** *gagates*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1847, 419.

**Stizus**, L. DUFOUR, Obs. sur ce genre, 1838, 269. — *id.*, Rem. sur les esp. de Stizes en général, 1838, 275. — *adustus*, *alternans*, *bizonatus*, *cingulatus*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 473. — *crassicornis*, 1838, 467, 473. — *fasciatus*, 1838, 473. — *nigricornis*, L. DUFOUR, Obs. sur le genre *Stizus*, 1838, 271. — *Perrisi*, 1838, 269. — *Savignyi*, 1838, 471.

**Symmorphus** *bifasciatus*, *crassicornis*, *elegans*, WESMAEL, Suppl. à la monogr. des Odyneres de Belgique, 1836, xviii.

(1) La pagination du texte aurait dû indiquer LXXV, et non LXV.

(2) Ce devrait être LXXVII.

**Synoecca**, DE SAUSSURE, Note sur un nouv. genre de Guêpes, 1852, 549.  
 — *azurea*, 1852, 554. — *chalybea*, 1852, 556. — *cærulea*, 1852, 552.  
 — *cyanea*, 1852, 553. — *ultramarina*, 1852, 554. — *violacea* 1851,  
 555.

**Systasis** *celer*, GOUREAU, Parasite des Diptères mineurs de feuilles,  
 1851, 151.

**Systropha** *hirsuta*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 516.

**Syzygonia** *cyanoptera*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Rem. sur les  
 caractères de ce genre, 1833, 456.

## T.

**Tachytes** *ruficrus*, L. DUFOUR, Signalement de qqes nouv. esp.  
 d'Hymén. algériens, 1853, 378.

**Tarpa** *hispanica*, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 117.

**Tenthredes**, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, mangeant des Ins. sur  
 les fleurs, 1834, xi. — *id.*, FOULQUES DE VILLARET, Mém. sur quatre  
 nouv. esp., 1832, 303.

**Tenthredo** *bætica*, SPINOLA, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843,  
 114. — *erythrogaster*, 1843, 116. — *limbalis*, 1843, 115. — *rufi-*  
*mana*, 1843, 112. — *xanthopus*, 1843, 114.

**Tetralonia** *atricornis*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 539. — *id.*,  
 Synonymie, 1842, xxxvii. — *basizona*, Hymén. d'Égypte, 1838, 538.  
 — *Grohmanni*, 1838, 540. — *tarsata*, 1838, 541. — *id.*, Synonymie,  
 1842, xxxvii. — (Voy. au mot *Macrocera*.)

**Tetramorium** *Kollari*, SICHEL, Identité de cette esp. avec celle de  
 l'Inde, 1856, xxiv.

**Thyreopus**, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834,  
 751. — *clypeatus*, 1834, 758. — *cribrarius*, 1834, 752. — *inter-*  
*ruptus*, 1834, 755. — *patellatus*, 1834, 756. — *pterotus*, 1834, 760.

**Thyreus**, LEPELETIER et BRULLÉ, Monogr. du genre *Crabro*, 1834, 761.  
 — *verillatus*, 1834, 762. — *id.*, L. DUFOUR, Obs. critiques sur qqes  
 esp. de *Crabro*, 1838, 409.

**Tiphia albilabris**, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 102. — *cayennensis*, 1841, 98. — *femorata*, 1841, 101. — *flavipennis*, 1841, 102. — *morio*, 1841, 101.

**Trachypus Gomesii**, SPINOLA, Note supplémentaire au mém. sur les Hymén. de Cayenne, 1841, 309. — *id.*, Synonymie, 1842, xxxviii.

**Trigonalys anglicana**, SICHEL, trouvée près de Paris, 1854, LXVII. — *Leprieurii*, SPINOLA, Synonymie, 1842, xxxviii. — (Voyez *Seminota*.)

**Trigonoderus amabilis?**, GOURBAU, Ins. vivant dans le chardon penché, 1845, 97.

**Trigonogaster benignus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, parasite de l'*Œcophora olivella*, 1844, LXXVII.

**Trogus cæruleator, lapidator**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1849, 239. — *lutorius*, 1849, 237. — *nigrator*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de trois grands Ichneumons provenant d'une chenille étrangère à la faune parisienne, 1860, LXXXIX.

**Tryphon**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Ichneumonologie provençale, 1849, 216. — *albocinctus*, 1849, 223. — *armillatorius*, 1849, 221. — *aulicus?*, 1849, 220. — *bicolor*, 1849, 233. — *breviusculus*, 1849, 217. — *caligatus*, 1849, 222. — *collaris?*, 1849, 229. — *colon?*, 1849, 223. — *compunctor*, 1849, 216. — *debilis*, 1849, 226. — *delicatus*, 1849, 227. — *elegantulus*, 1849, 225. — *erythropalpus*, 1849, 230. — *extirpatorius*, 1849, 224. — *flavescens*, 1849, 226. — *fulvescens*, 1849, 229. — *marginatorius*, 1849, 222. — *marginellus*, 1849, 220. — *murinus*, 1849, 216. — *petulans*, 1849, 228. — *pinguis*, 1849, 219. — *pratensis*, 1849, 231. — *5-cinctus*, 1849, 219. — *rufo-notatus*, 1849, 218. — *rutilator*, 1849, 232. — *scotopterus*, 1849, 225. — *6-cinctus*, 1849, 219. — *succinctus*, 1849, 220. — *varicornis*, 1849, 233. — *vernalis*, 1849, 231.

**Trypoxylon figulus**, L. DUFOUR et PERRIS, Hymén. des tiges sèches de la ronce, 1840, 28.

**Typhlopoma oraniensis**, LUCAS, Note sur cette esp., 1853, xxxvii.

## U.

**Urocerus juvenicus**, DUMÉRIL, Opinion sur la perforation de balles de plomb en Crimée, 1858, CXLVII. — *id.*, Discussion à cet égard, 1858, CXLVII. — (Voyez *Sirex*.)

## V.

**Vespa muraria**, WESMAEL, Note sur cette esp., 1837, XCIV. — *orientalis*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 504. — *rubra*, LABOULBÈNE, Nid découvert à Meudon, 1848, XLVIII.

## X.

**Xylocopa æstuans**, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 515. — *hellenica*, Hymén. peu connus d'Espagne, 1843, 144. — *pubescens*, SPINOLA, 1838, 518. — *sinuatifrons*, 1843, 143. — *violacea*, DUPLAN et GOURJON, Communic. de plusieurs indiv. dans un échalas, 1834, II. — *id.*, SPINOLA, Hymén. d'Égypte, 1838, 515. — *id.*, GOUREAU, Accouplement de qqes Ins., 1839, 549.

## Z.

**Zethus biglumis**, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1841, 135. — *didymogaster*, 1841, 133. — *gigas*, 1841, 129. — *globicollis*, 1841, 136. — *pyriformis*, 1841, 134.



## Articles généraux.



### Hermaphrodites :

SICHEL, Note sur un Hymén. hermaphrodite, 1858, CCXLII. — (Voyez *Bombus lapidarius*.)

### HYMÉNOPTÈRES :

BRULLÉ, Mém. sur un Hymén. parasite, 1843, 403 (voyez au mot Parasites). — *id.*, WESTWOOD, Note sur les habitudes de certaines esp. de fouisseurs, 1836, 297. — *id.*, SPINOLA, Rectif. au sujet de qqes genres, 1836, XXIII. — *id.*, Hymén. d'Égypte, 1838, 437. — *id.*, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 65. — *id.*, Souscription à la revue des Hymén. de la Suède, 1838, LVII. — *id.*, L. DUFOUR et PERRIS, Mém. sur ceux des tiges sèches de la ronce, 1840, 5. — *id.*, SPINOLA, Hymén. de Cayenne, 1840, 129. — *id.*, DE ROMAND, qqes détails sur les Hymén. du Sénégal, 1849, LXVIII. — *id.*, VALLOT, Obs. sur les Ins. de cet ordre, 1849, LXXIII. — *id.*, LABOULBÈNE, Larve trouvée dans le corps de la chenille du *Sphinx ligustri*, 1850, 4. — *id.*, SICHEL, Analyse de la revue critique de M. Wesmaël, 1852, LXIII. — *id.*, SICHEL, Adresse où l'on trouve l'ouvrage de M. Jurine, 1853, XXIII. — *id.*, BUQUET, M. de Romand désire céder sa coll. d'Hymén., 1856, xcVIII. — *id.*, GOUREAU, Note sur ceux de l'intérieur des tiges de la ronce, 1858, XXXIX. — *id.*, SICHEL, Liste des Hymén. recueillis dans les Basses-Alpes, 1860, 215. — *id.*, Liste de ceux recueillis en Sicile, 1860, 749.

### Miel vénéneux :

LEFEBVRE, Obs. de M. Keith-Abbot sur celui des env. de Trébizonde, 1835, LIII.

### Monstruosités :

DOUMERC, Note sur qqes monstruosités entomolog., 1834, 171.

### Parasites :

BRULLÉ, Note sur un Hymén. parasite, 1833, 403. — *id.*, BOUDIER, Obs. sur div. parasites, 1834, 327.

### Ruche :

GILET DE GRAMMONT, Ruche inventée par M. Nutt, et présentée à l'Institut, 1835, v.



## VI.

### LÉPIDOPTÈRES.



## A.

**Abrostola**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 67. — *asclepiadis*, 1841, 69. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur la chenille de cette espèce, 1846, LXIV. — *id.*, PIERRET, Suivant Engramelle, la chenille se trouvait au bois de Boulogne, 1846, LXVI. — *triplasia*, GUENÉE, 1841, 69. — *id.*, LUCAS, rencontrée aux env. de Tanger, 1857, XL. — *urticæ*, GUENÉE, 1841, 69.

**Acherontia Atropos**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Reproduction en cire d'une var. de chenille, 1846, CX. — *id.*, LABOULBÈNE et GUENÉE, Cette variété, commune aux env. d'Agen, est décrite et figurée dans Hubner, 1846, CXII. — *id.*, PARIS, de Gray, Détails sur le cri particulier de cette espèce, 1846, CXII,

**Achræa**, BECKER, Lépidoptères nouv. ou peu connus découverts à Quito, 1851, XXIII. — *Seis*, FEISTHAMEL, Descr. de qqes Lépid. Rhopalocères de la Cazamance, 1850, 247.

**Acidalia albularia**, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *bassaria*, FEISTHAMEL, Descr. de Lépid. nouv., 1835, 133. — *calceata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomologique de Sicile, 1860, 701. — *campata*, 1860, 702. — *candidaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *circuitata*, *consanguinata*, BELLIER DE



LA CHAVIGNERIE, 1860, 701. — *efflorata*, 1860, 702. — *elongaria*, RAMBUR, Catal. des Lépid. de la Corse, 1833, 38. — *fumidaria*, GUENÉE, Femelle aptère, 1856, cx. — *obsoletaria*, RAMBUR, 1833, 39. — *obsoletata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 702. — *ornataria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *ostrinata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 701. — *pallidata*, Note sur cette esp., 1859, iil. — *pinguedinata*, Faune de Sicile, 1860, 702. — *politata*, 1860, 701. — *serrularia*, GUENÉE, Femelle anormale, 1856, cxi. — *temeraria*, BOISDUVAL, 1852, xxxiv. — *turbidata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 701.

**Acompsia cinerella**, DUPONCHEL, Division de la tribu des Tinéides, 1838, 141.

**Acontia aprica, caloris, cerintha, Graellsii**, GUENÉE, Classif. des Noctuéliques, 1841, 220. — *Graellsii*, FEISTHAMEL, Notice sur trois Lépid. nouv., 1837, 300. — *insolatrix*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 495. — *insolatrix, luctuosa, malvæ, solaris, Titania*, GUENÉE, 1841, 221.

**ACONTIDI**, GUENÉE, Classif. des Noctuéliques, 1841, 219.

**Aeronycta tridens**, LUCAS, rencontrée aux env. de Tanger, 1857, xi.

**Adela De Geerella**, DUPONCHEL, Division de la tribu des Tinéides, 1838, 143.

**Æchmia equitella**, DUPONCHEL, Division des Tinéides, 1838, 217.

**Agarista guttata**, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 320.

**Aglia Tau**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Descr. et variétés de Lepid., 1858, 707.

**Aglossa pinguinalis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Chenilles vivantes vomies par une femme hydropique, 1849, xviii.

**Agraulis**, BECKER, Grand nombre de Lépid. découverts à Quito, 1851, xxiii.

**Agrophila**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 228. — *sulphurea*, 1841, 229. — *unca*, 1841, 227.

**AGROTIDES**, RAMBUR, Observ. sur la distribution de cette famille, 1848, 65.

**Agrotis**, GUENÉE, Classif. des Noctuéliques, 1837, 352. — *agathina*, 1837, 355. — *agricola*, 1837, 356. — *alpestris, Andereggii*, 1837,

355. — *annexa*, 1837, 356. — *aquilina*, 1837, 355. — *Arhwoortii*, BECKER, Communic. d'un indiv. provenant d'Angleterre, 1856, XIII. — *birivia*, *cataleuca*, GUENÉE, 1837, 355. — *celsicola*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Diagnose de cette esp., 1858, CCLIII. — *id.*, Obs. sur les Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 190. — *cinerea*, GUENÉE, 1837, 356. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Lardy, 1853, XXXIV. — *corticea*, GUENÉE, 1837, 356. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur la chenille, 1852, XLVII. — *Cos*, GUENÉE, 1837, 356. — *crassa*, 1837, 354. — *cursoria*, 1837, 355. — *id.*, COLIN, Détails sur ses mœurs, 1847, CXL. — *decora*, GUENÉE, 1837, 355. — *Desilii*, PIERRET, Descr. d'une nouv. esp., 1839, 95. — *id.*, Elle n'est qu'une var. de *ripæ*, 1839, XLIII. — *id.*, Entozoaire sortant de l'extrémité de l'abdomen, 1841, II. — *dianthi*, *dumetorum*, *endogæa*, *ericetorum*, GUENÉE, 1837, 355. — *eruta*, 1837, 356. — *europæa*, BOISDUVAL, Deux indiv. paraissant se rapporter à la *Desilii*, 1839, IV. — *exclamationis*, GUENÉE, 1837, 356. — *fimbriola*, 1837, 355. — *flammatra*, *forcipula*, *fugax*, *fumosa*, *fusca*, 1837, 355. — *gilva*, DONZEL, Descr. de cinq esp. de Noctuéliques, 1837, 473. — *Graslinii*, DE GRASLIN, Exploration dans la France occidentale, 1848, 70. — *grisescens*, GUENÉE, 1837, 355. — *hastifera*, DONZEL, Descr. de Lépid. nouv., 1847, 525. — *helvetina*, GUENÉE, 1837, 355. — *id.*, PIERRET, trouvée au crépuscule dans la vallée de Chamounix, 1839, XXIX. — *Honnaratina*, DONZEL, Descr. de cinq esp. de Noctuéliques, 1837, 473. — *incurva*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 191. — *islandica*, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 7. — *lariacia*, Qques lignes sur cette esp., 1856, 25. — *id.*, recueillie dans les Basses-Alpes, 1856, XXXV. — *lata*, GUENÉE, 1837, 354. — *latens*, *Lidia*, 1837, 355. — *Lidia*, BECKER, L'auteur en a reçu d'Allemagne plusieurs exemplaires, 1857, CXXXVII. — *lipara*, RAMBUR, Obs. sur la distribution de cette fam., 1848, 68. — *lucipeta*, GUENÉE, 1837, 355. — *molotina*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. d'indiv. de la France occidentale, 1858, CCXXV. — *multangula*, *nyc-timera*, GUENÉE, 1837, 355. — *obelisca*, 1837, 356. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques détails sur les mœurs de la chenille, 1854, XIII. — *obesa*, GUENÉE, 1837, 354. — *occidentalis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Descr. de cette esp., 1860, 665. — *id.*, Dépôt de la descr. de la var. de l'*Agrotis molothina*, 1858, CXXXIV. — *ocellina*, *polygona*, *præcox*, *puta*, GUENÉE, 1837, 355. — *puta*, LUCAS, trouvée aux env. d'Alger, 1857, CXXXVIII. — *pyrophila*, GUENÉE,

1837, 355. — *rava*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 9. — *ravida*, *rectangula*, *renigera*, *ripæ*, GUENÉE, 1837, 355. — *ruris*, 1837, 356. — *sagitta*, *sagittifera*, 1837, 355. — *saucia*, *segetum*, 1837, 356. — *senna*, *signata*, *signifera*, *simplonia*, 1837, 355. — *simplonia*, PIERRET, 1839, XXIX. — *spini-fera*, GUENÉE, 1837, 355. — *suffusa*, 1837, 356. — *telifera*, DONZEL, 1837, 471. — *trifida*, GUENÉE, 1837, 355. — *tritici*, 1837, 356. — *id.*, COLIN, Détails sur ses mœurs, 1847, CXI. — *trux*, GUENÉE, 1837, 356. — *vallesiaca*, 1837, 355. — *valligera*, 1837, 354. — *id.*, COLIN, 1847, CXI. — *Villiersii*, GUENÉE, Descr. de cette esp. du nord de la France, 1837, 173. — *id.*, GUENÉE, 1837, 355. — *vitta*, 1837, 356.

**Alucites**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ravages des blés du département de l'Indre, 1836, XLIII. — *id.*, Prix proposé par la Société d'agriculture pour de bonnes obs. sur cet Ins., 1837, XXIV. — *id.*, HERPIN, Moyen propre à détruire les larves, 1849, XXVI. — *id.*, AMYOT, Qques détails sur cet Ins., 1850, XXXI. — *id.*, Communic. sur les moyens de s'opposer à leurs ravages, 1852, VI. — *id.*, AUBÉ, Éloge d'un mém. de M. Doyère sur l'Alucite des céréales, 1852, LXXXIII. — *xylostella*, DESJARDINS, Note sur cette esp., 1837, 229. — *id.*, DUPONCHEL, Rapport sur le mém. de M. Desjardins, 1837, 235. — *id.*, Division de la tribu des Tinéites, 1838, 137.

**Amathusia** *lutea*, *nivea*, BOISDUVAL, Obs. sur un mém. de M. Zinken-Sommer, 1832, 417.

**Amphipyra**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 114. — *cinnamomea*, BERCE, trouvée dans la forêt de Fontainebleau, 1856, LXVIII. — *spectrum*, GUENÉE, 1838, 115.

**AMPHIPYRIDES**, GUENÉE, Sur qqes nouv. genres à établir dans le genre *Noctua* de Linné, 1837, 222. — *id.*, Matériaux pour servir à la classif. des Noctuélides, 1838, 107.

**Anacampsis** *populella*, DUPONCHEL, Division de la tribu des Tinéites, 1838, 139. — *id.*, GOUREAU, Exemple de parasitisme double, 1860, XXXIII.

**Anaitis** *lithoxylata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur les Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 189. — *Magdalenaria*, Descr. d'une Géomètre nouv., 1856, 23. — *id.*, Réclamation sur la notice de M. Guillemot, 1856, LII.

**Anarta**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 59. — *algida*, LEFEBVRE, Descr. de qqes Lépid. nocturnes hyperboréens, 1836, 395. — *id.*, GUENÉE, 1841, 61. — *amissa*, LEFEBVRE, 1836, 397. — *id.*, GUENÉE, 1841, 61. — *cordigera*, Friwaldzskyi, *funebri*, *melaleuca*, *myrtilli*, *vidua*, 1841, 61. — *Zetterstedti*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. de cette esp. originaire de la Laponie, 1858, xli.

**Anchoscellis**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 483. — *agrotoides*, *hæmatidea*, *humilis*, *litura*, *nitida*, *pistacina*, 1839, 486.

**Angerona** *prunaria*, DUPONCHEL, Notice sur un Lépid. hermaphrodite, 1835, 143.

**Anthocharis**, LUCAS, Obs. sur les Lépid. de ce genre, 1850, 90. — *Ausonia*, BOISDUVAL, Identité de cette esp. avec *Belia*, 1844, LXVIII. — *id.*, FALLOU, trouvée dans la forêt de Fontainebleau, 1858, xcv. — *Belemia*, BOISDUVAL, Identité de cette esp. avec *Glauce*, 1844, LXVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Mâle pris aux env. de Morlaix, 1846, xciv. — *Belia*, BOISDUVAL, Identité de cette esp. avec *Ausonia*, 1844, LVIII. — *Belia* et *Ausonia*, PIERRET, L'opinion de M. Boisduval sur l'identité de *Belia* et d'*Ausonia* et de *Belemia* et *Glauce* aurait besoin de nouv. obs. confirmatives, 1844, LXIX. — *id.*, PARIS, d'Épernay, Note sur les habitats différents et sur les différentes époques d'apparition de ces deux esp., 1845, xxxi. — *id.*, Opinions diverses au sujet de leur identité, 1845, xxxvi. — *id.*, ABICOT, Notice sur le même sujet, 1846, xvi. — *id.*, PIERRET et DAUBE, Opinions sur leur non-identité, 1846, xvii. — *id.*, DE GRASLIN, Lettre tendant à établir qu'elles sont distinctes, 1846, LXVI. — *cardamines*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur un cas d'hermaphrodisme, 1852, 325. — *id.*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiii. — *Charlonia*, DONZEL, Descr. de deux Lépid. nouv. de Barbarie, 1842, 197. — *Damone*, FEISTHAMEL, Notice sur trois Lépid. nouv., 1837, 301. — *id.*, PIERRET, reçu la ♀ de la Turquie ou de la Grèce; 1844, LVII. — *id.*, les deux sexes sont reconnus identiques avec l'esp. de M. Feisthamel, 1844, LXIV. — *Doüei*, Descr. et fig. d'une nouv. esp., 1836, 367. — *gallo-algirus*, BARTHELEMY, Lecture de sa descr., 1836, vi. — *id.*, identique avec la *Doüei* de M. Pierret, dont la Société adopte le nom, 1836, vi. — *id.*, LEFEBVRE, L'auteur ne la regarde que comme une var. d'*Eupheno*, 1836, vi. — *Glauce*, BOISDUVAL, Identité de cette esp. avec *Belemia*, 1844, XLVIII. — *id.*, PIERRET, Cette identité a encore besoin de nouv. obs. pour être

admise, 1844, XLVIII. — *lanceolata*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 284. — *Levaillantii*, LUCAS, Descr. de cette esp. trouvée aux env. d'Alger, 1847, XLIX. — *id.*, Communic. de deux indiv. en parfait état, 1848, LXIV. — *id.*, Obs. sur les Lépid. du genre *Anthocharis*, 1850, 92. — *Sara*, BOISDUVAL, 1852, 285. — *Simplonia*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, ♀ éclosée de chenille élevée dans les Basses-Alpes, 1858, XC.

**Anthophlia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 223. — *flavida*, Kindermanni, 1841, 224. — *obliterata*, RAMBUR, Lépid. de Corse, 1833, 27. — *vespertina*, GUENÉE, 1841, 224.

**Apamea**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 333. — *aquila*, DONZEL, Descr. de cinq esp. des Noctuéliques, 1837, 476. — *captiuncula*, *didyma*, GUENÉE, Classif. des Noctuéliques, 1837, 335. — *Dumerilii*, 1837, 336. — *expolita*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Esp. découvertes en Angleterre, 1856, LIII. — *furuncula*, *gemina*, GUENÉE, 1837, 335. — *Haworthii*, DE GRASLIN, Exploration dans la France occidentale, 1848, 58. — *imbecilla*, GUENÉE, 1837, 335. — *infesta*, 1837, 336. — *latruncula*, *nictitans*, 1837, 335. — *oculea*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Descr. de var. de Lépid., 1858, 704. — *ophiogramma*, GUENÉE, 1837, 335. — *rubeuncula*, DONZEL, Descr. de trois nouv. esp. de Lépid., 1838, 430. — *suffuruncula*, GUENÉE, 1837, 335. — *testacea*, 1837, 336. — *unanimis*, 1837, 335.

**Apatura** *bolina*, Gambrisius, *Sylvia*, BOISDUVAL, Obs. sur un mém. de M. Zinker-Sommer, 1832, 420.

**Aplecta**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 217. — *advena*, *clandestina*, 1838, 219. — *empyrea*, 1838, 220. — *herbida*, 1838, 219. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Éclosion précoce, 1846, XL. — *jodea*, *lucipara*, GUENÉE, 1838, 220. — *nebulosa*, *occulta*, *serratilinea*, *tincta*, 1838, 219.

**Aporodes** *siculalis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 697.

**Apocheima** *flabellaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 699.

**Arotia** *caja*, LEFEBVRE, Poils de chenille dans l'estomac d'un Coucou, 1834, LXV. — *fuliginosa*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 322. — *id.*, LUCAS, Communic. relative à ce Lépid., 1857, XIX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 687. —

*lubricipeda*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXVII. — *urticæ*, recueillie aux environs de Paris, 1848, LXII. — *vagans*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 322.

**Arctonotus** *lucidus*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 319.

**Arge**, LEFEBVRE, M. Géné n'en a rencontré aucun en Sardaigne, 1835, LXXXVII. — *Astanda*, BOISDUVAL, Même esp. que *Herta*, de Dalmatie, 1848, XXIX. — *Atropos*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 677. — *Galathea*, PIERRET, Pris à Lardy deux indiv. de la var. *leucomelas*, 1847, LXXXI. — *id.*, FALLOU, Aberration de cette esp. prise à Auch, 1858, XLI. — *Pherusa*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 677. — *plesaura*, 1860, 678. — *Titea*, Note sur cette esp., 1855, XIII. — *xenia*, BOISDUVAL, C'est un *Clotho*, plus noir que ceux de la Russie centrale, 1848, XXIX.

**Argus** *Abenceragus*, PIERRET, Descr. de trois nouv. esp. de Lépid., 1837, 21. — *id.*, l'auteur reconnaît qu'elle n'est qu'une var. locale d'*Hylas*, 1839, XLIII. — *Alexis*, *Escheiri*, LEFEBVRE, Descr. d'un indiv. hermaphrodite, 1835, 145. — *id.*, DAUBE, Diverses var. accidentelles, 1836, XXIV.

**Argynnis** *Adippe*, BOISDUVAL, rencontrée sur le sommet des Pyrénées, 1852, LX. — *Adippe*, *Aglaia*, GIRARD, ont paru également dans le département de Seine-et-Marne de 1854 à 1859, 1859, CCXXI. — *Astarte*, Lépid. de la Californie, 1852, 303. — *Callippe*, 1852, 302. — *Cleodora*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 675. — *Euphrosine*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. prise dans les bois de Meudon, 1857, LXI. — *Ino*, BOISDUVAL, 1852, XXXIV. — *id.*, trouvée à Compiègne, 1852, XXXVII. — *Niobe*, LEFEBVRE, Belle var. communiquée par M. Becker, 1836, XXIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Descr. et fig. de var. de Lépid., 1858, 703. — *ocellata*, GUENÉE, trouvée près de Beyrouth, 1856, CXI. — *Pales*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 187. — *Paphia*, WESMALL, Notice sur un Lépid. hermaphrodite, 1837, LXIII. — *id.*, PIERRET, Accouplement avec le *Satyrus Janira*, 1838, LIV. — *id.*, Même obs. faite par M. Bagriot, 1838, LIV. — *id.*, Même obs., 1844, VI. — *id.*, GIRARD, a paru par milliers en 1854, devenue moins commune depuis, 1859, CCXXI. — *Selene*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Variété remarquable, 1852,

- LXXIII. — *selenis*, LEFEBVRE, Descr. de cette esp., 1837, 15. — *Zerene*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 303.
- Argyresthia** *cyaneimarmorella*, MILLIÈRE, Descr. de nouv. esp. de Microlépidoptères, 1854, 64.
- Argyrolepia** *Hartmanniana*, DUPONCHEL, Division de la tribu des Platyomides, 1834, 448.
- Argyroptera** *Gouana*, DUPONCHEL, Div. de la tribu des Platyomides, 1834, 448.
- Asopia** *farinalis*, AUDOUIN, Chenilles présumées de cette esp. trouvées dans des farines, 1836, LXIII.
- Aspidia** *solandriana*, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 444.
- Aspilates** *calabraria*, MARTIN, Var. remarquable de cette esp., 1857, CVI. — *gloriosaria*, trouvée dans les env. de Bordeaux, 1857, CLI.
- Attacus** *Cynthia*, LUCAS, Éclosion des œufs, obs. sur ses mœurs, 1854, LXVII. — *Luna*, Chenilles nées au laboratoire d'entomologie, 1851, LXXVII. — *Prometheus*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Obs. sur son éducation, 1858, CLXXXIV.

## B.

- Bearmia** *consortaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *ilicaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée en automne au bois de Boulogne, 1851, xvii. — *id.*, trouvée aux env. de Paris, 1852, LIX. — *Solieraria*, RAMBUR, Descr. de plusieurs esp. du centre et du midi de la France, 1834, 390.
- Bombyx** (voyez *Saturnia*), AUDOUIN, Longue mèche de soie provenant de la coque d'une esp. des Indes, 1833, LXXVI. — *id.*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, grande esp. prise à Nossi-Bé (Madagascar), 1846, CIV. — *id.*, SALLÉ, superbe esp. nouv. du Mexique, 1852, LXVI. — *id.*, BOISDUVAL, Qques mots sur deux Bombyx de l'Inde produisant de la soie, 1854, 755. — *id.*, GUÉNÉE, Notice monogr. sur les esp. européennes du groupe des *Quercus*, 1858, 435. — *id.*, VILLENEUVE, Plusieurs che-

nilles d'Algérie envoyées par M. Poupillier, 1858, xxxii. — *Arrindia*; GUÉRIN-MÉNEVILLE, Esp. distincte du *Bombyx Cynthia*, 1858, clxvii. — *aurata*, Cocons rapportés du Paraguay, 1855, cviii. — *callunæ*, DELAMAIN, Chenilles vivantes, observ., 1857, cli. — *id.*, GUENÉE, 1858, 442. — *Carmelita*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, pris dans la forêt de Bondy, 1847, xliii. — *carpini*, VILLENEUVE, élevé avec des feuilles d'osier, 1858, clxvi. — *castrensis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur une variété, 1851, 101. — *id.*, BOISDUVAL, Communic. d'un mém. de M. Malapert sur ses mœurs, 1851, xc. — *catax*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenille soufflée prise dans la forêt de Saint-Germain, 1847, lxiii. — *Cecropia*, BECKER, Grand Ichneumon sorti du corps de ce Bombyx, 1846, xxxvi. — *id.*, LUCAS, Qques nouv. détails sur cette esp., 1846, xxxvii. — *id.*, Nouv. note sur son éducation, 1846, lxii. — *id.*, MILLIÈRE, Notice sur cette esp., 1852, lxiv. — *id.*, BOISDUVAL, M. Sommer, d'Altona, en a élevé les chenilles, 1852, lxvi. — *id.*, du chêne, BOUDIER, Obs. sur les larves d'Ichneumon vivant aux dépens de sa chenille, 1836, 357. — *chrysorrhea*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Dégâts causés au bois de Boulogne, 1852, xxxv. — *id.*, Mêmes dégâts dans les bois de Saint-Germain, 1852, xxxviii. — *Cynthia*, LEFEBVRE, Projet d'un voyage pour rapporter cette esp. en France, 1848, x. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques détails sur cette esp. et sur les travaux de l'auteur, 1854, xxvii. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. sur ce Bombyx, 1854, xxviii. — *id.*, LUCAS, Communic. sur les chenilles élevées au Muséum, 1854, xlv. — *id.*, Extrait d'une note de M. Milne-Edwards sur l'éducation et la soie de ce Lépid., 1854, lix. — *id.*, BOISDUVAL, Lecture d'une notice sur cette esp. (*Saturnia ricini*), 1854, lxix. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. détails sur son éducation, 1856, xlvii. — *id.*, Deux esp. confondues sous ce nom, 1857, xcvi. — *id.*, Détails sur ce Ver à soie, 1858, cli. — *id.*, Rem. sur l'éducation de cette esp., 1858, clxxxiii. — *id.*, Tentative de croisement avec le *Bombyx Arrindia*, 1858, cxci. — *id.*, Observ. sur cette esp., 1858, cxci. — *cocles*, GUENÉE, 1858, 452. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 688. — *Diego*, COQUEREL, Obs. sur divers indiv. de Madag., 1855, 532. — *dispar*, DEJEAN, Obs. sur l'inefficacité des moyens pour détruire les Ins., 1839, xli. — *Everia*, PIERRET, Obs. sur des cocons bisexuels de cette esp., 1845, lxxxii. — *id.*, RONSIN, Deux chrysalides trouvées dans une même coque, 1846, xxvi. — *Eversmanni*, GUENÉE, 1858, 456. — *iberica*, 1858, 453. — *hybride*,



BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. du produit de l'accouplement du *Bombyx pyri* et *spini*, 1860, xciv. — *lanestris*, BOISDUVAL, Chrysalide ayant vécu sept ans avant d'éclore, 1844, lxx. — *id.*, BECKER, Sa chrysalide peut vivre encore plus de sept ans en cet état, 1846, xl. — *id.*, PIERRET, Explication de ces éclosions tardives, 1846, xl. — *id.*, Bombyx de Madagascar, COQUEREL, Obs. sur divers Ins. recueillis à Madagascar, 1855, 529. — *Melitta*, BOISDUVAL, Qques mots sur la soie produite par ce Bombyx, 1853, xxxi. — *mori*, LUCAS, Obs. sur des cocons bisexuels de Vers à soie, 1845, lxxxli. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques faits d'entomologie appliquée relatifs à l'industrie séricicole, 1857, xcvi. — *id.*, Communic. sur son éducation en Chine, 1858, clxxiv. — *Mylitta*, Détails sur les travaux de l'auteur relatifs aux Vers à soie, 1855, lxviii. — *id.*, Note relative à l'éducation tentée par l'auteur, 1855, lxxxix. — *id.*, Nouvelles des progrès de l'éducation de cette esp., 1855, xcvi. — *id.*, Communic. d'une chenille encore vivante qui n'a pu se métamorphoser, 1855, cviii. — *id.*, Deuxième génération obtenue à Paris et à Lausanne, 1856, ci. — *Panda*, COQUEREL, 1855, 532. — *Paphia*, LABOULBÈNE, Note sur le cocon de cette esp., 1852, 535. — *Pernyi*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Considérations sur le Ver à soie du chêne, 1855, lv. — *id.*, BECKER, Trois œufs seulement ont donné de petites chenilles, 1855, lxvi. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques mots sur cette esp. du nord de la Chine, 1855, lxviii. — *philopalus*, DONZEL, Descr. de deux Lépid. nouv. de Barbarie, 1842, 198. — *pini*, PIERRET, Hommage à la Société d'un peloton de fil de ce Bombyx, 1842, xxvii. — *id.*, BAGRIOT, L'auteur en a élevé plusieurs chenilles près de Paris, 1849, lv. — *id.*, Note sur une ponte élevée en domesticité à Vaugirard, 1849, 455. — *pityocampa*, DE VILLIERS, Obs. sur cette esp., 1832, 201. — *id.*, DE SAPORTA, Notice sur cette esp., 1834, 191. — *id.*, LUCAS, Note sur les nids de cette esp., 1853, x. — *populi*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de la Sicile, 1860, 687. — *id.*, Communic. d'un indiv. de Sicile différent de celui des env. de Paris, 1860, vi. — *Promethæus*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouvelles des éducations de cette esp., 1858, clxviii. — *psidii*, SALLÉ, Note sur la soie sauvage du Mexique et descr. de l'Ins. qui la produit, 1857, 15. — *quercus*, BECKER, suivant M. Doubleday, les Lépid. montrés par l'auteur constituent une esp. distincte du *Bombyx quercus*, 1854, vi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur deux indiv. ♀ de cette esp., 1858, lxxxii. — *id.*, GUÉNÉE, 1858, 439. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Rectif.

topographique sur le sexe des indiv. présentés, 1858, CLXXXIII. — *Radama*, COQUEREL, 1855, 530. — *Ratamæ*, GUENÉE, 1858, 455. — *ricini*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques faits d'entomologie appliquée, 1856, VI. — *rubi*, LEFEBVRE, Faculté qu'a la chenille de se métamorphoser après avoir été entièrement gelée, 1834, XXIII. — *id.*, MONTEL, Moyens de conserver la chenille pendant l'hiver, 1834, LXVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chalcidites sortis des œufs de ce Bombyx, 1852, LXXII. — *serrata*, GUENÉE, 1858, 454. — *spartii*, 1858, 441. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 688. — *id.*, Communic. de deux grands Ichneumons éclos de chenilles de cette esp., 1860, LXXXIX. — *Tau*, PIERRET, pris le 8 avril dans la forêt de Saint-Germain, 1846, XL. — *Terrenti*, GUENÉE, 1858, 456. — *trifolii*, 1858, 449. — *versicolor*, PIERRET, Mention d'un Lépid. hermaphrodite, 1838, XXXII. — *id.*, BOISDUVAL, Anomalie plus singulière encore, 1838, XXXII.

**Botys costalis** (du *Cobæa*), DOUMERC, Envoi d'une notice sur les mœurs de cette esp., 1860, VIII. — *hybridæ*, BUREAU, sa réunion avec *Plusia gamma* dans des localités différentes, 1855, XVI. — *trinalis*, *verticalis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 698.

**Brophos notha**, *Parthenias*, GUENÉE, Classif. des Noctuéliques, 1841, 219. — *Parthenias*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Descr. de var. de Lépid., 1858, 705. — *puella*, GUENÉE, 1841, 219.

**BRYOPHAGIDI**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 322.

**Briophyla**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 324. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de plusieurs chenilles de ce genre, 1857, LXXIV. — *Algæ*, GUÉRIN, Branche de mûrier dans laquelle a vécu la chenille, 1836, XLVI. — *id.*, GUENÉE, Note sur les mœurs de cette esp., 1837, 123. — *id.*, Elle est identique avec *receptricula*, 1837, 124. — *id.*, Noctuéliques, 1837, 325. — *anomala*, *deceptricula*, 1837, 326. — *creptricula*, 1837, 325. — *fraudatricula*, *furvula*, 1833, 326. — *Germainii*, DUPONCHEL, Notice sur deux nouv. esp. de Noctuéliques, 1835, 194. — *glandifera*, GUENÉE, 1835, 825. — *lupula*, Qques chenilles des env. de Chateaudun, 1834, 197. — *perla*, 1834, 195. — *id.*, Rectif. relative à la chenille de cette esp., 1836, XLVII. — *id.*, Noctuéliques, 1837, 325. — *raptracula*, Rectif. relative à la chenille de cette esp., 1836, XLVII. — *id.*, Noctuéliques, 1837, 326. — *receptricula*, Identique avec *Algæ*, 1837, 124.

**Butalis cuspidella**, DUPONCHEL, Tribu des Tinéides, 1838, 144.

## C.

- Cabera Graellsiaria**, FEISTHAMEL, Descr. de trois Lépid. nouv., 1835, 134. — *pusaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv.
- Callimorpha dominula**, COSTA, Note sur *dominula* et *donna*, 1842, 239. — *id.*, DUPONCHEL, Les chenilles forment une coque commune, 1845, lxxxii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE et BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxvii. — *id.*, LUCAS, Var. remarquable, 1854, xl. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques mots sur la var. indiquée par M. Lucas, 1854, xliii. — *id.*, RATTET, Belle var. à ailes jaunes éclore à Paris, 1855, lxviii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. obtenue de chenilles à Paris, 1857, cxxxi. — *id.*, VILLENEUVE, Chenilles écloses à la suite d'un accouplement opéré le soir à la lumière, 1858, cxiv et cli. — *id.*, Rectif. de la page cli, 1858, ccxxvi. — *donna*, COSTA, 1842, 239.
- Callithea Leprieuri**, FEISTHAMEL, Mention de la descr. de cette esp., 1834, lxvii. — *id.*, Erratum de l'article qui précède, 1835, xxxi.
- Calocampa**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 505. — *cxoleta*, *vetusta*, 1839, 507.
- Calophasia platyptera**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 694.
- Calpe**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 70. — *thalictri*, 1841, 71.
- CALPIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 69.
- Campotogramma gemmata**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomologique de la Sicile, 1860, 704.
- Caradrina**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 343. — *alsines*, 1837, 345. — *aspersa*, RAMBUR, Esp. nocturnes du centre et du midi de la France, 1834, 385. — *aspersa*, *bilinea*, *blanda*, *cubicularis*, *Duponchelii*, *exigua*, *fuscicornis*, GUENÉE, 1837, 345. — *fuscicornis*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1832, 286. — *laciniosa*, DONZEL, Descr. de Lépid.

NOUV., 1847, 529. — *lenta*, *lurida*, *Morpheus*, *palustris*, *plantaginis*, GUENÉE, 1837, 345. — *pygmaea*, RAMBER, Esp. nocturnes du centre et du midi de la France, 1834, 384. — *pygmaea*, *respersa*, GUENÉE, 1837, 345. — *respersa*, BRICAND, Notice sur diverses chenilles, 1844, 194. — *stagnicola*, *trilinea*, GUENÉE, 1837, 345.

**Carpocapsa** *amplana*, GUENÉE, Notice sur trois Lépid. nocturnes, 1843, XL. — *Dehaisiana*, LUCAS, Note sur cette esp., 1858, XLI. — *id.*, Note sur les mouvements que la chenille imprime aux graines dans lesquelles elle se métamorphose, 1859, 560. — *Pomonana*, DUPONCHEL, Tribu des Platyomides, 1834, 446. — *id.*, GOREAU, Chenilles nuisibles aux pommiers, 1852, LXXXI.

**Castnia**, BOISDUVAL, Note de MM. Bar, de Cayenne, et obs. sur ce genre, 1852, LIII. — *Beskei*, LUCAS, identique avec la *C. Boisduvalii*, 1858, CXLIX. — *Langsdorffii*, identique avec la *C. Zerinthia*, 1858, CXLIX. — *umbrata*, identique avec la *C. Orestes*, 1858, CXLIX.

**Catagramma** *Bourciera*, *Humboldtii*, *micographa*, *nyctographa*, BECKER, Lépid. découverts à Quito, 1851, XXIII.

**Catephia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 80. — *alchymista*, *leucomelas*, 1841, 81. — *Ramburii*, 1841, 80.

**Catocala**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 81. — *callinympha*, *conjuncta*, *conversa*, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 83. — *conversa*, LUCAS, Elle habite l'est de nos provinces africaines, 1852, XXIV. — *dilecta*, *disjuncta*, *diversa*, *electa*, GUENÉE, 1841, 83. — *electa*, MILLIÈRE, Note sur une var. de cette esp., 1855, 205. — *id.*, Errata de la note sur une var. de cette esp., 1855, LXXXIV. — *elocata*, GUENÉE, 1841, 83. — *id.*, LUCAS, rencontrée aux env. de Tanger, 1857, XI. — *eutychea*, *fraxini*, GUENÉE, 1841, 83. — *fraxini*, AZAMBRE, Rem. physiologiques sur les chenilles, 1855, CVIII. — *hymenea*, *neonympha*, *nupta*, *nymphogoga*, *optata*, *pacta*, *paranympha*, *pellea*, *promissa*, *sponsa*, *vestalis*, GUENÉE, 1841, 83.

**CATOCALIDI**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 78.

**Catoptria** *carduana*, GOREAU, Ins. du chardon penché, 1845, 76.

**Caulobius** *sparganiellus*, DUPONCHEL, Tribu des Tinéites, 1838, 134.

**Cephalispheira** *æreinitidella*, MILLIÈRE, Descr. de nouv. esp. de Microlépid., 1854, 60.

- Cerastis**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 494. — *id.*, VILLIERS, Obs. sur les mœurs de diverses esp. de ce genre, 1842, XI. — *Buxi, erythrocephala, intricata, raticilla, Silene, spadicea, vaccinii*, GUENÉE, 1839, 497. — *vaccinti*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenille trouvée à Compiègne, 1852, XXXVII.
- Cerigo**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 363. — *Cytherea, prospicua*, 1837, 365.
- Cerocala**, LUCAS, Obs. sur les esp. de ce genre, 1850, 102. — *scapulosa*, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 73.
- Ceropacha**, GUENÉE, 1837, 314. — *bipuncta, diluta, flavicornis, fluctuosa, octogesima, or, ridens, ruficollis*, 1837, 315.
- Charaxes Boueti**, FEISTHAMEL, Lépid. de la Cazamance, 1850, 261. — *Delphis*, DOUBLEDAY, Deux nouv. esp. des Indes or., 1843, 217. — *Ephyra*, FEISTHAMEL, 1850, 258. — *epijasius*, 1850, 257. — *Eudamippus*, DOUBLEDAY, 1843, 218. — *Horatius*, FEISTHAMEL, 1850, 259. — *Jasius*, DUPONCHEL, Note sur les changements de peau de la chenille, 1837, 193. — *id.*, Chenilles élevées en domesticité, 1837, XLIX. — *id.*, PIERRET, Épidémie qui a frappé les chenilles de cette esp., 1846, LII. — *id.*, Reçu d'Hyères une vingtaine de chenilles, 1849, XLI. — *Pollux*, FEISTHAMEL, 1850, 255. — *Protopilea*, 1850, 260.
- Charentis dolosana**, P. MILLIÈRE, Métamorphoses de cette espèce, 1856, 39.
- Chariclea**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 521. — *Delphinii*, 1839, 522.
- Charidea fastuosa**, LUCAS, Identique avec l'*Euchromia jucunda*. 1858, CL.
- Chariptera**, GUENÉE, Matériaux pour la classific. des Noctuéliques, 1838, 124. — *aprilina, culta, gemmea, serpentina*, 1838, 125.
- Chauliodes Illigerellus**, DUPONCHEL, Tribu des Tinéites, 1838, 136. — *ochreomaculella*, MILLIÈRE, Nouv. esp. de Microlépid., 1854, 63.
- Cheimonophila gelatella**, DUPONCHEL, Tribu des Tinéites, 1838, 131.
- Chelaria conscriptella**, DUPONCHEL, Tribu des Tinéites, 1838, 142.
- Chelonia**, BECKER, Esp. nouv. rencontrée dans le Musée de Barcelone, 1850, XXV. — *alero*, LUCAS, Communic. de plusieurs indiv. et obs., 1858, CXVI. — *caja*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 321. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. provenant de chenille

trouvée et élevée à Paris, 1855, xciv. — *id.*, Var. remarquable provenant des Basses-Alpes, 1858, ccxvi. — *Dahurica*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 321. — *flavia*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de ce Lépid. excessivement rare, 1858, xvii. — *Hebe*, DAUBE, Var. accidentelle, 1836, xxiii. — *hemigena*, DE GRASLIN, Qques Lépid. nouv. des Pyrénées or., 1850, 402. — *Latreillei*, FEISTHAMEL, ♀ obtenue de chenille, 1834, xli. — *id.*, GRASLIN, Notice sur ses métamorphoses, 1843, 359. — *maculosa*, PIERRET, découverte aux env. de Rouen, 1840, iv. — *matronula*, DEMARY, prise aux env. de Grenoble, 1840, iv. — *id.*, PIERRET, prise aux env. de Nancy, 1850, iv. — *purpurea*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. de Lépid., 1858, 706. — *id.*, Var. remarquable des Basses-Alpes, 1858, ccxvi. — *id.*, Dépôt de la descr. et du dessin de cette var., 1858, ccxix. — *Quenseli*, Communic. de plusieurs indiv. et de la chenille préparée, 1858, v. — *villica*, Var. communiquée à la Société, 1856, liii. — *id.*, Var. *Konerikai*, Lépid. de Sicile, 1860, 686. — *id.*, Var., 1860, 687. — *virginalis*, BOISDUVAL, 1852, 321. — *Zoraida*, DE GRASLIN, Notice sur une exploration en Andalousie, 1836, 561.

**Chersotis erythrina**, MARTIN, trouvée dans les env. de Bordeaux, 1857, cli.

**Chesias gencata**, FEISTHAMEL, Descr. de trois Lépid. nouv., 1835, 131. — *ulicata*, RAMBUR, Descr. de plusieurs esp. du centre et du midi de la France, 1834, 394.

**Chilo carnifex**, COQUEREL, Divers Ins. de Madagascar, 1855, 534. — *phragmitellus*, BRUAND, Notice sur diverses chenilles, 1844, 187.

**Chimera funebris**, FEISTHAMEL, 1833, 259.

**Choreutes dolosana**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lecture de l'hist. de cet Ins. par M. Millièrre, 1856, xxvii.

**Chrysia leucochrysella**, MILLIÈRE, Nouv. esp. de Microlépidopt., 1854, 61.

**Chrysoptera deaurata**, PIERRET, reçue des Alpes de la Savoie, 1842, liv.

**Chymatophora**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 315. — *Oo, viminalis*, 1837, 316.

**Cidaria clutaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 10. — *malvata*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse,

1833, 43. — *munitaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1857, 11. — *propugnaria*, 1857, 9. — *russaria*, 1857, 10. — *variaria*, BERCE, Chenille trouvée aux env. de Paris, 1856, LXVII. — *id.*, Réponse à la note de M. Bruand, 1857, XXIII. — *variata*, BRUAND, Note sur les époques de son apparition, 1857, XXII.

**Cigaritis**, LUCAS, Obs. sur les Lépid. de ce genre, 1850, 96. — *Massinissa*, Individ. récolté dans le Djebel-Amour, 1847, CIX. — *id.*, Autre indiv. en parfait état, 1848, LXIV. — *id.*, Obs. sur les Lépid. de ce genre, 1850, 99. — *Zohra*, DONZEL, Lépid. nouv., 1847, 528.

**Cirœdia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 489. — *xerampelina*, 1839, 490.

**Cledeobia netricalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 696.

**Cleogene illibaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails au sujet de cette esp., 1856, XLVIII.

**Cleophana**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 515. — *id.*, Note sur la conformation du front dans plusieurs esp., et sur les divisions de ce genre, 1850, 233. — *anarrhini*, Noctuéliques, 1839, 521. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée en Touraine, 1858, XII. — *antirrhini*, GUENÉE, 1839, 521. — *Cyclopea*, DE GRASLIN, Exploration en Andalousie, 1836, 570. — *Cyclopea, cymbalariae*, GUENÉE, 1839, 521. — *cymbalariae*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1858, XII. — *Dejeanii*, GUENÉE, 1839, 521. — *Ferricri*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Noctuelle nouv., 1857, 13. — *id.*, Nouv. exemplaire de cette esp., 1858, XII. — *Lauteti, linariae, opalina, platyptera*, GUENÉE, 1839, 521. — *platyptera*, PIERRET, Pattes revêtues d'une végétation cryptogamique, 1840, XX. — *serrata*, FEISTHAMEL, Trois Lépid. nouv., 1837, 299. — *id.*, GUENÉE, 1839, 521. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de la Sicile, 1860, 693. — *Yvanii*, GUENÉE, 1839, 521.

**Cleantha**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 509. — *australis, conspicillaris, hyperici, perspicillaris, pinastri, radiata*, une esp. nouv., 1839, 512. — *radiata*, DONZEL, trouvée dans les forêts, 1842, XLII. — *solidaginis*, GUENÉE, 1839, 512.

**Clostera reclusa**, LUCAS, Var. rencontrée dans l'Afrique tingitanienne, 1857, XXXIV.

**Cnethocampa pytiocampa**, LUCAS, Communic. sur celles recueillies en Algérie, 1860, XIX.

**Cocci** *Turionana*, DUPONCHEL, *Platyomides*, 1834, 445.

**Cochylis** *citrana*, DUPONCHEL, *Platyomides*, 1834, 448. — *hilarana*, PERRIS, *Métam.* de cette esp., 1856, 33. — *roserana*, LABOULBÈNE, Chenilles prises sur des ceps de vigne à Villefranche, 1857, xc.

**Coleophora**, BRUAND, Chenille trouvée autour de Besançon, 1854, xxvii. — *id.*, Qques détails sur ce genre, 1857, lxviii. — *id.*, Essai monographique sur ce genre, 1859, 375. — *adelogramella*, 1859, 402. — *albigrisella*, 1859, 384. — *albitarsella*, 1859, 403. — *argentipennella*, 1859, 411. — *ballotella*, 1859, 395. — *balloticolella*, 1859, 393. — *Binderiella*, 1859, 397. — *conspicuellla*, 1859, 405. — *coracipennella*, 1859, 379. — *griscireticulatella*, 1859, 391. — *limosella*, 1859, 381. — *limosipennella*, 1859, 382. — *lineariella*, 1859, 390. — *parmeliella*, 1859, 391. — *scorodoniella*, 1859, 408. — *semilineariella*, 1859, 388. — *solitariella*, 1859, 399. — *troglydytella*, 1859, 385. — *vibicella*, 1859, 407. — *vulnerariella*, 1859, 402.

**COLIADES**, BOISDUVAL, *Nouv. caractères spécifiques dans qques esp. de ce groupe*, 1836, x.

**Collas** *amphidusa*, BOISDUVAL, *Lépid. de la Californie*, 1852, 286. — *Aurora*, Est une var. plus grande que l'*edusa* de l'Europe centrale, 1848, xxix. — *edusa*, LUCAS, *Indiv. dont l'une des ailes est plus petite que sa correspondante*, 1851, cxi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, *Obs. sur la communic. de M. Lucas*, 1851, cxii. — *id.*, GIRARD, Très-abondante en 1859 dans le département de Seine-et-Marne, 1859, ccxx. — *Eurytheme*, BOISDUVAL, 1852, 286. — *Hecla*, LEFEBVRE, *Descr. d'une nouv. esp.*, 1836, 383. — *Helice*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, *Lépid. de Sicile*, 1860, 675. — *Hyale*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, *Var. remarquable*, 1852, lxxiii. — *id.*, GIRARD, également commune de 1854 à 1859 en Seine-et-Marne, 1859, ccxx.

**Coremia** *Pontissalaria*, BRUAND, *Descr. de Lépid. nouv.*, 1846, 204.

**Cosmia**, GUENÉE, *Noctuélides*, 1837, 318. — *affinis*, *diffinis*, *pyralina*, 1837, 320.

**Cossus** *ligniperda*, DUPONCHEL, *Larve s'étant nourrie de l'abdomen d'un Bombyx quercus*, 1836, iv. — *id.*, PIERRET, *Pimpla sortie de la chrysalide de ce Cossus*, 1846, xxviii. — *id.*, AZAMBRE, *Chenilles recueillies sur les chênes-lièges de l'Italie*, 1856, vii. — *id.*, BELLIER DE LA



CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 689. — *robinia*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 323.

**Crambus**, GUENÉE, Réclam. de priorité contre M. Herrich-Schæffer, 1856, XLVIII. — *malacellus*, GHILIANI, Qques faits sur la géographie entomolog. de cet Ins., 1851, XCVIII. — *pedriolellus*, GUENÉE, Notice sur trois Lépid. nocturnes, 1843, XL.

**Crocallia æstivaria**, BECKER, Dessin de la chenille prise à Wied-Baden, 1852, XXVI.

**Crocallis**, *Dardoinaria*, DONZEL, Descr. de cette nouv. Phalène, 1840, 59. — *Lentiscaria*, Crocalle du Lentisque, 1837, 13.

**Cucullia**, GUENÉE, Noctuéides, 1839, 507. — *id.*, RAMBUR, Catal. des Lépid. de l'île de Corse, 1833, 5. — *abrotani*, *absinthii*, *argentina*, *argyrea*, *artemisia*, *asteris*, *blattaria*, GUENÉE, 1839, 509. — *blattaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 691. — *calendulæ*, 1860, 692. — *canina*, RAMBUR, 1833, 19. — *id.*, GUENÉE, 1839, 509. — *id.*, ABICOT, La var. *blattaria* se nourrit de *Scrophularia canina*, 1845, XII. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. sur la communic. de M. Abicot, 1845, XIII. — *cantomillæ*, *chrysanthemi*, *dracunculi*, *gnaphalii*, *lactea*, *lactucæ*, GUENÉE, 1839, 509. — *lactucæ*, *lucifuga*, RAMBUR, Rectific. sur les chenilles de cette esp., 1834, 179. — *lucifuga*, *lychnitis*, GUENÉE, 1839, 509. — *lychnitis*, RAMBUR, Catal. des Lépid. de l'île de Corse, 1833, 17. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 691. — *santolina*, RAMBUR, Descr. d'esp. nocturnes du centre et du midi de la France, 1834, 387. — *santolina*, *santonici*, GUENÉE, 1839, 509. — *scoparia*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de cette esp. récemment découverte en Autriche, 1856, XXIV. — *scrophularia*, RAMBUR, Catal. des Lépid. de l'île de Corse, 1833, 14. — *id.*, LEPELETIER DE SAINT-FARCEAU, Chenilles se dévorant entr'elles, 1834, XI. — *id.*, GUENÉE, 1839, 509. — *id.*, PARIS, d'Epernay, Note sur les mœurs de la chenille, 1858, CLXXII. — *scrophulariphaga*, RAMBUR, 1833, 20. — *spectabilis*, *tanaceti*, *thapsiphaga*, GUENÉE, 1839, 509. — *thapsiphaga*, RAMBUR, 1833, 22. — *umbratica*, Rectific. d'une erreur à l'égard des chenilles, 1834, 179. — *umbratica*, *verbasci*, Deux nouv. esp. ? GUENÉE, 1839, 509.

**Cyllo sepulta**, DUPONCHEL, Annonce de l'existence d'une impression de Lépid. fossile trouvée dans une plâtrière des env. d'Aix, 1838,

LI. — *id.*, Réponse négative à la demande de l'envoi de la pierre portant cette empreinte, 1839, v. — *id.*, AUDOUIN, Dessin de cette empreinte envoyé par M. de Fonscolombe, 1839, VII. — *id.*, BOISDUVAL, Rapport sur le dessin envoyé par M. de Fonscolombe, 1839, XI. — *id.*, DE SAPORTA, Avis de l'envoi de l'empreinte elle-même à M. Duponchel, 1839, XVI. — *id.*, DUPONCHEL, Communic. à la Société de cette empreinte, 1839, XVI. — *id.*, BOISDUVAL, Proposition de faire imprimer le dessin de cette empreinte, 1839, XXII. — *id.*, Rapport sur l'empreinte elle-même, 1840, 371. — *id.*, LEFEBVRE, Obs. relative à cette empreinte, 1851, 71. — *id.*, BOISDUVAL, Qques mots de réplique aux obs. de M. Lefebvre, 1851, XCVI. — *id.*, LEFEBVRE, Erratum du mém. sur ce Lépid. fossile, 1851, CXVI.

## D.

**Danais archippus**, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 300. — *Claudia*, Obs. sur un mém. de M. Zenken-Sommer, 1832, 420.

**Dasycampa**, GUENÉE, Note sur qqes nouv. genres à établir, 1837, 224. — *id.*, Noctuélides, 1837, 497. — *rubiginea*, 1837, 225, et 1839, 499.

**Dasycera æmulcella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 144.

**Deilephila Alecto**, RONSIN, Bel indiv. trouvé à Constantinople, 1846, XXVII. — *id.*, PIERRET, Cette esp. a été considérée longtemps comme exotique, 1846, XXVII. — *Boisduvalii*, BUGNION, Note sur cette esp., 1839, 115. — *celerio*, PIERRET, trouvé aux env. de Paris, 1846, LXXXVI. — *id.*, pris en grand nombre dans plusieurs jardins à Clermont-Ferrand, 1846, XCI. — *celerio* et *nerii*, BRUAND, Note sur ces deux esp. et leurs parasites, 1847, LIV. — *cretica*, BUGNION, Note sur cette esp., 1839, 113. — *Dahlia*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1832, 266. — *id.*, PIERRET, Effets d'un orage sur les chenilles et les chrysalides, 1842, XXXVIII. — *id.*, Chenille vivante, et causes présumées de la mort de toutes les autres, 1842, LXIV. — *id.*, Détails sur une belle variété nouvellement obtenue, 1847, LXXII. — *Elpenor*, DE ROMAND,

Indiv. retenu par la trompe dans la corolle d'une fleur, 1850, XL. — *epilotii*, RAMBUR, crue une hybride de *vespertilio* et d'*euphorbiæ*, 1832, 426. — *euphorbiæ*, LUCAS, Note sur la réalité de cette esp., 1858, XIII. — *lineata*, trouvée dans le Djebel-Amour, 1847, CIX. — *nerii*, PIERRET, Trente-cinq chenilles prises à Gisors sur la pervenche, 1835, LXIV. — *id.*, DUPONT, Soixante chenilles recueillies à Amiens, 1835, LXIV. — *id.*, DORMOY, Pareilles quantités prises et élevées à Épernay par M. Paris, 1835, LXIV. — *id.*, Autres quantités découvertes par MM. Feisthamel, Ledoux, Lefebvre et Guinée, 1835, LXIV. — *id.*, Discussion soulevée à cette occasion, 1835, LXIV. — *id.*, DORMOY, Note sur le grand nombre de ces chenilles trouvées en 1835 dans le nord de la France, 1836, 363. — *id.*, GRAVENHORST, Lettre à M. Lefebvre au sujet de cette chenille, 1837, XLV — *id.*, DUCELLIER, Notice sur ces chenilles, 1839, IX. — *id.*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU en constate plusieurs apparitions en 1835 aux env. de Paris, 1835, LXXIII. — *id.*, BOISDUVAL et PIERRET, Discussion sur ces apparitions en France et près de Paris, 1846, CVI. — *id.*, PIERRET, Éclosion obtenue le 2 décembre, 1846, CXIII. — *id.*, trouvées abondamment dans le jardin du Luxembourg, 1849, LXXV. — *id.*, FAIRMAIRE, rencontrées en assez grand nombre à Abbeville, 1849, LXXVI. — *id.*, BRUAND, Chenilles trouvées à Besançon et à Mulhouse, 1858, XVIII. — *nerii* et *celerio*, BRUAND, Note sur ces deux esp. et leurs parasites, 1847, LIV. — *id.*, DONZEL, Obs. sur l'indigénéité de ces deux esp., 1850, 225. — *id.*, GHILIANI, Qques obs. sur les chenilles trouvées en Piémont en 1850, 1850, LXX. — *id.*, LUCAS, pris une dizaine près de Saint-Germain-en-Laye, 1852, LI. — *id.*, PARIS, d'Épernay, La chenille a reparu à Épernay, et l'auteur en a obtenu des chrysalides, 1852, LXXIII. — *id.*, BOISDUVAL, Ces chrysalides ne doivent pas éclore au printemps, 1851, LXXIV. — *porcellus*, DE ROMAND, Indiv. retenu par la trompe dans une corolle de fleur, 1850, XL. — *id.*, PIERRET, Indiv. présentant un commencement de végétation parasite, 1847, CVII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Obs. sur cette sorte de végétation parasite, 1847, CVIII. — *id.*, VILLENEUVE, Accouplement en captivité, 1858, CII. — *tithymali*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Présentation d'une chenille et détails à ce sujet, 1848, XLV. — *id.*, LUCAS, Obs. sur cette chenille, 1848, XLVII. — *vespertilio*, MILLIÈRE, Note sur une chenille ichneumonisée, 1852, XVI. — *vespertilioides*, RAMBUR, Suivant l'auteur, c'est un hybride de *vespertilio* et d'*hippophacs*, 1832, 426.

**Dianthæcia**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 204. — *albimacula*, 1838, 207. — *cæsia*, 1838, 208. — *capsincola*, 1838, 207. — *carpophaga*, 1838, 208. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Cas de monstruosité, 1853, XXXIX. — *compta*, *conspersa*, GUENÉE, 1838, 207. — *corsica*, *cucubali*, 1838, 208. — *echii*, *filigramma*, 1838, 207. — *luteago*, DE GRASLIN, Hist. des mœurs et descr. de la chenille, 1842, 313. — *magnolii*, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 208. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 691. — *silenes*, *tephroleuca*, GUENÉE, 1838, 207.

**Diasemia** *litteralis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques mots sur cette esp., 1856, XC. — *Ramburialis*, MILLIÈRE, Note sur cette esp., 1856, LXXXIX.

**Dicranura** *erminca*, GUILLEMOT, Notice sur son hybridation avec *vinula*, 1856, 29. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur une hybride de cette esp. avec *vinula*, 1858, XXIX. — *vinula*, BOYER DE FONSCOMBE, Qques détails de mœurs relatifs à deux esp. de Bombycites, 1844, LX. — *id.*, LUCAS, trouvée aux env. d'Alger, 1850, LXII. — *id.*, DESMAREST, Boltes de plomb rongées par les chenilles, 1851, XVI. — *id.*, MILLIÈRE, Note relative à l'habitat des chrysalides, 1852, XLVII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques obs. sur les mœurs de ces chenilles, 1852, XLVIII. — *id.*, GUILLEMOT, Notice sur son hybridation avec *erminca*, 1856, 29. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur une hybride de cette esp. avec *erminca*, 1858, XXIX. — *id.*, VILLENEUVE, Indiv. provenant d'une chrysalide envoyée d'Alger, 1858, LXXIII.

**Dicrorampha** ? *ulicana*, GOUREAU, Ins. des gousses du genêt épineux, 1847, 249.

**Diorina** *Laenome*, MORISSE, Essai sur ce genre, 1837, 421.

**Diptera** *Cænobita*, PIERRET, Cas d'hermaphrodisme, 1843, VII.

**Diurnea** *fagella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 130.

**Dosithea** *attenuaria*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1833, 37. — *infirmaria*, 1833, 36. — *scutularia*, AUDOUIN, Obs. sur les métam. d'une chenille de ce genre, 1834, 417.

**Drassus** *segestiformis*, LABOULBÈNE, Communic. d'une note de M. L. Dufour sur cet Ins., 1858, XIX.

## E.

**Ebulea rubiginalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 698.

**Ecaille Hété**, BOISDUVAL, Chenilles atteintes de la muscardine, 1837, LXXXII.

**Elachista**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Demande d'un rapport sur les mœurs de la chenille mineuse de l'olivier, 1847, XLVI. — *coffcella*, Ses divers états et ses habitudes, 1842, II. — *complanella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 147. — *oleælla*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Rapport demandé sur les chenilles qui rongent les feuilles de l'olivier, 1847, LI. — *olivella*, 1847, LII. — *id.*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur son identité avec l'*Oecophora oleælla*, 1851, XVII. — *id.*, GHILIANI, Obs. confirmatives de cette identité, 1851, LIV. — *Rivillei*, STANTON, Note sur une chenille de l'intérieur des feuilles de la vigne, 1855, 211. — *Treitschkiella*, 1855, 213. — *id.*, Extrait d'une lettre de M. Millière, 1856, XXXIX.

**Emydia cascia**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 685.

**Enicostoma Geoffrella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 144.

**Ennomos illunaria**, GRÉGÉE, Note sur cette esp., 1842, 243. — *sarpetaria*, BOISDUVAL, Note sur les Lépid. recueillis par M. Kindermann, 1848, XXX.

**Ephippiphora dorsana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 466.

**Ephyra omicronaria**, *trilineararia*, BOISDUVAL, trouvés à Compiègne, 1852, XXXIV.

**Epigraphia avellanea**, DUPONCHEL, Tinéites, 1839, 132.

**Epimecla**, GRÉGÉE, Noctuéliques, 1839, 514. — *ustulata*, 1839, 516.

**Episema chrysocephala**, PIERRET, Ichneumon sorti d'une chrysalide, 1846, XXXVIII. — *hispania*, MERCK, L'auteur demande de quelle plante se nourrit la chenille, 1838, LXVIII. — *id.*, RAMBUR, Obs. critiques

sur la distribution de la famille des Agrotides, 1848, 66. — *Piarrati*, BUGNION, Descr. de quatre nouv. esp. de Syrie et d'Égypte, 1837, 441. — *unicolor*, DUPONCHEL, Notice sur deux nouv. esp. de Noctuéliques, 1835, 193.

**Epunda nigra**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 691.

**Erastria**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 226. — *atrátula*, *candidula*, 1841, 227. — *elychrysi*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1833, 24. — *fuscata*, *numerica*, *parvula*, GUENÉE, 1841, 227. — *scitula*, RAMBUR, 1833, 26. — *venustula*, GUENÉE, 1841, 227. — *id.*, BERCE, Note sur cette esp. trouvée dans les env. de Paris, 1856, LXVIII. — *id.*, BRUAND, Note sur l'habitat et les mœurs de cette esp., 1857, XXI. — *id.*, BERCE, Rép. à la note de M. Bruand, 1857, XXIII. — *id.*, BOISDUVAL, Note sur la saugère, 1857, XXIV. — *id.*, PIERRET, Influence de la nature du sol dans les montagnes sur les Lépid., 1846, xc.

**Erebia Arcte**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. des deux sexes de cette esp., 1858, v. — *id.*, Note sur cette esp., 1858, 485. — *Euryale*, MARTIN, Particularités curieuses, 1857, XXVI. — *Stenno*, DE GRASLIN, Notice sur qqes Lépid. nouv. des Pyrénées orientales, 1850, 393. — *id.*, PIERRET, Note relative à cette esp., 1850, 417.

**Eriopus Latreillei**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 226. — *Latreillei*, *pteridis*, 1838, 224. — *pteridis*, BRUAND, Descr. de la chenille, 1842, 37.

**Erycina aristoderus**, MORISSE, Essai sur le genre *Erycina*, 1837, 417. — *Licarsis*, *Thia*, 1837, 419.

**ERYCINIDES**, BOISDUVAL, MM. Bar ont découvert à Cayenne des chenilles de cette famille, 1852, LXVI. — *id.*, Détails donnés par MM. Bar sur les chenilles de cette famille, 1856, xcix.

**Eubolia larentiaria**, BRUAND, Obs. sur son identité avec *Eub. larentaria*, 1854, XXVI. — *id.*, Descr. d'un Lépid. nouv., 1858, 475. — *proximaria*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1833, 40. — *scitularia*, 1833, 42.

**Euclidia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 221. — *fortalium*, *glyphica*, *munita*, *triquetra*, 1841, 223.

**Eudamus Bathyllus**, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 310.

**Eudorea borealis**, LEFEBVRE, Qques Lépid. nocturnes hyperboréens, 1836, 400.

**Euperia**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 486. — *abluta*, *fulvago*, *trapezina*, 1839, 489.

**Eupithecia**, LABOULBÈNE, Microlépidoptère obtenu de chenille, 1857, LXXXIX. — *id.*, BRUAND, Proposition de s'occuper de l'examen de ce groupe pour le Congrès de Paris, 1858, LXV. — *cauchiaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenille élevée à Paris, 1856, XXXI. — *costigaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *gemellata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomologique de la Sicile, 1860, 704. — *pumilata*, 1860, 703. — *satyraria*, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 11. — *valerianaria*, et une nouv. esp., 1857, 12.

**Euplœa** *albata*, BOISDUVAL, Obs. sur un mémoire de M. Zinken-Sommer, 1832, 418. — *faber*, 1832, 419. — *mulciber*, *pavettæ*, 1832, 420. — *philomela*, 1832, 418.

**Euplocamus** *anthracinellus*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 132.

**Eupœcilia** *hybridellana*, GOUREAU, Ins. du chardon penché, 1845, 101.

**Euprepia** *pudica*, DE VILLIERS, Obs. sur l'écaille pudique de Godart, 1832, 203.

**Eurhyla**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 222. — *adulatrix*, *blandiatrix*, 1838, 223.

**Euryphena** *cocalia*, FEISTHAMEL, Lépid. de la Cazamance, 1850, 254. — *gambiæ*, 1850, 251. — *Phrcone*, 1850, 253.

**Euterpe**, SALLÉ, Le *Capullo de Mandrogno* est l'ouvrage de chenilles de ce genre, 1857, 20.

## F.

**Fidonia** *assimilaria*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1833, 34. — *chrysi-taria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomologique de Sicile, 1860, 703.

## G.

**Galleria cerella**, LUCAS, Note sur ses div. états, 1846, cviii. — *id.*, Portion de nid construit par cet Ins., 1848, xxvii.

**Gastropacha lanestris**, GUENÉE, Obs. sur les coques de cette esp., 1835, lxiii. — *pityocampa*, DE VILLIERS. Obs. sur ce *Bombyx*, 1832, 201.

**Gelechia carlinella**, GOUREAU et LABOULBÈNE, Hist. des métam. de cet Ins., 1858, 263. — *vicinella*, BRUAND, Obs. faites en 1858, 1858, 481.

**Geometra**, GUENÉE, Réclam. de priorité contre M. Herrich-Schæffer, 1856, xlviii. — *cratægaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Absence absolue des deux ailes gauches, 1852, lxix. — *fasciaria*, trouvée aux env. de Paris, 1848, lxiii. — *flabellaria*, éclore de chrysalides rapportées de Sicile, 1860, vi. — *papilionaria*, Chenille trouvée à Compiègne, 1852, xxxvii. — *sinuaria*, Chenilles trouvées sur le *Galium verum*, 1852, liv.

**GÉOMÈTRES**, GUENÉE, L'auteur s'occupe d'un travail sur ce groupe, 1854, xxvii.

**Glaphyra**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 232. — *amœna*, *glarea*, *lusitana*, *obliterata*, *parallela*, *pura*, 1841, 233.

**Glaucopis lætipennis**, BOISDUVAL, Lépid. de Californie, 1852, 320.

**Glottula**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 359. — *encausta*, 1837, 360. — *id.*, GHILIANI, C'est une var. de *Pancratii*, 1851, lvi. — *Pancratii*, GUENÉE, 1837, 360. — *id.*, GHILIANI, prise en Piémont, 1851, lvi. — *id.*, LUCAS, trouvée aux env. d'Alger, 1857, cxxxviii.

**Gnophos Daubearia**, PIERRET, découverte à Larche (Basses-Alpes), 1849, lxxviii. — *obscuraria*, MILLIÈRE, Note sur une var. de cette esp., 1853, 389. — *sartata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 700. — *variegata*, BRUAND, Descr. de sa chenille, 1843, 249.



**Godartia madagascariensis**, LUCAS, Obs. sur un nouv. genre de la tribu des Nymphalites, 1842, 295.

**Gonophora derasa**, BRUAND, Note sur *derasa* et *batis*, types de deux genres différents, 1849, 40. — *id.*, GUENÉE, Obs. sur ce genre et réponse à la note de M. Bruand, 1850, 107. — *id.*, BRUAND, Deux mots de réponse à M. Guenée, 1851, 89. — *id.*, Note rectificative, 1852, xxxix.

**Gonoptera**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 228. — *libatrix*, 1838, 280. — *id.*, LUCAS, rencontrée aux env. de Tanger, 1857, xi. — *id.*, trouvée aux env. d'Alger, 1857, cxxxviii.

**Gortyna**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 329. — *Borelii*, PIERRET, Descr. d'une nouv. esp., 1837, 449. — *id.*, N'est qu'une var. de *lunata*, 1839, xliii. — *celsia*, *flavago*, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 331. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenilles et chrysalides dans les tiges de *Cirsium palustre*, 1856, xci. — *leucostigma*, *lucago*, *picacca*, GUENÉE, 1837, 331. — *micacca*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée aux env. de Paris, 1848, lxiii.

**Gracillaria upupapencella**, DUPONCHEL, Tinçites, 1838, 148. — *vau-flava*, REICHE, Bouchons perforés par la chenille, 1853, vii. — *id.*, Réapparition des chenilles dans les bouchons, 1854, lxix.

**Grammodes stolidus**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 696.

**Grapholitha petrana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 446. — *susc-dana*, GOUREAU, Chenille trouvée dans les gousses de l'ajonc ou genêt épineux, 1847, 247.

## H.

**Hadena**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 213. — *adusta*, 1838, 217. — *æruginea*, 1838, 216. — *æthiops*, 1858, 215. — *albicolon*, *aliena*, 1838, 216. — *amica*, *atriplicis*, 1838, 217. — *Borea*?, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 8. — *bras-*

*sicæ*, GUENÉE, 1838, 216. — *cespitis*, 1838, 215. — *chenopodii*, *chenopodiphaga*, *contigua*, 1838, 216. — *convergens*, *dentina*, *distans*, 1838, 217. — *crulis*, LEFEBVRE, Qques lépid. nocturnes hyperboréens, 1836, 392. — *Feisthamelii*, BOISDUVAL, Quatre nouv. esp. de Noctué-  
lides, 1833, 375. — *id.*, GUENÉE, 1838, 217. — *id.*, PIERRET, trouvée  
au crépuscule dans la vallée de Chamounix, 1839, XXIX. — *fovea*,  
*fribolus*, GUENÉE, 1838, 217. — *furva*, 1838, 216. — *gelata*, LEFEBVRE,  
1836, 393. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques Lépid. d'Is-  
lande, 1857, 6. — *genistæ*, GUENÉE, 1838, 216. — *glauca*, 1838, 217.  
— *implicata*, LEFEBVRE, 1836, 394. — *Latcnai*, PIERRET, Descr.  
d'une nouv. esp., 1837, 177. — *id.*, N'est autre que la *dentina* des  
montagnes, 1839, XLII. — *lutulenta*, GUENÉE, 1838, 215. — *occlusa*,  
*odontites*, 1838, 217. — *olcracca*, 1838, 216. — *orfa*, BELLIER DE LA  
CHAVIGNERIE, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1837, 9. — *peregrina*,  
*pernix*, *persicariæ*, *pisi*, GUENÉE, 1838, 216. — *pisi*, BELLIER DE LA  
CHAVIGNERIE, 1857, 9. — *protæa*, *proxima*, *roboris*, GUENÉE, 1838,  
217. — *rubrivena*, 1838, 216. — *Saportæ*, *satura*, 1838, 217. —  
*sociabilis*, DE GRASLIN, Qques Lépid. nouv. des Pyrénées orientales,  
1850, 412. — *sodæ*, GUENÉE, 1838, 216. — *Solicri*, 1838, 217. —  
*Sommeri*, LEFEBVRE, 1836, 391. — *suasa*, *thalassina*, *Treitschkii*,  
GUENÉE, 1838, 216. — *nov. sp.*, 1838, 217.

### **HADÉNIDES**, GUENÉE, 1838, 201.

**Hæmerosia**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 230. — *albicans*, *renalis*,  
*scitula*, 1841, 231.

**Hæmilis** *hypericella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 134. — *pastinacella*,  
BRUAND, Notice sur plusieurs chenilles, 1844, 189. — *Theophilella*,  
Noté sur deux Lépid. nouv., 1855, LX.

**Hallas** *prasinana*, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 442.

**Harpipterix** *karpella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 138.

**Hastula** *hyerana*, MILLIÈRE, Descr. d'un Platyomide nouv., ses métam.,  
1857, 799. — *id.*, Envoi d'un errata sur ce mémoire, 1858, LXXIII.

**Heliconia** *Bourcierii*, *caligo*, BECKER, Lépid. découverts à Quito par  
M. Bourcier, 1851, XXIII. — *Lepricuri*, FEISTHAMEL, *Heliconia* *Le-*  
*pricuri*, 1835, 631.

**Heliodes** GUENÉE, Noctuélides, 1841, 61. — *arbuti*, 1841, 63. — *arbu-*  
*toides*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 694. —  
*rapitobol*, GUENÉE, 1841, 63. — *id.*, 1841, 63. — *id.*, 1841, 63.

**Heliothobus**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 350. — *albinea*, 1837, 352. — *bætica*, *graminis*, 1837, 351. — *graminis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. d'Islande, 1857, 9. — *hirta*, GUENÉE, 1837, 352. — *id.*, découvert à Marseille, 1850, VIII. — *leucophæa*, *optabilis*, *pilosa*, *popularis*, *vitalba*, Noctuélides, 1837, 352.

**HELIOTHIDI**, GUENÉE. Noctuélides, 1841, 53.

**Heliothis**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 55. — *armigera*, LUCAS, découverte dans les env. d'Alger, 1852, XXIV. — *armigera*, *dipsacca*, GUENÉE, 1841, 58. — *dipsacca*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 694. — *Frimwaldszkii*, DUPONCHEL, Descr. d'une nouv. esp. de Noctuélides, 1835, 633. — *incarnata*, *marginata*, GUENÉE, 1841, 58. — *maritima*, DE GRASLIN, Nouv. esp. de la faune occidentale, 1855, 65. — *ononis*, *peltigera*, GUENÉE, 1841, 58. — *peltigera*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenilles trouvées aux env. de Paris, 1851, LXXVII. — *purpurites*, *scutosa*, *nov. sp.*, GUENÉE, 1841, 58.

**Hemidia Rippertii**, BOISDUVAL, trouvée sur le sommet des Pyrénées, 1852, LX.

**Hemithea corsicaria**, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1833, 32.

**Hepialus pyrenaicus**, DONZEL, Desc. de trois nouv. esp. des Pyrénées orientales, 1838, 429. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques détails sur cette esp., 1848, LXXXVI.

**Hesperia**, BRUAND, Proposition de l'examen de ce groupe au Congrès de Paris, 1858, LXV. — *agricola*, BOISDUVAL, Lépid. de Californie, 1852, 314. — *campestris*, 1852, 316. — *cernes*, 1852, 317. — *comma*, 1852, 313. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Variété remarquable, 1852, LXXIII. — *Lefebvrei*, Lépid. de Sicile, 1860, 679. — *linca*, trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII. — *nemorum*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 314. — *pratincola*, 1852, 315. — *Phylæus*, 1852, 317. — *ruricola*, 1852, 315. — *sabuleti*, 1852, 316. — *sylvanoides*, 1852, 313. — *sylvanus*, BERCE, Production cryptogamique sur l'un des yeux, 1849, LV. — *id.*, BOISDUVAL, 1852, 313. — *id.*, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 679. — *Therapne*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1832, 265. — *vestris*, BOISDUVAL, 1852, 317.

**Heterogynis**, RAMBUR, Note sur plusieurs Lépid. du midi de l'Espagne, 1836, 584. — *affinis*, 1836, 586. — *crotica*, DE GRASLIN, Qques Lépid.

nouv. des Pyrénées orientales, 1850, 396. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, N'est autre que la *penella* d'Ilubn., 1850, LXIV. — *paradoxa*, RAMBUR, 1836, 585. — *id.*, ROUGET, découverte aux env. de Dijon, 1849, XLIX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, L'esp. des env. de Dijon est la *penella* et non *paradoxa*, 1850, XIV. — *penella*, Ravages exercés par la chenille, 1858, CXXXIX.

**Mimera pennaria**, PIERRET, Différence dans l'insertion des deux antennes, 1847, LXXXV.

**Hipparchia Titca**, EMPRICH et ERENBERG, Descr. latine de ce Satyre, 1832, 441.

**Hydrella**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 227. — *argentula*, *unca*, 1841, 228.

**Hydrocampa**, L. DUFUR, Note sur une chenille de ce genre, 1849, LXXI.

**Hypanis Cora**, FEISTHAMER, Lépid. de la Cazamance, 1850, 249.

**Hypercallia Christiannana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 449.

**Hyponomeuta**. (Voyez *Iponomeuta*.)

**Hypotia corticalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de la Sicile, 1860, 696.

**Hypsolopha asperella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 135.

## I.

**Iarus**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 208. — *ochroleuca*, 1838, 209.

**Ilythia pudorella**, GHILIANI, Faits relatifs à la géographie entomologique de cette esp., 1851, XCVIII.

**Incurvaria masculella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 145. — *psychidella*, MILLIÈRE, Descr. de nouv. esp. de Microlépid., 1854, 59.

## L.

**Lampros majorella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 139.

**Larentia Brullei**, LEFEBVRE, Qques Lépid. nocturnes hyperboréens, 1836, 399. — *Carsiaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques Lépid. d'Islande, 1857, 10. — *dissimilata*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1833, 46. — *criccata*, 1833, 50. — *ligustigata*, DONZEL, Trois nouv. esp. de Lépid. des Pyrénées orientales, 1838, 431. — *melanoparia*, DE GRASLIN, Exploration dans la France occidentale, 1848, 62. — *Millierata*, BRUAND, Descr. de cette nouv. esp., 1858, 473. — *muscosata*, DONZEL, Descr. de deux esp. de Phalénides, 1837, 478. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomol. de Sicile, 1860, 703. — *oxyccdrata*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1833, 47. — *phæniceata*, Descr. de plusieurs esp. du centre et du midi de la France, 1834, 392. — *porcataria*, BOISDUVAL, Lépid. des env. d'Odessa et du Caucase, 1848, xxx. — *scopariata*, RAMBUR, 1833, 49. — *stepparia*, BOISDUVAL, 1848, xxx. — *undulataria*, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv.

**Laslocampa lincosa**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Qques détails de mœurs sur deux esp. de Bombycides, 1844, lx. — *otus*, BECKER, Qques détails de mœurs sur cette esp., 1845, lvi. — *id.*, PIERRET, Réponse aux détails de M. Becker, 1845, lvii. — *pini*, BAGRIOT, Note sur une ponte élevée à Vaugirard, 1849, 455.

**Lemmatophila phryganella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 131.

**Leptalis**, LUCAS, Note sur une nouv. esp. appartenant à ce genre, 1854, 51.

**Leptosia**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 225. — *Dardouini*, *mundaculalis*, *polygramma*, *velox*, 1841, 226.

**Leucanla**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 338. — *albigutta*, 1837, 341. — *albipuncta*, 1837, 340. — *albirena*, DE GRASLIN, Mém. sur trois esp. nouv., 1852, 409. — *id.*, Sur l'interversion de la planche 8, 1852, lxxxii. — *amnicola*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 289. —

*amnicola*, *Bathyerga*, *caricis*, *comma*, *congrua*, GUENÉE, 1837, 341. — *conigera*, 1837, 340. — *elymi*, 1837, 341. — *fuscilinea*, DE GRASLIN, 1852, 411. — *id.*, Sur l'interversion de la planche 8, 1852, 411. — *impura*, *L. album*, GUENÉE, 1837, 341. — *littoralis*, FAIRMAIRE, pris à la Teste, près de Bordeaux, 1855, xxxiv. — *Loreyi*, *lutosa*, GUENÉE, 1837, 341. — *lythargyria*, *musculosa*, 1837, 340. — *obsoleta*, *pallens*, *pudorina*, *punctosa*, 1837, 341. — *riparia*, RAMBUR, 1832, 288. — *riparia*, *sicula*, *straminea*, GUENÉE, 1837, 341. — *vitellina*, *zeæ*, 1837, 340. — *nov. sp.*, 1837, 341.

**LEUCANIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 331.

**Leuconæa** *cratægi*, LUCAS, trouvée en Kabylie, 1860, xciv.

**Ligla** *caliginaria*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1833, 35. — *opacaria*, PIERRET, Chenille trouvée dans la Vendée, 1843, xi. — *id.*, DUPONCHEL, N'est pas rare dans les env. de Tours, 1843, xi.

**Limenitis** *Camilla*, LEFEBVRE, Var. curieuse, 1835, vi. — *id.*, GIRARD, Seconde éclosion en septembre, 1859, ccxxi. — *Eulalia*, *Lorquini*, BOISDUVAL, 1852, 301. — *Lucilla*, LEFEBVRE, Var. curieuse, 1835, vi. — *id.*, LUCAS, Esp. prises sur les frontières chinoises, 1858, cxcvi. — *Ludmilla*, BOISDUVAL, Var. de *Lucilla*, 1848, xxix. — *Sibylla*, GIRARD, non rencontrée de 1854 à 1857, est devenue abondante en 1858 et 1859, 1859, ccxxi.

**Liodes**, DE BAULNY, Ce nom de genre doit être changé, 1858, lxxxii.

**Liparis** *dispar*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commencement d'hermaphrodisme, 1847, xcvi. — *id.*, Note sur une anomalie sexuelle, 1849, 173. — *id.*, Var. remarquables, 1852, lxxiii.

**Lita** *Fischerella*, FISCHER DE ROSLERSTAMM, Hist. de ce Lépid., 1834, xl. — *vigeliella*, GOUREAU, Rem. sur plusieurs Ins., 1857, xxvii. — *zebrella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 140.

**Lithosia**, BOISDUVAL, D'un côté *aurita* et de l'autre *ramosa*, 1834, v. — *id.*, GUENÉE, Envoi d'études sur ce genre, 1860, cxi. — *bifasciata*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 270. — *lacteola*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur cette esp., 1857, xxv. — *marcida*, Lépid. de Sicile, 1860, 686. — *quadra*, Dégâts causés par la chenille dans les bois de Saint-Germain, 1852, xxxviii. — *rufcola*, RAMBUR, 1832, 271. — *stramincola*, PIERRET, envoyée par M. Doubleday, 1848, lxxxvi.

**Luperina conspicillaris**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur la chenille, 1847, xxxiv.

**Lycœna Acis, Adonis**, BOISDUVAL, trouvées à Compiègne, 1852, xxxiv. — *Ægon*, MARTIN, Communic. d'une var. remarquable, 1857, cvi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Individ. bien développé, de 16 millim. d'envergure, 1857, cxxi. — *Agestis, Alcon, Alexis*, BOISDUVAL, 1852, xxxiv. — *Alexis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 675. — *Alsus*, BOISDUVAL, 1852, xxxiv. — *Amyntula*, Lépid. de la Californie, 1852, 294. — *Antægon*, 1852, 295. — *Antiacis*, 1852, 300. — *batica*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenille et nymphe observées aux env. de Chartres, 1847, xciv. — *id.*, Nouvelle note sur son éclosion, 1847, cv. — *Baltus*, trouvé aux env. de Thiers par M. Guillemot, 1852, xxviii. — *Cyllarus*, BOISDUVAL, 1852, xxxiv. — *enoptes*, Lépid. de la Californie, 1832, 298. — *exilis*, 1852, 294. — *heteronea*, 1852, 298. — *Hylas*, PIERRET, trouvée en grande quantité dans les env. de Lardy, 1845, lxxvi, et 1846, liv. — *Icarioides, Phœces*, BOISDUVAL, 1852, 297. — *piasus*, 1852, 299. — *pseudargiolus*, 1852, 300. — *Redereri*, Fort belle esp. nouv., 1848, xxix. — *sæpiolus*, Lépid. de la Californie, 1852, 296. — *Telicanus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 675. — *Xerces*, BOISDUVAL, 1852, 296.

## M.

**Macaria alternaria**, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv.

**Macrochila rostrella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 138.

**Macroglossa bombyliiformis**, GUENÉE, Mémoire sur qqes chenilles de Châteaudun, 1834, 194. — *id.*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *fuciformis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 684.

**Margarodes unionalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 698.

**Mamestra chenopodiphaga**, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 283. — *Maillardi, pernix*, PIERRET, trouvées au crépuscule dans la vallée de Chamounix, 1839, xxix.

**Mania**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 111. — *maura, typica*, 1838, 114.

**Mecoptera** GUENÉE, Notes sur qqes nouv. genres à établir, 1837, 225. — *satellitica, serotina*, 1837, 226. — *id.*, Noctuélides, 1839, 499 et 500.

**Megasoma**, FEISTHAMEL, Notice sur le *Bombyx repanda*, 1832, 340. — *acaciæ, cristatum*, 1832, 347. — *repandum*, 1832, 341. — *id.*, LUCAS, trouvé dans l'Est de nos possessions africaines, 1852, xxiv.

**Melanippe alchemillaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Compiègne, 1852, xxxvii. — *id.*, Qques Lépid. d'Islande, 1857, 11. — *hastaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *hydraria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Géomètre obtenu de chenilles élevées à Paris, 1855, lxvi. — *montanaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *Thulearia*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. d'Islande, 1857, 9.

**Melanthia breviculata**, DONZEL, Descr. de deux esp. de Phalénites, 1837, 478.

**Melasina ciliaris**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, prise aux env. de Thiers par M. Guillemot, 1850, lxvii.

**Melithœa Artemis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Variété remarquable, 1852, lxxiii. — *id.*, BOISDUVAL, Var. présentant un cas d'albinisme, 1857, cxxx. — *Athalia*, BECKER, Belle var., 1852, xxxviii. — *id.*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *Chalcedon*, Lépid. de la Californie, 1852, 303. — *Cinxia*, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Variétés présentées par l'auteur, 1856, lxiv. — *Deione*, DONZEL, trouvée dans le Forez, 1842, xlii. — *Dictinna*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *didyma*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Indiv. monstrueux trouvé dans les Basses-Alpes, 1854, lxviii. — *id.*, Lépid. de Sicile, 1860, 676. — *Editha*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 304. — *maturna*, PARIS, d'Épernay, Chenille trouvée en juin dans la forêt d'Épernay, 1838, lii. — *id.*, PIERRET, trouvée par M. de Saint-Fargeau dans la forêt de Saint-Germain, 1838, lii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur les chenilles de cette esp., 1846, xii. —



*id.*, PIERRET, Obs. sur son habitat, 1846, XIII. — *id.*, Chenille trouvée par M. Ronssin dans la forêt de Bondy, 1846, LX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, pris en grand nombre, 1854, XXXII. — *Palla*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 305. — *Parthenia*, BERCE, Var. remarquable, 1850, XLV. — *Phæbe*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 676. — *pulchella*, BOISDUVAL, Lép. de la Californie, 1852, 306.

**Metasia supbandalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 698.

**Metopenia matutinalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 695.

**Micra**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 224. — *concinna*, *Etychrysi*, *minuta*, *ostrina*, 1841, 225. — *ostrina*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 695. — *parva*, *Paula*, *purpurina*, GUENÉE, 1841, 225. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 695. — *Rosina*, *viridula*, 1841, 225.

**Microphysa**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 233. — *inamæna*, *jucunda*, 1841, 234. — *rada*, BOISDUVAL, Jolie petite Ophiuride nouv. des env. d'Odessa, 1848, XXX. — *regularis*, *suava*, GUENÉE, 1841, 234.

**Miselia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 122. — *bimaculosa*, 1838, 124. — *jaspidea*, DONZEL, Notice sur cette esp., 1841, 211. — *orbiculosa*, *oryacanthæ*, GUENÉE, 1838, 124.

**MISELIDI**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 119.

**Morpho**, GUENÉE, Note monographique et rectificative sur un groupe de ce genre, 1859, 365. — *id.*, DEYROLLE fils, Notice sur cinq *Morpho* nouv., 1860, 207. — *Achilles*, GUENÉE, 1859, 369. — *Corydon*, 1859, 372. — *Amathonte*, DEYROLLE fils, 1860, 211. — *Deiadena*, GUENÉE, 1859, 371. — *Egyptus*, DEYROLLE fils, 1860, 210. — *Eugenia*, *Hébé*, 1860, 209. — *Helenor*, GUENÉE, 1859, 371. — *Klugius*, BOISDUVAL, C'est le *Morpho Odana* de Godart, 1832, 418. — *Leontus*, C'est le *M. canens* d'Hubn., 1832, 418. — *Montezuma*, GUENÉE, Note monogr. et rectific. sur un groupe de ce genre, 1859, 373. — *Thescus*, DEYROLLE fils, 1860, 213.

**Myelophila cribrella**, GOREAU, Chenille vivant dans les tiges du chardon, 1855, VI.

**Mythimna**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 336. — *implexa*, *turca*, *xanthographa*, 1837, 337.

## N.

**Nacella**, FAIRMAIRE, Ins. recueillis pendant la session extraordinaire de 1857, 1857, 646. — *famula*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 686.

**Nemeophila plantaginis**, VILLENEUVE, Éducation que l'auteur en a faite, 1858, CXCv. — *russula*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV.

**Nemoptera lusitanica**, LABOULBÈNE, Lettre de M. L. Dufour sur l'absence d'un système nerveux, 1856, XXV. — *id.*, SICHEL, Obs. sur le même sujet, 1856, XXV.

**Nemoria pulmentata**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomolog. de la Sicile, 1860, 701.

**Nephopteryx angustella**, BRUAND, Sa descr., 1847, 289.

**Nepticula acerella**, GOUREAU, Note sur les mœurs de cette esp., 1860, XXII.

**Noctua**, GUENÉE, Notice sur qqes nouv. genre à établir dans le genre *Noctua* de Linné, 1837, 249. — *id.*, Noctuéliques, 1837, 361. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Chenille ayant ravagé des plants de chanvre et de haricots, 1846, LXVII. — *id.*, BOISDUVAL, Espèce de Sicile que l'auteur croit nouv., 1846, CV. — *id.*, DE ROMAND, Individ. retenu par la trompe dans une fleur, 1850, XL. — *aprilina*, DUPONCHEL, Chenille ayant rendu un Entozoaire par l'anus, 1841, XXI. — *Augur, baja, bella*, GUENÉE, 1837, 363. — *brassicæ*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ravage des feuilles de betteraves par la chenille, 1846, CXVI. — *brunnea, candellisequa*, GUENÉE, 1837, 363. — *cataluca*, BOISDUVAL, Descr. de quatre nouv. esp. de Noctuéliques, 1833, 377. — *C-nigrum*, GUENÉE, 1837, 836. — *communimacula*, BOISDUVAL, Obs. intéressante qui la réunirait au genre *Limacodes*, 1847, LXX. — *conflua*, GUENÉE, 1837, 363. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. d'Islande, 1857, 8. — *cupræa, Dahlii*, GUENÉE, 1837, 363. — *delphinii*, BELLIER DE LA

CHAVIGNERIE, Chenilles trouvées en grand nombre, 1854, xxxii. — *depuncta*, *ditrapezium*, GUENÉE, 1837, 363. — *crythræa*, BOISDUVAL; Rem. de géographie entomol., 1857, xxv. — *faceta*, *festiva*, *glareosa*, GUENÉE, 1837, 363. — *Graslinii*, BECKER, Communic. de cette esp. qui n'aurait point encore été figurée, 1854, xlv. — *helvetina*, BOISDUVAL, Descr. de quatre nouv. esp. de Noctuéliques, 1833, 376. — *jaspidea*, DONZEL, Notice sur cette esp., 1841, 211. — *Lepetitii*, *leucogaster*, GUENÉE, 1837, 363. — *malinella*, ROUZET, Envoi de cocons attribués à cette esp., 1856, lxiv. — *musiva*, GUENÉE, 1837, 363. — *nyctimera*, MERCK, Découverte de la chenille que l'auteur croit inconnue, 1838, lxviii. — *occulta*, LEFEBRE, Obs. sur la phosphorescence de la chenille, 1832, 424. — *persicariæ*, VALLOT, Obs. sur les larves qui dévastent le chanvre, 1834, lxiii. — *plecta*, *porphyrea*, *punicca*, GUENÉE, 1837, 363. — *radiosa*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, prise aux env. de Thiers par M. Guillemot, 1850, lxvii. — *rhomboides*, GUENÉE, 1837, 363. — *satellitica*, LEPELETIER DE SAINT-FARCEAU, Chenilles se dévorant entre elles, 1834, xi. — *segetis*, LEFEBVRE, Pâturages du Jura dévastés par la chenille, 1834, xix. — *segetum*, Grands ravages des plantes légumineuses en Danemark, 1835, lxxi. — *sigma*, *umbrosa*, n. sp., GUENÉE, 1837, 363.

**NOCTUÉLIDES**, BOISDUVAL, Descr. de quatre nouv. esp.; 1833, 373. — *id.*, GUENÉE, Essai pour servir à leur classification, 1837, 219, 311; 1838, 107, 201; 1839, 473; 1841, 217. — *id.*, Division en tribus, 1837, 321. — *id.*, Index methodicus Noctuarum europæarum, 1841, 235.

**NOCTUELIDI**, GUENÉE, Essai sur la classification des Noctuéliques, 1837, 347.

**Noctuelles** *Batis* et *derasa*, BRUAND, Note sur ces deux esp., types de deux genres nouv., 1849, 40. — *id.*, GUENÉE, Réponse à la note de M. Bruand, 1850, 107. — *id.*, BRUAND, Deux mots de réponse à M. Guenée, 1851, 89. — *id.*, Note rectificative, 1852, xxxix.

**NOCTUO-BOMBYCIDI**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 313.

**NOCTUO-PHALENIDI**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 220.

**Nonagria**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 328. — *cannæ*, *despecta*, *extrema*, *fluxa*, 1837, 329. — *fluxa*, *Helmanni*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Prises aux env. de Paris, 1848, lii. — *hospes*, *neurica*, *noxæ*, GUENÉE,

1837, 329. — *paludicola*, Notice sur les mœurs de la chenille, 1833, 447. — *paludicola*, *phragmitidis*, *sparganii*, *typhæ*, Noctuélides, 1837, 329. — *typhæ*, PIERRET, Ichneumons sortis de deux chrysalides, 1846, XXVIII. — *ulvæ*, *nov. sp.*, 1837, 329.

**NONAGRIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 326.

**Notodonta Carmelita**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Prise dans les bois de Bondy, 1847, XLIII.

**Nudaria nodosalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de la Sicile, 1860, 696.

**Numeria agaritharia**, DARDOUIN, Descr. d'une nouv. esp. de Lépid., 1842, 201. — *Donzelaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur l'éducation d'une chenille, 1850, XXVI.

**Nychiodes lividaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 700.

**Nymphalis populi**, WESMAEL, Note sur un cas de difformité, 1837, XCI. — *id.*, LUCAS, Espèces prises sur les frontières chinoises, 1858, CXCVI.

**Nyssia pomonaria**, LEFEBVRE, Rectif. de cette esp., 1835, 101. — *Vertumnaria*, 1835, 104. — *zonaria*, PIERRET, découverte en grand nombre aux env. de Paris, 1843, XVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII.

## O.

**Œcophora oleella**, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note pour établir son identité avec *Elachista olivella*, 1851, XVII. — *id.*, GHILIANI, Obs. confirmative de cette identité, 1851, LIV. — *olivella*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Aperçu rapide des mœurs de cette esp., 1844, LXXVI. — *id.*, Individ. trouvé dans une branche de saule, 1845, XLI. — *pruniella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 147.

**Œdipoda cruciata**, LEFEBVRE, Une grêle de cet Ins. observée à Smyrne en juin, 1832, 237.

**œEnophytia Pilleriana**, AUDOUIN, L'auteur fait connaître une brochure de M. Farines, 1837, XVI. — *id.*, WALCKENAER, A l'occasion de cette brochure l'auteur rappelle les travaux de M. Audouin, 1837, XXXVIII. — *id.*, BRULLÉ, Excursion dans les vignes d'Argenteuil, 1837, LVII. — *id.*, Annonce du départ de M. Audouin pour le Mâconnais, 1837, LVII. — *id.*, DUPONCHEL, Les auteurs allemands ne la regardent pas comme nuisible à la vigne, 1837, LVIII. — *id.*, AUDOUIN, Dégâts causés dans le Mâconnais, 1837, LX. — *id.*, Annonce de la prochaine publication des recherches de l'auteur, 1839, III. — *id.*, Particularités curieuses dans la structure de cet Ins., 1839, III. — *id.*, BRUAND, *œEnophytia Pilleriana*, 1849, 45.

**Ophiodes**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 77. — *lunaris, tyrrhæa*, 1841, 78.

**Ophlusia**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 73. — *algira, Cailino, geometrica*, 1841, 75. — *illunaris*, DAUBE, Var. accidentelles, 1836, XXIII. — *id.*, GUENÉE, 1841, 75. — *id.*, AZAMBRE, Qques mots sur sa chrysalide et son parasite, 1856, XXIV. — *lineolaris*, GUENÉE, 1841, 75. — *nubilaris*, DE GRASLIN, Notice sur une exploration en Andalousie, 1836, 568. — *punctularis, stolidia*, GUENÉE, 1841, 75. — *syriaca*, BUGNION, Descr. de quatre nouv. esp. de la Syrie et de l'Égypte, 1837, 442. — *thyrræa*, DAUBE, Note relative aux chenilles de Lépid., 1860, XXVIII.

**OPIIUSIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 71.

**Oratoscellis**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 231. — *communimacula*, 1841. 232.

**Orgya aurolimbata**, GUENÉE et DE VILLIERS, Note sur une *Orgya* nouv., 1835, 635. — *id.*, DE GRASLIN, Note sur qqes Lépid. nouv. des Pyrénées orientales, 1850, 408. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur les résultats de l'éducation des chenilles, 1858, XCVII. — *dubia*, DE GRASLIN, Notice sur une exploration en Andalousie, 1836, 564. — *pudivunda*, REICHE, Chenilles qui ravagent le canton de Phalsbourg, 1848, LVI. — *id.*, REEB, Détails intéressants sur cette invasion, 1848, LVI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenilles envoyées des env. de Phalsbourg, 1848, LXII. — *id.*, DESMAREST, Chenilles et cocons reçus de Phalsbourg, 1848, LXV. — *id.*, ROBI-NEAU-DESVOIDY, Détails sur ses ravages dans les env. de Saint-Sauveur, 1849, XIV. — *id.*, BRUAND, Dessin d'une var. curieuse, 1849,

XXX. — *id.*, LABOULBÈNE, Indiv. dont la chenille dévorait les forêts de l'Est, 1849, XLI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Éclosion de même origine et identique avec l'esp. des env. de Paris, 1849, XLI. — *id.*, LUCAS, Chrysalide ayant donné naissance à deux Diptères, 1849, XLIX. — *rupestris*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 275. — *trigotephras*, DE SAPORTA, Notice sur cette esp., 1834, 183. — *id.*, LEFEBVRE, Note sur la même esp., 1834, 186. — *vetusta*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 322.

**Ornithoptera Brookea**, STEVENS, Communic. de cette esp. de Borneo, 1855, LXXXIX. — *Brockiana*, BECKER, Communic. d'un dessin de M. Kollar, 1855, XXI.

**Ornlx vibicipennella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 148.

**Orobena blandalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 699.

**Orthosia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 480. — *id.*, DE VILLIERS, Obs. sur les mœurs de diverses esp. de ce genre, 1842, XI. — *id.*, ROUGET, Apparition nombreuse de la chenille de la décolorée, 1849, LV. — *acetosellæ*, GUENÉE, 1839, 483. — *amicta*, DONZEL, Descr. de Lépid. nouv., 1847, 527. — *cæcimacula*, *congener*, *Forkasii*, GUENÉE, 1839, 483. — *gothica*, CONSTANT, Notice sur trois var. de cette esp., 1855, 209. — *gracilis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII. — *ilicis*, *lævis*, *lota*, *macilenta*, *neglecta*, *oxalina*, GUENÉE, 1839, 483. — *pistacina*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII. — *ypsilon*, GUENÉE, 1839, 483.

**ORTHOSIDES**, GUENÉE, Qques nouv. genres à établir dans le genre *Noctua* de Linné, 1837, 224.

**ORTHOSIDI**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 473.

**Orthostixis lætata**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 703.

## P.

**Pædisca corticana**, GOUREAU, Note sur les habitudes de cette esp.; 1856, XIV. — *parmatana*, DUPONCHEL, *Platyomides*, 1834, 447.

**Palpula bitrabcella**, DUPONCHEL, *Tinéites*, 1838, 137.

**Papilio**, LUCAS, Obs. sur les Lépid. de ce genre, 1850, 83. — *Adamas*, BOISDUVAL, Identique avec *Polydorus* Cramer, 1832, 419. — *Ajax*, LUCAS, Note sur ce papillon, 1855, IX. — *Alexanor*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Grand nombre de chrysalides élevées à Paris, 1856, LXXIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chrysalides recueillies en 1854 et écloses en 1856, 1856, LXXXII. — *id.*, Individ. éclos après trois ans en chrysalide, 1857, c. — *Arbates*, BOISDUVAL, c'est le *Memnon* de Cramer, 1832, 419. — *Bathycles*, Identique avec le *Swammerdamii* de Dehaan, 1832, 419. — *Delessertii*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. esp. de Lépid., 1839, XXXVI. — *Duponchelii*, LUCAS, Notice sur une nouv. esp., 1839, 91. — *Eurymedon*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 280. — *Feisthamclii*, PIERRET, trouvé avec le *Podalirius* aux env. de Perpignan, 1836, LIX. — *id.*, LEVAILLANT, Notice sur cette esp., 1848, 407. — *id.*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Note sur ce papillon, 1849, XLVIII. — *Horsfieldii*, BOISDUVAL, Voisin de *Jairus* Swainson, 1832, 420. — *Hospiton*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Grand Ichneumon parasite de la chenille, 1860, LXXXIX. — *Ledebourus*, BOISDUVAL, Var. de *Pammon*, *Ledebourus*, Eschsch., 1832, 419. — *meges*, Identique avec *curius* de Fab., 1832, 418. — *Necsius*, Identique avec *nox* Swains., 1832, 417. — *Nomion*, Lépid. de Californie, 1852, 282. — *Paris*, Identique avec *arjuna* Horsfield, 1832, 419. — *Philenor*, Lépid. de la Californie, 1852, 282. — *Podalirius*, trouvé à Compiègne, 1852, XXXIII. — *Polycaon*, LUCAS, Aberration assez curieuse, 1857, XXV. — *rutulus*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 279. — *Sardalus*, BECKER, découvert à Quito par M. Boudier, 1851, XXXIII. — *Sphyrus* var., BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 674. — *striatus*, BOISDUVAL, Identique avec *Macarcus* God., 1832,

417. — *Urania*, Identique avec *Jairus auctorum*, 1832, 420. — *Zolicaon*, Lépid. de la Californie, 1852, 281. — *id.*, LUCAS, Note sur sa non-identité avec *P. Machaon*, 1856, LXVII.

**Papillon fossille.** (Voyez *Cyllo sepulta*.)

**Parasia carlinella**, LABOULBÈNE, C'est la Tinéite des têtes de la Carline, 1858, XXXII. — *id.*, GOUREAU, Rem. sur plusieurs Ins., 1857, XXVI.

**Parnassius Apollo**, LABOULBÈNE, Dessin d'un travail sur son anatomie, 1858, CCIX. — *clarius*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 283. — *Smintheus*, 1852, 282.

**Patula asperipunctella**, BRUAND, Note sur une Tinéite constituant un genre nouv., 1858, 177.

**Pellonia sicanaria, vibicaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomologique de Sicile, 1860, 702.

**Pempelia carbonariella**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. d'Islande, 1857, 12.

**Penthina salicana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 445.

**Peronea cristana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 444. — *id.*, LAVICE, trouvée accouplée avec *nyctemerana*, 1834, LXI.

**PHALÆNOIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 217.

**Phibalocera fagana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 449.

**Philopyra**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 116. — *effusa, lirida*, 1838, 119. — *perflua, pyramidea*, 1838, 118. — *tetra, tragopogonis*, 1838, 119.

**Phlœphila irrorana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 443.

**Phlogophora**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 220. — *adulatrix*, DE SAPORTA, Note sur cette esp., 1834, 183. — *meticulosa*, GUENÉE, 1838, 222. — *scita*, BRUAND, Obs. entom., 1858, 477.

**Phoxopteris siculana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 446.

**Phygas taurella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 142.

**Phytometra**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 229. — *ænea*, 1841, 235. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 696. — *Santi-Florentis*, GUENÉE, 1841, 230.



**Pieris**, BECKER, Esp. nouv. découverte à Quito par M. Bourcier, 1851, XXIII. — *brassicæ*, LEFEBVRE, Passage d'une nuée de ce papillon à Cuigy (Oise), 1834, XLII. — *id.*, BUREAU, Champs de choux et de navets ravagés par la chenille, 1855, XCV. — *cratægi*, PIERRET, Dommages causés par la chenille aux arbres fruitiers, 1846, XLIII. — *id.*, Réflexions sur les causes de propagation de certaines espèces, 1846, XLIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Torts causés aux amandiers par cette chenille, 1849, xv. — *Daplidice*, LUCAS, Petit indiv. pris aux env. de Médeah, 1851, CXII. — *Krüperi*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. de plusieurs exemplaires que l'auteur croit la *Gliciria* Cram., 1860, xx. — *Leucodice*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 284. — *napi*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Variétés accidentelles des env. de Paris, 1857, CXXI. — *id.*, Descr. de var. de Lépid., 1858, 705. — *Protodice*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 284. — *rapæ*, LEFEBVRE, Faculté qu'a la chrysalide de résister à une chaleur de 60 degrés, 1834, XXIV. — *sisymbrii*, BOISDUVAL, 1852, 284. — *Tagis*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 259.

**Pionca** *dispersalis*, *limbalis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de la Sicile, 1860, 698.

**PLATYOMIDES**, DUPONCHEL, Division de cette tribu, 1834, 433. — *id.*, BOISDUVAL, C'est une esp. de cette famille qui fait sauter les grains renfermant des larves, 1858, XXXIII.

**Plusia**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 65. — *accentifera*, 1841, 67. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 696. — *æmula*, *ain*, *aurichalcea*, *aurifera*, *bractea*, *chalsytis*, GUENÉE, 1841, 67. — *chalsytis*, LUCAS, Plusieurs indiv. pris aux env. d'Alger, 1851, XLII. — *chrysitis*, *circumflexa*, *circumscripta*, *concha*, *consona*, *Daubei*, *deaurata*, *devergens*, *diasema*, *divergens*, *festucæ*, GUENÉE, 1841, 67. — *festucæ*, GOUREAU, Descr. de la chenille, 1845, 361. — *gamma*, GUENÉE, 1841, 67. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. remarquable, 1846, XCVIII. — *id.*, Nouv. var. identique avec la précédente, 1846, CII. — *id.*, BUREAU, Réunion avec le *Botys hybridalis* dans des localités différentes, 1855, XVI. — *illustris*, *interrogationis*, GUENÉE, 1841, 67. — *interrogationis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. d'Islande, 1857, 8. — *iota*, GUENÉE, 1841, 67. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Compiègne, 1852, XXXVII. — *microgramma*, GUENÉE, 1841, 67. — *modesta*, AUD.-SERVILLE, trouvée dans le bois de Boulogne, 1833, XLVII. — *id.*, GUENÉE,

1834, 67. — *id.*, PIERRET, trouvée par M. Janvier au bois de Boulogne, 1842, XLIII. — *moneta*, GUENÉE, 1841, 67. — *mya*, PIERRET, trouvée au crépuscule dans la vallée de Chamounix, 1839, XXIX. — *mya, ni*, GUENÉE, 1841, 67. — *ni*, LUCAS, Plusieurs indiv. pris aux env. d'Alger, 1851, XLIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 696. — *parilis, questionis*, GUENÉE, 1841, 67. — *uralensis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 192. — *zosimi*, GHILIANI, Faits relatifs à la géographie entomologique de cette esp., 1851, XCVIII.

**PLUSIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1841, 63.

**Polia**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 210. — *albimacula*, Mém. sur qqes chenilles des env. de Châteaudun, 1834, 197. — *asphodeli*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 281. — *id.*, GUENÉE, 1838, 213. — *canescens, cappa, chi*, 1838, 212. — *corsica*, RAMBUR, 1832, 279. — *dumosa*, DONZEL, Descr. de cinq esp. de Noctuélides, 1837, 475. — *dysodea*, GUENÉE, 1838, 212. — *felicina*, DONZEL, Descr. d'une nouv. esp. de Lépid., 1844, 199. — *id.*, GUENÉE, Particularité curieuse sur le front de cette esp., 1850, XVII. — *flavicincta*, Noctuélides, 1838, 213. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII. — *lichenea*, GUENÉE, 1838, 213. — *luteocincta*, RAMBUR, Lépid. nocturnes du centre et du midi de la France, 1834, 382. — *id.*, GUENÉE, 1838, 212. — *nigrocincta*, 1838, 213. — *id.*, BERCE, trouvée à Fontainebleau, 1856, LXVIII. — *id.*, BRUAND, Note sur l'habitat et les mœurs de cette esp., 1857, XXIII. — *id.*, BERCE, Réponse à la note de M. Bruand, 1857, XXIII. — *platinea, polymita*, GUENÉE, 1838, 213. — *polymita*, PIERRET, trouvée dans le nord de la France, 1840, XXXVII. — *id.*, BOISDUVAL, prise par M. Rambur aux env. de Montpellier, 1840, XXXVII. — *pumicosa, ruficincta*, GUENÉE, 1838, 213. — *ruficincta*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1856, LXXII. — *senescens*, GUENÉE, 1838, 212. — *senex*, 1838, 213. — *serena, suda*, 1838, 212. — *templi*, 1838, 213. — *tephroleuca*, BOISDUVAL, Descr. de quatre nouv. esp. de Noctuélides, 1833, 374. — *id.*, PIERRET, trouvée au crépuscule dans la vallée de Chamounix, 1839, XXIX. — *venusta, viridicincta*, GUENÉE, 1838, 213.

**Polyommatus** *Acis, Alsus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Compiègne, 1852, XXXVII. — *Arota*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 293. — *Ceronus*, PIERRET, Note sur cette esp., 1833, 119. — *Chryseis*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIII. —

*id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvé aussi à Compiègne, 1852, xxxvii. — *id.*, BUREAU, Aberration remarquable, 1853, xxxix. — *epiphania*, BOISDUVAL, Fort jolie esp. nouv., 1848, xxix. — *Gordius*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 675. — *Gorgon*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 292. — *helloides*, *hypophlæas*, 1852, 291. — *Lorquinii*, BECKER, Lépid. d'Andalousie, 1847, lvii. — *Phlæas*, BERCE, Cas d'albinisme, 1849, lv. — *Xanthe*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 188. — *Xanthoides*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 292.

**Procris** *globulariæ*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, xxxiv. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Compiègne, 1852, xxxvii. — *pruni*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Tort causé aux amandiers dans le midi de la France, 1849, xv. — *statices*, BOISDUVAL, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiv. — *tenuicornis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 685.

**Pseudoterpna** *coronillata*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 701.

**Psyche** *albida*, MERCK aîné, Mém. sur cette esp., 1843, 81. — *id.*, BOISDUVAL, rencontré sur le sommet des Pyrénées, 1852, lx. — *apiformis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 690. — *cannabinella*, DOUMERC, Notice sur la Teigne du chanvre, 1860, 322. — *ciliarella*, BRUAND, 1858, clxiii. — *Erkstciniella*, Obs. sur divers Lépid., 1858, 461. — *febretta*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Descr. de cette esp., 1835, 107. — *id.*, PIERRET, Présentation des deux sexes dans l'esprit-de-vin, 1844, lxv. — *id.*, Mode de son accouplement, 1844, lxvi. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. relative aux *Psyche*, 1844, lxvi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de la Sicile, 1860, 690. — *Graslinella*, BOISDUVAL, Descr. de nouv. esp. découvertes en France, 1852, xxii. — *Gruneriella*, BRUAND, Obs. sur divers Lépid., 1858, 468. — *helicinella*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 689. — *Helix*, NYLANDER, Note sur le mâle de cette esp., 1854, 335. — *id.*, BRUAND, Deux mots à propos de la note de M. Nylander, 1854, lx. — *Kahri*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1869, 690. — *Leschenaultii*, STAUDINGER, Descr. d'un Lépid. nouv. des Hautes-Pyrénées, 1860, 663. — *linguliformella*, BRUAND, Commun. de cette esp. dont le genre est incertain, 1857, lxxv. — *maritimella*, Obs. sur divers Lépid., 1858, 459. — *Millicrella*, BOISDUVAL, Descr. de nouv.

esp. découvertes de France, 1852, XXII. — *Pontbriantella*, BRUAND, 1858, 467. — *Sicheliclla*, 1858, 464. — *siculccla* var., BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 691. — *surientella*, BRUAND, 1858, 465. — *stomoxella*, BOISDUVAL, 1852, XXII. — *villosella*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 690. — *Zelleriella*, BRUAND, 1858, 463.

**PSYCHIDES**, BRUAND, Descr. d'esp. nouv., 1858, LXXVII. — *id.*, Obs. sur la notice de M. Bellier de la Chavignerie, Lépid. des Pyrénées orientales, 1858, XCVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Réponse aux obs. de M. Bruand, 1858, c. — *id.*, BRUAND, Note au sujet de la réponse de M. Bellier de la Chavignerie, 1858, CXCv.

**Pyrale de la vigne**, DUPONCHEL, Obs. sur le fait de son engourdissement en été, 1837, LXI. — *id.*, AUDOUIN, Annonce de la prochaine publication des recherches sur cet Ins., 1839, III. — *id.*, Particularité curieuse dans sa structure, 1839, III.

**Pyralis farinalis**, AUDOUIN, Chenilles trouvées dans les farines des magasins de Versailles, 1836, LXIII. — *Pillcriana*, Communic. d'une brochure de M. Farine sur cette esp., 1837, XVI. — *id.*, WALCKENAER, L'auteur rappelle les obs. de M. Audouin, 1837, XXXVIII. — *id.*, AUDOUIN, Dégâts causés dans le Mâconnais, 1837, LX. — *ribeana*, DOUMERC, Obs. sur ses mœurs, 1839, XXVIII. — *viridana*, ROBINEAU-DESVOIDY, Mal que font les chenilles aux chênes, 1849, xv.

**Pyrausta porphyralis**, BRUAND, Notes sur divers Lépid., 1849, 46. — *pygmaealis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 697.

## R.

**Réaumuria**, RAMBUR, Nouv. genre de Lépid. nocturnes, 1832, 234.

**Rhinosia ustulccla**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 135.

**Rhodaria hæmatalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 697.

**Rhodocera Cleopatra**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Découverte aux env. de Lyon par M. Millière, 1855, LXXXII. — *rhamni*, Note sur les chenilles de cette esp., 1846, XIII. — *id.*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 286.

**Rusina**, GUENÉE, Noctuéélides, 1837, 346. — *tenebrosa*, 1837, 347.

## S.

**Salamis Antilope**, *Ethyra*, FEISTHAMEL, Lépid. de la Cazamance, 1850, 250.

**Sarrothripa revayana**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 443.

**Saturnia arrindia**, LUCAS, Note relative aux chenilles élevées au Muséum, 1855, XXI. — *id.*, Deux chenilles trouvées dans l'estomac d'un Trigonocéphale, 1855, XXII. — *id.*, BECKER, Individ. provenant d'une éducation en Algérie, 1855, LXVI. — *atlantica*, SICHEL, Communic. au nom de M. Bruand d'un dessin des deux sexes, 1855, CXV. — *id.*, BRUAND, Envoi d'un mém. avec planche de cette esp., 1856, LXIV. — *id.*, de Chine, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Rem. sur trois indiv. éclos en France, 1857, CXVII. — *campionea*, SIGNORET, Dessin d'une nouv. esp. de l'Afrique centrale, 1845, XCVII. — *carpini*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Individ. manquant d'aile inférieure gauche, 1846, XXXIV. — *id.*, BERCE, Coque remarquable, 1847, CXII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Papillons sortis des gros cocons déjà présentés à la Société, 1860, LXXXIII. — *Cecropia*, LUCAS, Détails sur les chenilles, 1845, LI. — *id.*, Deuxième note sur les chenilles, 1845, LV. — *id.*, Nouv. obs. sur les chenilles, 1845, LX. — *id.*, Nouv. note sur les chenilles, 1845, LXXIII. — *id.*, Continuation des obs. sur les chenilles, 1845, LXXXIV. — *id.*, Note sur l'éducation des chenilles, 1858, XCVI. — *Diana*, FAIRMAIRE, retrouvée dans les montagnes des env. de Madrid, 1849, LXII. — *Eglanterina*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 323. — *Isabellar*, GRAELLS, Descr. d'un Lépid. nouv. de la faune centrale de l'Espagne, 1850, 241. — *id.*, BUQUET, Individ. envoyé à M. Feisthamel par M. Graells, 1850, LI. — *Montezuma*, SALLÉ, Communic. de cette esp. nouv., 1856, LX. — *id.*, Ses carac-

ières distinctifs, 1856, XCII. — *Mylitta*, LUCAS, Note sur son éclosion au Jardin des Plantes, 1860, VII. — *Pernyi*, BECKER, Exhibition de cette esp., 1855, LX. — *id.*, LUCAS, Détails relatifs aux œufs de ce Lépid., 1855, LX. — *id.*, BUREAU, Procédé pour féconder artificiellement ses œufs, 1855, LX. — *Polyphemus*, LUCAS, Note sur l'éducation des chenilles, 1858, XCVI. — *id.*, Note sur l'éducation de cette esp., 1858, CXIV. — *id.*, Communic. sur le même sujet, 1858, CLXI. — *id.*, Non-accouplement des deux sexes obtenus d'éclosion, 1858, CLXVIII. — *Prometheus*, BECKER, Œufs mis à la disposition de MM. Guérin-Méneville et Lucas, 1858, CLI. — *id.*, LUCAS, Communic. sur l'éducation de cette esp., 1858, CLXI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Nouv. des éducations de cette esp., 1858, CLXVIII. — *id.*, LUCAS, Communic. de chenilles du troisième âge élevées au Muséum, 1858, CLXXIII. — *pyri*, BECKER, Il reste quelquefois plus de trois ans en chrysalide, 1846, XL. — *id.*, LUCAS, Cocon anormal, 1846, LXXXVIII. — *id.*, WACHANRU, Éclosion en avril d'une chrysalide piquée d'une épingle en septembre, 1852, XLI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 689. — *ricini*, BOISDUVAL, Lecture d'une notice sur le *Bombyx Cinthia*, 1854, LXIX. — *Selene*, LUCAS, Note sur son éclosion au Jardin des Plantes, 1860, VII. — *spini*, DESMAREST, Étoffe de sole écrue produite par sa chenille, 1841, VII.

**Satyres**, MARLOY, Obs. sur qqes chenilles, 1838, 263. — *Briseis*, *fidia*, *Scmcle*, 1838, 267. — *id.*, LEFEBVRE, Caractères distinctifs des Satyres leucomélaniens, 1832, 80. — *id.*, M. Génè n'en a pas trouvé en Sardaigne, 1835, LXXVII. — *id.*, Variations dans les taches des ailes, 1836, LXXIII. — *id.*, Errata de la note qui précède, 1836, fin du volume. — *id.*, DUPONCHEL, Division du genre Satyre en neuf groupes, 1833, 97.

**Satyrus** *Abd-el-Kader*, PIERRET, Descr. de trois nouv. esp. de Lépid., 1837, 19. — *Anthelca*, LEFEBVRE, Son identité avec *Thelephassa*, 1834, XXV. — *id.*, PIERRET, Prise à Smyrne et près d'Athènes, 1844, VIII. — *arcanioides*, Descr. de deux nouv. esp. de ce genre, 1837, 306. — *arcanius*, Var. ♀ recueillie dans la forêt de Fontainebleau, 1840, III. — *Arge*, LEFEBVRE, Caractères distinctifs, 1832, 88. — *Ariane*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 307. — *Aristeus*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 262. — *id.*, Var., BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 678. — *Briseis*, LUCAS, Note sur la forme de ses œufs, 1847, LXXIX. — *californius*, BOISDU-

VAL, 1852, 309. — *Clotho*, LEFEBVRE, Caractères distinctifs, 1832, 85. — *Darcet*, Addenda au mémoire sur les Satyres leucomélaniens, 1832, 440. — *id.*, Note sur la troisième décade du *Symbolæ physicæ*, 1832, 440. — *id.*, KLUG, Lettre établissant son identité avec *Titca*, 1834, xxiv. — *Dejanira*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur la chenille, 1846, xiii. — *epistigne*, DE LAPORTE, Note sur ce Satyre, 1834, 190. — *galactinus*, BOISDUVAL, 1852, 309. — *Galathea*, LEFEBVRE, 1832, 95. — *Hermione*, VILLENEUVE, trouvé à Lardy, 1858, clii. — *Hero*, BOISDUVAL, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiv. — *hanifa*, Ne diffère pas de l'*Anthe*, 1848, xxix. — *Ines*, LEFEBVRE, 1832, 88. — *Janira*, PIERRET, Accouplement de la ♀ avec *Argynnis Paphia* ♂, 1838, liv. — *id.*, BRUAND, Note sur l'accouplement du ♂ avec *Vanessa urticæ*, 1844, vi. — *id.*, PIERRET, Ce fait avait déjà été constaté par M. Bagriot, 1844, vi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Jolie var. ♀, 1849, vii. — *Lachesis*, LEFEBVRE, 1832, 85. — *id.*, PIERRET, pris aux environs d'Athènes par M. Signoret, 1844, viii. — *Larissa*, LEFEBVRE, 1832, 86. — *Lefeburci*, DOÛÉ, pris plusieurs indiv. dans les Pyrénées par M. Pierret, 1848, xlv. — *Lyllus* var. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 678. *Lyssa*, Note sur ce Satyre, 1853, 319. — *Nurag*, Note sur cette esp., 1855, viii. — *Œdipus*, PIERRET, Obs. sur son habitat et ses mœurs, 1846, lviii. — *id.*, Obs. rectificative, 1847, lxxvii. — *id.*, BOISDUVAL, Rem. de géographie entomologique, 1857, xxv. — *pirata*, Var. de *Briseis*, 1848, xxix. — *Præuri*, PIERRET, Descr. de deux nouv. esp. du genre Satyre, 1837, 304. — *Psyche*, LEFEBVRE, 1832, 88. — *id.*, Var. *Pherusa*, 1832, 88. — *Roxandra*, BOISDUVAL, Ne diffère pas de *glymenc*, 1848, xxix. — *Sthenclc*, Lépid. de Californie, 1852, 308. — *Styx*, BUGNON, Note sur ce Satyre, 1834, 337. — *Telephassa*, LEFEBVRE, Identique avec *Anthelca*, 1834, xxv. — *Tigelius*, Caractères distinctifs, 1832, 263. — *Titca*, KLUG, Lettre établissant son identité avec *Darcet*, 1834, xxiv.

**Scelaphila** *Walbomiana*, DUPONCHIEL, Platyomides, 1834, 447.

**Scodiana** *conspersaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 703. — *favillaccaria*, BERCE, trouvée à Fontainebleau, 1856, lxviii.

**Scoparia** *pyrenaicalis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 699.

- Scopula** *argillacealis*, *dispunctalis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 699.
- Scotophita** *tragopogonis*, DE VILLIERS, Obs. sur ses mœurs, 1842, XII.
- Selidosema** *ambustaria*, *semicanaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 703.
- Sericaria** (voir Ver à soie) *mori*, LUCAS, Obs. sur les cocons bisexuels, 1845, LXXXI.
- Sericoris** *antiquana*, GOUREAU, Note pour servir à son histoire, 1851, 323. — *astrana*, BRUAND, Obs. entomologiques, 1858, 480. — *conchana*, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 445. — *siderana*, BRUAND, Note sur cette esp., 1860, XLII.
- Sesamia** *nonagrioides*, LUCAS, trouvée en Algérie, 1856, LXXII. — *id.*, GUENÉE, Note en réponse à une précédente de M. Lucas, 1856, CXIV. — *id.*, Réponse de M. Lucas, 1856, CXV. — *id.*, Note sur les mœurs de cette esp., 1858, LXXI. — *id.*, VILLENEUVE, Chrysalides prises en Algérie, 1858, CCXVII.
- Sesia** *anthraciformis*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 266. — *apiformis*, BLISSON, Mém. sur les mœurs des Sésies, 1846, 218. — *bembeciformis*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Branche de saule contenant une chenille, 1846, LXVIII. — *chrysidiformis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 683. — *cynipsiformis*, BLISSON, 1849, XXXV. — *doryliformis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 684. — *hymenopteriformis*, 1860, 681. — *ichneumoniformis*, 1863, 683. — *mutilaformis*, BLISSON, 1846, 210. — *nomadæformis*, 1846, 213. — *arifrons*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 683. — *osmiæformis*, 1860, 684. — *scoliaformis*, trouvée dans la forêt de Bondy, 1847, LXIII. — *Theracæformis*, Lépid. de Sicile, 1860, 683. — *linciformis*, 1860, 681. — *tipuliformis*, BLISSON, 1846, 216. — *uroccriformis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 683. — *vespiformis*, BLISSON, 1846, 215. — *nov. sp.*, trouvée au mois de mars; détails de mœurs, 1849, XXIII.
- Sésies** (chenilles de), BLISSON, Mém. sur leurs mœurs, 1845, CI, e 1846, 207. — *id.*, PIERRET, Rem. à l'occasion de la notice de M. Blisson, 1845, CI.
- Simyra**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 341. — *Büssneri*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. de cette esp. découverte en Prusse, 1858, ALI. — *dubiosa*, *nervosa*, *venosa*, GUENÉE, 1837, 342.



**Siona dealbaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée à Compiègne, 1852, XXXVII. — *odessaria*, BOISDUVAL, Nouv. esp. fort remarquable, 1848, XXX.

**Smerinthus abyssinicus**, LUCAS, Communic. d'une planche représentant cette esp., 1857, XII. — *id.*, Descr. et fig. de cette nouv. esp., 1857, 606. — *ocellata*, WESTWOOD, Hybridisme avec *populi*, 1838, XIII. — *id.*, LUCAS, Var. remarquable rencontrée en Algérie, 1856, XCII. — *id.*, DOUMERC, Cas tératologique observé dans cette esp., 1860, VIII. — *populi*, WESTWOOD, Hybridisme avec *ocellata*, 1838, XIII. — *id.*, BRUAND, Rem. sur l'hermaphrodisme de cette esp., 1858, XVII. — *sperchius*, LUCAS, Identique avec *Sm. dyrus* Walk., 1858, CXLIX. — *Tatarinovii*, Note sur cette esp., 1858, CXLIX. — *tiliæ*, PIERRET, Chrysalide ayant supporté une congélation complète sans périr, 1844, LXX.

**Solenobia clathrella**, BRUAND, Notice sur la chenille, 1844, 195.

**Speranza conspicuaria**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, prise à Bondy fin d'avril par M. Ronsin, 1846, XLIX. — *id.*, PIERRET, Pris trois indiv. dans la forêt de Chantilly, 1846, XLIX.

**Sphinx**, LACORDAIRE, Chrysalide résistant à une chaleur de 60°, 1834, XXIV. — *id.*, BOISDUVAL, Note sur des chenilles observées dans les jardins de Paris, 1856, LXXXVII. — *Atropos*, DUPONCHEL, Opinion d'Engramel sur la cause du bruit qu'il fait entendre, 1838, LIV. — *id.*, NORDMANN, Envoi d'un N° de la Revue cuvierienne contenant un mémoire sur l'organe du cri de cette esp., 1838, LV. — *id.*, DUPONCHEL, Expériences pour découvrir l'origine de ce cri, 1839, 59. — *id.*, GOUREAU, Note sur sa stridulation, 1840, 125. — *id.*, ABICOT, La section de la trompe fait cesser le bruit, 1843, L. — *id.*, GHI-LIANI, Nouv. renseignements sur sa stridulation, 1844, LXXII. — *id.*, PARIS, de Gray, Note sur son cri particulier, 1846, XCV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Pièce en cire représentant une var. de la chenille, 1846, CX. — *id.*, PARIS, de Gray, Note contenant de nombreux détails sur son cri particulier, 1846, CXII. — *id.*, BECKER, Chenille ayant détruit en grand nombre des feuilles de tabac, 1854, VIII. — *Boisduvalii*, BUGNION, Note sur cette esp., 1839, 115. — *convolvuli*, PIERRET, Cas d'hermaphrodisme, 1842, LIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, S'est montré en grande abondance en Bretagne, 1846, XCIV. — *id.*, PIERRET, Pris par centaines dans les jardins de Paris et aux env., 1846, LXXXVI. — *cretica*, BUGNION, Note sur cette esp., 1839, 113. — *Dahlia*, RAMBUR, Lépid. de l'île de

Corse, 1832, 266. — *epilobii*, Hybride de *vespertilio* et de *euphorbiæ*, 1832, 426. — *euphorbiæ*, DE SELYS-LONGCHAMPS, Var. de cette esp., 1856, CX. — *ligustri*, BRUAND, Indiv. en chrysalide depuis quatre ans, 1849, 43. — *id.*, LABOULBÈNE, Larve trouvée dans le corps de la chenille, 1850, L. — *nerii* (voyez genre *Deilephila*), BRUAND, Chenilles trouvées à Besançon et à Mulhouse, 1858, XVIII. — *pinastri*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chenille vivante prise au bois de Boulogne, 1848, LII. — *pini*, trouvé en assez grand nombre au bois de Boulogne, 1850, XXXV. — *porcellus* (voyez genre *Deilephila*), VILLENEUVE, OÙufs provenant d'accouplements à la lumière d'une lampe, 1858, CLI. — *id.*, Rectif. de la page CLI, 1858, CCXXVI. — *tithymali*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Descr. et figure de la chenille, 1858, 488. — *vespertilioides*, RAMBUR, Hybride de *Vespertilio* et d'*Hippophæus*, 1832, 426.

**Spilotes gloriosaria**, BOISDUVAL, Rem. de géographie entomologique, 1857, XXV.

**Spœlotis nyctimera**, BRUAND, Notice sur sa chenille, 1844, 192. — *præcox*, COLIN, Note sur ses mœurs, 1847, CX. — *id.*, BERCE, trouvée à Fontainebleau, 1856, LXVIII.

**Stemmatophora combustalis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 697.

**Stenia carnealis**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 697.

**Stenoptera orbonella**, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 146.

**Stilbia?** *Philopalis*, DE GRASLIN, Mém. sur une esp. inédite de la France méridionale, 1852, 413. — *stagnicola*, Sa descr. dans ses divers états, 1842, 303.

**Strenia clathrata**, RATTET, Sur une var. remarquable de cette esp., 1859, 559.

**Syntomis Mestralii**, BUGNION, Descr. de quatre nouv. esp. de Lépid. de Syrie et d'Égypte, 1837, 439. — *Phegæa*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 685.

**Syntomopus**, GUENÉE, Noctuélides, 1838, 115. — *cinnamomea*, GUENÉE, Notes sur qqes nouv. genres à établir, 1837, 223. — *id.*, Noctuélides, 1838, 116.

**Syrichthus althææ**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 680. — *alveolus*, BOISDUVAL, trouvé à Compiègne, 1852, XXXIV. — *cespitalis*, Lépid. de la Californie, 1852, 312. — *ericetorum*, 1852,

- 313. — *Eucrate*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 681. — *oilus*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 311. — *onopordi*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 681. — *ruralis*, BOISDUVAL, 1852, 311. — *scriptura*, 1852, 312. — *scrratulæ*, BECKER, Communic. de plusieurs indiv. reçus d'Allemagne, 1857, xxxv.

## T.

**Tænlocampa**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 477. — *ambigua*, *carnca*, *gothica*, *gracilis*, *instabilis*, *miniosa*, *opima*, *populæti*, *rubella*, *rubricosa*, *stabilis*, 1839, 480.

**Talæporia**, GUENÉE, Note monographique et rectificative sur ce genre, 1846, 5. — *clathrella*, *lapidicella*, 1846, 14. — *minorella*, 1846, 13. — *murinella*, 1846, 14. — *petrella*, 1846, 15. — *politella*, *pseudobombycella*, 1846, 13. — *tabulella*, 1846, 15. — *triquetrella*, 1846, 14.

**Teigne**, DOUMERC, Larve se nourrissant de la pulpe des châtaignes, 1839, XLIV.

**Teigne à lozange de l'Orthotriche**, DOUMERC, Note sur cette esp., 1860, 579.

**Teigne des toiles d'Araignée**, DOUMERC, Envoi d'une notice sur cette esp., 1860, XXIV.

**Teinopalpus imperialis**, LUCAS, Communic. de cette esp. des plus remarquable, 1856, v.

**Tephrosia crepuscularia**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Esp. anormale trouvée dans la forêt de Bondy, 1856, XLVIII. — *extersaria*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV.

**Teras effractana**, LEFEBVRE, Note sur son accouplement avec *emargana*, 1832, 231. — *id.*, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 444. — *emargana*, LEFEBVRE, Son accouplement avec *effractana*, 1832, 221.

**Tethea**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 317. — *ambusta*, *rectusa*, *sublusa*, 1837, 318.

**Thais Cassandra**, BERCE, Cas d'ectromélie, 1847, CXI. — *Hypsipyle*, GHILIANI, Obs. importante sur cette esp., 1851, LVI. — *id.*, LABOUL-

BÈNE, Note sur l'anatomie des Insectes, 1852, 345. — *medesicaste*, DUPONCHEL, Obs. sur des chrysalides, 1835, 661. — *id.*, PIERRET, Ichneumons sortis de deux chrysalides, 1846, xxvi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Indiv. éclos après trois ans passés en chrysalides, 1857, c.

**Thanaos** *Briso*, BOISDUVAL, Lépid. de Californie, 1852, 310. — *Cervantes*, DE GRASLIN, Note sur une exploration en Andalousie, 1836, 558. — *id.*, *Cervantes*, *Juvnalis*, BOISDUVAL, 1852, 310. — *Tages*, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiv. — *tristis*, Lépid. de la Californie, 1852, 311.

**Thecla** *auretorum*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 288. — *dumetorum* 1852, 291. — *Eryphon*, 1852, 290. — *grunus*, *iroides*, 1852, 289. — *melinus*, 1852, 287. — *pruni*, trouvé à Compiègne, 1852, xxxiii. — *sæpium*, Lépid. de Californie, 1852, 288. — *sylvinus*, 1852, 287. — *W. album*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. accidentelles des env. de Paris, 1857, cxxi. — *id.*, Descr. de var. de Lépid., 1858, 704.

**Thyatira**, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 226. — *batis*, 1838, 227. — *id.*, BRUAND, Note sur deux Noctuelles devant être types de deux genres différents, 1849, 40. — *id.*, GUENÉE, Obs. et réponse à la note de M. Bruand, 1850, 107. — *id.*, De la place de ce genre dans la méthode, 1850, 113. — *derasa*, Noctuéliques, 1838, 227.

**Timia** *margarita*, DUPONCHEL, découverte aux env. de Montpellier, 1841, xx. — *id.*, PIERRET, découverte par M. Ghiliani aux env. de Turin, 1843, l. — *id.*, GHILIANI, Note sur la géographie entomologique de cette esp., 1851, xcvi.

**Tinea**, GUENÉE, Réclamation de priorité contre M. Herrich-Schæffer, 1856, xlviii. — *accessella*, DUPONCHEL, Obs. à la suite d'un mém. de M. Boyer de Fonscolombe, 1837, 187. — *Aglacella*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Descr. d'une nouv. esp. du genre Teigne, 1840, 61. — *cræcella*, LEFEBVRE, Rapport de M. Duméril à l'Institut sur cette esp., 1835, lxxviii (1). — *decuriella*, DUPONCHEL, Notice sur une esp. de Tinéite. 1832, 300. — *gelatella*, BRUAND, Chenille trouvée en mai près de Châtillon, 1844, vi. — *olella*, *olivella*, BOYER DE FONSCOLOMBE, Notice sur deux Teignes qui attaquent l'olivier, 1837, 179. — *padella*, LEFEBVRE, Résultat d'une expérience faite à Munich sur sa toile, 1833, iii. — *tapczella*, DUPONCHEL, Tinéites, 1838, 133.

(1) Le texte des Annales indique, par erreur, LXVIII.

**TINÉIDES**, REICHE, Papillons éclos dans une cave dans les premiers jours de l'année, 1855, VIII. — *id.*, LABOULBÈNE, Foureaux et indiv. de deux esp. pris sur des arbres fruitiers, 1856, LXXXVI. — *id.*, BRUAND, Classif. et examen de leurs caractères, 1857, 807, et 1858, 601.

**TINÉITES**, AUDOUIN, Obs. sur les dégâts causés au *Pinus sylvestris*, 1837, LVI. — *id.*, L'auteur rappelle le volume publié par Joyeuse en 1773, 1837, LX. — *id.*, DUPONCHEL, Division de cette tribu, 1838, 127. — *id.*, Généralités, 1838, 150. — *id.*, STANTON, Quelques mots sur les mœurs de leurs chenilles, 1856, 749, et 1858, 159.

**Tortrix**, GUENÉE, Réclamation de priorité de M. Herrich-Schæffer, 1856, XLVIII. — *id.*, De quelques esp. de *Tortrix* de Linné, 1847, 421. — *avellana*, 1847, 424. — *Brandcrana*, 1847, 426. — *brunnica*, 1847, 429. — *id.*, Var., 1847, 432. — *compressana*, DUPONCHEL, Descr. de la chenille, 1840, 62. — *cratægana*, Platymides, 1834, 443. — *cruciana*, GUENÉE, 1847, 439. — *dumicolona*, BRUAND, prise à Parizet dans une grotte, 1858, CXXXVII. — *hastiana*, GUENÉE, 1847, 427. — *herminiana*, MARGAROT, Chrysalide découverte entre les feuilles du *Nerium oleander*, 1835, XLII. — *Kækeritziana*, GUENÉE, 1847, 437. — *Lediana*, *logiana*, *moderiana*, 1847, 438. — *occultana*, 1847, 436. — *pilleriana*, BRULLÉ, Excursion avec M. Audouin dans les vignes d'Argenteuil, 1837, LVII. — *id.*, Annonce du départ de M. Audouin pour le Maconnais, 1837, LVII. — *id.*, DUPONCHEL, Les Allemands ne la regardent pas comme nuisible à la vigne, 1837, LVIII. — *pratana*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur quelques Lépid. d'Islande, 1857, 12. — *ratana*, GUENÉE, 1847, 433. — *Rosana*, 1847, 423. — *semifusca*, 1847, 435. — *sinuana*, 1847, 432. — *Solan-driana*, 1847, 430. — *sordidana*, 1847, 434. — *trapezana*, 1847, 431.

**Toxocampa**, GUENÉE, Noctuéliques, 1841, 75. — *cracca*, *limosa*, *ludicra*, *lusoria*, *pastinum*, *rectangularis*, *viciæ*, 1841, 77.

**Trachea**, GUENÉE, Noctuéliques, 1839, 475. — *piniperda*, 1839, 477. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII.

**Tricosoma**, LUCAS, Revue de ce genre, 1853, 391. — *algiricum*, 1853, 415. — *atlanticum*, 1853, 412. — *bæticum*, RAMBUR, Notice sur plusieurs Lépid. du midi de l'Espagne, 1836, 587. — *id.*, LUCAS, 1853, 400. — *corsicum*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 272. — *id.*, LUCAS, 1853, 397. — *hemigenum*, 1853, 405. — *mauritanicum*,

1853, 414. — *parasitum*, 1853, 403 et LXXI. — *Pierreti*, RAMBUR, L'insecte communiqué par M. Carreño est celui-ci, 1844, XXVII. — *id.*, CARRENO, Réponse aux obs. de M. Rambur, 1844, XXVIII. — *pudens*, LUCAS, 1853, 410.

**Triphaena**, GUENÉE, Noctuéliques, 1837, 365. — *Cardinyi*, *fimbria*, *interjecta*, *janthina*, *linogrisea*, *orbona*, *pronuba*, 1837, 367. — *pronuba*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 9. — *subscqua*, GUENÉE, 1837, 367.

**Trypana**, GUENÉE, Noctuéliques, 1844, 58. — *cardui*, *cognata*, 1844, 59.

## U.

**Urania** *pygmæa*, BOISDUVAL, Obs. sur sa chenille, 1834, XXIX. — *rhiphæus*, Anomalie du genre *Urania*. 1833, 248, et 1834, XXIX.

**Urapteryx** *sambucata*, BOTTIN-DESYLLES, Notice sur la chenille, 1837, 401.

**Uropus** *ulmi*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 278.

## V.

**Valeria** *jaspidea*, BRUAND, Note sur divers Lépid., 1849, 39. — *oleagina*, GUENÉE, Noctuéliques, 1838, 121.

**Vanessa** *Antiopa*, BOISDUVAL, Lépid. de la Californie, 1852, 307. — *Atalanta*, BRUAND, Note sur le produit de son hybridisme avec *urticæ*, 1844, VI. — *id.*, LABOULBÈNE, L'une des ailes plus petite que la correspondante, 1851, CXII. — *id.*, BOISDUVAL, 1852, 307. — *californica*, 1852, 306. — *cardui*, GHILIANI, Passage, considérable, 1851, LV. — *cardui*, GIRARD, Fréquente en 1858 et peu les années précédentes en Seine-et-Marne, 1859, CCXXI. — *cardui*, *carye*, *cœnia*, *huntera*, BOISDUVAL, 1852, 307. — *Ichnusa*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 260. — *Io*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXVII. — *id.*, PIERRET, trouvé en Sicile, 1842, LII. — *morio*, GIRARD, Commune en 1858 dans le département

de Seine-et-Marne, 1859, CCXXI. — *polychloros*, DUPONCHEL, Var. curieuse, 1841, XXX. — *Progne*, BOISDUVAL, 1852, 306. — *prorsa*, PIERRET, Nouv. obs. sur ses variations, 1845, LXXVI. — *id.*, PIERRET et DUPONCHEL, Discussion sur cette esp., 1845, LXXX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Entozoaires provenant de la chenille et de la chrysalide, 1852, LI. — *id.*, BOISDUVAL, trouvée à Compiègne, 1852, XXXIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXXVII. — *id.*, Beaux exemplaires obtenus de chenilles, 1854, LXXIV. — *id.*, BOISDUVAL, Détails à ce sujet, 1854, LXXV. — *urticæ*, GODET, Passage considérable sur les bords du lac de Neuchâtel, 1832, 237. — *id.*, BRUAND, Accouplement de la ♀ avec *Satyrus Janira*, ♂, 1844, VI. — *id.*, Note sur le produit de son hybridisme avec *Atalanta*, 1844, VI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Var. accidentelle recueillie aux env. de Paris, 1857, CXXI. — *V-Album*, LEFEBVRE, Var. accidentelle présentée de la part de M. Daube, 1836, XXIV.

**Ver à soie**, LEFEBVRE, Nouv. esp. des forêts de la Nouvelle-Grenade, 1834, LXIII. — *id.*, AMYOT, Annonce de la prochaine publication d'un ouvrage chinois traitant du Ver à soie et des moyens de l'élever, 1837, XIII. — *id.*, Grande médaille d'or décernée à M. Bassi pour la découverte de la nature et du développement de la Muscardine, 1837, XXIV. — *id.*, Prix de deux mille francs pour prévenir et arrêter cette maladie, 1837, XXIV. — *id.*, AMYOT, Obs. importantes des principaux ouvrages chinois, 1838, 11. — *id.*, AUBÉ, Influence de la nourriture sur la production des sexes, 1844, LXXXVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, A Constantinople on nourrit le Ver à soie avec de la laitue, 1846, XIX. — *id.*, LUCAS, Note sur deux générations par an, 1846, LXXX. — *id.*, AUDOUIN, Recherches sur la Muscardine et le Ver à soie, 1837, LXXXI. — *id.*, REPOS, Obs. sur un nouveau moyen de le nourrir, 1848, XII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Lecture d'un mém. sur ses maladies, 1849, XCI. — *id.*, M. Guérin va dans le midi de la France étudier ses maladies, 1850, XXXI. — *id.*, Lecture d'un nouv. mém. sur ces maladies, 1850, XLIV. — *id.*, L'auteur va continuer ses études dans le midi de la France, 1851, XXV. — *id.*, Principaux résultats des travaux de l'auteur, 1851, XCI. — *id.*, de Chine, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Coloration des chenilles différente de celle du *Bombyx mori*, 1846, LXVIII. — *id.*, BASSI, Note sur un indiv. monstrueux, 1852, VIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Détails sur le récent voyage entomologique de l'auteur, 1853, LX. — *id.*, AUBÉ, Mém. sur les moyens d'en améliorer les races, 1854, 367. — *id.*,

GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur les travaux entrepris à la magnanerie de Sainte-Tulle, 1854, L. — *id.*, Du chêne, Éducation heureusement faite à Lausanne, 1856, VII. — *id.*, AUBÉ, Nécessité de mélanger et de croiser les races pour les améliorer, 1856, VII. — *id.*, REICHE, Médailles d'honneur décernées par la Société d'encouragement de Londres, 1856, VII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques détails sur la maladie régnante, 1856, LXXIV. — *id.*, Causes de l'épizootie actuelle, remèdes pratiques, 1857, X. — *id.*, NOURRIGAT, Cocons d'une race importée de Chine, 1857, LXXI. — *id.* GUÉRIN-MÉNEVILLE, Idée sommaire des études de l'auteur sur l'épidémie actuelle, 1857, CXIX. — *id.*, Du ricin, Résultats d'un travail sur la richesse en soie des cocons, 1857, CXXXVIII. — *id.*, Obs. sur la maladie appelée *Gatine*, 1858, CIX. — *id.*, Communic. sur leur maladie, 1858, CXLIV. — *id.*, Communic. sur l'épidémie de la *Gatine*, 1858, CLXV. — *id.*, Rem. sur l'hybridation des Vers à soie du ricin et du vernis du Japon, 1858, CCIX. — *id.*, Rapport sur l'emploi industriel de la bourre de soie de celui du ricin, 1858, CCXIV. — *id.*, Vers provenant de l'hybridisme de ceux du ricin et de l'aylante, 1858, CCXV. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. à cette occasion, 1858, CCXVI. — *id.*, RAUTOU, Obs. sur leur éducation, 1858, CCLI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Qques obs. relatives à l'ouvrage de M. de Quatrefages, 1860, XIII. — *id.*, Lecture d'une note sur les étoffes fabriquées en Chine, 1860, XIII. — *id.*, Qques détails sur plusieurs éducations de celui de l'aylante, 1860, LXIV. — *id.*, DE LACERDA, Détails sur les éducations faites à Bahia, 1860, LXIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Muscide parasite ayant nui aux éducations en plein air de celui de l'aylante, 1860, LXXXIX.

## X.

**Xanthia**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 490. — *aurago*, *cerago*, *citrage*, *croceago*, *ferruginea*, *gilvago*, *palleago*, *rubecula*, *silago*, *sulphurago*, 1839, 494,

**Xanthosetia** *hamana*, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 447.

**Xilana**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 503. — *australis*, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 291. — *conformis*, *Leautieri*, GUENÉE, 1839,



505. — *exoleta*, GIRARD, Sur la longévité de cette esp., 1859, CCXXI, — *Lefebvrei*, BUGNION, Descr. de quatre nouv. esp. de la Syrie et de l'Égypte, 1837, 443. — *Merckii*, RAMBUR, 1832, 293. — *Merckii*, *oculata*, *petrificata*, *rhizoliltha*, GUENÉE, 1839, 505. — *vetusta*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Trouvé la chenille à Compiègne, 1852, XXVII. — *Yvanii*, DUPONCHEL, Descr. d'une nouv. esp. de Noctuelles, 1833, 257. — *Zinckenii*, GUENÉE, 1839, 505.

**XYLINIDI**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 500.

**Xylocampa**, GUENÉE, Noctuélides, 1839, 512. — *lithoriza*, Qques nouv. genres à établir dans le genre *Noctua* de Linné, 1837, 227. — *id.*, Noctuélides, 1839, 512. — *ramosa*, Qques nouv. genres à établir, 1837, 227.

**Xylophasia**, GUENÉE, Noctuélides, 1837, 356. — *hepatica*, *lateritia*, *lithoxylea*, *musicalis*, *petrorhiza*, *polyodon*, *putris*, *rurea*, *scolopacina*, 1837, 358.

**Xylopoda**, DUPONCHEL, Platyomides, 1834, 448.

## Y.

**Yponomeuta**, GOUREAU, Faits relatifs à divers parasites de ce genre, 1855, xxxv. — *padella*, Ravages causés aux pommiers par ses chenilles, 1848, LXV. — *id.*, Ravages qu'elle cause aux haies d'aubépine, 1845, LXXV. — *id.*, Note pour servir à son histoire et à celle de ses parasites, 1847, 239. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ravages faits par sa chenille, 1848, LXV.

**Ypsolopha** *austriacella*, *bicingulatella*. BRUAND, Esp. prises dans le département du Doubs, 1854, XXVII. — *congressuriella*, Descr. d'une nouv. Tinéite, 1858, LXXVIII. — *id.*, Note sur cette esp. nouv., 1858, 471. — *speluncicolella*, Esp. prises dans le Doubs, 1854, XXVII.

## Z.

**Zegris**, RAMBUR, Notice sur qqes Lépid. du midi de l'Espagne, 1836, 581. — *Eupheme*, 1836, 582. — *id.*, PIERRET, Elle habite en même temps l'Espagne et la Crimée, 1844, ix.

**Zelima paradoxa**, BOISDUVAL, Obs. sur un mém. de M. Zencken-Sommer, 1832, 418.

**Zeonia**, MORISSE, Essai sur le genre *Zeonia*, 1837, 423. — *autestes*, 1837, 424. — *heliconides*, 1837, 428. — *Lysippus*, 1837, 425. — *Melybæus*, 1837, 426. — *Morissci*, 1837, 427. — *Octavius*, 1837, 426. — *Periander*, 1837, 424. — *tedea*, 1837, 425.

**Zerene pantaria**, BERCE, Chenille non encore décrite ni figurée en France, 1858, CXVII. — *ulmaria*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, récoltée en grand nombre à Montfermeil, 1857, XXXV.

**Zethes insularis**, RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1833, 29. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 696.

**Zeuzera æsculi**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 689.

**Zonilia Schimperi**, LUCAS, Descr. et fig. de deux nouv. esp. de Sphingides, 1857, 601. — *id.*, Présentation d'une planche représentant cette esp., 1857, XII.

**Zygæna**, RAMBUR, Engourdissement de jeunes chenilles pendant l'été, 1837, LXI. — *id.*, BRUAND, Proposition de l'examen de ce groupe pour le Congrès de Paris, 1858, LXV. — *achilleæ*, DUPONCHEL, Var. fort curieuse présentée au nom de M. Bruyat, 1841, XXX. — *id.*, PIERRET, Var. à ailes jaunes trouvée dans la forêt de Bondy, 1842, XLI. — *id.*, Accouplement de deux mâles avec une femelle, 1843, XXXI. — *id.*, Quatre indiv. de la var. jaune trouvée auprès de Livry, 1843, XXXI. — *id.*, RONSIN, Qques détails au sujet de deux mâles accouplés avec une femelle, 1846, XXVI. — *id.*, PIERRET, trouvée en grande quantité dans les env. de Lardy, 1846, LIV. — *algira*, VILLE-

NEUVE, Envoyée d'Algérie par M. Poupillier, 1858, xxxii. — *balea-rica*, GUENÉE, Notice sur trois esp. de Lépid. nocturnes, 1843, xl. — *id.*, CHEVROLAT, Obs. sur son double habitat, 1843, xliii. — *id.*, ABICOT, Note sur sa chenille et sa descr., 1849, 175. — *id.*, DE GRASLIN, Obs. sur le travail de M. Abicot, 1849, lxxxii. — *cedri*, BRUAND, Descr. de Lépid. nouv., 1846, 202. — *Contaminei*, PIERRET père, trouvée dans les Pyrénées, 1846, lxxxiii. — *corsica*, RAMBUR, Lépid. de la Corse, 1832, 267. — *Dsidsilia*, BOISDUVAL, C'est tout à fait l'*Olivieri*, 1848, xxx. — *cphialtes*, LEFEBVRE, Note sur son accouplement avec *filipendula*, 1832, 232. — *crythrus*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 684. — *crulans*, MARTIN, Différentes localités où elle se trouve abondamment, 1858, cxl. — *filipendulæ*, LEFEBVRE, Note sur son accouplement avec *cphialtes*, 1832, 232. — *id.*, DE VILLIERS, Note sur un accouplement de deux Zygènes d'esp. différentes, 1832, 421. — *id.*, PIERRET, Var. recueillie dans la forêt de Fontainebleau, 1840, iii. — *hypocrepididis*, MARTIN, Var. trouvée à Lardy, 1855, xcv. — *Minos*, DE VILLERS, 1832, 421. — *id.*, BOISDUVAL, Critique du fait précédent, 1832, 426. — *occitanica*, Monstruosité observée dans cette esp., 1853, lxxviii. — *Ochsenheimeri*, *oxytropis*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 685. — *puccedani*, ♀ trouvée accouplée avec *hypocrepididis*, ♂, 1854, lxxvi. — *punctum*, Lépid. de Sicile, 1860, 684. — *Rognada*, BOISDUVAL, Esp. nouv. entre *onobrychis* et *Scowitzii*, 1848, xxx. — *Sarpedon*, DONZEL, trouvée dans le Forez, 1842, xlii. — *syracusia*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. de Sicile, 1860, 685. — *trifolii*, trouvée à Compiègne, 1852, xxxvii. — *Valentini*, BRUAND, Descr. de Lépid. nouv., 1846, 201. — *Zulcima*, PIERRET, Descr. de trois nouv. esp. de Lépid., 1837, 22.

---

## Articles généraux.



### Aberrations.

Discussion sur ces var. accidentelles, 1844, VII.

### Accouplements anormaux. (Voyez *Hybridisme*.)

CONSTANT fils, Obs. entomologique de M. Landa, 1857, XLI. — Obs. de divers membres à ce sujet, 1857, XLII.

### Apparitions précoces. (Voyez *Bombyx Tau* et *Aplecta herbida*.)

### Apparitions tardives. (Voyez *Bombyx lancstris* et *Saturnia pyri*, etc., 1846, XL.)

PIERRET, Elles sont dues à la dureté des coques, 1846, XL.

### Capullo de Madroño.

SALLÉ, Note sur cette matière produite par des chenilles du genre *Euterpe*, 1857, 20.

### Catalogues.

RAMBUR, Lépid. de l'île de Corse, 1832, 245, et 1833, v. — *id.*, DUPONCHEL, Catal. des Lépid. trouvés dans la Lozère, 1834, 271 et 291. — *id.*, GUENÉE, *Lepidopterorum nocturnorum*, divisio VII, 1845, 135 et 297. — *id.*, BOISDEVAL, Liste des Lépid. trouvés à Compiègne, 1852, XXXIII. — *id.*, GUILLEMOT, Lecture de son Catalogue des Lépid. du Puy-de-Dôme, 1851, XII. — *id.*, SICHEL, Lépid. d'Europe, de Sibérie et d'Asie Mineure, par M. Herrich-Schæffer, 1856, XXXI. — *id.*, FAIRMAIRE, Lépid. recueillis pendant la session extraordinaire de 1857, 1857, 643. — *id.*, LABOULBÈNE, Lépid. recueillis pendant la session de 1858, 1858, 882. — *id.*, EMM. MARTIN, Lépid. recueillis pendant le Congrès de Clermont-Ferrand, 1859, 674. — *id.*, BELLIÉRIE DE LA CHAVIGNERIE, Lépid. observés en Sicile de mars à septembre 1859, 1860, 705. — *id.*, EMM. MARTIN, Lépid. recueillis pendant l'excursion en Franche-Comté, 1860, 1008.

**Chasses.**

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Chasse à la lanterne sur les raisins des vignes en espalier, 1851, CIV. — *id.*, Chasse à la miellée, heureux résultats obtenus, 1851, CIII. — *id.*, BUREAU, Sur la chasse des Noctuelles, 1855, 215.

**Chenilles.** (Voyez au mot *Classification.*)

LEFEBVRE, Chenille venimeuse suivant la plante dont elle se nourrit, 1851, XXV. — *id.*, GOUREAU, Histoire des Ins. qui vivent dans les gousses du genêt épineux, 1847, 245. — *id.*, GUENÉE, Mémoire sur qqes chenilles des env. de Châteaudun, 1834, 193. — *id.*, BRUAND, Épreuves pour les débarrasser des œufs d'Ichneumons, 1843, XXXVIII. — *id.*, DOÛÉ, Trois chenilles présentant des végétations bien marquées, 1846, XCII. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. sur ces trois chenilles, 1846, XCIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Div. esp. d'Ichneumons obtenues de chenilles, 1847, XXIII. — *id.*, Méthode ordinaire d'insufflation un peu modifiée, 1848, XLIX. — *id.*, REICHE, Détails sur une invasion de chenilles dans le canton de Phalsbourg, 1848, LVI. — *id.*, MILLIÈRE, Note sur les propriétés vénéneuses de la chenille du *Deilephila euphorbiæ*, 1851, LXXVIII. — *id.*, BAR, Détails sur les chenilles observées près de Cayenne, 1854, XIX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. de celles préparées provenant de la Sardaigne, 1855, X. — *id.*, BOISDUVAL, Note sur quelques chenilles de Sphinx observées dans les jardins de Paris, 1856, LXXXVII. — *id.*, Détails sur celles qui ravagent le bois de Boulogne, 1858, XCI.

**Chrysalides.**

PIERRET, Plusieurs cas d'éclosion tardives, 1844, LXX. — *id.*, BOISDUVAL et PIERRET, Cas de résistance aux froids les plus rigoureux, 1844, LXX. — *id.*, FAIRMAIRE, Indiv. transformé en papillon, quoique traversé par une épingle, 1853, LI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Moyen d'obtenir des éclosions complètes, 1856, LXXXIII.

**Classification.**

DUPONCHEL, Les caractères fournis par les chenilles doivent-ils prévaloir dans la classification, 1837, 411. — *id.*, GUENÉE, Mémoire en réponse à celui de M. Duponchel, 1838, 231. — *id.*, DUPONCHEL, 2<sup>e</sup> partie de son mémoire sur ce sujet, 1838, 247. — *id.*, GUENÉE, Lettre en réponse aux obs. de M. Duponchel, 1838, LXV. — *id.*, Réponse au 2<sup>e</sup> mémoire de M. Duponchel, 1839, 99. — LACORDAIRE,

Lettre à M. Duponchel sur cette discussion, 1839, 595. — *id.*, GUENÉE, Essai sur une nouv. classification des Microlépidoptères, 1845, 105.

### Collections.

Lépid. à vendre chez M. Buquet, 1834, LXXI. — Annonce de la vente d'une collection de Lépid. imprimés, 1832, 429. — *id.*, AUDOUIN, Acquisition par le Muséum de la coll. de Lépid. exotiques de M. Lacordaire, 1850, XLVIII. — *id.*, PIERRET, L'auteur vient d'acheter la coll. de M. Levillant, 1848, XCII. — *id.*, DOÛÉ, Annonce du don fait à la Société par M. Pierret père de la collection de son fils, 1850, XXXII. — *id.*, Acceptation par la Société; décisions à cette occasion, 1850, XXXII. — *id.*, Lettre de remerciement à M. Pierret père, 1850, XXXV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Rapport de la commission pour la conservation de cette collection, 1855, XI. — *id.*, Discussion et décision en faveur de la vente, 1855, XLII. — *id.*, Proposition de M. Milne-Edwards; explications; retrait de la proposition, 1855, XLIV. — *id.*, Dépôt d'un paquet cacheté indiquant le prix *minimum*, 1855, LVIII. — *id.*, Lettre de M. Bellier de la Chavignerie, 1855, LXV. — *id.*, Extraits de procès-verbaux, etc., relatifs à la vente, 1855, LXX. — *id.*, Rapport de la commission relatif à la vente, 1855, LXXI. — *id.*, Commission chargée d'indiquer les livres à acheter sur les fonds provenant de la vente de la collection Pierret, 1856, XXII. — *id.*, Lettre du Président à M. Guillemot à Thiers, 1856, LIV. — *id.*, Lettre de M. Guillemot en réponse à celle du Président, 1856, LXI. — *id.*, Discussion sur l'exclusion de M. Guillemot, 1856, LXI. — *id.*, Nouv. décision de la Société sur la radiation de M. Guillemot du nombre de ses membres, 1856, LXII. — *id.*, Lettre du Président à M. Guillemot, lui annonçant la décision de la Société, 1856, LXV. — *id.*, La Société décide que la réponse de M. Guillemot à la dernière lettre du Président, communiquée en particulier à chacun des membres présents, ne sera point lue en séance, 1856, LXVI. — *id.*, LAMOTTE, Protestation contre la vente de la collection Pierret et contre l'expulsion de M. Guillemot, 1856, LXX. — *id.*, BECKER, Les collections envoyées par MM. Bar ont beaucoup souffert en route, 1853, XXXI.

### Cramer.

BECKER, MM. Hewitson et Saunders vont en publier la continuation, 1851, CXVII.

**Crin des Lépidoptères. (Voyez au mot *Lépidoptères*.)****Échenillage.**

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Utilité d'engager le gouvernement à faire écheniller, 1848, LXII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Proposition d'adresser au gouvernement un projet de règlement à ce sujet, 1848, LXVII. — *id.*, Commission nommée pour étudier cette question, 1848, LXVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Rapport à adresser au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, 1848, LXXIV. — *id.*, Lettre du Ministre remerciant la Société de son envoi, 1848, LXXXV. — *id.*, Nouvelle Lettre du Ministre à ce sujet, 1848, XC. — *id.*, AMYOT, Détails sur les travaux de la Commission, 1849, XXIV. *id.*, Détails sur la législation en cette matière, 1849, XXVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, L'auteur fait part des recherches de M. Herpin à ce sujet, 1849, XXVI. — *id.*, Envoi par le Ministre de sa circulaire sur l'échenillage, 1849, XXIX.

**Éclosions tardives.**

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur ce sujet, 1856, LXVIII.

**Excursion entomologique.**

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. de celle faite par l'auteur dans les Pyrénées orientales, 1857, XCIX. — *id.*, Quelques détails sur une excursion dans les Basses-Alpes, 1853, XLVIII. — *id.*, Communication sur une excursion dans le nord des Alpes de Provence, 1855, LXXII.

**Exploration entomologique.**

DE GRASLIN, Notice sur celle de l'Andalousie, 1856, 547.

**Géographie entomologique.**

MOUSSA, Note sur celle de quelques Lépidoptères, 1856, XXX.

**Hermaphroditisme.**

DE DONCHER, Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite, 1865, 115. — *id.*, LÉONARD, Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite, 1865, 116. — *id.*, PAULIS, Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite, 1865, 118. — *id.*, GILBERT, Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite, 1867, 119. — *id.*, FLEURY, Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite, 1868, 120. — *id.*, GILBERT, Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite, 1868, 121.

**Hybridisme.** (Voyez *Accouplements anormaux*.)

WESTWOOD, Obs. sur l'accouplement des *Smerinthus populi* et *ocellata*, 1838, XIII. — PIERRET, Accouplement de *Satyrus Janira* ♀ avec *Argynnis Paphia* ♂, 1838, LIV.

**Lardy (Roches de).**

PIERRET, On y trouve différentes espèces rares, 1845, LXXVI.

**Larves.**

LUCAS, Obs. sur celles habitant les graines d'une Euphorbiacée, 1858, x.

**Lépidoptères.**

POEY, Obs. sur le crin des Lépid. nocturnes et crépusculaires, 1832, 91. — *id.*, Errata du mém. de M. Poey, 1832, 441. — *id.*, RAMBUR, Catalogue de ceux de l'île de Corse, 1832, 245. — *id.*, Liste générale des esp., 1833, 52. — Errata du catalogue des Lépid. de l'île de Corse, 1833, CI. — *id.*, BOISDUVAL, Obs. sur un mémoire de M. Zenken-Sommer, 1832, 416. — *id.*, EMY, Nouv. mode d'impression des Lépid., 1833, L. — *id.*, LACORDAIRE, Notice sur les habitudes des Lépid. Rhopalocères, 1833, 379. — *id.*, DUPONCHEL, Catalogue des Lépid. trouvés dans la Lozère, 1834, 271 et 291. — *id.*, BOISDUVAL, L'auteur en a reçu un grand nombre en communic. du pays des Hottentots, 1834, XLIII. — *id.*, AUDOUIN, Résumé des recherches microscopiques sur les ailes des Lépid., 1834, LVI. — *id.*, RAMBUR, Descr. de plusieurs esp. inédites du centre et du midi de la France, 1834, 379. — *id.*, BECKER, Communic. des esp. trouvées en Andalousie par M. Lorquin, 1847, LVII. — *id.*, LEFEBVRE, Descr. de qqes esp. hyperboréennes, 1836, 389. — *id.*, DE GRASLIN, Notice sur une exploration en Andalousie, 1836, 547. — *id.*, RAMBUR, Notice sur plusieurs esp. de l'Espagne méridionale, 1836, 573. — *id.*, GOUREAU, Essai sur la stridulation des Ins., 1837, 66. — *id.*, DONZEL, Obs. sur l'accouplem. de qqes genres, 1837, 77. — *id.*, PARIS, de Gray, De plusieurs esp. considérées comme var. de régions, 1848, 191. — *id.*, DOYÈRE, Obs. sur qqes genres, 1837, 264. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur le mém. de M. Paris, de Gray, 1848, 307. — *id.*, DUPONCHEL, Rem. sur l'engourdissement estival de qqes esp., 1837, LXI. — *id.*, WESTMAEL, Lépid. hermaphrodite, 1837, LXIII. — *id.*, PACCARD, Lettre sur les habitudes de certaines esp., 1837, LXXV. — *id.*, GUENÉE, Expli-



cations des néologismes introduits par l'auteur, 1838, VI. — *id.*, DE SAPORTA, Lépid. fossile (voyez au mot *Cyllo sepulta*). 1838, LI. — *id.*, BLISSON, Analyse par M. Demary d'un essai sur une méthode propre à faciliter la recherche et l'étude des larves, 1840, IX. — *id.*, DOUÉ, Larves et chrysalides trouvées dans un champignon, 1851, XXIII. — *id.*, AUDOUIN, Acquisition par le Muséum de la collection des Lépid. exotiques de M. Lacordaire, 1840, XLVIII. — *id.*, LEFEBVRE, Communic. verbale de la Ptérologie des Lépid., 1842, 5. — *id.*, Communic. de nombreux dessins à l'appui de cette méthode, 1842, III. — *id.*, Par déférence pour M. Milne-Edwards, qui s'occupe du même sujet, l'auteur cessera ses communic. à cet égard, 1842, XVI. — *id.*, DUPONCHEL, M. Donzel travaille à une faune des Basses-Alpes, 1842, LXIII. — *id.*, DE SELYS-LONGCHAMPS, 1844, XII. — *id.*, BOISDUVAL, L'auteur s'occupe d'un prodrome des Lépidoptères-Hétérocères, 1844, LXIV. — *id.*, BUGNION fils, Présentation d'un travail sur plusieurs esp. de Lépid., 1837, LXII. — *id.*, BECKER, L'auteur vient d'acquérir la belle collection de Lépid. de M. Palmer, 1845, LVIII. — *id.*, HOPE, Obs. sur les esp. d'un même groupe attaquées par les mêmes esp. d'Ichneumons, 1846, XXXIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Protestation contre l'opinion de M. Blaud, 1846, LVIII. — *id.*, GUENÉE, L'auteur s'est associé à M. Boisduval pour terminer le Species général des Lépid., 1846, CVII. — *id.*, PIERRET, Communic. d'une boîte de Lépid. des Canaries, réflexions, 1846, CXIV. — *id.*, DU THIEUL, Confirmation des réflexions de M. Pierret, 1846, CXV. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Recherches sur la chenille qui mine les feuilles de l'olivier, 1847, XLV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Rapport sur cette chenille, 1847, LI. — *id.*, BERCE, Communic. de divers parasites, 1847, CXII. — *id.*, DE GRASLIN, Exploration entom. dans la France occidentale, 1848, 49. — *id.*, GUENÉE, Note sur qqes nouv. groupes à établir dans l'ordre des Lépid., 1837, 249. — *id.*, PIERRET, Obs. faites en juillet et août dans les env. de Gavarnie, 1848, 397. — *id.*, BOISDUVAL, Qques détails sur ceux recueillis par M. Kindermann dans les env. d'Odessa, 1848, XXVIII. — *id.*, DOUBLEDAY, Qques détails sur un Lépid. de la terre de Kerguelen, 1848, LXIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Petite chenille parasite de la Cochenille, 1848, LXXIX. — *id.*, PIERRET, L'auteur vient d'acheter la coll. de M. Levailant, 1848, XCII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. d'exemplaires imprimés sur papier obtenus par M. Robert, de Vaugirard, 1848, XLIX. — *id.*, BRUAND,

L'avortement des Lépid. a été très-fréquent dans les Alpes en 1847, 1849, 44. — *id.*, PIERRET, Détails sur un voyage dans les Alpes de Provence, 1849, LXX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Indication de qqes esp. de l'Auvergne, 1849, LXXI. — *id.*, BECKER, Communic. de qqes esp. recueillies par M. Becke, 1849, LXXIX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur les esp. d'Auvergne, 1850, 73. — *id.*, DE GRASLIN, Notice sur qqes esp. des Pyrénées orientales, 1850, 394. — *id.*, GUENÉE, Détails sur le procédé du décalcage des Lépid., 1850, XXVII. — *id.*, BECKER, Papillons dont le corps et les ailes sont décalqués, 1850, XXIX. — *id.*, Moyen de faire pondre les Lépid. en captivité, 1850, XXXV. — *id.*, DE ROMAND, Lépid. retenus par la trompe dans la corolle d'une *Oenothera speciosa*, 1850, XL. — *id.*, WESTWOOD, Chenille observée en Chine comme parasite de la *Fulgora candularia*, 1850, LX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur les Lépid. de la Lozère, 1851, 684. — *id.*, GUILLEMOT, Lecture d'un catal. des Lépid. du Puy-de-Dôme, 1851, XII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Procédé pour empêcher les corps de se détacher, 1851, LXXVIII. — *id.*, DELAHAYE, Offre des deux premières livraisons de l'Iconographie des Lépid. de France, 1851, CIV. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note sur cette Iconographie, 1851, CIV. — *id.*, BOISDUVAL, Qques mots sur les Lépid. de Laponie recueillis par M. Kintlen, 1851, CIV. — *id.*, BECKER, Impressions de Lépid. sur papier dues à M<sup>me</sup> Hervé, 1851, CXII. — *id.*, BOISDUVAL, L'auteur parle du premier envoi de Lépid. de Cayenne par M. Bar, 1851, CXX. — *id.*, Lépid. de la Californie, 1852, 275. — *id.*, DE GRASLIN, Mém. sur trois esp. nouv. de la France méridionale, 1852, 407. — *id.*, DELAHAYE, Offre de six nouv. livraisons de son Iconographie, 1852, XII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Note à cette occasion, 1852, XII. — *id.*, BOISDUVAL, Liste des esp. trouvées à Compiègne, 1852, XXXIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur une nouv. chasse dans la forêt de Compiègne, 1852, XXXVII. — *id.*, LORQUIN, Détails entomologiques sur les Lépid. de Californie, 1852, LVI. — *id.*, BECKER, Lépid. fixés sur verre par un procédé de M. Lucas (rue Basse-du-Rempart!), 1852, LXXIX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Indication de ceux recueillis par M. Thourangin dans les env. de Bourges, 1852, LXXIII. — *id.*, BECKER, Communic. de plusieurs esp. remarquables, 1853, XXVIII. — *id.*, envoyées par M. Bar, ont beaucoup souffert, 1853, XXXI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE,

Qques détails sur une excursion dans les Basses-Alpes, 1853, XLVIII. — *id.*, Communication de plusieurs esp. de Grèce, 1853, LIII. — *id.*, BECKER, Communic. de nouv. ~~hy~~raïs. de M. Herrich-Schæffer, 1853, LXVIII. — *id.*, RAMBUR, L'auteur adresse un travail rectificatif sur la synonymie de Lépid. d'Andalousie, 1854, XVII. — *id.*, BUREAU, Persistance de la vie dans l'appareil de la génération, 1854, XXII. — *id.*, BOISDUVAL, M. Bar vient d'envoyer 250 Lépid. de Cayenne, 1854, XXVII. — *id.*, L'auteur parle d'un envoi de Lépid. du Darjeeling, 1854, XXVII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Lecture d'une lettre de M. Guenée en réponse aux obs. de M. Rambur, 1854, XXIX. — *id.* Obs. sur les Lépid. des Basses-Alpes, 1854, 49. — *id.*, Chasses de l'auteur en Auvergne, 1854, LII. — *id.*, Hommage à la Société par M. Guillemot de son Catal. des Lépid. du Puy-de-Dôme, 1854, LXXIV. — *id.*, BRUAND, Note sur la vitalité des organes génitaux après la mort de l'Ins., 1854, LXI. — *id.*, BOISDUVAL et COQUEREL, Commun. de plusieurs Lépid. de Madagascar recueillis par M. Coquerel, 1854, LXVI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. sur une excursion dans le nord des Alpes de Provence, 1855, LXXXII. — *id.*, BOISDUVAL, Commun. de qqes esp. de Californie reçues de M. Lorquin, 1855, XXXI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. des Lépid. reçus par l'auteur de la Laponie, 1855, CXIII. — *id.*, Obs. sur les Lépid. des Basses-Alpes, 1856, 5. — *id.*, BOISDUVAL, Annonce d'un envoi considérable de la Californie, 1856, VIII. — *id.*, SICHEL, Le Catal. des Lépid. d'Europe, de Sibérie et d'Asie Mineure de M. Herrich-Schæffer est mis à la disposition des amateurs, 1856, XXXI. — *id.*, BECKER, Commun. de qqes rares esp. d'Australie, 1856, LXIX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Qques détails sur un voyage dans les Basses-Alpes, 1856, LXXX. — *id.*, REICHE, M. le docteur Staudinger propose de céder des Lépid. d'Islande, 1856, CVI. — *id.*, BECKER, Commun. d'un grand nombre d'esp. rares du Brésil, 1856, CX. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur qqes Lépid. d'Islande, 1857, 5. — *id.*, Obs. sur les Lépid. des Basses-Alpes, 1857, 587. — *id.*, FAIRMAIRE, Esp. recueillies pendant la session extraordinaire de Montpellier, 1857, 643. — *id.*, BOISDUVAL, Note sur les esp. recueillies par M. Bar dans la Guyane française, 1857, XXI. — *id.*, BECKER, Commun. de plusieurs esp. d'Espagne, 1857, XXXI. — *id.*, DEPUSET, Qques détails sur des chasses faites en juin dans l'Indre, 1857, LXXXVII. — *id.*, BOISDUVAL, Qques

détails sur plusieurs esp. des env. de Montpellier, 1857, LXXXVIII. — *id.*, BECKER, L'auteur parle des Lépid. recueillis par M. Bar sur les bords du Maroni, 1857, xc. — *id.*, BOISDUVAL, L'auteur en a reçu de M. le colonel Tropp, venant de l'Inde centrale, 1857, xcii. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Détails sur une excursion dans les Pyrénées orientales, 1857, xcix. — *id.*, BRUAND, Note sur les Lépid. recueillis près de la Grande-Chartreuse, 1857, cvi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Résultat d'une excursion dans le duché de Namur, 1857, cxv. — *id.*, BRUAND, Envoi du Catal. des Lépid. du Doubs, 1857, cxii. — *id.*, JANVIER, Envoi d'une note autographiée sur le résultat de ses chasses, 1857, cxlvi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, M. Staudinger offre de céder un grand nombre de Lépid. recueillis en Espagne, 1857, cxlvi. — *id.*, BOISDUVAL, M. Lorquin lui annonce l'envoi de qqes esp. du lac Salé, 1857, cli. — *id.*, LUCAS, Communic. de Lépid. diurnes de la frontière chinoise, 1858, xci. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur des Lépid. des Pyrénées orientales, 1858, 123. — *id.*, PARIS, de Gray, Envoi d'obs. physiologiques sur les Lépid., 1858, LXXVII. — *id.*, VILLENEUVE, Communic. des Lépid. d'Alger envoyés par M. Poupillier, 1858, LXXXII. — *id.*, PARIS, de Gray, Envoi d'un travail sur la classific. naturelle des Lépid. d'Europe, 1848, LXXXIII. — *id.*, BRUAND, Obs. sur la notice de M. Bellier de la Chavignerie, 1858, xcvi. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de trois var., avec dépôt des descr. et fig., 1858, xcvi. — *id.*, Rép. aux obs. de M. Bruand, 1858, c. — *id.*, BRUAND, Communic. relatives aux époques d'éclosions de divers Lépid., 1858, cxv. — *id.*, LABOULBÈNE, Longue suite de dessins représentant les organes internes, 1858, cxxxvii. — *id.*, DE SELYS-LONGCHAMPS, Liste de ceux recueillis aux Eaux-Bonnes, 1858, ccx et ccxi. — *id.*, REICHE, Communic. de qqes-uns de ceux rapportés d'Espagne par M. Staudinger, 1858, ccxix. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Obs. sur les Lépid. des Basses-Alpes, 1859, 177. — *id.*, Catal. de ceux observés en Sicile, 1860, 705. — *id.*, EMM. MARTIN, Liste de ceux recueillis pendant l'excursion en Franche-Comté, 1860, 1008. — *id.*, BRUAND, L'auteur indique les types principaux qu'il a recueillis aux env. d'Hyères, 1860, xiv. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Faune entomologique de la Sicile, 1860, 667. — *id.*, Rem. sur les Lépid. par lui recueillis en Corse, 1860, xlii. — *id.*, BRUAND, Envoi d'un supplément à l'ouvrage de Godart et Duponchel, 1860, L. — *id.*, BOISDUVAL, Communic. des Lépid. de la Sibérie orientale donnés à l'auteur par M. Ménétriés, 1860,

**Lépidoptérologie.**

GUENÉE, Notice sur l'ouvrage de M. Fischer von Roslerstamm, 1848, 23.

**Magnaneries.**

La Société décide (Congrès de Montpellier), sur la proposition de M. Mocquerys, que les membres qui sont encore à Montpellier iront visiter les magnaneries, 1857, LXXV.

**Microlépidoptères.**

LEFEBVRE, Communic. d'une lettre de M. Fischer de Boslerstamm sur ses travaux, 1836, XIX. — *id.* GUENÉE, Annonce d'un travail sur cette classe, 1842, LV. — *id.*, Essai sur une nouv. classification; introduction, 1845, 105. — *id.*, Lepidopterorum nocturnorum divisio, VII, 1845, 135 et 297. — *id.*, COSTA, Détails sur qqes esp., 1847, LXXXVIII. — *id.*, MILLIÈRE, Descr. de nouv. esp. de Microlépid., 1854, 59. — *id.*, LABOULBÈNE, Communic. d'indiv. éclos de chenilles, 1856, LXXXVI. — *id.*, BRUAND, Note sur ceux à lui envoyés par M. Daube de Montpellier, 1857, CLXIII.

**Muscardine.**

DUPONCHEL, Communic. des obs. de M. Bassi sur cette maladie, 1836, XXXV. — *id.*, Grande médaille d'or décernée à M. Bassi par la Société d'Agriculture, 1837, XXIV. — *id.*, Prix de 2,000 fr. proposé par la Société d'Agriculture, 1837, XXIV. — *id.*, Dépôt du programme du prix proposé par cette Société, 1837, XXXVIII. — *id.*, AUDOUIN, Obs. sur la muscardine, 1837, LXXXI. — *id.*, BOISDUVAL, Rem. sur l'écaille *Hébé*, 1837, LXXXII. — *id.*, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Nouv. obs. sur la muscardine, 1847, CII. — *id.*, Nouv. détails, 1848, VIII. — *id.*, Mém. sur la muscardine; moyen de s'en préserver, 1848, LXVIII.

**Néerantome.**

DE VILLIERS, Moyen de conserver les Lépidoptères, 1838, XLIX.

**Organes génitaux.**

BUREAU, Persistance de la vie dans l'appareil de la génération après la mort de l'Insecte, 1854, XXII.

**Papillons imprimés sur papier.**

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Communic. de plusieurs obtenus par M. Robert, de Vaugirard, 1848, XLIX.

**Papillons de passage.**

REICHE, Quantité innombrable de petits papillons ayant traversé la vallée du Vigan, 1860, LXXVIII.

**Parasites.**

BERCE, Communic. de parasites de div. esp. de Lépid., 1847, cxii.

**Phalènes suisses.**

BRUAND, Obs. sur la classific. de MM. Herrich-Schæffer et Delaharpe, 1852, 51.

**Pierret (Collection).** (Voyez au mot *Collections*.)**Société sérécicole.**

AUDOUIN, Dépôt des prospectus de cette Société, 1837, xvi.

**Sole naturelle.**

DE VILLIERS, Morceau de toile paraissant le travail de qqes chenilles vivant en société, 1841, vii.

**Species général.**

GUENÉE, L'auteur s'est associé avec M. Boisduval pour le continuer, 1846, cvii.

**Stool (Ouvrage de).**

BECKER, MM. Harvilson et Saunders vont le continuer, 1851, cxvii.

**Système appendiculaire.**

GUENÉE, Cils secondaires des antennes dans qqes Lépid., 1849, LXVI.

**Variétés accidentelles.** (Voyez le mot *Aberrations*.)

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Mém. sur ce sujet, 1858, 299.

**Voyages scientifiques.**

BOISDUVAL, Qques détails sur les magnifiques espèces trouvées par M. Sallé, 1856, lx.



## VII.


### RHIPIPTÈRES.



**RHIPIPTÈRES**, LEFEBVRE, Dessins envoyés par M. Westwood, 1834, LXIII.

**STRÉSIPTÈRES**, LEFEBVRE, MM. Heyden et de Roset se sont livrés à diverses observations sur cette famille, 1835, XLV.

**Xenos vesparum**, LEFEBVRE, Communication de ce rare Insecte reçu de M. Géné, de Turin, 1833, LXXV.



## VIII.

### DIPTÈRES.



#### A.

**Actia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 185. — *pilipennis*, 1851, 186.

**Adapsilia** *coarctata*, WAGA, Genre de Diptères de la tribu des Dolichocères, 1842, 279.

**Agculocera** *nigra*, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1855, 24.

**Agromyza** *Macquarti*, GOUREAU, Mém. sur les Diptères à larves mineuses des feuilles, 1851, 133. — *nana*, 1851, 135. — *nigripes*, Notes sur les Diptères dont les larves minent les feuilles des plantes, 1846, 227. — *æncocentris*, RONDANI, Note contenant sa descr. latine, 1845, XLVII. — *pusilla*, GOUREAU, 1851, 138.

**Anabarhynchus** *variegatus*, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 428.

**Amethysa** *calligyna*, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 304.

**Anglearia** *antennata*, CARLIER, *Anglearia antennata*, 1835, 659.

**Anthomyia** *impudica*, REICHE, Descr. sommaire d'Ins. des mers arctiques, 1857, IX. — *platura*, GOUREAU, Note pour servir à son histoire, 1849, 81. — *radicum*, 1849, 84.

**ANTHOPHILES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 26.



**Anthracia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1855, 181. — *caminaria*, 1855, 182. — *trifasciata*, 1855, 181,

**Anthrax bombyciformis**, L. DUFOUR, Descr. et iconographie de qqes Diptères de l'Espagne, 1850, 142. — *fasciata*, 1850, 141. — *formosa*, 1852, 7. — *madagascariensis*, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 430. — *Miegii*, L. DUFOUR, 1850, 140. — *morio*, LABOULBÈNE, trouvé dans des nids d'Hymén., 1857, xc. — *nebulosa*, L. DUFOUR, 1852, 6. — *ornata*, LABOULBÈNE, trouvé dans Schæffer les figures de la larve et de la nymphe, 1858, CXIII. — *sinuata*, JACQ. DU VAL, Qques mots sur ses mœurs, 1851, LXXX. — *id.*, LABOULBÈNE, Note sur la nymphe de cette esp., 1857, 781. — *id.*, parasite de l'*Odynerus spinipes*, 1858, CXII. — *trinotata*, L. DUFOUR, 1852, 7.

**Aphria longirostris**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères de la tribu des Tachinaires, 1845, 290. — *Servillei*, 1845, 292.

**Apodaera**, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1854, 425. *seriemaculata*, 1854, 426.

**Aricia cærulea**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 544. — *pici*, MACQUART, Note sur une nouv. esp. d'Aricie, 1853, 657.

**ASILIDI**, J. BIGOT, Essai d'une classif. de l'ordre des Diptères, 1857, 517.

**Astomella curviventris**, L. DUFOUR, Descr. et iconographie de qqes Diptères d'Espagne, 1850, 131. — *Vancitii*, COSTA, Lecture sur son habitat, détails sur cet Ins. 1847, LXXXVIII.

**Aulacephala maculithorax**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 533.

**Aulacigaster rufitarsis**, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1846, 455.

## B.

**Baccha cochenillaria**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Extrait d'un mém. sur deux parasites de la Cochenille, 1848, LXXIX.

**Blacus? florus**, GOUREAU, Diptères à larves mineuses de feuilles, 1851, 137.

**Blepharicera limbipennis**, MACQUART, Descr. d'un nouv. genre de Diptères, 1843, 61. — *id.*, Nouv. obs. sur cet Ins., 1844, 69.

**BOMBYLIDI**, J. BIGOT, Essai d'une classif. générale et synoptique des Diptères, 1858, 569. — *id.*, Tableaux synoptiques de cette tribu, 1858, 593. — *id.*, Qques rem. sur les critiques du D<sup>r</sup> Gerstäcker, 1858, 597.

**Bombyllus boghariensis**, LUCAS, Note sur ses transformations, 1852, 11. — *claripennis*, J. RIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 430. — *fumosus*, L. DUFOUR, Descr. et iconographie de qqes esp. de l'Espagne, 1852, 7. — *major*, Hist. de ses métam., 1858, 503. — *melanopygus*, J. BIGOT, Descr. des nouv. esp. de Sicile, 1860, 771.

**Bonellia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 34. — *hæmorrhoidalis*, 1844, 37. — *rubiginosa*, 1844, 38. — *tessellans*, 1844, 35.

**Brachyopa bicolor**, L. DUFOUR, Qque chose sur cet Ins., 1846, XLVII. — *scutellaris*, ROBINEAU-DESVOIDY, Descr. d'une nouv. esp., 1844, 39.

**Brachystylum**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1855, 199. — *nigrum*, 1855, 200.

**Braula cæca**, LUCAS, Note sur ce parasite de l'*Apis mellifica*, 1850, LXVII.

**Buquetia musca**, Myodaires des env. de Paris, ROBINEAU-DESVOIDY, 1847, 286.

## C.

**Callicera**, RONDANI, Species Italicæ generis Calliceræ, 1844, 61. — *aurata*, 1844, 67. — *Macquartii*, 1844, 66. — *Roserii*, 1844, 65. — *Spinolæ*, 1844, 64.

**Calliphora fulvilabris, vomitoria**, LUCAS, Larves vivantes dans le corps d'un Saurien d'Algérie, 1851, LXII. — *vomitoria*, GRATIOLET, 1851, LXIII.

**Calobata triannulata**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 552.

**Calobatomyia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1855, 33. — *nigra*, 1855, 34.

**Caloptera nepalensis**, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 681.

**Carcellia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 274. — *amaena*, *arguta*, 1847, 279. — *Arion*, 1847, 275. — *id.*, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 163. — *aurifrons*, Myodaires des env. de Paris, 1847, 281. — *Bercci*, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 164. — *bombycivora*, Myodaires des env. de Paris, 1847, 280. — *festiva*, 1847, 277. — *gnava*, 1847, 276. — *id.*, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 164. — *hilaris*, Myodaires des env. de Paris, 1847, 280. — *macrocera*, *puparum*, 1847, 278. — *puparum*, Myodaires entomobies, 1850, 164. — *scutellaris*, Myodaires des env. de Paris, 1847, 281.

**Carcellies**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires entomobies, 1850, 183.

**Cecidomyia**, LEFEBVRE, Dégâts causés sur le blé par une esp. de ce genre, 1835, LV. — *id.*, DREWSSEN, Récolte de navette ravagée par les larves d'une esp. de ce genre, 1835, LXII. — *id.*, GOUREAU, Note sur les Ins. qui vivent dans le chardon penché, 1845, 88. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ins. trouvés dans une branche de saule, 1845, XLI. — *id.*, LABOULBÈNE, Métam. de l'esp. qui vit dans la capsule du *Papaver rhæas*, 1856, LXXXVI. — *id.*, AMBLARD, Note sur une galle du *Tamarix brachystilis*, 1856, 169. — *id.*, SICHEL et AMYOT, Compte rendu des obs. de M. Ch. Bazin sur cet Ins., 1856, VIII. — *brassicae*, LABOULBÈNE, La larve vit dans les siliques du colza, 1857, XC. — *id.*, JACQ. DU VAL, L'auteur demande si l'Ins. qui vit aux dépens du colza est bien celui-ci, 1857, XCI. — *destructor*, AMYOT et ROBINEAU-DESVOIDY, Quelques détails sur diverses esp. de ce genre, 1850, XV. — *criceæ scopariae*, L. DUFOUR, Mém. sur une galle de la bruyère à balais et sur ses habitants, 1837, 83. — *fagi*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Commun. sur les larves qui habitent les galles du hêtre, 1857, CXVI. — *id.*, BERCE, Note sur les galles du hêtre, 1858, XCI. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Cette esp. a presque entièrement disparu en Belgique, 1858, CCIX. — *papaveris*, LABOULBÈNE, Métam. de cette esp. et rem. sur plusieurs autres, 1857, 565. — *id.*, Rectif. d'erreurs typographiques dans la notice qui précède, 1857, CLXIV. — *pini maritimæ*, L. DUFOUR, Note sur les Cécidomyes et descr. d'une nouv.

esp., 1838, 293. — *tritici*, AMYOT et ROBINEAU-DESVOIDY, Quelques détails sur diverses esp. de ce genre, 1850, xv. — *id.*, AMYOT, Note sur cette esp., 1851, lvi. — *id.*, LUCAS, Communic. de larves de cette esp., 1854, xlvi. — *id.*, GOUREAU, Sur les mœurs, les ravages et les parasites de cette esp., 1857, xii. — *id.*, AUBÉ, Obs. à l'occasion de la communic. de M. le colonel Goureau, 1857, xiv. — *urticæ*, PERRIS, Obs. sur les Ins. de la galle de l'ortie dioïque, 1841, 403.

**Ceranthia** *flavipes*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 200.

**Ceratitis** *hispanica*, DE BRÈME, Note sur ce genre, 1842, 183.

**Ceratopogon**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Notice sur leurs métam., 1833, 161. — *brunnipes*, PERRIS, Note pour servir à l'histoire des Ins. de ce genre, 1847, 555. — *flavifrons*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1833, 165. — *geniculatus*, 1833, 164. — *lucorum*, PERRIS, Note pour servir à l'hist. des Cératopogon, 1847, 566.

**Ceria** *conopsoidea*, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1847, 19. — *id.*, RONDANI, Nota sexta pro Dipterologia Italica, 1850, 211.

**Ceriatellæ**, RONDANI, Nota sexta pro Dipterologia Italica, 1850, 212.

**Ceromya**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 193. — *abdominalis*, 1850, 197. — *erythroceræ*, 1850, 194. — *grisea*, 1850, 198. — *ludibunda*, 1850, 195. — *microcera*, 1850, 199. — *rubifrons*, 1850, 197. — *testacea*, 1850, 199. — *vivida*, 1850, 196.

**CÉROMYDES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 183.

**Chalcidimorpha** *fulvipes*, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 684.

**Chamarota**, MACQUART, Esp. trouvée dans un paquet d'orge, 1843, LXXXVII.

**Cheillosia**, L. DUFOUR, Réclam. sur les métam. de ce genre, 1853, 384. — *aurantipes*, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 297.

**Chlorops** *cornuta*, MACQUART, Esp. trouvée dans un paquet d'orge, 1843, LXXXVII. — *læta*, WAGA, Note sur une immense multiplication de cette esp., 1848, viii. — *nasuta*, AUBÉ, Note sur les deux Muscides qui attaquent le froment, 1858, LXXIV.

**Chrysosoma**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1848, 89. — *aurata*, *rufipes*, 1848, 91. — *viridis*, 1848, 90.

**Chrysotoxum**, RONDANI, Species Italicæ generis Chrysotoxi, 1845, 193. — *arcuatum*, 1845, 201. — *bicinctum*, 1845, 202. — *chrysopolita*, 1845, 199. — *cisalpinum*, 1845, 197. — *elegans*, 1845, 200. — *fasciolatum*, 1845, 199. — *italicum*, 1845, 196. — *parmense*, 1845, 198. — *tricinctum*, 1845, 201.

**Clella**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1854, 739. — *minor*, 1844, 740.

**Clista**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1855, 38. — *fæda*, 1855, 41. — *heteropalpis*, 1855, 42. — *iners*, 1855, 38. — *lentis*, 1855, 41. — *mærens*, 1855, 40. — *obsolcta*, 1855, 42. — *provida*, 1855, 39.

**Clytia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1854, 411. — *auriceps*, 1854, 414. — *continua*, 1854, 413. — *helvola*, 1854, 412. — *pellucens*, 1854, 413. — *rotundiventris*, 1854, 415. — *tephra*, 1854, 414.

**Cœnura**, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 286. — *longicauda*, 1857, 287.

**Conops flavipes**, L. DUFOUR et PERRIS, Mém. sur les Hymén. des tiges de la ronce, 1840, 12.

**CONOPSIENS**, SICHEL, Esp. se développant dans le corps d'Hymén mellifères, 1856, LXIII.

**Cosmina cuprina**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 539.

**Cousins noirs**, REICHE, Myriades innombrables trouvées dans un voyage au Nord, 1856, xcviii.

**Criorhina bombyliiformis**, PERRIS, Note sur qqes Diptères nouv., 1839, 54.

**Ctenophora elegans**, *festiva*, *flavcolata*, *flavicornis*, *guttata*, *ornata*, *pectinicornis*, *vittata*, BRULLÉ, Note sur le genre *Xiphura*, 1833, 400.

**Cnlex alternans**, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 681. — *anxifer*, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 117. — *insatiabilis*, 1859, 118.

**Cuphocera ruficornis**, MACQUART, NOUV. obs. sur les Ins. Diptères, 1845, 267.

**Curtisia regula**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 440.

**Cuterebra noxialis**, JUSTIN GOUDOT, Note relative à une nouv. esp. de Cutérébre, 1844, XLI.

**Cylindrotoma macrotoma**, PERRIS, Note sur les métam. de diverses esp. de Diptères, 1849, 337.

**Cyllenia elegantula**, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 294.

**Cyrtophorus pictipennis**, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 292.

**Cyrtosia <sup>m</sup>arginata**, PERRIS, Note sur qqes Diptères nouv., 1839, 54.

## D.

**Dacus oleæ**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Obs. sur ses mœurs, 1845, LXVIII. — *id.*, Communic. d'un travail sur les Ins. nuisibles à l'olivier, 1844, LXXVI. — *id.*, Note sur les dommages causés aux récoltes d'olivier, 1847, X.

**Damalis**, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 684.

**Damonis flavipalpis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 596.

**Degeeria**, MACQUART, NOUV. obs. sur les Diptères d'Europe, 1850, 443. — *albocingulata*, 1850, 449. — *albomaculata*, 1850, 446. — *ambulatoria*, 1850, 447. — *blanda*, 1850, 450. — *cærulescens*, 1850, 451. — *collaris*, 1850, 448. — *fasciata*, 1850, 444. — *fascinans*, 1850, 447. — *flavisquamis*, 1850, 452. — *fuscanipennis*, 1850, 450. — *incisuralis*, 1850, 451. — *minima*, 1850, 455. — *muscaria*, 1850, 444. — *ornata*, 1850, 448. — *parallela*, 1850, 453. — *pulchella*, *pygmæa*, 1850, 454. — *selecta*, 1850, 446. — *separata*, 1850, 452. — *strigata*, 1850, 445. — *tragica*, 1850, 453.

**Délie**, ROBINEAU-DESVOIDY, Note sur un indiv. vivant dans le vinaigre de colchique, 1846, LXXXI.

**Demoticus**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1854, 442. — *plebeius*, 1854, 443.

**Dialineura varicincta**, J. BIGOT, Diptères exotiques nouv., 1860, 222.

**Diastata apicalis**, ROBERT, Descr. de trois nouv. esp. de *Diastata*, 1834, 459. — *capitata*, *stricta*, 1834, 460.

**Diehelacera longirostris**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 128.

**Dietenidia bimaculata**, *paludosa*, BRULLÉ, Notice sur le genre *Xyphura*, 1833, 399.

**Dioctria chalcogastra**, L. DUFOUR, Descr. et iconographie de qqes Diptères d'Espagne, 1850, 146. — *melas*, 1850, 148. — *ochrocera*, 1852, 9.

**Dolichomerus nigrilus**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 431.

**Dolichopus**, MACQUART, Notice sur les différences sexuelles des Diptères de ce genre, 1844, 177. — *Dufourii*, L. DUFOUR, obs. sur le *Sybstroma Dufourii*, 1839, 129.

**Dorbinia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 272. — *aurifrons*, 1847, 274. — *gentilis*, 1847, 273. — *ludibunda*, 1847, 272. — *nitida*, 1847, 273.

**Doria concinnata**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères d'Europe, 1848, 98.

**Drosophila pallipes**, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1846, 321.

## E.

**Echinomyia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères de la tribu des Tachinaires, 1845, 253. — *cucullia*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 19. — *echinata*, MACQUART, 1845, 266. — *fera*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1844, 14. — *id.*, MACQUART, 1845, 256.

— *ferox*, 1845, 254. — *fuscipennis*, 1845, 263. — *grossa*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1844, 18. — *id.*, MACQUART, 1845, 255. — *leucocoma*, 1845, 266. — *lurida*, 1845, 264. — *nigricornis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1844, 18. — *pedemontana*, MACQUART, 1845, 266. — *præceps*, 1845, 260. — *prompta*, 1845, 261. — *pusilla*, 1845, 259. — *rubidigaster*, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 781. — *ruficeps*, MACQUART, 1845, 263. — *sphyricea*, 1845, 260. — *tessellata*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1844, 17. — *id.*, MACQUART, 1845, 258. — *ursina*, 1845, 265.

**Elaphomyia**, J. BIGOT, Note sur deux esp. de ce genre, 1860, xxix.

**Elassogaster metallicus**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 546.

**Elia cingulata**, *spathulata*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 190.

**EMPIDI**, J. BIGOT, Essai d'une classif. générale des Diptères, 1857, 553.

**Empis platyptera**, LEFEBVRE, Note sur cette esp., 1854, 125. — *variabilis*, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 291.

**Euthineura myrtilli**, MACQUART, 1836, 517.

**ENTOMOBIES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 17. — *id.*, 1847, 255. — *id.*, 1847, 591.

**Epleampocera succincta**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères de la tribu des Tachinaires, 1849, 414.

**Erebia**, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1854, 741. — *flavipalpis*, 1854, 742. — *tremula*, 1854, 742 et 743. — *vicina*, 1854, 742.

**Erigona**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 32. — *flavipennis*, 1846, 35. — *lurida*, 1846, 33. — *myophoroidea*, 1846, 35.

**Eristalis cupreus**, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 433. — *sexvittatus*, 1859, 434.

**Erycia vanessæ**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 170.

**Eumerus**, RONDANI, Species Italicae generis Eumeri observatæ, 1850, 117. — *angusticornis*, *barbarus*, 1850, 128. — *barbiventris*, 1850,



124. — *cavitibius*, 1850, 126. — *delicatæ*, 1850 127. — *exilipes*, 1850, 121. — *funeralis*, 1850, 125. — *ornatus*, 1850, 123. — *sabulorum*, 1850, 121. — *strigatus*, 1850, 126. — *tricolor*, 1850, 121. — *uncipes*, 1850, 123.
- Eurlgaster**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 434. — *hemisphæricus*, 1848, 426. — *tibialis*, 1848, 435.
- Eurithia puparum**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 24.
- Eurythrodera**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 436. — *cinerea*, 1848, 439. — *flavipes*, 1848, 438. — *fulvescens*, 1848, 440. — *fulvipes*, 1848, 437. — *nigripes*, 1848, 440. — *scutellaris*, 1848, 438. — *scutellata*, GOUREAU, Parasite de l'*Yponomeuta malinella*, 1852, LXXX. — *siphonoidea*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1848, 439.
- Exochostoma nitida**, MACQUART, Descr. d'un nouv. genre d'Ins. Diptères, 1842, 41.
- Exoprosopa Archimedeæ**, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 774. — *arcuata*, Diptères de Madagascar, 1859, 438. — *Dyonisii*, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 772. — *madagascariensis*, Diptères de Madagascar, 1859, 429. — *zona*, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 773.
- Exorista**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères de la tribu des Tachinaires, 1849, 360. — *acris*, 1849, 411. — *acronictarum*, 1849, 404. — *æmula*, 1849, 371. — *ænescens*, 1849, 409. — *affinis*, 1849, 369. — *agilis*, 1849, 399. — *alacris*, 1849, 364. — *ancilla*, 1849, 407. — *angelicæ*, 1849, 403. — *angustipennis*, 1849, 365. — *appendiculata*, 1849, 382. — *ardens*, 1849, 389. — *arrogans*, 1849, 374. — *arvensis*, 1849, 365. — *arvicola*, 1849, 364. — *audax*, 1849, 338. — *berberidis*, 1849, 373. — *biserialis*, 1849, 379. — *brevis*, 1849, 388. — *brunnicornis*, 1849, 406. — *cancscens*, 1849, 391. — *cauta*, 1849, 378. — *cita*, 1849, 412. — *cærulescens*, *concava*, 1849, 398. — *confinis*, 1849, 403. — *consanguinea*, 1849, 387. — *crassistylum*, 1849, 412. — *curicensis*, 1849, 410. — *curvicornis*, 1849, 401. — *diadema*, 1849, 363. — *diffusa*, 1849, 413. — *distans*, 1849, 387. — *dolosa*, 1849, 393. — *dubia*, 1849, 376. — *dumetorum*, 1849, 392. — *elliptica*, *fauna*, 1849, 408. — *festiva*, 1849, 392. — *fimbriata*, *flavicalyptrata*, 1849, 366. — *flavicans*, *flavifrons*, 1849, 400. — *flavida*, 1849, 409. — *fraterna*, 1849, 400. — *fulva*, 1849, 390. — *gibbicornis*, 1849, 381. — *glaucia*, LUCAS,

Indiv. provenant de l'*Orgyia pudibunda*, 1849, XLIX. — *id.*, MACQUART, 1849, 372. — *gnava*, 1849, 367. — *griseifrons*, 1849, 399 — *habilis*, 1849, 413. — *heraclei*, 1849, 384. — *hortulana*, 1849, 372. — *impavida*, 1849, 395. — *inclinata*, 1849, 386. — *insinuans*, 1849, 395. — *jucunda*, 1849, 382. — *lateralis*, J. BIGOT, esp. nouv. de Sicile, 1860, 782. — *laticella*, MACQUART, 1849, 373. — *levicula*, 1849, 404. — *leucophæa*, 1849, 393. — *levis*, 1849, 389. — *libatrix*, 1849, 349. — *longicornis*, 1849, 411. — *lota*, 1849, 384. — *lucorum*, 1849, 378. — *major*, 1849, 381. — *meditata*, 1849, 369. — *minuta*, 1849, 386. — *mitis*, 1849, 385. — *modesta*, 1849, 405. — *nemestrina*, 1849, 375. — *nitida*, 1849, 401. — *notata*, 1849, 377. — *pabulina*, 1849, 374. — *pallipes*, 1849, 402. — *parvula*, 1849, 410. — *pertinax*, 1849, 371. — *platycera*, 1849, 370. — *polychæta*, 1849, 380. — *prominens*, 1849, 405. — *pusilla*, 1849, 377. — *rapida*, 1849, 383. — *rasa*, 1849, 368. — *rufiventris*, 1849, 380. — *saluum*, 1849, 370. — *sanguinolenta*, 1849, 367. — *scutellaris*, 1849, 407. — *sepium*, 1849, 375. — *singularis*, *terminalis*, 1849, 396. — *uticola*, 1849, 383. — *vetula*, 1849, 391. — *vivida*, 1849, 385. — *volatica*, 1849, 414. — *vulgaris*, 1849, 397.

## F.

**Fabricia** *ferox*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 11.

**Failenia**, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1855, 44. — *coracina*, 1855, 45. — *fasciata*, L. DUFOUR, Descr. et iconographie de qqes Diptères d'Espagne, 1850, 150. — *nudioculata*, MACQUART, 1855, 46.

**Fausta**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 28. — *florea*, 1846, 31. — *lateralis*, 1846, 32. — *nervosa*, 1846, 31. — *nigra*, 1846, 29. — *viridescens*, 1846, 30.

**Fischeria** *bicolor*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 477.

**Frontina**, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1850, 433.  
— *austera*, 1850, 434. — *læta*, 1850, 433. — *tibialis*, 1850, 435.

**Fucellia** *arenaria*, ROBINEAU-DESVOIDY, Note sur le genre *Fucellia*, 1841, 269.

## G.

**Germaria** *latifrons*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 319.

**Glossina** *morsitans*, COQUEREL, Lecture d'une note pour servir à l'hist. du Tsétsé, 1858, CCXXVI.

**Gonia**, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1845, 275. — *atra*, 1845, 280. — *bicincta*, 1845, 281. — *capitata*, 1845, 277. — *fasciata*, 1845, 281. — *fasciventris*, 1845, 280. — *hebes*, 1845, 281. — *melanura*, 1845, 279. — *ornata*, 1845, 278. — *tessellata*, 1845, 283. — *vacua*, *vittata*, 1845, 279.

**GONIDES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 305.

**Gymnostylina** *nitida*, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1855, 25.

**Gynoplistia** *punctipennis*, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 682.

## H.

**Hebia** *flavipes*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 441. — *petiolata*, 1848, 442.

**Hebotomus**, RONDANI, Species Italicæ generis Hebotomi, 1843, 263. — *minutus*, 1843, 265. — *molestus*, 1843, 266. — *papatasi*, 1843, 265.

**Helomyza**, L. DUFOUR, Réclam. sur les métam. de ce genre, 1853, 383.  
— *gibba*, PERRIS, Note sur qqes Diptères nouv., 1839, 50 — *pallida*,  
*ustulata*, LUCAS, Qques détails sur ces deux esp., 1848, L.

**Helophilus luctuosus**, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 296.

**Herbina liliorum**, ROBINEAU-DESVOIDY, Note sur l'Herbine du lis,  
1841, 263. — *id.*, MACQUART, Obs. en rép. au mém. de M. Robineau-  
Desvoidy, 1842, 165.

**Herbstia tibialis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris,  
1851, 184.

**Heteromyza Delarouzei**, J. BIGOT, Descr. d'une nouv. esp. de ce genre,  
1858, CCXLIX.

**Heteropterina**, MACQUART, Diptères de la tribu des Tachinaires, 1854,  
426. — *heteronevra*, 1854, 427.

**Heterostomus**, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857, 283. — *cur-  
vipalpis*, 1857, 285.

**Hippobosca camelina**, L. DUFOUR; Note sur cette nouv. esp., 1858,  
CIII.

**Hirmonevra brevirostrata**, J. BIGOT, Diptères nouv. du Chili, 1857,  
280. — *barbarossa*, 1857, 281. — *niveibarbis*, 1857, 282.

**Hubneria**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847,  
601. — *acronicta*, Plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850,  
167. — *alacris*, Myodaires des env. de Paris, 1847, 609. — *apicalis*,  
1847, 605. — *arvicola*, *campestris*, 1847, 610. — *cæsia*, 1847, 605.  
— *cucullia*, Plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 166. —  
*distincta*, Myodaires des env. de Paris, 1847, 603. — *diversa*, 1847,  
608. — *Duponcheli*, 1847, 603. — *eructi*, Plusieurs esp. de Myodaires  
entomobies, 1850, 165. — *festiva*, Myodaires des env. de Paris, 1847,  
606. — *fuscipennis*, 1847, 611. — *gagatea*, 1847, 602. — *hilaris*,  
1847, 607. — *nigripalpis*, 1847, 612. — *nigripes*, 1847, 604. —  
*nigrita*, 1847, 607. — *nitida*, 1847, 611. — *pallidipes*, 1847, 610.  
— *plusia*, 1847, 604. — *rustica*, 1847, 608. — *subænea*, 1847, 606.  
— *velox*, 1847, 612. — *vivida*, 1847, 602.

**Hyalomyia dispar**, L. DUFOUR, né des entrailles du *Brachyderus tusi-  
tanicus*, 1851, 63. — *id.*, Mélanges entomologiques (suite), 1852,  
443.

**Hypostena**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 21. — *convexinervis*, 1855, 23. — *incisuralis*, *procera*, 1855, 22. — *setiventris*, 1855, 23.

## I.

**Idia fasciata**, ROBINEAU-DESVOIDY, vit sous le climat de Paris, 1849, VIII. — *myoidea*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 538.

**Illigera ruficeps**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 283.

**Isomera Blondeli**, *parisiaca*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 315.

## J.

**Jurinia callipiga**, J. BIGOT, Dipt. nouv. du Chili, 1857, 299.

## L.

**Labidigaster forcipatus**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1854, 738. — *intermedia*, 1854, 739.

**Lampromyia funebris**, L. DUFOUR, Descr. et Iconogr. de qqes Dipt. d'Espagne, 1850, 151.

**Laphria macra**, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 415. — *maroccana*, LUCAS, Détails sur les mœurs des Laphries, 1848, LXXXII.

**Lasiophthicus mecogramma**, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 778.

**Lauxanacanthus**, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 553. — *barbipes*, 1859, 554.

**Leptis vermilco**, DE ROMAND, Note sur sa larve, 1833, 498.

**Leria** *melina*, *mustelina*, ROBINEAU-DESVOIDY, Trois esp. nouv. de Malacomydes, 1841, 261.

**Leskia** *aurea*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 460. — *flavescens*, 1848, 461.

**Leucostoma**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 190. — *analis*, *anthracina*, 1855, 191. — *brevipetiolata*, 1855, 195. — *flavidipennis*, 1855, 194. — *lepida*, 1855, 195. — *limbata*, 1855, 193. — *minor*, 1855, 195. — *phæoptera*, 1855, 193. — *ruficornis*, *tetraptera*, 1855, 192. — *umbratica*, 1855, 191.

**Limnobia**, LEFEBVRE, trouvée dans une couche de houille, 1836, XVII.

**Limnoblorthynchus** *brasiliensis*, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 683. — *canadensis*, 1835, 684.

**Limnophila** *dispar*, PERRIS, Métam. de div. esp. de Dipt., 1859, 331.

**Linnoemyia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 28. — *heraclæi*, 1844, 31. — *longipes*, 1844, 34. — *œnanthis*, 1844, 33. — *vulpina*, 1844, 30.

**Lonchœa** *nigra*, PERRIS, Note pour servir à son hist., 1849, 62. — *parvicornis*, Mém. sur cette esp., 1839, 29.

**Luellia** *dispar*, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1845, 205. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Obs. sur cette Muscide, 1849, IV. — *id.*, L. DUFOUR, *Lucilia dispar*, 1852, 460. — *hominivorax*, COQUEREL, Note sur les larves d'une esp. nouv. de Dipt., 1858, 171. — *id.*, Communic. de la fig. de cette esp. de Cayenne, 1858, XIX. — *id.*, Nouv. cas de mort produit par la larve de cet Ins., 1859, 233. — *madagascariensis*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 542. — *marginalis*, 1859, 541. — *smaragdosaphira*, 1859, 543. — *tæniops*, 1859, 542.

**Lycomyia**, J. BIGOT, Dipt. nouv. du Chili, 1857, 288. — *id.*, Note en rép. à une critique de M. Schaum, 1860, XXXV. — *Germanii*, Dipt. nouv. du Chili, 1857, 290.

## M.

**MÆROMYDES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 7.

**MALACOMYDES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur trois esp. nouv., 1841, 251.

**Masicera**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1850, 455. — *acutangulata*, 1850, 478. — *ænescens*, 1850, 485. — *albo-cinota*, 1850, 486. — *analis*, 1850, 462. — *angusta*, 1850, 469. — *aprica*, 1850, 462. — *atropivora*, 1850, 477. — *badensis*, 1850, 481. — *bisignata*, 1850, 483. — *Bremei*, 1850, 476. — *brevis*, 1850, 460. — *buccata*, 1850, 466. — *cespitum*, 1850, 473. — *cinerea*, 1850, 488. — *consobrina*, 1850, 484. — *cylindrica*, 1850, 475. — *declivicornis*, 1850, 479. — *distincta*, 1850, 474. — *dumetorum*, 1850, 487. — *errans*, 1850, 480. — *fatua*, 1850, 461. — *ferruginea*, 1850, 469. — *festinans*, 1850, 471. — *flavescens*, 1850, 486. — *flavidipennis*, 1850, 476. — *flavifrons*, 1850, 465. — *florum*, 1850, 460. — *fuscipennis*, 1850, 466. — *hannoniensis*, 1850, 481. — *innoxia*, 1850, 484. — *interrupta*, 1850, 469. — *latipennis*, 1850, 487. — *lutescens*, 1850, 461. — *maculifacies*, 1850, 462. — *major*, 1850, 471. — *media*, 1850, 467. — *micans*, 1850, 459. — *minuta*, 1850, 469. — *montana*, 1850, 479. — *montium*, 1850, 463. — *multisetosa*, 1850, 464. — *myodæa*, 1850, 468. — *nitens*, 1850, 482. — *nitida*, 1850, 464. — *pachystyla*, 1850, 480. — *palustris*, 1850, 485. — *parva*, 1850, 489. — *parvula*, 1850, 488. — *pinctorum*, 1850, 482. — *pulverulenta*, 1850, 473. — *4-maculata*, 1850, 484. — *Robertii*, 1850, 477. — *ruficornis*, 1850, 472. — *rufoscutellata*, 1850, 474. — *rutila*, 1850, 457. — *scutellata*, 1850, 458. — *socia*, 1850, 475. — *sylvatica*, 1850, 470. — *tesselata*, 1850, 468. — *unicolor*, 1850, 464. — *virescens*, 1850, 465.

**Medeterus oceanus**, MACQUART, Notice sur trois Diptères nouv. 1838, 421.

**Medoria**, MACQUART, Dipt. de la trib. des Tachinaires, 1855, 27. — *acerba*, 1855, 30. — *corvina*, 1855, 28. — *digramma*, 1855, 29. — *flavicalyptrata*, 1855, 30. — *funcsta*, 1855, 31. — *luctuosa*, 1855, 28. — *melania*, 1855, 29.

**Megistocera dimidiata**, WESTWOOD, Insectorum nonnullorum novorum descriptiones, 1835, 682.

**Megistopoda Pilatei**, MACQUART, Notice sur ce nouv. genre de Dipt., 1852, 331.

**Melanophora**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 201. — *appendiculata*, 1855, 202. — *helicivora*, GOUREAU, Note sur la larve qui vit dans l'*Helix conspurcata*, 1843, 77. — *pygmæa*, MACQUART, 1855, 203. — *roralis*, 1855, 202.

**Melibæa**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 613. — *aurulenta*, 1847, 615. — *Blondelii*, *gagatea*, 1847, 616. — *lepida*, 1847, 614. — *subrotundata*, 1847, 615. — *zonaria*, 1847, 617.

**Meriania sylvatica**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 24.

**Mericia crigonea**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 36.

**Metopia**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1850, 435. — *argentata*, 1850, 442. — *argyrocephala*, 1850, 439. — *biseriata*, *campestris*, 1850, 440. — *convexinevria*, 1850, 441. — *fastuosa*, 1850, 437. — *leucocephala*, 1850, 438. — *rubricornis*, 1850, 442. — *sinuata*, 1850, 441.

**Microcheilosia**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 183. — *nitida*, 1855, 184.

**Micropalpus**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 269. — *analisis*, 1845, 272. — *assimilis*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 535. — *consobrinus*, MACQUART, Supplém. au mém. sur les Tachinaires d'Europe, 1848, 133. — *fulgens*, *hæmorrhoidalis*, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 271. — *longirostris*, 1845, 273. — *marmoratus*, *pictus*, 1845, 274. — *tessellens*, 1845, 273. — *vicinus*, Supp. au mém. sur les Tachinaires d'Europe, 1848, 134. — *vulpinus*, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 270.

**Microsoma**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 37. — *nigra*, 1855, 38.

**Midas**, AUDOUIN, Annonce d'un mém. de M. Wiedmann sur ce genre, 1832, 311.

**Mycrostylum appendiculatum**, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 423.



*barbarossa*, 1859, 424. — *cilipes*, 1859, 425. — *gigas*, 1849, 424. — *nigrum*, 1859, 426.

**Millogramma**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1854, 416. — *aurifrons*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. d'Espagne, 1850, 149. — *id.*, MACQUART, 1854, 422. — *conica*, 1854, 424. — *immaculata*, 1854, 423. — *interrupta*, 1854, 420. — *intricata*, 1854, 421. — *melanura*, 1854, 422. — *melitensis*, 1854, 419. — *nigricornis*, 1854, 424. — *æstracæ*, 1854, 418. — *ruficornis*, 1854, 421. — *tessellata*, 1854, 419. — *v-nigrum*, 1854, 423.

**Morinia**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 35. — *anthracina*, *fimbriata*, 1855, 35. — *melanoptera*, *nana*, 1855, 36.

**Montrouziera**, J. BIGOT, Dipt. exotiques nouv., 1860, 224. — *lifua*, 1860, 225.

**Musca domestica**, AZAMBRE, Note sur l'élévation de leur vol, 1857, XLII. — *pumilionis*, AUDOUIN, Ravage des seigles par la larve, 1839, XIII. — *rosæ*, VALLOT, Obs. sur les larves qui dévastent le chanvre, 1834, LXIII. — *vitripennis*, L. DUFOUR, Sur la *Musca vitripennis*, 1851, 67.

**Muscine**, ROBINEAU-DESVOIDY, Esp. vivant dans du vinaigre de Colchique, 1846, LXXXI.

**Mycetobia pallipes**, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1849, 202.

**Mycetophila lycogalæ**, PERRIS, Note sur qqes Dipt. nouv., 1839, 47. — *scatophora*, Note sur plusieurs esp. de Dipt., 1849, 51.

**Mydæa vomiturationis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Larves de Myodaires ayant vécu aux dépens de l'homme, 1849, XVIII.

**Mydas** (voyez *Midas*) *fulviventris*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. d'Espagne, 1850, 145. — *igniticornis*, J. BIGOT, Dipt. du Chili, 1857, 288. — *lusitanicus*, L. DUFOUR, 1850, 143.

**Myoba**, MACQUART, NOUV. obs. sur la tribu des Tachinaires, 1854, 427. — *æqua*, 1854, 435. — *arcuata*, 1854, 432. — *aurca*, 1854, 429. — *dubia*, 1854, 436. — *flavida*, 1854, 431. — *fragilis*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 454. — *frontalis*, MACQUART, 1854, 439. — *fulvipalpis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1848, 456. — *hospes*, MACQUART, 1854, 435. — *inanis*, 1854, 450. — *lestremensis*, 1854, 437. — *longirostris*, 1854, 431. — *micans*, 1854, 442. — *nitens*,

1854, 432. — *nitidiventris*, 1854, 438. — *pruinosa*, 1854, 436. — *pulverulenta*, 1854, 433. — *pumila*, 1854, 437. — *spretta*, 1854, 440. — *sublutea*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1848, 456. — *testacea*, 1848, 458. — *tibialis*, MACQUART, 1854, 439. — *vaga*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1848, 457. — *vetusta*, MACQUART, 1854, 441. — *villana*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1848, 459.

**Myophora** *hæmorrhoidalis*, ROBINEAU-DESVOIDY, Note sur les larves de Myodaires ayant vécu aux dépens de l'homme, 1849, XVIII.

## N.

**Næra**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 187. — *atra*, 1850, 189. — *laticornia*, 1850, 188.

**Nemestrina** *Perezii*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. de l'Espagne, 1850, 135.

**Nemoræa**, MACQUART, NOUV. obs. sur les Dipt. d'Europe, 1848, 104. — *acutangularis*, 1848, 121. — *analis*, 1848, 124. — *appendiculata*, 1848, 112. — *Bremei*, 1848, 130. — *cæsia*, 1848, 111. — *conjuncta*, 1848, 120. — *consobrina*, 1848, 116. — *floricola*, 1848, 139. — *histrion*, 1848, 129. — *ignobilis*, 1848, 128. — *lævigata*, 1848, 127. — *lateralis*, 1848, 121. — *maculosa*, 1848, 113. — *minor*, 1848, 112. — *nemorum*, 1848, 129. — *nigroscutellata*, 1848, 117. — *pellucida*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 25. — *puparum*, MACQUART, 1848, 122. — *4-pustulata*, 1848, 114. — *radicum*, 1848, 110. — *rubrica*, 1848, 131. — *rudis*, 1848, 119. — *setosa*, 1848, 116. — *soror*, 1848, 115. — *strenua*, 1848, 126. — *tessellans*, 1848, 117. — *unicolor*, 1848, 123. — *vagans*, 1848, 127. — *varicornis*, 1848, 118. — *variegata*, 1848, 114. — *venusta*, 1848, 125.

**Nemotelus** *cingulatus*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. de l'Espagne, 1852, 5. — *lateralis*, 1852, 6. — *maculiventris*, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 770.

**Notiphila** *flavcola*, GOUREAU, Dipt. dont les larves minent les feuilles, 1851, 161.

**Nycteribia**, J. BIGOT, Dipt. exotiques nouv., 1860, 226. — *Dufourii*, LUCAS, trouvée sur les ailes d'un *Vespertilio murinus*, 1850, XLVI. — *oxycephala*, J. BIGOT, 1860, 227.

**NYCTÉRIBIES**, FAIRMAIRE, trouvées sur div. chauves-souris de Sicile, 1852, LXII.

**Nyetia**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 31. — *Carceli*, *maura*, 1855, 32.

## O.

**Ochtera** *mantis*, RONDANI, Note 7<sup>e</sup> ad inserviendum dipterologiæ Italicæ, 1847, XXIX. — *Schembrii*, 1847, xxx.

**Odontomyia** *bipunctata*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 130. — *limbifacies*, 1859, 129.

**Œdemachilus**, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 549. — *Coquereli*, 1859, 549.

**Œstra**, ROBINEAU-DESVOIDY, Larve rendue avec les urines, 1849, XVIII. — *id.*, AUDOUIN, Larve ayant vécu dans l'oreille d'un enfant, 1833, LXV.

**Œstride**, COQUEREL, Larve extraite du bras d'un homme à Cayenne, 1858, CCLI.

**Œstrus** *hominis*, I. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Rapport sur trois notices relatives à son existence, 1833, 518.

**Ogcodes** *gibbosus*, LEPRIEUR, recueilli près de Lardy, 1847, LXXXI.

**Ommatias** *atrogaster*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 420. — *coarctatus*, 1859, 418. — *fallax*, 1859, 421. — *madagascariensis*, 1859, 418. — *mayottæ*, 1859, 422. — *pulchripes*, 1859, 419.

**Oodigaster**, MACQUART, Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1854, 397. — *agrestis*, 1854, 402. — *apicalis*, 1854, 403. — *bella*, 1854, 400. — *bimaculata*, 1854, 405. — *brevipennis*, 1854, 408. — *cæsifrons*, 1854, 404. — *corusca*, 1854, 401. — *diluta*, 1854, 408. — *distantipennis*, 1854, 401. — *doris*, 1854, 399. — *fasciata*, 1854, 407. — *flavidipennis*, 1854, 405. — *gratiosa*, 1854, 407. — *micans*, 1854, 403. —

*morosa*, 1854, 400. — *pallidipalpis*, 1854, 411. — *rapida*, 1854, 406. — *rubriscutellatus*, *tenax*, 1854, 410. — *urbana*, 1854, 404. — *viduatus*, 1854, 409.

**Opomyza** *scutellata*, ROBERT, Descr. d'une nouv. esp. de ce genre, 1834, 461.

**Orilla** *curvinervis*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 474. — *pellucida*, 1848, 476. — *rectinervis*, 1848, 475.

**Ortalis** *maculipennis*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. de l'Espagne, 1850, 145. — *sanctæ-mariæ*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 547.

**Oscinis** *nigerrima*, GOUREAU, Note contenant des détails entom. intéressants, 1847, XL. — *oleæ*, LEFEBVRE, Ravage les olives depuis trois ans, 1835, VI. — *id.*, BOYER DE FONSCOLOMBE, 2<sup>e</sup> mém. sur les Ins. qui attaquent l'olivier, 1840, 112.

**Osmæa** *grisca*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 188.

**Otites** *pulchella*, L. DUFOUR, sur l'*Otites pulchella*, 1851, 68.

## P.

**Pachystylum** *Bremii*, MACQUART, Suppl. au mém. sur les Tachinaires d'Europe, 1848, 132.

**Pales**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 282. — *Blondeli*, 1847, 286. — *lævigata*, 1847, 285. — *petrosa*, *pumigata*, 1847, 284. — *strenua*, 1847, 283.

**Pangonia**, MACQUART, Notice sur ce genre, 1837, 429. — *aterrima*, L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1853, 388. — *conica*, J. BIGOT, Dipt. nouv. du Chili, 1857, 278.

**Panzeria** *tricincta*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 21.

**Paramesia** *riparia*, ROBERT, Descr. d'un Dipt. nouv., 1836, 537.

**Pegomyia** *atriplicis*, GOUREAU, Mém. sur les larves qui minent les feuilles des plantes, 1851, 163. — *milis*, 1851, 166.

- Pegomyia univittata**, J. BIGOT, Dipt. nouv. du Chili, 1857, 303.
- Peleccocera lugubris**, PERRIS, Note sur qqes Dipt. nouv., 1839, 52.
- Peleteria rubescens**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 10.
- Petelna**, MACQUART, Nouv. obs. sur la tribu des Tachinaires, 1855, 43.  
— *erinacea*, 1855, 44.
- Phalacromyia**, J. BIGOT, Dipt. nouv. du Chili, 1857, 295. — *nigripes*, 1857, 296.
- Phasia crassipennis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Note sur cet Ins., 1841, 274. —  
*id.*, L. DUFOUR, Note pour servir à l'hist. de ses métam., 1848, 427.  
— *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Obs. à l'occasion du mém. de M. L. Dufour, 1848, xciv. — *pulverulenta*, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 779.
- Phebellia æstivalis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 37.
- Phora**, L. DUFOUR, Réclam. sur les métam. de ce genre, 1853, 385. —  
*camariana*, COQUEREL, Descr. d'un Dipt. de Madag., 1848, 188. —  
*id.*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 559.
- Phormia regina**, ROBINEAU-DESVOIDY, La *Lucilia dispar* Duf. doit être rapportée à cette esp., 1849, iv.
- Phorocera**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1850, 419. — *æstuans*, 1850, 431. — *angusta*, 1850, 428. —  
*assimilis*, 1850, 423. — *Bercei*, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 177. — *cæsifrons*, MACQUART, 1850, 424. — *cinerca*, 1850, 429. — *confinis*, 1850, 427. — *cucullia*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1850, 177. — *elongata*, MACQUART, 1850, 421. — *frontosa*, 1850, 425. — *gramma*, 1850, 420. — *Guerini*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1850, 178. — *leucomelas*, MACQUART, 1850, 428. — *minuta*, 1850, 424. — *orgyæ*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1850, 176. — *orthalidis*, 1850, 175. — *pavida*, MACQUART, 1850, 430. — *pieiridis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1850, 179. — *præcox*, MACQUART, 1850, 431. — *pullata*, 1850, 422. — *pumicata*, 1850, 426. — *pusilla*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1850, 181. — *tæniata*, MACQUART, 1850, 429. — *tessellata*, 1850, 423. — *unicolor*, 1850, 432. — *varipalpis*, 1850, 425.
- PHOROCÈRES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 174.

**Phryno agilis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 432. — *aurulenta*, *brunnea*, 1848, 434.

**Phryxe flavipalpis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 173. — *pieridis*, 1850, 172. — *vanessæ*, 1850, 171.

**Physecerania obscura**, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 123.

**Phytomyza ancholiæ**, GOUREAU, Mém. sur les larves qui minent les feuilles des plantes, 1851, 153. — *aquisolii*, 1851, 143. — *flava*, 1851, 146. — *horticola*, 1851, 148. — *lappæ*, Note sur la larve qui mine les feuilles de l'iris des marais, 1847, xli. — *lappina*, Larves qui minent les feuilles des plantes, 1851, 159. — *lateralis*, 1851, 156. — *obscurella*, 1846, 225. — *plantaginis*, 1851, 142. — *primulæ*, 1851, 151. — *scolopendrii*, 1851, 139. — *spondylii*, 1851, 147. — *tropæoli*, L. DUFOUR, Mélanges entomologiques, 1857, 39. — *xylostii*, GOUREAU, Larves qui minent les feuilles des plantes, 1851, 145.

**Pissemya atra**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 318.

**Plagia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1848, 94. — *ambigua*, 1848, 96. — *marginata*, 1848, 97. — *transversa*, 1848, 96. — *verticalis*, 1848, 95.

**Plesina**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 200. — *phalerata*, 1855, 201.

**Plesionevra incisuralis**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 180.

**Ploas fuminervis**, *macroglossa*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. d'Espagne, 1852, 8.

**Polidea**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1848, 92. — *ænca*, *conspersa*, 1848, 93.

**Psalidomyia fucicola**, DOUMERC, Mém. sur cette esp., 1833, 89.

**Psychoda phalenoides**, LUCAS, Détails de cette esp., 1848, lIII.

## R.

**Ramburia setipennis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 189.

**Reaumuria capitata**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 309. — *fasciata*, 1851, 313. — *picea*, 1851, 314. — *puncticornis*, *vittata*, 1851, 312.

**Rhadiurgus**, J. BIGOT, Dipt. exotiques nouv., 1860, 219. — *Macquarti*, 1860, 220.

**Rhamphina pedemontana**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1848, 86.

**Rhingia femorata**, L. DUFOUR, Note sur cet ins., 1846, LVI.

**Rhinomyia Lamberti**, ROBINEAU-DESVOIDY, Descr. d'une nouv. esp. de Myodaires, 1851, XXVI.

**Rhinophora**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 184. — *cilipennis*, 1855, 186. — *femoralis*, 1855, 185. — *fuscipennis*, 1855, 186. — *maculata*, 1855, 187. — *melania*, 1855, 188. — *nigrans*, 1855, 189. — *obliqua*, *perpendicularis*, 1855, 188. — *rectangularis*, 1855, 187. — *submetallica*, 1855, 189.

**Rhynchosia longirostris**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1848, 88.

**Rhynchomyia columbina**, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1846, 327.

**Rhyphus fenestralis**, L. DUFOUR, Hist. de ses métam., 1849, 195.

**Roeselia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 443. — *agrestis*, *antiqua*, 1848, 447. — *cylindrica*, 1848, 446. — *flavescens*, *flavisquamis*, 1848, 445. — *interrupta*, 1848, 444. — *sylvatica*, 1848, 446.

**Rondania cucullata**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 192.

## S.

**Sapromyza** 4-punctata, PERRIS, Hist. de ses métam., 1852, 594.

**Sarconesia**, J. BIGOT, Dipt. nouv. du chili, 1857, 300. — *chlorogaster*, 1857, 301. — *versicolor*, 1857, 302.

**Sarcophaga** albofasciata, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 536. — *madagascariensis*, 1859, 535. — *tetripunctata*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. de l'Espagne, 1850, 149.

**Sargus** australis, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 132. — *flavipennis*, 1859, 131. — *glaucus*, 1859, 134. — *hovas*, 1859, 133.

**Scatella** urinaria, ROBINEAU-DESVOIDY, Détails sur ses mœurs, 1848, XCIV.

**Scathopse** punctata, PERRIS, Note sur ses métam., 1847, 43.

**Scatophaga**, ZETTERSTEDT, Monographia Scatophagarum scandinavæ, 1835, 175. — *atra*, *atrimana*, 1835, 188. — *Audouini*, 1835, 179. — *bicolor*, 1835, 178. — *buccata*, 1835, 183. — *fmataria*, 1835, 177. — *fuscincervis*, 1835, 183. — *gracilis*, 1835, 184. — *latipalpis*, 1835, 187. — *Lefeburei*, 1835, 180. — *marina*, MACQUART, Notice sur trois Dipt. nouv., 1838, 424. — *morio*, *nigra*, ZETTERSTEDT, Monographia Scatophagarum scandinavæ, 1835, 185. — *nigricornis*, 1835, 182. — *oceana*, MACQUART, 1838, 423. — *pallida*, ZETTERSTEDT, 1835, 178. — *pectoralis*, *rosæ*, 1835, 181. — *rufa*, 1835, 177. — *scrotina*, PERRIS, Note sur qqes Dipt. nouv., 1839, 48. — *signata*, ZETTERSTEDT, 1835, 186. — *tessellata*, MACQUART, 1838, 424. — *villosula*, ZETTERSTEDT, 1835, 188.

**Scenopinus** fenestralis, L. DUFOUR, Note sur sa chrysalide et son poste dans la classif., 1850, 493.

**Sciara**, L. DUFOUR, Réclam. sur les métam. de ce genre, 1853, 385. — *Thomæ*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Note sur les migrations de ses larves, 1846, VIII. — *thoracica*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 124.

**Sciophila** unimaculata, PERRIS, Sur les métam. de div. esp. de Dipt., 1849, 341.



**Scopolia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 196. — *carbonaria*, 1855, 198. — *costata*, *cunctans*, 1855, 197. — *lugens*, 1855, 196. — *ovata*, 1855, 198.

**Senometopia** *spinipennis*, L. DUFOUR et PERRIS, Mém. sur les Hymén. qui nichent dans les tiges de la ronce, 1840, 12.

**Senopterina** *femorata*, *zonata*, J. BIGOT, Dipt. de Madag., 1859, 551.

**Servillia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1844, 21. — *echinata*, 1844, 24. — *subpilosa*, 1844, 23. — *urina*, 1844, 22.

**Simulium**, GUÉRIN-MÉNEVILLE et LESPÈS, Grands ravages sur des troupeaux d'animaux domestiques, 1860, cvi. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Quelques détails sur une larve aquatique, 1860, cvii.

**Smidtia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 593. — *cuprea*, 1847, 595. — *flavipalpis*, *myoidæa*, 1847, 596. — *vernalis*, 1847, 594.

**Solieria** *binotata*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1848, 461. — *brunicosa*, *cinerascens*, *cinerea*, 1848, 470. — *dimidiata*, 1848, 471. — *elongata*, 1848, 465. — *femoralis*, 1848, 469. — *festiva*, 1848, 462. — *fuscana*, 1848, 468. — *gagatea*, 1848, 463. — *germana*, 1848, 467. — *immaculata*, 1848, 464. — *inanis*, 1848, 467. — *lateralis*, 1848, 473. — *modesta*, 1848, 466. — *nana*, 1848, 473. — *nigra*, 1848, 472. — *nitens*, 1848, 473. — *pacifica*, 1848, 474. — *pulverulenta*, 1848, 471. — *ruficrus*, 1848, 465. — *rustica*, 1848, 464. — *vicina*, 1848, 466.

**Spallanzania** *hebes*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 316.

**Sphixea** *Bellieri*, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 776.

**Sphiximorpha** *antipoda*, J. BIGOT, Diptères exotiques nouv., 1860, 223. — *Petronillæ*, RONDANI, Nota sexta prodipterologia italica, 1850, 212.

**Stomoxys** *geniculatus*, J. BIGOT, Diptères de Madagascar, 1859, 537.

**Sturmia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 259. — *atropivora*, 1847, 261. — *luteipalpis*, 1847, 262. — *scutellata*, 1847, 260. — *vancssæ*, 1847, 262. — *id.*, Mémoire sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 158.

**Subula citripes**, L. DUFOUT, Que chose sur cet Ins., 1846, XLVII.

**Sybistroma Dufourii**, MACQUART, Notice sur un nouv. genre de la famille des Dolichopodes, 1838, 425. — *id.*, L. DUFOUT, Obs. sur cette esp., 1839, 129.

**Syphona**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 201. — *analis*, 1850, 206. — *clausa*, 1850, 209. — *consimilis*, *fuscicornis*, 1850, 205. — *geniculata*, MACQUART, Nouv. obs. sur les Diptères de la tribu des Tachinaires, 1845, 292. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1850, 201. — *humeralis*, 1850, 207. — *melanocera*, 1850, 206. — *pusilla*, 1850, 204. — *4-notata*, 1850, 203. — *sylvatica*, 1850, 208. — *testacea*, 1850, 207. — *tristis*, 1850, 203.

**Syphonella nucis**, PERRIS, Note sur une nouv. esp. de *Syphonella*, 1839, 39.

**Syritta albifacies**, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 439. — *flavopicta*, 1859, 440. — *leucopleura*, 1859, 437.

**Syrphus annulipes**, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 436. — *balteatus*, VALLOT, Obs. sur les larves qui dévastent le chanvre, 1834, LXIV. — *natalensis*, J. BIGOT, 1859, 435. — *pyrastris*, VALLOT, 1834, LXV.

## T.

**Tabanus albipictus**, *albitibialis*, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 425. — *obscurestigmatus*, 1859, 426.

**Tachina**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1854, 373. — *acuticornis*, 1854, 389. — *alacer*, 1854, 390. — *albiceps*, 1844, 387. — *albifrons*, 1854, 389. — *angusta*, 1854, 381. — *angustifasciata*, 1854, 380. — *arcuata*, 1854, 390. — *argyroreata*, 1854, 392. — *audens*, 1854, 385. — *aurifrons*, 1854, 394. — *bilincata*, 1854, 396. — *brevicornis*, 1854, 379. — *celer*, 1854, 380, 385. — *carruleifrons*, 1854, 392. — *devia*, 1854, 393. — *dorsalis*, 1854, 395. — *fallax*, 1854, 379. — *flavescens*, 1854, 377. — *flavicalypte-*

- *rata*, 1854, 382. — *flaviceps*, 1854, 376. — *flavifrons*, 1854, 386. — *flavipalpis*, 1854, 382. — *gracilistylum*, 1854, 396. — *illustris*, 1854, 391. — *inflexicornis*, 1854, 397. — *larvarum*, 1854, 376. — *levicula*, 1854, 386. — *ludibunda*, 1854, 383. — *marginella*, *nectinervis*, 1854, 378. — *nitidiventris*, 1854, 381. — *nitidula*, 1854, 394. — *macroglossæ*, ROBINEAU-DESVOIDY, Mémoire sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 169. — *præpotens*, MACQUART, 1854, 375. — *pumila*, 1854, 387. — *pusilla*, 1854, 391. — *rufifrons*, 1854, 354. — *rustica*, 1854, 377. — *simulans*, 1854, 378. — *spectabilis*, *sybarita*, 1854, 388. — *testacco-lateralis*, 1854, 395. — *vagabunda*, 1854, 390. — *velox*, 1854, 382. — *vittata*, 1854, 377. — *vivida*, 1854, 384.

**TACHINAIRES**, MACQUART, 1845, 237; 1848, 85; 1849, 353; 1854, 733. — *id.*, L'auteur offre 150 fr. pour hâter l'impression de son travail, 1854, xxxiii.

**Tephritis** *jaceæ*, L. DUFOR, Histoire des métam. de cet Ins., 1857, 48.

**Teremyia** *laticornis*, PERRIS, Mémoire sur cette esp., 1839, 34.

**Teretromyia**, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 416. — *cothurnata*, 1859, 417.

**Tetanocera** *ferruginea*, L. DUFOR, Histoire de ses métam., 1849, 67.

**Thelida** *vespertilionca*, ROBINEAU-DESVOIDY, Mémoire sur plusieurs esp. nouv. de Malacomydes, 1841, 262.

**Thryptocera**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 285. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 180. — *albicollis*, MACQUART, 1845, 290. — *bicolor*, 1845, 288. — *ciliata*, Supplément au mémoire sur les Tachinaires d'Europe, 1848, 134. — *crassicornis*, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 286. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1851, 181. — *exoleta*, MACQUART, 1845, 289. — *flavipalpis*, Supplément au mémoire sur les Tachinaires d'Europe, 1848, 135. — *flavisquammis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1851, 181. — *frontalis*, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1845, 289. — *humeralis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1851, 183. — *laticornis*, MACQUART, 1845, 286. — *nigripalpis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1851, 182. — *pili-pennis*, MACQUART, 1845, 287. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1851, 182. — *setipennis*, MACQUART, 1845, 285. — *silacea*, 1845, 287.

**THRYPTOCÉRÉES**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1851, 177.

**Thyreophora**, ROBINEAU-DESVOIDY, Note sur trois esp. de ce genre, 1849, v. — *cynophila*, Note sur cette espèce, 1841, 273. — *id.*, Expériences tendant à faire nier sa phosphorescence, 1849, v.

**Tipula** *brunnea*, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 121. — *tritici*, AMYOT, Note sur cette esp., 1851, LVI. — *id.*, DOUÉ, Dégâts causés dans des champs de céréales, 1855, CIII. — *id.*, AMYOT, Note sur cet Ins., d'après M. Asa-Fitch, 1855, CIV.

**TIPULAIRES CULICIFORMES**, GERVAIS, Larves ramenées par la pompe d'un puits artésien, 1851, LXX.

**TIPULIDES**, MACQUART, Descr. d'un nouv. genre d'Ins. Diptères, 1843, 59.

**TIPULIDII**, J. BIGOT, Essai d'une classif. générale des Ins. Diptères, 1854, 447.

**Trichocera** *annulata*, PERRIS, Note sur ses métam., 1847, 37.

**Trixa**, ROBINEAU-DESVOIDY, Ce genre doit être reporté dans la tribu des Macropédies, 1850, VIII. — *id.*, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1848, 99. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Ces Ins. sont vivipares, leurs mœurs, 1855, XCV. — *Amsteinii*, MACQUART, 1848, 103. — *cærulescens*, 1848, 100. — *dorsalis*, 1848, 104. — *ferruginea*, *grisea*, 1848, 101. — *Imhoffi*, 1848, 102. — *æstroidea*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1846, 20. — *id.*, MACQUART, 1848, 102. — *variegata*, 1848, 104.

**Trypeta**, J. BIGOT, Spécimen des planches d'un travail sur ce genre de Diptères, 1858, LXXVII.

**Tryphera**, MACQUART, Nouv. Obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 177. — *delicata*, *flavida*, 1855, 179. — *tesselum*, 1855, 178.

## U.

**Uromyia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1855, 25. — *curvicauda*, 1855, 27.

**Urophora** *cuspidata*, GOUREAU, Ins. qui vivent dans le chardon penché, 1845, 83. — *flexuosa*, J. BIGOT, Dipt. nouveau du Chili, 1857, 305. — *jasonæ*, LABOULBÈNE, Galle produite par cette esp. sur un *Jasona*, 1860, XCIV. — *4-fasciata*, L. DUFOUR, Hist. des métam. de cet Ins., 1857, 53.

## V.

**Vafrellia** *podacina*, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1850, 191.

**Voluccella** *bombylans*, BIGOT, Note sur les différences sexuelles chez cette espèce, 1845, LXIV. — *obesa*, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 431.

## W.

**Winthemia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Myodaires des env. de Paris, 1847, 263. — *aurulenta*, 1847, 269. — *catocalæ*, 1847, 265. — *cinerea*, 1847, 270. — *crassicornis*, 1847, 266. — *flavescens*, 1847, 265. — *meditata*, 1847, 266. — *nigripalpis*, 1847, 269. — *4-pustulata*, 1847, 268. — *variegata*, 1847, 264. — *viarum*, 1847, 267. — *vinulæ*, 1847, 271.

## X.

**Xestamiza** *chrysanthemi*, L. DUFOUR, Descr. et iconogr. de qqes Dipt. d'Espagne, 1850, 136. — *helianthemi*, FAIRMAIRE, Note sur cet Ins. auquel se rapporte le *Baryphora* de M. Lœw, 1850, 155.

**Xiphura**, BRULLÉ, Mémoire sur un nouv. genre de Dipt. de la famille des Tipulaires, 1832, 205. — *id.*, Note sur ce genre, 1833, 398. — *id.*, Errata du mémoire sur ce nouv. genre, 1832, 444. — *atrata*, Note sur le genre *Xiphura*, 1833, 399. — *fulvida*, J. BIGOT, Descr. d'esp. nouv. de Sicile, 1860, 769. — *nigricornis*, BRULLÉ, 1833, 399. — *nigrofasciata*, Mémoire sur un nouv. genre de Dipt. de la famille des Tipulaires, 1832, 208. — *nigrofasciata*, *ruficornis*, 1833, 399. — *villarciana*, Mémoire sur un nouv. genre de Dipt. de la famille des Tipulaires, 1832, 208.

**Xylophagus** *marginatus*, WESMAEL, Notice sur les métam. de plusieurs larves, 1837, LXXXIX.

## Y.

**Ysopogon** *parvulus*, J. BIGOT, Dipt. de Madagascar, 1859, 427.

## Z.

**Zenillia** *libatrix*, *orgia*, ROBINEAU-DESVOIDY, Mémoire sur plusieurs esp. de Myodaires entomobies, 1850, 168.

**Zophomyia**, MACQUART, Nouv. obs. sur les Dipt. de la tribu des Tachinaires, 1854, 744. — *ænea*, 1854, 750. — *albicalyptrata*, 1854, 746. — *chalybeata*, 1854, 748. — *clausa*, 1854, 747. — *egens*, 1854, 749. — *flavicalyptrata*, 1854, 748. — *flavipennis*, 1854, 750. — *germanica*, 1854, 749. — *gymnophthalma*, 1854, 751. — *nudioculata*, 1854, 752. — *microcera*, 1854, 745. — *nudistylum*, 1854, 751. — *perpendicularis*, 1854, 752. — *rufipalpis*, 1854, 746. — *tibialis*, 1854, 747. — *varipalpis*, 1854, 746.



## Articles généraux.



### Anatomie.

LABOULBÈNE, Note sur l'anatomie des Ins., 1852, 348.

### Balanciers.

GOUREAU, Mémoire sur ces organes chez les Diptères, 1843, 299. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Revendication de priorité sur leur usage, 1845, XII. — *id.*, GOUREAU, Réponse à la revendication de M. Robineau-Desvoidy, 1845, XII.

### Diptères.

AUDOCIN, Le Muséum est sur le point d'acquérir la collection Meigen, 1839, XLVIII. — *id.*, BERCE, provenant des *Cucullia lychnitis* et *Chelonia civica*, 1847, CXII. — J. BIGOT, Essai d'une classif. générale et synoptique, 1852, 471; 1853, 295; 1854, 447; 1856, 51, et 1857, 517. — *id.*, Rectif. de fautes graves dans l'impression de cet essai, 1852, LXXXII; 1853, LXII; 1854, LXVI; 1856, XC, et 1857,

CLIII. — *id.*, Rem. sur les critiques de M. Gerstaecker, 1858, 597.  
 — *id.*, Diptères contenus dans un morceau de succin, 1860, CIX.  
 — *id.*, Descr. des Diptères de l'île de Lifu, 1860, VIII. — *id.*,  
 Diptères nouv. de Chili, 1857, 277. — *id.*, Diptères de Madagascar,  
 1859, 115, 415, 533. — *id.*, MONCEAUX, Notice sur un ouvrage  
 manuscrit du docteur Robineau-Desvoidy sur les Diptères des env.  
 de Paris, 1858, 331. — *id.*, FAIRMAIRE, Rapport sur cet ouvrage,  
 1858, 339. — *id.*, Décision de la Société sur cet ouvrage, 1858,  
 XCIV. — *id.*, J. BIGOT, Diptères de Sicile, 1860, 765.

### **Diptérologie mexicaine.**

BALLARDI, Offre de la 1<sup>re</sup> partie de son Essai, 1860, xv.

### **Entomologie actuelle.**

ROBINEAU-DESVOIDY, Coup d'œil rétrospectif, 1846, 347. — *id.*,  
 MACQUART, Obs. sur la notice de M. Robineau-Desvoidy, 1847, 71.

### **Larves.**

GOUREAU, Larves mineuses des feuilles des plantes, 1846, 223; 1851,  
 131. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Larves observées au centre de  
 têtes avortées de l'*Arundo phragmites*, 1846, XXXIV. — *id.*, GOU-  
 REAU, Détails intéressants sur la Mouche dont la larve mine les  
 feuilles de l'iris des marais, 1847, XL. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY,  
 Larve de Myodaire ayant vécu aux dépens de l'homme, 1849, XVII.  
 — *id.*, FAIRMAIRE, Larves de Mouche rendues vivantes par une  
 femme, 1851, CIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, L'auteur a observé  
 des faits semblables, 1851, CIX.

### **Muscardine.**

AUBÉ, Obs. sur les Mouches atteintes de cette maladie, 1837, LXXXII,

### **Muscide (Larve de).**

GOUREAU, Ins. qui vivent dans les têtes de la carline vulgaire, 1857,  
 XXVI.

### **Myodaires des environs de Paris.**

ROBINEAU-DESVOIDY, 1844, 5; 1846, 17; 1847, 255, 591; 1848, 429.  
 — *id.*, Offre de payer l'impression de deux feuilles du travail de  
 l'auteur, 1848, xcv. — *id.*, Nouv. offre de cent francs pour hâter



l'impression de son travail, 1849, xciii. — *id.*, Nouv. somme de cent francs offerte par l'auteur, 1851, ix.

### **Myodaires entomobies.**

ROBINEAU-DESVOIDY, Mémoire sur plusieurs esp., 1850, 157, 183; 1851, 177.

### **Parasites.**

LUCAS, Note sur la *Braula cæca*, parasite de l'*Apis mellifica*, 1850, LXVII. — *id.*, Qques mots sur les parasites de la *Chalicodoma sicula*, 1858, CXII. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Qques détails sur les Myodaires parasites de div. esp. d'Hyménoptères, 1854, xxiv.

### **Pupe.**

BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, trouvée dans une chrysalide de *Saturnia pyri*, 1858, LXXVI.



## IX.

### APTÈRES.



## A.

- Achorutes**, NICOLET, Essai sur une classif. des Ins. Aptères, 1847, 376.  
— *affinis*, 1847, 379. — *agaricorum*, 1847, 378. — *agaricinus*, *aquaticus*, LUCAS, Obs. sur les travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 295. — *armatus*, NICOLET, 1847, 378. — *bielanensis*, WAGA, Descr. d'un Ins. Aptère des env. de Varsovie, 1842, 264. — *bielanensis*, *cellaris*, *cynocephalus*, *dubius*, NICOLET, 1847, 378. — *dubius*, LUCAS, 1843, 294. — *fuscoviridis*, 1843, 295. — *larvatus*, NICOLET, 1847, 378. — *murorum*, 1847, 377. — *murorum*, *muscorum*, LUCAS, 1843, 295. — *purpureus*, NICOLET, 1847, 379. — *rufescens*, 1847, 378. — *similis*, 1847, 379. — *tuberculatus*, LUCAS, 1843, 295.
- Anoura**, NICOLET, Essai sur une classif. des Ins. Aptères, 1847, 386. — *albipes*, *atra*, *chilensis*, 1847, 389. — *granaria*, 1847, 387. — *maritima*, *muscorum*, 1847, 388. — *rosea*, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVII. — *id.*, NICOLET, 1847, 388. — *tuberculata*, GERVAIS, 1842, XLVII. — *id.*, NICOLET, 1847, 387.
- Anurophorus ambulans**, NICOLET, Essai sur une classif. des Ins. Aptères, 1847, 384. — *curtus*, *dubius*, 1847, 386. — *finetarius*, *laricis*, 1847, 385.
- APTÈRES**, GERVAIS, Détails sur qqes familles d'Ins. Aptères, 1844, XXVII.

## C.

**Campodea**, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVIII. — *id.*, WESTWOOD, Note sur ce genre, 1844, LII. — *id.*, GERVAIS, Rép. à la note de M. Westwood, 1844, LXII. — *id.*, NICOLET, Essai sur une classif. des Ins. Aptères, 1847, 354. — *staphylinus, succinea*, 1847, 355.

**Chellfer Bravaisii**, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Aptères, 1842, XLVI.

**Cyphoderus**, NICOLET, Essai sur une classif. des Ins. Aptères, 1847, 381. — *æneus*, LUCAS, Obs. sur les travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 293. — *æneus, agilis*, NICOLET, 1847, 383. — *agilis, albinos*, LUCAS, 1843, 293. — *albinos*, NICOLET, 1847, 383. — *argentatus*, 1847, 382. — *capucinus*, LUCAS, 1843, 293. — *curvicollis*, NICOLET, 1847, 382. — *flavus*, 1847, 383. — *gibbulus*, LUCAS, 1843, 293. — *id.*, NICOLET, 1847, 382. — *giganteus*, 1847, 383. — *lignorum*, LUCAS, 1843, 293. — *id.*, NICOLET, 1847, 382. — *parvulus*, LUCAS, 1843, 293. — *id.*, NICOLET, 1847, 383. — *pulex*, 1847, 382. — *pusillus*, LUCAS, 1843, 293. — *id.*, NICOLET, 1847, 383. — *violaceus*, 1847, 382.

## D.

**Degeeria**, NICOLET, Essai sur une classif. des Ins. Aptères, 1847, 367. — *albocincta, atra*, 1847, 370. — *corticalis*, LUCAS, Observ. sur les travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 294. — *id.*, NICOLET, 1847, 369. — *crassicornis, decora*, 1847, 370. — *disjuncta*, LUCAS, 1843, 293. — *id.*, NICOLET, 1847, 369. — *domestica*, LUCAS, 1843, 294. — *id.*, NICOLET, 1847, 370. — *elongata*, LUCAS, 1843, 294. — *id.*, NICOLET, 1847, 369. — *crudita*, LUCAS, 1843, 296. — *id.*,

NICOLET, 1847, 369. — *fenestrarum*, *fusiformis*, *incerta*, 1847, 370. — *lanuginosa*, LUCAS, 1843, 294. — *id.*, NICOLET, 1847, 369. — *margaritacea*, LUCAS, 1843, 294. — *id.*, NICOLET, 1847, 369. — *membranca*, 1847, 371. — *muscorum*, LUCAS, 1843, 294. — *id.*, NICOLET, 1847, 369. — *nigromaculata*, 1847, 370. — *nivalis*, LUCAS, 1843, 293. — *id.*, NICOLET, 1847, 368. — *platani*, *pruni*, LUCAS, 1843, 294. — *platani*, *pruni*, NICOLET, 1847, 369. — *variegata*, 1847, 368.

**Dermanyssus** *coriaceus* et n...., GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVI.

**Desoria** *annulata*, *cinerea*, *cylindrica*, *ebriosa*, *fulvo-maculata*, LUCAS, Obs. sur les travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 292. — *fusca*, 1843, 293. — *pallida*, 1843, 292. — *riparia*, 1843, 293. — *saltans*, *tigrina*, *viatica*, *virescens*, 1843, 292.

**Dicyrtoma**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 361. — *alveolus*, 1847, 362. — *atropurpurea*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 298. — *id.*, NICOLET, 1847, 360. — *cirtanus*, 1847, 362. — *dorsimaculata*, LUCAS, 1843, 298. — *dorsimaculata*, *guttata*, *Lucasii*, NICOLET, 1847, 361. — *oraniensis*, 1847, 362.

**Docophorus** *struthionis*, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'Ins. Aptères, 1842, XLVII.

## H.

**Hæmatopinus** *bicolor*, LUCAS, Notice sur une esp. d'Épizoïque de ce genre, 1847, 531. — *bubali*, trouvé en immense quantité sur un buffle, 1851, v. — *cervicapræ*, Notice sur une nouv. esp. vivant sur l'antilope des Indes, 1846, LXXIII. — *id.*, Notice sur une nouv. esp. d'Épizoïque de ce genre, 1847, 531. — *tuberculatus*, Descr. de cette esp. parasite du buffle d'Italie, 1852, 529.

**Holotyrus** *coccinella*, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVI.

## I.

**Isotoma**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 371. — *annulata*, 1847, 373. — *bifasciata*, *chlorata*, 1847, 374. — *cinerea*, 1847, 372. — *cœrulea*, 1847, 374. — *cylindrica*, 1847, 372. — *Desmarcstii*, 1847, 374. — *ebriosa*, 1847, 373. — *fulvomaculata*, 1847, 372. — *fusca*, *Gervaisii*, 1847, 374. — *glacialis*, 1847, 372. — *Nicoletii*, 1847, 374. — *nitida*, 1847, 375. — *riparia*, 1847, 373. — *spilosoma*, 1847, 374. — *stagnorum*, 1847, 375. — *tigrina*, 1847, 372. — *viatica*, 1847, 373. — *villosa*, 1847, 374. — *virescens*, 1847, 372. — *viridis*, 1847, 373.

## L.

**Lepidocyrtus** *argentatus*, *curvicollis*, *rivularis*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 287.

**Lepisma**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 348. — *ægyptiaca*, 1847, 350. — *annuliscia*, *Audouinii*, *aurca*, 1847, 349. — *chlorosoma*, 1847, 352. — *ciliata*, *collaris*, 1847, 350. — *fuliginosa*, 1847, 352. — *gyriniformis*, 1847, 349. — *horrens*, *lineata*, 1847, 350. — *mauritanica*, 1847, 352. — *minuta*, 1847, 349. — *myrmecophila*, LUCAS, trouvée en Algérie et aux env. de Paris, 1847, XLIV. — *id.*, NICOLET, 1847, 352. — *nivcofasciata*, 1847, 350. — *parisiensis*, 1847, 351. — *Petitii*, *pilifera*, 1847, 350. — *4-lineata*, 1847, 352. — *saccharina*, *Savignyi*, 1749, 349. — *subvittata*, 1847, 350. — *thermophila*, 1847, 352. — *villosa*, 1847, 350.

**LÉPISMIDES**, NICOLET, Nouv. classif. des Ins. Aptères, 1847, 343.

**Lipura** *ambulans*, *corticina*, *fimctaria*, *laricis*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 296.

**Lipurelles**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 383.

**Lithobies**, GERVAIS, Recherches sur leurs demi-métamorphoses, 1837, VIII.

## M.

**Machilis**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 344. — *acuminithorax*, 1847, 347. — *anceps*, 1847, 346. — *annulicornis*, 1847, 345. — *bimaculata*, 1847, 347. — *crassicornis*, 1847, 348. — *fasciola*, 1847, 346. — *fastuosa*, 1847, 348. — *gigas*, 1847, 346. — *maritima*, 1847, 345. — *pallipes*, 1847, 348. — *polypoda*, 1847, 345. — *rupestris*, 1847, 347. — *striata*, 1847, 346. — *thoracica*, 1847, 348. — *variabilis*, *vittata*, 1847, 346.

## N.

**Nicoletia**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 352. — *geophila*, GERVAIS, Une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVII. — *id.*, NICOLET, 1847, 353. — *phytophila*, GERVAIS, 1842, XLVIII. — *id.*, NICOLET, 1847, 353. •

**Nycteribla** *senegalensis*, GERVAIS, Une quinzaine d'esp. Aptères, 1842, XLVIII.

## O.

**Orchesella**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 363. — *aquatiqua*, *bifasciata*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 289. — *bifasciata*, NICOLET, 1847, 366. — *Bourletii*, LUCAS, 1843, 289. — *chitensis*, NICOLET, 1847, 367. — *cincla*, *crystallina*, LUCAS, 1843, 288. — *cincla*, *crystallina*, NICOLET, 1847, 366. — *dimidiata*, LUCAS, 1843, 289. — *id.*, NICOLET, 1847, 367. — *fastuosa*, LUCAS,

1843, 289. — *id.*, NICOLET, 1847, 364. — *filicornis*, LUCAS, 1843, 288. — *id.*, NICOLET, 1847, 364. — *flavescens*, 1847, 365. — *grisea*, LUCAS, 1843, 288. — *histrion*, *livida*, NICOLET, 1847, 366. — *luteola*, *mauritanica*, 1847, 367. — *melanocephala*, LUCAS, 1843, 289. — *id.*, NICOLET, 1847, 366. — *musci*, *4-punctata*, LUCAS, 1843, 289. — *4-punctata*, NICOLET, 1847, 367. — *5-fasciata*, LUCAS, 1843, 389. — *id.*, NICOLET, 1847, 367. — *rubrofasciata*, LUCAS, 1843, 289. — *id.*, NICOLET, 1847, 367. — *rufescens*, LUCAS, 1843, 288. — *7-guttata*, 1843, 289. — *id.*, NICOLET, 1847, 366. — *sylvatica*, *unifasciata*, LUCAS, 1843, 289. — *sylvatica*, *unifasciata*, NICOLET, 1847, 366. — *vaga*, *villosa*, LUCAS, 1843, 289. — *villosa*, NICOLET, 1847, 366.

## P.

**Philopterus**, L. DUFOUR, Descr. et iconographie de trois esp. de ce genre, 1835, 669. — *brevis*, 1835, 674. — *Diomedææ*, 1835, 671. — *pederiformis*, 1835, 676. — *platalææ*, LUCAS, Son mode d'accouplement, 1852, xxxviii.

**Podura** *annulata*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 291. — *aquatica*, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 375. — *arborea*, *argento-cincta*, LUCAS, 1843, 291. — *armata*, 1843, 292. — *bicolor*, 1843, 298. — *cellaris*, 1843, 292. — *cærulca*, *cursitans*, *cycanocephala*, 1843, 291. — *fasciata*, 1843, 298. — *fenestrarum*, *fusi-formis*, 1843, 291. — *iricolor*, 1843, 298. — *nitida*, 1843, 290. — *palustris*, *rubricauda*, 1843, 291. — *rufescens*, 1843, 292. — *similata*, 1843, 291. — *stagnorum*, 1843, 290. — *trifasciata*, *violacca*, 1843, 291. — *viridis*, 1843, 290.

**Podurelle**, COQUEREL, trouvée constamment sur les cocons de *Scolia oryctophaga*, 1855, 172.

**Podurelles**, BOURLET, Obs. sur une notice publiée sur cette famille, 1842, 45. — *id.*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 269.

**Podures**, AUDOUIN, Petites esp. récoltées sur le mont Vélant (Alpes), 1836, XI. — *id.*, BOURLET, Hommage à la Société d'un mémoire sur les Podures, 1840, VIII.

**Podurides**, BOURLET, Mém. sur ces Insectes, 1841, XL. — *id.*, Lecture d'un mém. contenant la descr. de 14 esp., 1841, LVII. — *id.*, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 356.

## R.

**Ricin de l'Houbara**, BARTHÉLEMY, Descr. de cette esp., 1836, 689.

## S.

**SMINTHURIDES**, BOURLET, Mém. sur cette famille, 1841, XL.

**Sminthurus**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 357. — *aquaticus*, LUCAS, Travaux publiés sur l'ordre des Thysanoures, 1843, 297. — *id.*, NICOLET, 1847, 359. — *ater*, *bilineatus*, LUCAS, 1843, 297. — *ater*, *bilineatus*, *Bourletii*, NICOLET, 1847, 359. — *Coulonii*, LUCAS, 1843, 297. — *Coulonii*, *deformis*, NICOLET, 1847, 359. — *exiguus*, *fuliginosus*, 1847, 360. — *fulvipes*, 1847, 359. — *fuscus*, LUCAS, 1843, 297. — *id.*, NICOLET, 1847, 358. — *guttatus*, LUCAS, 1843, 298. — *liliputanus*, NICOLET, 1847, 360. — *lupulinæ*, LUCAS, 1843, 297. — *id.*, NICOLET, 1847, 358. — *Lusseri*, 1847, 360. — *oblongus*, LUCAS, 1843, 297. — *id.*, NICOLET, 1847, 358. — *ornatus*, *pallipes*, LUCAS, 1843, 297. — *ornatus*, *pallipes*, NICOLET, 1847, 359. — *punctatus*, 1847, 360. — *signatus*, LUCAS, 1843, 296. — *signatus*, *viridis*, NICOLET, 1847, 358. — *viridis*, LUCAS, 1843, 297.



## T.

**THYSANURES**, LUCAS, Travaux publiés sur cet ordre, 1843, 269.  
— *id.*, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 335. — *id.*, Distribution géographique des Thysanures, 1847, 392.

**Tomocerus**, NICOLET, Classif. des Ins. Aptères, 1847, 379. — *ccler*, 1847, 381. — *ccler, ferruginosus*, LUCAS, Travaux publiés sur cet ordre, 1843, 287. — *lepidus*, NICOLET, 1847, 381. — *longicornis, niger*, LUCAS, 1843, 287. — *plumbeus*, 1843, 286. — *id.*, NICOLET, 1847, 380. — *spiricornis*, LUCAS, 1843, 287.

**Trichobius parasiticus**, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVIII.



## X.

### ARACHNIDES.



## A.

**ACARIDES**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Deux esp. trouvées dans des pommes de terre malades, 1845, LXXXVII. — *id.*, Détails sur la note relative à ces Acarides, 1845, cv.

**Acariens**, AUBÉ, C'est comme moyen de transport qu'ils s'attachent à certains Coléopt., 1845, ix. — *id.*, GHILIANI, Détails sur des Acariens du Para, 1847, xxxvi. — *id.*, LABOULBÈNE, Descr. de qqes Acariens et d'une Hydrachne, 1851, 295. — *id.*, AUBÉ, Communic. sur leurs moyens de transport, 1857, CLVIII. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Quantité de larves sur les bourgeons du pêcher, 1851, v.

**Acarus**, ROBINEAU-DESVOIDY, trouvé en grand nombre sur des feuilles de vigne au Muséum, 1852, L. — *id.*, AZAMBRE, Préservatifs contre ceux qui vivent dans les collections, 1856, xvi. — *entomophagus*, LABOULBÈNE, Lecture de la descr. de l'esp. des Ins. des collections, 1852, LIV. — *id.*, de la gale, AUDOUIN, Lecture d'un mémoire de M. Dugès sur cette esp., 1834, LVI. — *id.*, de la gale des chameaux, GERVAIS, Détails sur cette esp., 1840, xxxii. — *horridus*, TURPIN, Compte rendu de l'examen de cette esp., 1837, xciii. — *limacum*, LEFEBVRE, Annonce d'obs. de M. Thion sur cette esp., 1835, lxi. — *plantarum*, Esp. découverte par M. Vallot dans les galles en clou du tilleul, 1835, lxii.

**Actinopus**, LUCAS, Note sur une nouv. esp. de ce genre. 1845, 57.

**Androctenus funestus**, LUCAS, Communic. au sujet de cette esp., 1856, xiv.

**ARACHNIDES**, DE THEIS, trouvées très-vivaces par 14° de froid, 1832, 313. — *id.*, BUQUET, Communic. d'espèces du Brésil rares ou nouv., 1835, LXI.

**Araignée**, GUÉRIN-MÈNEVILLE, Lettre de M. Recluz sur les effets de la piqure d'une Araignée, 1843, XLVII. — *id.*, LEFEBVRE, Obs. de M. le docteur Joffre sur la propriété fébrifuge de la toile d'Araignée, 1833, IX.

**Araignée pionnière**, AUDOUIN, Obs. sur la structure de son nid, 1833, 69.

**Araignées**, L. DUFOUR, Moyen qu'elles emploient pour se transporter d'un lieu dans un autre, 1834, XXI. — *id.*, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, Faculté pour la reproduction de leurs pattes cassées, 1832, 238.

**Aranea domestica**, WALCKENAER, Rectif. de la synonymie de cette esp., 1834, XIX.

**Aranéide**, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Esp. assez singulière trouvée dans la forêt Noire, 1846, LXXXVI.

**ARANÉIDES**, WALCKENAER, Mém. sur une nouv. classif., 1833, 414. — *id.*, DUGÈS, Découverte des organes de la respiration, 1845, XII. — *id.*, WALCKENAER, trouvées parfaitement gelées et revenant ensuite à la vie, 1834, XXIV.

**ARANÉIDES 4-PULMONAIRES**, LATREILLE, Mém. sur cette famille dans les nouv. annales du Muséum, 1832, 234.

**Argas reflexus**, GHILIANI, conservé vivant, privé de nourriture pendant quatorze mois et demi, 1850, XVIII. — *id.*, Encore vivant après vingt-trois mois et demi sans nourriture, 1850, LXX. — *id.*, Mort au bout de vingt-six mois et demi de jeûne absolu, 1851, LVI.

**Argyope aurantia**, LUCAS, Descr. de cette nouv. esp., 1833, 86. — *fasciata*, LUCAS, L'Aranéide présentée par M. Bellier de la Chavignerie est de cette espèce, 1846, LXXXVIII.

**Atax**, LABOULBÈNE, Descr. de qqes Acariens et d'une Hydrachne, 1851, 295.

**Atta**, BUQUET, Communic. d'une nouv. esp. du Brésil, 1835, LXI.

**Atte**, LUCAS, Mém. sur plusieurs Arachnides nouv. de ce genre, 1835, 476.

**Atte fossile**, WALCKENAER, Esp. renfermée dans un morceau d'ambre fossile, 1836, LXVII.

**Attus melanocephalus**, LUCAS, Obs. sur un travail de M. Mac-Leay, 1839, 121.

**Atypus**, LUCAS, Qques obs. sur ce genre, 1836, 213.

## B.

**Buthus**, LUCAS, Arachnide de la famille des Scorpionides et de ce genre, 1849, LXXV. — *occitanus*, Communic. d'indiv. de cette esp., 1860, XXIV.

## C.

**Clotho Durandii**, LUCAS, Communic. d'indiv. pris aux env. de Montpellier, 1854, LIII.

**Clubione corticatis**, WALCKENAER, Atrophie du deuxième œil antérieur chez un indiv. de cette esp., 1835, LXX.

## D.

**Deinopis lamia**, LUCAS, Obs. sur un travail de M. Mac-Leay, 1839, 121.

**Drassus segestriiformis**, L. DUFOUR, Sur cet Ins., 1858, 255.

## E.

**Epeira apochlypsa**, WALCKENAER, Communc. d'un mém. sur cette esp., 1848, XXXIII. — *diadema*, LUCAS, Var. trouvée dans la forêt de Bondy,

1847, LXXVII. — *fasciata*, GERVAIS, prise dans une haie près de Fontainebleau, 1835, LXII. — *scalaris*, LUCAS, Var. fort remarquable, 1853, LIV. — *sericea*, L. DUFOUR, Envoi d'une notice sur cette esp., 1860, XLIX. — *thomisoides*, Descr. de deux nouv. esp. d'Aranéides, 1855, 5.

**Epeire**, BUQUET, Communic. d'une esp. venant du Brésil, 1835, LXI.

**Episinus algiricus**, LUCAS, rencontré à Kouba, env. d'Alger, 1847, XLIV. — *americanus*, pris au Chili par M. Gay, 1847, XLIV. — *truncatus*, pris dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye par M. Nicolet, 1847, XLIII. — *id.*, pris à Pierrefonds, près Compiègne, 1852, XXXIV. — *id.*, pris à Compiègne, 1852, XXXIV.

**Eresus cinnaberinus**, LUCAS, pris à Passy, près Paris, par M. L. de Barneville, 1849, LXXXI. — *4-punctatus*, MORINEAU, trouvé sous terre en décembre, 1834, LXI.

## F.

**Filistrata**, LUCAS, Trois esp. de ce genre trouvées en Amérique, 1851, XXVIII.

**Filistrata bicolor**, L. DUFOUR, Obs. sur cette esp., 1836, 527. — *id.*, WALCKENAER, Obs. sur le mém. de M. L. Dufour, 1836, LVIII.

## G.

**Galcodes**, LUCAS, Note sur trois esp. de ce genre (*barbara*, *intrepida* et *arancoides*), 1855, LXVI. — *id.*, Communic. sur l'habitat de deux esp. de ce genre (*barbara* et *melana*), 1856, XLIX. — *barbara*, Note sur cette esp., 1849, XXXI. — *id.*, L. DUFOUR, Un mot et un portrait sur la femelle, 1853, 5. — *phalangista*, Note sur cette esp. d'Algérie, 1857, 64.

**Gamasus**, LABOULBÈNE, Descr. de qqes Acariens, 1851, 295. — *halophilus*, *maritimus*, 1851, 298. — *salinus*, 1851, 297.

## H.

**Homalonotus bispinosus**, LUCAS, Note sur cette esp., 1856, cxi.

**Hydrachna viridana**, LABOULBÈNE, Descr. d'une *Hydrachna*, 1851; 308.

**Hypoplætea**, LUCAS, Obs. sur un travail de M. Mac-Leay, 1839, 119.

## I.

**Ixodes**, LUCAS, Obs. sur leur manière de pondre, 1836, 629. — *id.*, GERVAIS, Nouv. esp. parasite de l'Ornithorhynque, 1844, LVII. — *id.*, LUCAS, Nouv. esp. parasite du *Python Sebæ*, 1845, 61. — *id.*, Notice sur qqes esp. parasites des Serpents et de l'Ornithorhynque, 1846, 53. — *id.*, Descr. abrégée d'une nouv. esp. trouvée sur le *Python Sebæ*, 1860, LXXXIV. — *Bibronii, coxalis*, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVII. — *Dugesii*, LUCAS, pris au Jardin des Plantes sur un *Lacerta viridis*, 1848, XXXIV. — *exilipes*, Note sur qqes esp. parasites des Serpents et de l'Ornithorhynque, 1846, 63. — *flavomaculatus*, 1846, 56. — *id.*, Descr. d'une femelle vivante, 1851, CXX. — *fuscolineatus, Gervaisii*, Descr. de deux *Ixodes* nouv., 1847, XCIX. — *globulus*, Diagnose d'une esp. nouv. d'*Ixodes*, 1860, 538. — *gracilentus, ornithorhynchi*, Mém. sur qqes esp. parasites des Serpents et de l'Ornithorhynque, 1846, 58. — *Poortmani*, Descr. d'une Arachnide du genre *Ixodes*, 1850, XLI. — *pulchellus*, Note sur qqes esp. parasites des Serpents et de l'Ornithorhynque, 1846, 53. — *id.*, prise sur le *Boa constrictor*, 1849, LXXX. — *id.*, Communic. de trois indiv. pris sur le *Boa constrictor*, 1857, CXX. — *variegatus*, Note sur une nouv. esp. parasite d'un Saurien, 1852, LXXXVIII. — *Walckenaerii*, GERVAIS, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, XLVII.

## L.

**Latrodectus malmignatus**, GRAELLS, Notice sur la propriété venimeuse de cette esp., 1842, 205. — *id.*, PIERRET, Elle habite l'île de Corse et sa morsure est venimeuse, 1843, VIII. — *id.*, LUCAS, observée en Algérie, où elle n'est pas venimeuse, 1843, VIII. — *martius*, trouvé aux env. de Paris, 1847, XLVIII. — *id.*, pris aux env. de Vendôme, 1848, XCI.

**Lycosa erythrognatha**, LUCAS, Notice sur une nouv. esp. d'Aranéide de ce genre, 1836, 521. — *id.*, WALCKENAER, Synonymie de cette esp. avec la *L. raptoria*, 1836, LVIII.

## M.

**Micrommata spongitaris**, L. DUFOUR, Mélanges entomologiques sur cette esp., 1852, XLII.

**Mygale**, GACHET, Lettre relative à une Mygale des env. de Bordeaux, 1834, 399. — *aviculaire*, AUD.-SERVILLE, prise vivante sur un quai de Rouen, 1835, LIII. — *id.*, LUCAS, Jeune femelle vivante venant de la Martinique, 1858, CLXXI. — *id.*, AUDOUIN, Obs. sur le nid d'une esp. américaine, 1837, L. — *bicolor*, LUCAS, Obs. sur cette esp., 1860, XV. — *fodians*, AUDOUIN, Obs. sur la structure du nid de l'Araignée pionnière, 1833, 69. — *Leblondii*, LUCAS, Qques détails sur une Aranéide vivante du Brésil, 1851, XCI. — *id.*, GIRARD, Dimensions de cette esp., 1858, CCXXXIII. — *luctuosa*, LUCAS, Note sur cette nouv. esp., 1855, 15. — *nigra*, Communic. d'un bel indiv. vivant, 1857, CXX.

**Mygales atra**, *Blondii*, *zebrata*, BUQUET, Communic. de div. esp. rares ou nouv. du Brésil, 1835, LXI. — *zebrata*, WALCKENAER, Mém. sur une nouv. esp. de Mygale, 1835, 637.

## N.

**Nops** *Guanabacoæ*, LUCAS, Obs. sur un travail de M. Mac-Leay, 1839, 117.

## O.

**Olios** *albifrons*, LUCAS, Descr. d'une esp. de l'île Bourbon, 1852, LXXVI.  
— *annulipes*, *geniculatus*, Diagnoses de deux nouv. Aranéides, 1857, CLX.

**Olothops** *Walckenaerii*, LUCAS, Obs. sur un travail de M. Mac-Leay, 1839, 122.

## P.

**Pachiloscelis**, LUCAS, Mém. sur un nouv. genre d'Aranéides de l'ordre des Pulmonaires, 1834, 359. — *id.*, Obs. sur les Aranéides de ce genre, 1837, 369. — *Abbotii*, *Audouinii*, 1837, 377. — *Audouinii*, 1837, 387. — *fulvipes*, 1837, 378. — *nigripes*, 1837, 377 et 379. — *id.*, Mém. sur un nouv. genre de l'ordre des Pulmonaires, 1834, 364. — *rufipes*, 1834, 362. — *id.*, Obs. sur les Aranéides de ce genre, 1837, 376. — *tarsalis*, *Walckenaerii*, 1837, 377.

**Phalangops** *Linderei*, L. DUFOUR, Nouv. esp. des grottes des Pyrénées-Orientales, 1860, L.

**Phrynus** *bassamensis*, GIRARD, Communic. de cette esp. vivante, 1858, CCXXXIII.

**Pompilius** *croceicornis*, L. DUFOUR, Sur cette esp., 1860, XLIX.

**Pteroptus** *vespertilionis*, LUCAS, rencontré sous les ailes d'un *Vespertilio murinus*, 1850, XLVI.



## S.

**Sallicus aurantius**, LUCAS, Mém. sur plusieurs Arachnides nouv. du genre *Atte*, 1833, 480. — *brasiliensis*, 1833, 479. — *formicæformis*, Notice et descr. de cette esp., 1837, LII. — *limbatus*, Mém. sur plusieurs Arachnides nouv. du genre *Atte*, 1833, 481. — *id.*, Addition à un mém. sur plusieurs Arachnides nouv., 1836, 631. — *variegatus*, Mém. sur plusieurs Arachnides nouv., 1833, 478.

**Sarcoptes auricularum**, LUCAS, trouvé dans les oreilles d'un chien de la Louisiane, 1849, XXXIV. — *Folleti*, JACQ. DU VAL, Maladie de la peau chez une femme, 1856, CII.

**Sclerosoma**, LUCAS, Descr. et figure d'une Arachnide nouv., 1858, 489 et XCII. — *bispinosum*, 1858, 493. — *monoceros*, *oraniense*, *quadridentatum*, *tuberculiferum*, 1858, 492.

**Scorpio flavicaudus**, LUCAS, trouvé à Paris, 1855, CI.

**Scorpion** OTTO, Animal de ce genre trouvé dans des charbons fossiles, 1835, XLV. — *id.* d'Europe, VANDER WEGHE, Note sur cette esp., 1834, XXXVII.

**Scorpions**, AUDOUIN, Communic. de la traduction du prodrome des esp. de l'Afrique septentrionale et de l'Asie occidentale, 1832, 233. — *id.*, GERVAIS, Communic. d'un travail sur la famille de ces animaux, 1844, XIV.

**Scotolemon Lepricurii**, LUCAS, Note sur cette nouv. esp. d'Arachnide trachéenne, 1860, 984 et LXXVII. — *Lespesii*, Obs. sur un nouv. genre d'Arachnide trachéenne, 1860, 973 et XXIV. — *id.*, L. DEFOUR, Envoi de la descr. et de la figure de cette esp., 1860, LXIV.

**Scytodes longipes**, LUCAS, Note sur une nouv. esp. d'Aranéides, 1845, 67. — *id.*, WALCKENAER, Cette esp. est identique avec la *Sc. rufipes*, 1845, XC. — *id.*, LUCAS, Réponse à la note de M. Walckenaer, 1845, XCI. — *thoracica*, Note au sujet d'une ponte obtenue de cette esp., 1847, VIII.

**Segestria florentina**, LUCAS, Oques rem. sur sa manière de vivre, 1860, 309. — *perfida*, Note au sujet du jeune âge de cette esp., 1851, XCIX.

**Stagobius troglodytes**, LUCAS, Esp. privées d'yeux des grottes d'Adelsberg, 1853, LXI.

**Stalita tænaria**, LUCAS, Note sur cette esp., 1855, LXIX.

## T.

**Tarentule**, LEFEBVRE, Détails sur le mémoire de M. L. Dufour, 1833, XXXIX.

**Tegenaria**, LUCAS, Note monogr. sur les Aranéides de ce genre, 1844, 455. — *agrestis*, 1844, 466. — *annulipes*, 1844, 463. — *arboricola*, 1844, 465. — *australensis*, 1844, 467. — *civilis*, 1844, 466. — *coarctata*, 1844, 467. — *domestica*, 1844, 461. — *emaciata*, *fuliginea*, 1844, 468. — *Guyonii*, 1844, 462. — *insularia*, *nemorensis*, *notata*, *senegalensis*, 1844, 467.

**Tetragnatha gibbosa**, WALCKENAER, Note sur une nouv. esp. de ce genre, 1847, LXIV.

**Tetranychus lintearius**, GACHET, Extrait d'une lettre relative à cette esp., 1834, 397. — *id.*, trouvé sur l'ajonc, 1834, x.

**Théraphoses**, WALCKENAER, Mém. sur ces animaux, 1835, 637.

**Theridion ardesiacum**, L. DUFOUR, Descr. de deux nouv. esp. d'Aranéides, 1855, 10. — *civicum*, LUCAS, Descr. et figure d'une nouv. esp., 1849, 179. — *id.*, DUMÉRIL, Obs. sur cette esp., 1850, 5. — *id.*, LUCAS, Note sur la même esp., 1850, 11. — *id.*, Il s'est établi de nouveau sur la Tour-de-l'Horloge, Palais-de-Justice, 1853, LXIV. — *dispar*, L. DUFOUR, Obs. sur la séparation en deux esp. des deux sexes, 1855, 12. — *malmignatte*, GRAELLS, Détails sur les accidents causés en Catalogne par cette esp., 1834, XXVI. — *id.*, LAREYNIE, Note sur cette esp., 1859, 284. — *triangulifer*, DOUMERC, Notice sur des cocons à pontes unisexuelpares, 1840, 421.

**Toile d'Araignée**, LEFEBVRE, Obs. du docteur Joffre sur sa propriété fébrifuge, 1833, ix.

**Trogulus nepæformis**, LUCAS, prise dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, 1848, v.

**Trombidium holosericeum**, LUCAS, Quantité prodigieuse observée au Jardin-des-Plantes, 1848, xxviii.

**Tyroglyphus**, LUCAS, Esp. nouv. trouvée dans le pus d'un abcès, 1849, xxviii. — *bicaudatus*, GERVAIS, Présentation d'un grand nombre d'indiv. de cette esp., 1844, xxvii. — *Mericourti*, LABOULBÈNE, Descr. de qqes Acariens, 1851, 302.

## U.

**Uropoda denticulata**, LUCAS, Envahissement par cette esp. des organes de locomotion, des parties buccale et gastriques de l'*Arrhenodes ersertus*, 1849, xxxiv.

## X.

**Xenillus clypeaster**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur cet Ins. cru un Coléoptère, 1839, 455. — *id.*, DEJEAN, L'auteur pense que c'est un Acarien, 1839, xii. — *id.*, DÉMARY, Rapport sur le mém. de M. Robineau-Desvoidy, 1839, 463. — *id.*, DÉMARY et LUCAS, Nouv. rapport sur cet Ins., 1839, xx. — *id.*, AUDOUIN et DÉMARY, Obs. à cette occasion, 1839, xx. — *id.*, Rapport de la Commission de publication et décision de la Société relativement à l'impression du mémoire de M. Robineau-Desvoidy, 1839, xxx.



## XI.

### MYRIAPODES.



## B.

**Bdelle**, GERVAIS, NOUV. esp. recueillie aux env. de Paris, 1840, xxxii.

**Blaniulus guttulatus**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, On le rencontre dans les pommes de terre gâtées, 1845, lxxxvi. — *id.*, LUCAS, Détails sur cette esp., 1849, lviii.

## C.

**Cambala lactaria**, GERVAIS, Descr. de cette esp., 1844, xxii.

**CHILOPODES**, GERVAIS et J. GOUDOT, Div. esp. de cette famille recueillies en Colombie par M. Justin Goudot, 1844, xxix.

## G.

**Gelasime**, GERVAIS, Esp. du Sénégal identique avec celle de Tanger, 1837, xlix.

**Geophiles**, GERVAIS, NOUV. détails sur les métam. des Myriapodes, 1837, ix.

**Geophilus**, GERVAIS, Communic. de deux esp. de ce genre, 1835, liv.  
— *electricus*, LABOULBÈNE, trouvé vivant auprès de Paris, 1855, xcvi.

**Gervaisia costata**, WAGA, Descr. d'un nouv. Myriapode, 1857, 829.

**Glomeridesmus porcellus**, GERVAIS et J. GOUDOT, Descr. des esp. de Myriapodes les plus intéressantes recueillies en Colombie, 1844, XXVII.

## I.

**IULITES**, LUCAS, Obs. sur un nouv. genre de cette famille, 1843, 43.

**Iulus albolineatus**, LUCAS, Note sur une nouv. esp. des env. de Toulon, 1845, 365. — *bioculatus*, GERVAIS et J. GOUDOT, Descr. des esp. les plus intéressantes, 1844, XXVIII. — *ferrugineus*, LUCAS, Communic. d'indiv. vivants venant de la Martinique, 1858, CLXXI. — *insularum sechellarum*, J. DESJARDINS, Descr. d'un Ins. Myriapode du genre *Iule*, 1835, 171. — *Lepricurii*, LUCAS, Descr. d'un indiv. rapporté vivant de Cayenne, 1849, LIX. — *lucifugus*, GERVAIS, trouvé abondamment dans les serres du Muséum, 1836, LVI. — *id.*, Recherches sur les demi-métamorphoses des Myriapodes, 1837, VII. — *muscorum*, LUCAS, Descr. et figure d'une nouv. esp. des env. de Paris, 1840, 55.

## L.

**Lithobius**, GERVAIS, Recherches sur les demi-métamorphoses des Myriapodes, 1837, VIII. — *Coquerctii*, LUCAS, Note sur ce Myriapode, 1860, LXXIII.

## M.

**MYRIAPODES**, BRANDT, Classif. nouv., 1837, LXVI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Détails sur les esp. trouvées dans les pommes de terre malades, 1855, CV. — *id.*, GERVAIS, Communic. de plusieurs esp. de Colombie, 1844, XXVII. — *id.*, Indication d'un travail de M. de Waga sur les espèces des env. de Varsovie, 1839, VII.

## P.

**Platydesmus polydesmoides**, LUCAS, Obs. sur un nouv. genre de la famille des *Iulites*, 1843, 51 et 52.

**Polydesmus**, GERVAIS, Note sur ce genre, 1836, 373. — *id.*, Myriapode fossile trouvé dans les cavernes des env. de Montpellier, 1850, LVII. — *Blainvillei*, Note sur le genre *Polydesmus*, 1836, 379. — *complanatus*, *conspersus*, *depressus*, *glabratus*, 1836, 378. — *granosus*, GERVAIS et J. GOUDOT, Descr. des esp. les plus intéressantes, 1844, XXVIII. — *granulosus*, GERVAIS, Note sur le genre *Polydesmus*, 1836, 378. — *Guerinii*, Notice sur une nouv. esp. de Polydesme Iuliforme, 1836, 685. — *lateralis*, Note sur le genre *Polydesmus*, 1836, 378. — *margaritiferus*, 1836, 379. — *oniscinus*, GERVAIS et J. GOUDOT, Descr. des esp. les plus intéressantes, 1844, XXVIII. — *pallipes*, GERVAIS, Nouv. esp. trouvée sur les bords des étangs du Plessis-Piquet, 1835, LXII. — *id.*, Note sur le genre *Polydesmus*, 1836, 378. — *rubescens*, 1836, 379. — *rugulosus*, *scaber*, *stigma*, 1836, 378. — *velutinus*, GERVAIS et J. GOUDOT, Descr. des esp. les plus intéressantes, 1844, XXVIII. — *virginiensis*, GERVAIS, Note sur le genre *Polydesmus*, 1836, 378. — *zebratus*, 1836, 379. — *zonatus*, 1836, 381.

**Polyzonium germanicum**, LUCAS, trouvé dans les bois de Verrières, Synonymie, 1848, LVII.

## S.

**Scolopendra alternans**, GERVAIS, Descr. de trois esp. signalées par Leach, 1844, XXI. — *gigantea*, DELAMARCHE, Indiv. recueilli dans l'île de la Trinité, 1857, XLV. — *McIlinoii*, LUCAS, Descr. d'une nouv. esp. de Myriapode, 1853, LV. — *scopoliana*, Note sur cette esp., 1853, L. — *subspinipes*, *trigonopoda*, GERVAIS, Descr. de trois esp. signalées par Leach, 1844, XXII.

**Scolopendre**, LEFEBVRE, rejetée des sinus frontaux par des éternuements, 1833, LXV.

**Scolopendrella**, GERVAIS, 2<sup>e</sup> esp. nouv. trouvée à Paris, 1840, xxxii.  
— *notacantha*, Descr. d'un genre nouv. de la famille des Scolopendres, 1839, xxxvi. — *id.*, Communic. d'une quinzaine d'esp. d'Ins. Aptères, 1842, xlvii.

**Scutigera** *coleoptrata*, LEFEBVRE, rendu par un enfant, au dire de sa mère, 1834, xxviii et xxxviii.

**Symphora** *luteola*, GERVAIS et J. GOUDOT, Rectif. du nom générique, 1844, xlii.

**Symphonotus** *lutcolus*, GERVAIS et J. GOUDOT, Descr. des esp. les plus intéressantes recueillies en Colombie par M. Justin Goudot, 1844, xxix.



## XII.

### ANOPOLOURES.

---

**ANOPOLOURE**, LUCAS, Communic. de plusieurs Anoploures trouvés en immense quantité sur un buffle, 1851, v. — *id.*, Parasite de cette famille trouvé sur un chat très-maigre, 1856, xciii.

---

## XIII.

### CRUSTACÉS.

---

#### A.

**Amphion Reynaudi**, H. MILNE-EDWARDS, Note sur un nouv. genre de l'ordre des *Stomapodes*, 1832, 336.

**Ancus vorax**, LUCAS, Obs. sur qqes esp. du nord de l'Afrique, 1849, 457.

**Apus cancriformis**, LUCAS, trouvé dans le désert, en Algérie, 1849, ix — *id.*, Note sur cette esp., 1856, lx. — *id.*, rencontré en grand nombre aux env. de Mâcon, 1856, lxxiv.

**Astacus**, WAGA, Esp. de grande taille provenant d'un lac de Lithuanie, 1857, cxix. — *fluvialilis*, LUCAS, Notice sur qqes monstruosités dans



des Crustacés, 1844, 41. — *id.*, DESMAREST, Notice sur une disposition anormale des organes génitaux, 1848, 479. — *id.*, LUCAS, Var. rouge prise aux env. de Bougival, 1851, XLVIII. — *id.*, BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, Variation de couleur observée aux env. de Chartres, 1851, XLIX. — *pellucidus*, LUCAS, Note sur cette esp., 1856, CII. — *id.*, LUCAS, Communic. d'une belle var. rouge, 1857, CXX. — *id.*, GIRARD, Qques rem. sur cette esp., 1859, 137.

## B.

**Branchiopode stagnal**, DE VILLIERS, Notice sur cette espèce, 1836, LXXIII.

**Branchipes**, AUDOUIN, Obs. sur leurs œufs, 1837, LXXXI.

**Branchipus torvicornis**, WAGA, Nouv. esp. de Crustacés, 1842, 261.

**Brongniartia trilobitoïdes**, LEFEBVRE, découvert aux îles de la Nouv.-Shetland, 1835, XLIV.

## C.

**Cancer**, GIRARD, Communic. de la suite de sa note monogr. sur ce genre, 1858, CCXXXIV. — *fossulatus*, Note monogr. sur les genres *Cancer* et *Platycarcinus*, 1859, 143. — *Huonii*, 1859, 148.

**Carcinus mœnas**, LUCAS, Notice sur qqes monstruosités dans des Crustacés, 1844, 41.

**Cœnobita Diogenes**, LUCAS, Communic. d'un indiv. vivant à la ménagerie du Muséum, 1854, LIV.

**Crabe**, GIRARD, Note monogr. sur les genres Crabe et *Platycarcin*, 1859, 143.

**CRUSTACÉS**, AUDOUIN, Dessins à la plume faits par M. G. CUVIER, 1832, 425. — *id.*, Obs. sur leur faculté de reproduire leurs pattes, 1832, 238. — *id.*, LEFEBVRE, Il fait part d'un mémoire de M. H. MILNE-EDWARDS sur leurs changements de forme dans le jeune âge, 1833, XXXIX. — *id.*, GERVAIS, Présentation d'une notice de M. WAGA sur deux esp. nouv., 1857, LXX.

**CRUSTACÉS BRACHYCÈRES**, H. MILNE-EDWARDS, Quelques considérations sur la monographie de cette famille, 1833, VII.

**CRUSTACÉS BRANCHIOPODES**, AUDOUIN, Découverts dans les salines des env. de Marseille, 1836, LXI.

**CRUSTACÉS DÉCAPODES**, H. MILNE-EDWARDS, Compte rendu d'un travail sur leur anatomie comparée, 1832, 234.

**CRUSTACÉS FOSSILES**, H. MILNE-EDWARDS, Obs. sur qqes esp., 1837, LXVIII. — *id.*, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur ceux du terrain néocomien de Saint-Sauveur, 1848, XCIII, et 1849, 95. — *id.*, GIRARD, Communic. de plusieurs échantillons curieux, 1858, CCXXXII.

**Cyzicus Bravaisii, tetracerus**, AUDOUIN, Communic. de qqes Crustacés de la côte d'Afrique et de Russie, 1837, IX.

## D.

**Dolops Lacordairei**, AUDOUIN, Communic. de deux indiv. de cette esp., 1837, XIII.

## E.

**Écrevisse ordinaire**, BIGOT, Envoi à la Société d'un indiv. de 30 cent. de long, 1851, LXXXI. (Voyez *Astacus*.)

**Estheria Dahalacensis**, STRAUS-DURKHEIM, Indication d'un mém. contenant la descr. anatomique de cette esp., 1837, XXII.

## G.

**Galathæa Lupiæ**, ROBINEAU-DESVOIDY, Mém. sur les Crustacés-fossiles du terrain néocomien, 1849. 132.

**Gammarus stagnalis**, DE VILLIERS, Notice sur cette esp., 1836, LXXIII.

**Gebia**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 136. — *digitata*, 1849, 136 et 137. — *Meyeri*, 1849, 136 et 138.

**Glyphæa neocomiensis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 131.

## H.

**Heterograpsus sexdentatus**, LUCAS, Indiv. pris dans l'archipel grec et le golfe de Gênes, 1850, XIII.

**Homarus**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 104. — *Blainvillii*, 1849, 111. — *Boscii*, 1849, 122. — *Cottaldi*, 1849, 115. — *Cuvierii*, 1849, 117. — *Desmarestii*, 1849, 120. — *Dorbignyi*, 1849, 118. — *Edwardsii*, 1849, 109. — *Fabricii*, 1849, 125. — *Guerini*, 1849, 114. — *Herbstii*, 1849, 122. — *Lamarckii*, 1849, 112. — *Latreillei*, 1849, 113. — *Linnei*, 1849, 123. — *Lucasii*, 1849, 124. — *Michelini*, 1849, 116. — *Sowerbii*, 1849, 119.

**Hypoconcha sabulosa**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. d'un nouv. genre de Crustacés, 1854, 329.

## I.

**Isea**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Descr. d'un nouv. genre de *Crustacés macroures*, 1832, 295. — *elongata*, 1832, 300.

**Ixa**, LUCAS, Note monogr. sur ce genre de *Crustacés macroures*, 1858, 179.

## L.

**Lambrus iconensis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 161.

**Langouste**, GIRARD, Communic. d'une pièce anatomique montée en laiton, 1860, LXIII,

**Leander erraticus**, DESMAREST, Descr. d'un nouv. genre de Crustacés, 1849, 87.

**Leptopodia sagittaria**, LUCAS, Sur son habitat, 1860, 326.

**Leucippe pentagona**, H. MILNE-EDWARDS, Descr. du genre *Leucippe*, 1833, 512.

**Limnadia**, AUDOUIN, Envoi par M. DESJARDIN, de l'île Maurice, de Crustacés de ce genre, 1835, LXI. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Lecture d'une note monog. sur ce genre, 1836, XIX. — *id.*, AUDOUIN, Obs. à l'occasion du mém. de M. Guérin-Méneville, 1836, XIX. — *id.*, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Réponse à M. Audouin, 1836, XX.

**Limnoria terebrans**, LUCAS, Dégâts causés aux bois dans les ports par cette esp., 1849, XIX.

**Lupa dicantha**, LUCAS, Notice sur qqes monstruosités dans des Crustacés, 1844, 43.

**Lyncæus brachyurus**, AUDOUIN, Qques Crustacés de la côte d'Afrique et de Russie, 1837, XI.

## N.

**Nephrops Geoffroyi**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 128. — *norwegicus*, LUCAS, Note sur un Crustacé de l'ordre des Décapodes Macroures, 1850, XLIX. — *salviensis*, ROBINEAU-DESVOIDY, 1849, 125.

## O.

**OEglea n. . . . .**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 133.

**Oniseus murarius**, LUCAS, Note au sujet des dégâts causés par ce Crustacé, 1860, LVI.

## P.

**PALEMONTIENS**, DESMAREST, Descr. d'un nouv. genre de Crustacés et tableau de cette tribu, 1849, 89.

**Palaeno Ræmeri**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 129.

**Pandalus**, L. DUFOUR, Consultation sur un Crustacé fluviatile, 1834, 477.

**Parthenope neocomiensis**, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 140.

**Philoscia notata**, WAGA, Descr. d'une nouv. esp. de Crustacés, 1857, 827.

**Phyllosome**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Ce genre ne se compose que de jeunes Langoustes, 1858, XLIV.

**Platyarthrus Hoffmannseggii**, LUCAS, Note sur cette esp. trouvée en France, 1858, CCXII. — *id.*, Note sur un Crustacé Édriophthalme des env. de Paris, 1860, CX.

**Platycarcin**, GIRARD, Note monogr. sur ce genre, 1859, 143 et 152.

**Platycarcinus Bervillei**, GIRARD, Note monogr. sur ce genre, 1859, 158. — *pagurus*, LUCAS, Note sur un cas de pathologie, 1853, XLIX.

**Polybius Henslowii**, LUCAS, Qques détails sur un Crustacé de l'ordre des Décapodes Brachyures, 1850, XLII.

**Porcellio Poeyi**, GUÉRIN-MÉNEVILLE, Esp. envoyée de l'île de Cuba par M. Poëy, 1837, VI.

**Portunus puber**, LUCAS, Indiv. pris dans la baie d'Alger, 1850, XLVI.

**Poupart**, AUDOUIN, Obs. sur l'amputation volontaire d'un membre, 1832, 238.

**Praniza mauritanica**, LUCAS, Obs. sur qqes nouv. esp. du nord de l'Afrique, 1849, 461. — *obesa*, 1849, 465,

## R.

**Ranina** *cristata, serrata*, DESJARDIN, Extrait d'un rapport à la Société d'hist. naturelle de l'île Maurice, 1835, II.

## S.

**Solenocera**, LUCAS, Obs. sur un nouv. genre de l'ordre des Décapodes Macroures, 1850, 215. — *Philippii*, 1850, 223.

## T.

**Thalassina** *grandidactylus*, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 135.

**Theallia** *acanthophora*, LUCAS, Obs. sur un nouv. genre de Décapodes Brachyures, 1839, 573.

**Tourteau** (**Poupart**), AUDOUIN, Obs. sur l'amputation volontaire d'un membre, 1832, 238.

## X.

**Xantho** *Agassizi*, ROBINEAU-DESVOIDY, Crustacés fossiles du terrain néocomien, 1849, 139.



## XIV.

### ANNÉLIDES.

**Peripatus**, GERVAIS, Détails à l'occasion d'une obs. de M. de Blainville, 1836, xv.

**Phyllodorce**, H. MILNE-EDWARDS, Qques obs. sur une monstruosité d'une esp. de ce genre, 1833, LXXVI.

**Splo Gidei**, ROBIN, Détails anatomiques et zoologiques sur cette esp., 1849, LI.

**Strongllosoma speluncarum**, LUCAS, Note sur la découverte de cette esp. dans la grotte de l'Ours, 1860, XLVIII.

---

## XV.

### VERS.

**Eutozealre**, PAUL LAMBERT, extrait du corps d'un *Amara*, 1851, LXXXIII. — *id.*, LEGRAND, Individus sortis vivants du corps d'un *Dytiscus marginalis*, 1858, CLXXXV.

**Gordius aquaticus**, GERVAIS, Vers intestinaux retirés d'un *Blaps mortisaga*, 1835, LXX.

**Mermis**, DAVAINÉ, Note sur une esp. trouvée dans le corps d'un *Amara similata*, 1851, CXIII.

---

## XVI.

### INFUSOIRES.

**Infusoires des environs de Lyon**, FAIRMAIRE, Offre à la Société d'un mémoire de feu M. ORMANCEY sur ces animaux, 1852, LX.



## XVII.

### ARTICLES GÉNÉRAUX et OBJETS DIVERS..

#### A.

**Absorption des matières ingérées** : Observations anatomiques de MM. ALESSANDRINI, DE FILIPI et BASSI, 1848, IV.

**Académie des aspirants naturalistes de Naples** : Détails sur les travaux entomologiques de cette Société, par M. COSTA, 1841, XXXV.

— **des Sciences de Barcelone** : Détails sur ses travaux, ses professeurs et ses correspondants, 1836, L.

**Accouplement de quelques Insectes** : Obs. détachées pour servir à l'histoire de quelques Insectes, par M. GOUREAU, 1839, 531.

**Altération des couleurs** : Détails sur l'état grassey des Insectes dans les collections, par M. DE LA FERTÉ, 1843, XVIII.

**Anatomie des Insectes** : Notes sur ce sujet, par M. LABOULBÈNE, 1852, 335.

**Animaux articulés** : Annonce de la publication d'un Catalogue des espèces d'Abyssinie, par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1845, CVIII. — *id.*, Détails sur divers animaux articulés recueillis par PÉRON aux terres australes, par M. GIRARD, 1857, CLIV.

**Annales de la Société** : M. DOUMERC propose de déposer aux archives les manuscrits des mémoires insérés dans les Annales, 1838, III. — *id.*, Proposition de M. GOUGELET pour hâter l'impression des Annales, 1856, CXIII. — *id.*, Rejet de la proposition de M. GUENÉE tendant à la publication séparée et mensuelle du Bulletin, 1857,



xxxviii. — *id.*, Chaque numéro paraîtra exactement un mois au plus tard après l'expiration du trimestre, 1857, xxxviii. — *id.*, Modification de l'article 37 du règlement sur le tirage à part des mémoires, 1857, xxxviii. — *id.*, A partir de 1858, le Bulletin donnera la liste des ouvrages offerts et de ceux achetés, 1858, xxxiii. — *id.*, La Société décide que les n° ne seront plus envoyés que par la poste, 1858, civ. — *id.*, La Société décide qu'à l'avenir tous les exemplaires lui seront remis à la fois, 1858, ccxxxiv. — *id.*, Le Bulletin bibliographique sera donné en entier à la fin de chaque volume, 1858, ccxxxv. — *id.*, Les Annales seront échangées contre les publications des Sociétés entomologiques de Berlin et des Pays-Bas, 1859, xxxv. — *id.*, Le tirage sera porté de 350 à 500 exemplaires, et le nombre des lignes de chaque page de 31 à 35, 1859, xxxv. — *id.*, Les prix payés à l'imprimeur et au graveur-coloriste seront augmentés, 1859, xxxv. — Le Bulletin bibliographique ne sera plus scindé, mais donné en une seule fois à la fin de chaque volume, 1859, xxxv. — Les Annales seront échangées, à partir de 1859, contre les publications de la Société entomologique belge, 1859, cii. — L'évaluation des exemplaires en magasin et l'inventaire des propriétés de la Société n'auront lieu que tous les trois ans, 1859, ccli. — *id.*, Fixation du contenu et de l'époque de la publication des quatre numéros de 1860, 1860, cxxxiv. — *id.*, Nouveau mode de composition et de publication des Annales, 1860, 1012.

**Annuaire des Sociétés savantes** : Circulaire du Ministre de l'Instruction publique qui demande l'envoi du règlement de la Société, 1845, lix. — *id.*, Réponse à la circulaire du Ministre, 1845, lxxxiii. — *id.*, Accusé de réception de la réponse de la Société à la circulaire du Ministre, 1845, xc.

**Antennes** : Note de M. LEFEBVRE sur le sentiment olfactif des antennes, 1838, 395. — Lecture, au nom de M. DUPONCHEL, d'une note sur l'usage des antennes, 1840, v. — *id.*, Obs. critiques relatives au mémoire de M. Duponchel, par M. DÉMARY, 1840, v. — *id.*, Mémoire de M. G. NEWPORT sur le même sujet, 1841, x. — *id.*, Obs. critiques sur le mémoire de M. G. Newport, par M. PIERRET, 1841, x. — *id.*, Obs. sur les fonctions des antennes, par M. GOUREAU, 1841, xii. — *id.*, Nouvelle discussion sur le même sujet, 1841, xvi. — *id.*, Lettre de M. ROBINEAU-DESVOIDY sur les usages des antennes, 1842, xxiii.

**Appareil alaire** : Considérations sur cet appareil chez les Insectes, par M. GIRARD, 1860, CX.

**Appareil de M. Blisson** : Pour faire périr et pour conserver les Insectes, 1847, 315.

**Asphyxie des Insectes** : Communication par M. LUTRAND, de Montpellier, 1857, LXXI.

**AUDOUIN** : Notice sur sa vie et ses travaux, par M. DUPONCHEL, 1842, 95. — Analyse de ses travaux, par M. DUPONCHEL, 1842, 113.

**AUDINET-SERVILLE** : Notice sur sa vie et ses travaux, par M. AMYOT, 1858, 343.

## B.

**Benzine** : Sur une particularité qui suit son action chez certains Insectes, par M. GIRARD, 1859, 172. — *id.*, Note de M. GIRARD sur son action sur les Lépidoptères, 1859, CCXX. — *id.*, Obs. de MM. LEPRIEUR, LABOULBÈNE et DUMÉRIL sur le même sujet, 1859, CCXXI. — *id.*, Nouvelles expériences de M. GIRARD sur ses effets toxiques, 1860, XCVI.

**Bulletin des Annales** : A partir de 1858 on donnera, dans le Bulletin, la liste des ouvrages offerts, 1858, XXXIII. — *id.*, Décision de la Société sur une proposition de M. BIGOT, 1860, XXX.

**Bulletin de la Société Impériale de Moscou** : Lettre de M. FISCHER DE WALDHEIM rendant compte des articles entomologiques, 1836, v.

## C.

**Carbone (sulfure de)** : Employé par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE pour faire périr les larves d'Anthrènes, 1859, CCXLIX. — *id.*, La benzine, suivant M. BUQUET, produit les mêmes effets et n'altère pas les couleurs, 1859, CCXLIX.

**CARCEL (Pierre)** : Notice sur M. Carcel, décédé le 24 juillet 1831, 1832, 113.

**Catalogue Gaubil** : Proposition de M. Reiche adoptée à l'unanimité, 1849, LXXXVIII.

**Chaire d'entomologie au Muséum** : La Société devra-t-elle présenter un candidat ? 1841, XLIII. — *id.*, Discussion sur cette question, 1841, XLIV. — *id.*, Décision, 1841, LII. — *id.*, Désignation de M. Lacordaire comme candidat, 1841, LII. — *id.*, Projet de lettre aux membres de l'Institut et au Ministre de l'Instruction publique, 1841, LIII. — *id.*, Lettre de remerciements de M. LACORDAIRE, 1841, LVI.

**CHARDINY**, de Lyon : Notice nécrologique, par M. DONZEL, 1837, XXVI.

**CHARLON**, capitaine : Extrait d'une notice nécrologique par M. DONZEL, 1842, XXVIII.

**CHARRE (Émile)** : Notice nécrologique, par M. LABOULBÈNE, 1848, XXXIX.

**Chasses entomologiques** : Mémoire sur quelques chasses à Fontainebleau, 1833, 466. — *id.*, Détails sur l'excursion dans les environs de Bouray et Lardy, 1856, LVII. — *id.*, Quelques détails sur les résultats de celle faite à Fontainebleau, 1858, xcv. — *id.*, Lecture d'une lettre de M. L. DUFOUR sur ses chasses entomologiques en Espagne avec M. PERRIS, 1854, XXXIII. — *id.*, Détails sur les chasses faites dans les Pyrénées orientales, par M. JACQUELIN DU VAL, 1855, LXXX. — *id.*, Sur celles faites aux Eaux-Bonnes, au cirque de Gavarni et à Biarritz, par M. E. DE SELYS-LONGCHAMPS, 1858, LXXII. — *id.*, Sur celles faites en Corse, par M. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, LXX.

**Circulation du sang chez les Insectes** : Mémoire de M. TYRRELL sur ce sujet, 1835, XLV.

**Citations synonymiques** : Lettre de M. REICHE sur celles en entomologie, 1858, 311.

**Classification en histoire naturelle** : Lecture d'un mémoire sur un nouveau mode, par M. AMYOT, 1835, LXXXVI.

**Clichés typographiques** : Percés par l'*Apate capucina*, Note de M. DESMAREST, 1844, XXIV.

**Club scientifique** : Annonce de sa réunion en septembre dans la ville de Douai, 1835, XLII. — *id.*, Il ouvrira ses séances le 6 septembre et durera dix jours, 1835, XLVI.

**Collections** : M. le marquis DE BRÊME vient de donner la sienne au Muséum de Turin, 1850, XIX.

**Collections (Conservation des)** : Préservatif proposé par M. REICHE, 1835, LXVIII. — *id.*, Note de M. REICHE sur les moyens de les conserver, 1858, CLIII. — *id.*, Note de M. ANDRÉ, de Beaune, sur le même sujet, 1858, CLV. — *id.*, Obs. et discussion sur le même sujet, 1858, CLVII. — *id.*, Note de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE sur le même sujet, 1858, CLXXIV. — *id.*, Lecture d'un travail de M. GIRARD sur l'action toxique de la benzine, 1858, CCXVIII. — *id.*, Sur une particularité qui suit l'action de la benzine, par M. GIRARD, 1859, 172. — *id.*, Note de M. GEHIN sur l'action des poudres insecticides, 1859, xv. — *id.*, Lecture d'un mémoire de M. LEPRIEUR sur l'emploi de l'alcool saturé d'acide arsénieux, 1860, LVII.

**Collections du Muséum de Madrid** : Détails sur leur état, par M. GRAELLS, 1838, XXXV.

**Colza. (siliques de)** : Note de M. LABOULBÈNE sur celles attaquées par les Insectes, 1857, 791.

**Conduits trachéens** : Détails anatomiques sur l'absorption des matières ingérées ; communication de M. le marquis DE BRÊME, 1848, IV.

**Congrès entomologiques** : Proposition de M. BRUANT D'UZELLE, 1857, CXXII. — *id.*, Rapport sur la proposition de M. BRUANT D'UZELLE, 1858, XXXIV.

**Congrès de Clermont-Ferrand** : Procès-verbal de la séance du 27 juin 1859, 1859, CXXII. — *id.*, Rapport de M. EMM. MARTIN sur cette session, 1859, 647.

**Congrès de Grenoble** : Discours du Président, 1858, CXXVIII. — *id.*, Rapport sur la session extraordinaire tenue à Grenoble, par M. LABOULBÈNE, 1858, 819. — *id.*, Insectes recueillis pendant le Congrès, 1858, 871. — *id.*, Plantes recueillies ou observées, 1858, 894.

**Congrès de Montpellier** : Procès-verbal de la séance du 8 juin 1857, 1857, LXXII. — *id.*, Procès-verbal de la séance du 14 juin 1857, 1857, LXIX.

**CORDIER (Jules)** : Notice nécrologique par M. L. FAIRMAIRE, 1847, xv.

**Couleurs des Insectes** : Suivant M. le docteur HEER, plus l'habitat est élevé, moins les couleurs sont brillantes, 1835, XLV.

**CRISTOFORI** : Notice nécrologique, par M. Ant. VILLA, 1837, XCVII.

**CUVIER** : Notice nécrologique par M. AUDOUIN, 1832, 317. — *id.*, Lettre autographique à M. Alexandre Lefebvre, 1832, 316.

## D.

**Décharges électriques** : Expériences de M. VANDER-WIGH sur leurs effets sur les Insectes, 1834, XXXVIII.

**DEJEAN (Le comte)** : Notice nécrologique par M. le D<sup>r</sup> BOISDUVAL, 1845, 499.

**DESMAREST (Anselme-Gaétan)**, membre honoraire : Notice nécrologique par M. Em. BLANCHARD, 1838, XLII.

**Détails entomologiques** : Lettre de M. le colonel GOUREAU à M. DUPONCHEL, 1845, LXXIX.

**Discours** : De M. LATREILLE à l'ouverture des séances de la Société, 1832, 22. — *id.*, de M. HOPE, Vice-Président de la Société entomologique de Londres, 1834, XXIX. — *id.*, de M. le baron WALCKENAER à l'occasion de l'inauguration du buste de LATREILLE, 1835, XXIII. — *id.*, de M. le marquis DE BRÊME, Président de la Société, 1844, III. — *id.*, du même lors de l'installation de la Société à l'Hôtel-de-Ville, 1844, 213. — *id.*, de M. le colonel GOUREAU, Président, 1845, 5. — *id.*, de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, Président sortant, 1847, III. — *id.*, de M. REICHE, Président, 1847, IV. — *id.*, de M. GUENÉE, Président, 1849, XI.

**DUMÉRIL** : Discours prononcé à ses funérailles, par M. MILNE-EDWARDS, au nom de l'Académie des sciences, 1860, 647. — *id.*, Discours prononcé par M. le D<sup>r</sup> LABOULBÈNE, au nom de la Société entomologique de France, 1860, 651. — *id.*, Liste de ses travaux entomologiques, par M. H. LUCAS, 1860, 653.

**DUPONCHEL** : Discours prononcés à ses funérailles par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE et par M. DUMÉRIL, 1846, IV et VII. — *id.*, Notice sur la vie et les ouvrages de DUPONCHEL, par M. DUMÉRIL, 1847, 5.

## E.

**Écaille fondue** : Dégâts causés par les larves de l'*Anthrenus pimplinellæ*, 1851, xv.

**Entomologie** : Indication des mémoires présentés à l'Académie des Sciences, par M. ROBINEAU-DESVOIDY, 1836, LXXVII. — *id.*, Observations sur l'utilité de l'entomologie, par M. le colonel GOUREAU, 1844, 261. — *id.*, Réflexions sur le même sujet, par M. CAILLETTE D'HERVILLIERS, 1845, XCVIII. — *id.*, Remarques de M. REICHE sur l'application de l'entomologie au commerce, 1860, 331.

**Entomologie actuelle** : Coup d'œil rétrospectif sur quelques points de l'entomologie actuelle, par M. ROBINEAU-DESVOIDY, 1846, 347. — *id.*, Observations sur la notice de M. ROBINEAU-DESVOIDY, par M. MACQUART, 1847, 71.

**Entomologie (Étude de l')** : Mélanges entomologiques, par M. L. DUFOUR, 1851, 55.

**Entomologie de la Guyane française** : Notice de M. LACORDAIRE, 1832, 348.

**Entomologie du département de Maine-et-Loire** : Extrait; par M. AMYOT, d'une brochure de M. MILLET, 1848, LXIX.

**Entomologie du Yucatan** : Note de M. PILATE, 1846, xcvi.

**Entomologistes étrangers** : Lettre de M. BASSI à M. LEFEBVRE contenant des détails sur quelques-uns d'eux, 1834, LVII.

**Errata et addenda** : Du 3<sup>e</sup> volume des Annales, 1835, xxxi. — *id.*, Corrections à faire au 6<sup>e</sup> volume, 1838, xv. — *id.*, des 8<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup> et 11<sup>e</sup> volumes, 1842, lxxxix. — *id.*, des deux 1<sup>ers</sup> volumes de la 2<sup>e</sup> série, 1843 et 1844, 1846, xcix. — *id.*, du 3<sup>e</sup> volume de la 2<sup>e</sup> série, 1846, cxx. — *id.*, du 4<sup>e</sup> n<sup>o</sup> de 1846, 1847, xxxii. — *id.*, des tomes 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> série, 1850, cix. — *id.*, du 6<sup>e</sup> volume, 1849, xv. — *id.*, du 7<sup>e</sup> volume, 1850, cix.

**Espèce (De l') et des races** : Analyse d'un travail de M. le D<sup>r</sup> GAUDRON, par M. AMYOT, 1848, lxxxvii. — Un nom d'espèce ne doit pas être appliqué à un genre, question soumise à la Société par M. AMYOT et résolue affirmativement, 1842, lxi.

**Excursion entomologique** : Dans la Gironde, les Landes et le nord de l'Espagne, par M. LUCAS, 1852, lxi. — *id.*, M. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE parle de celle par lui faite dans la forêt de Compiègne, 1852, xxxvii. — *id.*, Détails sur celle annuelle de la Société dans les environs de Bouray et de Lardy, 1856, lvii. — *id.*, Rapport de M. FAIRMAIRE sur celle faite aux environs de Montpellier en 1857, 1857, 617. — *id.*, M. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE donne des détails sur celle qu'il a faite dans les Pyrénées orientales, 1857, xcix.

**Excursion provinciale** : Rapport de M. Emm. MARTIN sur celle de Besançon en 1860, 1860, 989.

**Exploration entomologique** : Dans les îles Lochau, à Jalajala et dans la Grande Lagune, par M. LORQUIN, 1860, xcvi.

**Exploration du Mexique** : Communication par M. SICHEL d'une lettre de M. DE SAUSSURE, 1856, xi.

## F.

**Faune entomologique française** : Proposition de M. PEYRON, 1859, lxxv.

**Faune entomologique de la Sicile** : Observations de M. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1860, 667.

**Faune de la forêt de Fontainebleau** : Obs. de M. A. LEFEBVRE, 1833, xl.

## G.

**Galles** du *Papaver dubium* : Obs. sur les Insectes qui les habitent, par M. Ed. PERRIS, 1840, 93. — *id.*, du *Quercus Mirbeckii* : Communication par MM. AMBLARD et LABOULBÈNE, 1853, xxvi. — *id.*, du *Tamarix* : Communication par M. A. LABOULBÈNE, 1855, xviii. — *id.*, de l'*Ulex nanus* : Obs. sur les Insectes qui les habitent, par M. Ed. PERRIS, 1840, 89.

**GÈNÈ** : Notice nécrologique par M. BASSI, 1848, 5.

**Génération** : Extrait d'un ouvrage sur l'histoire et la classification des Insectes de France, par M. DUMÉRIL, 1859, xxxviii.

**Genres (Noms de)** : Un nom d'espèce ne doit pas être appliqué à un genre ; question soumise à la Société par M. AMYOT et résolue affirmativement, 1842, lxi. — Commission nommée pour faire un rapport sur leurs changements et modifications, 1854, l.

**Géographie entomologique** : Envoi par M. AMYOT d'une notice de M. MILLET sur l'entomologie de Maine-et-Loire, 1848, lxix. — *id.*, Note de M. GIRARD, 1859, ccxx.

**GERMAR** : Notice sur sa vie et ses travaux, par M. SCHAUM, 1853, 689.

## H

**Histoire naturelle** : Quelques obs. sur la manière de travailler en histoire naturelle, par M. GODET, 1832, 34.

**Histoire naturelle des Insectes** : Note de M. DUMÉRIL accompagnant l'offre de son ouvrage, 1860, i.



## . I.

**Insecte d'un ordre incertain** : Notice de M. CARRENO, 1841, 205.

**Insectes** : Compte rendu par M. LEFEBVRE d'un mémoire de M. DUTROCHET sur leur respiration, 1833, x. — *id.*, Résultat d'expériences sur la sécrétion urinaire chez les Insectes, par M. MILNE-EDWARDS, 1833, LXIV. — *id.*, Expériences sur l'effet des décharges électriques sur les Insectes, 1834, XXXVIII. — *id.*, Présentation par M. AUDOUIN d'un manuscrit précieux intitulé : *Observations sur les Insectes, faites exactement par un solitaire*, et renseignements à cet égard, 1835, XVI. — *id.*, Observations au sujet d'un mémoire de M. TYRRELL sur la circulation du sang chez ces animaux, 1835, XLV. — *id.*, Notice sur leur système nerveux, par M. DE CASTELNAU, 1836, XXXII. — *id.*, Observations sur les organes de perforation chez les Insectes, par M. DOYÈRE, 1837, XVII. — *id.*, Communication d'un travail de M. AUDOUIN sur les effets du froid sur les Insectes, 1838, XXXIX. — *id.*, Observations détachées pour servir à l'histoire de quelques Insectes, par M. le colonel GOUREAU, 1839, 531. — *id.*, Observations par M. Ed. PERRIS sur ceux qui vivent dans les galles de l'ortie dioïque, 1840, 401. — *id.*, De l'irisation de leurs ailes, par M. le colonel GOUREAU, 1843, 201. — *id.*, Explication du phénomène de l'irisation, par M. AMYOT, 1843, XXI. — *id.*, Observations sur le même sujet, par M. MILNE-EDWARDS, 1843, XXII. — *id.*, Note sur certains Insectes qui prennent la couleur des terrains sur lesquels ils vivent, par M. Al. LEFEBVRE, 1851, XXIV.

— **de l'Amérique du Nord** : Observations entomologiques, par M. DE CASTELNAU, 1842, XII.

— **de Californie** : Note de M. LORQUIN contenant des détails intéressants, 1852, LVI.

— **(Conservation des)** : Insectes conservés dans un flacon contenant des feuilles hachées de laurier-cerise, 1860, LXIX.

— **de la Guadeloupe** : Observations sur leurs habitudes, par M. LHERMINIER, 1837, 497.

- Insectes de Java** : Observations sur un mémoire de M. ZINKEN-SOMMER, par M. BOISDUVAL, 1832, 416.
- (**Destruction des**) : Observation sur ce sujet par M. DEJEAN, 1839, xli.
  - **nuisibles** : Note de M. MOCQUERYS relative à leur destruction, 1857, lxxi.
  - **nuisibles et utiles** : Proposition de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE ; renvoi à la Commission, 1859, lxxxii.
  - **nuisibles à l'agriculture** : M. AMYOT communique une lettre de M. Joseph Li sur les dégâts causés aux moissons en Chine, 1836, xli, — *id.*, Rapport fait à la Société d'Agriculture de Paris par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE sur la proposition d'un prix pour la découverte d'un moyen de les détruire, 1845, xix. — *id.*, Rapport à la Société d'Agriculture sur le concours ouvert sur le même sujet, 1845, xxii. — *id.*, Extrait du rapport de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE sur le même concours, 1846, xli. — *id.*, Résumé d'un rapport de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE sur l'étude d'un Insecte qui nuit aux moissons de l'arrondissement de Barbezieux, 1847, xvii.
  - **nuisibles à l'agriculture et à la sylviculture** : Note de M. AMYOT, 1851, xxxvi. — *id.*, Note de M. le colonel GOUREAU, 1851, xxxix.
  - **nuisibles aux blés** : M. GUÉRIN-MÉNEVILLE entretient la Société d'un travail du D<sup>r</sup> PIGEON, 1851, vi.
  - **nuisibles au chardon penché** : Note pour servir à leur histoire, par M. le colonel GOUREAU, 1845, 75.
  - **nuisibles aux colzas** : Réflexions sur un mémoire de M. FOCIL-LON, par M. AUBÉ, 1852, lxxxiii.
  - **nuisibles aux forêts, etc.** : M. AUDOUIN résume les résultats de ses recherches sur les Scolytes, 1837, ii. — *id.*, M. AMYOT fait part des dégâts causés en Autriche, 1837, ii. — *id.*, Communication de M. le colonel GOUREAU sur les moyens préservatifs, 1857, xxviii. — *id.*, Lettre de M. CUSSAC relative aux dégâts causés dans les plants de betteraves, 1857, lxxiii. — *id.*, Note de M. WAGA sur ceux qui exercent leurs ravages en Pologne, 1857, cxxvi. — *id.*, Détails sur les collections présentées à l'Exposition d'agriculture, 1860, lviii.

**Insectes nuisibles à l'olivier** : Lecture d'un extrait d'un grand mémoire de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE sur ce sujet, 1844, LXXVI. — *id.*, Deuxième mémoire de M. BOYER DE FONSCOLOMBE, 1840, 101.

— **de différents ordres** : Observations sur une lettre de M. WESTERMANN à M. WIEDEMANN, par M. AUDINET-SERVILLE, 1833, 490.

— **nuisibles aux pommiers** : Note de M. le colonel GOUREAU, 1852, LXXIX.

— **du pin maritime** : Introduction à leur histoire, par M. Ed. PERRIS, 1852, 491.

— **de Sielle** : M. GUÉRIN-MÉNEVILLE parle d'un rapport sur le voyage de MM. MILNE-EDWARDS et BLANCHARD, 1844, LXXVI. — *id.*, M. MILNE-EDWARDS explique lui-même les résultats de son voyage avec M. BLANCHARD, 1844, LXXVIII. — *id.*, Réponse de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1844, LXXIX. — *id.*, M. BLANCHARD donne à son tour des détails sur le même voyage, 1844, LXXIX.

— **de la truffe** : Note de M. le colonel GOUREAU, 1852, LXXV. — *id.*, M. GUÉRIN-MÉNEVILLE ajoute quelques détails à ce sujet, 1852, LXXVI.

— **nuisibles à la vigne** : Recherches sur ces animaux, par M. WALCKENAER, 1835, 687, et 1836, 219.

**Instinct des Invertébrés** : Considérations physiologiques sur son développement, par M. FRAY, 1833, 361.

**Invertébrés** : M. DUPONCHEL rend compte du mémoire de M. BECQUEREY sur la chaleur de ces animaux, 1834, x.

## L.

**Larve innommée** : Trouvée vivante incluse dans du granit compacte et hermétiquement fermé, 1836, LXXIV.

**Larves d'Insectes** : M. DESMAREST parle d'un morceau de bois fossile paraissant perforé par des larves, 1845, XXVI. — *id.*, M. GUÉRIN-MÉNEVILLE montre des os d'un tombeau celtique sillonnés et perforés, 1845, LXXXVII.

**LATREILLE** : Discours prononcé sur sa tombe par M. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1833, XVIII. — *id.*, Discours prononcés par MM. AUDOUIN et CORDIER, 1833, XXIII et XXV. — *id.*, Fac-simile d'une lettre de M. LATREILLE à M. Alex. LEFEBVRE, 1834, fin du volume. — *id.*, Discours de M. WALCKENAER, président, sur l'inauguration du buste de LATREILLE, 1835, XXIII.

**LEACH (Le docteur)** : Notice nécrologique par M. HOPE, 1837, XXXIV. — *id.*, Observations au sujet de la notice de M. HOPE, 1837, XLVII.

**LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU (Le comte)** : Notice nécrologique par M. AUDINET-SERVILLE, 1846, 193.

## M.

**MAILLE (Arsène)** : Notice nécrologique par M. AUDINET-SERVILLE, 1839, 603.

**Maladies des Pommes de terre** : Réflexions de M. GUÉRIN-MÈNEVILLE sur ce sujet, 1845, LXXXVI. — *id.* des raisins : Lecture d'une note de M. L. DUFOUR sur ce sujet, 1852, XXX. — *id.* des feuilles de tilleul : Note de M. AZAMBRE et observations sur ce sujet, 1855, LXII. — *id.* de la vigne et des pommes de terre : M. ROBINEAU-DESVOIDY fait connaître un travail par lui lu à l'Institut, 1851, C.

**MEIGEN** : Notice nécrologique par M. MACQUART, 1847, 323. — *id.*, Note additionnelle à la notice nécrologique de M. MACQUART sur Meigen, 1847, LXXVI.

**MELLY** : M. CHEVROLAT communique un journal des États-Unis contenant une notice nécrologique sur cet entomologiste, 1851, XXXV.

**Membres fondateurs** : Liste des membres fondateurs de la Société, 1832, 14.

**Membres honoraires** : Lettre de remerciement de M. le baron CUVIER, 1832, 17. — *id.*, de M. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1832, 17. — *id.*, de M. DUMÉRIL, 1832, 18. — *id.*, de M. ALEX. BRONGNIARD, 1832, 19.

— *id.*, de M. le baron DE HUMBOLDT, 1832, 21. — CROTAY DE BLAINVILLE, 1832, 20. — *id.*, de M. A.-G. DE 20. — *id.*, de M. KLUG, 1832, 245. — *id.*, de M. le baron 1832, 424. — *id.*, de M. KIRBY, 1832, 117. — *id.*, de 1832, 335. — *id.*, de M. L. DUFOUR, 1833, XLIV. — NODIER, 1843, XXXVII. — *id.*, de M. SCHOENHERR, 1844, M. le comte LEPELETIER DE SAINT-FARCEAU, 1845, X. — SPINOLA, 1847, LIV. — *id.*, de MM. CLRTIS et LEFEBVRE et XLIV. — *id.*, de M. BOHEMANN, 1856, XLIX. — LACORDAIRE, 1858, LXXXVI. — *id.*, de M. ZETTERSTEDT — *id.*, de M. WESTWOOD, 1860, XXV.

**Métamorphoses des Insectes** : Note de M. AZAMON.

**Méthodes entomologiques** : Observations de M. AMYOT sur l'expression des noms de famille et de tribu, 1854, XIV.

**Méthode mononymique** : Lettre de M. WESTWOOD, M. AMYOT, 1848, LXX.

**Monstruosités entomologiques** : Notice de M. DE 171.

**Musccardine** : Observations de MM. AUDOLIN, AUBE et BOULEY, LXXXI. — *id.*, M. GUERIN-MENEVILLE envoie quelques renseignements sur cette maladie et sur les insectes en sont atteints, 1847, LVI. — *id.*, Rapport de M. CHAVIGNERIE, en réponse à la demande de M. Guérin-Meneville, LXXV.

**Muséum d'Histoire naturelle** : Réunion pour l'anniversaire de sa fondation, 1835, VIII. — *id.*, Proposition de renvoi à la Commission, 1850, LXXX.

## N.

**Naturalistes allemands** : Compte rendu des travaux des communications faites à leur réunion, 1833, LV. — *id.*, est chargée de représenter la Société à la réunion de 1834, LXXI.

**Nécrantome** : Présentation d'un nouveau modèle , par M. BOISDUVAL, 1837, LXXXIII. — Note de M. GUENÉE sur cet instrument, 1838, XXVII. — *id.*, Quelques observations de M. VILLIERS sur le même sujet, 1838, XLIX.

**Nécrologie** :

AUDINET-SERVILLE. Notice nécrologique sur M. Audinet-Serville, par M. AMYOT, 1858, 343.

AUDOUIN (VICTOR). Notice sur la vie et les ouvrages de Jean-Victor Audouin, par M. DUPONCHEL, 1842, 95.

BLUTEL. Notice nécrologique sur M. Blutel, par M. BUQUET, 1858, 905.

BOUCHIER. Note nécrologique sur M. Boucher, par M. GOUGELET, 1859, XXVIII.

BOYER DE FONSCOLOMBE. Notice nécrologique sur M. Boyer de Fonscolombe, par M. le marquis DE SAPORTA, 1853, XIII.

CARCEL (PIERRE). Note nécrologique sur M. Carcel, 1832, 113.

CHARDINY. Notice sur M. Chardiny, par M. DONZEL, 1837, XXVI.

CHARLON (AUGUSTIN). Extrait d'une notice nécrologique sur M. Charlon, par M. DONZEL, 1842, XXVIII.

CONTAMINE. Courte notice sur M. Contamine, par M. DOUÉ, 1846, LXII.

CORDIER (JULES). Notice nécrologique sur M. Cordier, par M. L. FAIRMAIRE, 1847, XV.

CRISTOFORI. Notice sur M. de Cristofori, par M. ANT. VILLA, de Milan, 1837, XCVII.

CUVIER. Notice nécrologique sur M. Cuvier, par M. V. AUDOUIN, 1832, 317.

DEJEAN (le comte). Notice nécrologique sur M. le comte Dejean, par M. le docteur BOISDUVAL, 1845, 499.

DELAMONTAGNE (ALEX.). Notice nécrologique sur M. Delamontagne, par M. PIERRET, 1836, LXXX.

DESMAREST père. Notice sur M. A.-G. Desmarest, par M. EM. BLANCHARD, 1838, XLIII.

TABLES DES ANNALES.

**DUMÉRIL.** Discours de M. MILNE-EDWARDS aux funérailles de M. Duméril, 1860, 647. — *id.*, Discours de M. le docteur LABOULRÈNE à la même occasion, 1860, 652.

**DUPONCHEL.** Discours prononcé par M. GUÉRIN aux funérailles de M. Duponchel, 1846, iv. — *id.*, Discours de M. DUMÉRIL, 1846, vii. — *id.*, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Duponchel, par M. DUMÉRIL, 1847, 5.

**FEISTHAMEL** (le général). Paroles prononcées sur sa tombe, par M. BUQUET, 1851, ix.

**FISCHER DE WALDHEIM.** Notice biographique par M. AMYOT, 1855, 323.

**GÉNÉ.** Notice nécrologique sur M. Géné, par M. BASSI, 1848, 5.

**GERMAR.** Note sur la vie et les travaux de Germar, par M. SCHAUW, 1853, 689.

**LAREYNIE.** Notice nécrologique sur M. Ph. Lareynie, par M. L. FAIRMAIRE, 1859, 261.

**LATREILLE.** Rapport de la Commission du monument à élever à M. Latreille, 1833, viii et xxix.

**LEACH.** Notice sur le docteur Leach, par M. HOPE, 1837, xxxv.

**LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU.** Notice nécrologique, par M. AUDINET-SERVILLE, 1846, 193.

**LEVRAT.** Notice de M. MILLIÈRE sur M. Levrat, 1860, xviii.

**MAILLE (ARSÈNE).** Notice nécrologique par M. AUDINET-SERVILLE, 1839, 603.

**MEIGEN.** Notice nécrologique par M. MACQUART, 1847, 323. — *id.*, Note devant être placée à la suite de la notice nécrologique de M. MACQUART, 1847, lxxvi.

**MELLY.** Note nécrologique par M. GUX, 1851, xxxv.

**MERCK aîné.** Courte note nécrologique par M. PIERRET, 1849, lxxiii.

**NEUVILLIER.** Notice nécrologique par M. WOLF, de Bonn, 1845, cv.

**PASSERINI.** Notice sur la vie et les travaux de M. Passerini, par M. G. TAPPES, 1858, 187.

**PICARD.** Notice nécrologique par M. le baron FEISTHAMEL, 1839, 587.

PIERRET (ALEX.). Discours prononcé sur sa tombe, par M. AMYOT, 1850, xxx. — *id.*, Notice nécrologique par M. DOUÉ, 1850, 351.

PITTOIS. Courte notice sur M. Pittois, par M. Eug. DESMAREST, 1843, xxiii.

PRADIER (JULES). Notice biographique par M. LAFONT, 1858, ccvii.

ROBERT. Notice sur M. Ch. Robert, par M. LACORDAIRE, 1837, xxxi.

ROBINEAU-DESVOIDY. Notice nécrologique par M. J. BIGOT, 1857, cxxxii.

ROUX. Notice nécrologique sur Paul Roux, par M. BARTHELEMY, 1834, xliv.

VILLIERS (DE). Notice nécrologique par M. GUENÉE, 1847, 619.

WALCKER (PATRICK). Notice nécrologique par M. REICHE, 1837, xcvi.

**Noir des Oliviers** : Lecture à l'Académie des Sciences de Barcelone d'un travail sur cette maladie, 1836, l.

**Nomenclature entomologique** : Mémoire de M. AMYOT, 1859, 571. — *id.*, Notes de M. REICHE sur le même sujet, 1859, 607. — *id.*, Discussion sur la proposition de M. REICHE, 1859, lviii. — *id.*, Décision de la Société, 1859, lxxiv. — *id.*, Note de MM. SCHAUUM et KIESENWETTER, 1859, cxcvii. — *id.*, Réponse de M. REICHE, 1859, cci. — *id.*, Observations de M. L. FAIRMAIRE, 1859, cciv. — *id.*, de M. DUMÉRIL, 1859, cciv.

**Noms génériques et spécifiques** : Note de M. REICHE sur l'abus des changements de ces noms, 1858, lxi.

**Nymphes d'Insectes** observées dans des tubercules de pommes de terre, par M. PAUL DE SAINT-MARTIN, 1849, xlv. — *id.*, trouvée dans des herbiers ; communication par M. LABOULBÈNE, 1855, xix.

## O.

**Observations entomologiques** : Extrait d'une lettre de M. MOREAU à M. LEFEBVRE, 1834, lx. — *id.*, Communication par M. le



comte de CASTELNAU des observations par lui recueillies pendant son voyage en Amérique, 1842, XII.

**Odorat chez les Insectes** : Note sur l'organe de l'odorat, par M. MOCQUERYS, 1857, XVI. — *id.*, Réponse à cette note par M. GOU-REAU, 1857, XVI.

**Organe de l'olfaction** : Remarque sur le siège de cet organe chez les Insectes, par M. AUBÉ, 1841, XVII.

**Organes génitaux chez les Insectes** : Réclamation par M. OR-MANCEY, pour la découverte de leur valeur spécifique, 1852, 1852, III. — *id.*, Remarques de M. le Secrétaire et de plusieurs membres à cette occasion, 1852, IV.

## P.

**Pierret (Collection)** : Rapport de la Commission sur les moyens de la conserver ou de l'utiliser, 1855, XL. — *id.*, Discussion et décision de la Société, 1855, XLII. — *id.*, Nouvelle discussion; motifs de l'ordre du jour adopté par la Société, 1855, XLIV. — *id.*, Rapport de la Commission sur la mise à exécution de la vente de cette collection, 1855, LXXI. — *id.*, Lettre de M. GUILLEMOT; décision de la Société, 1856, LII. — *id.*, Lettre de M. le Président à M. GUILLEMOT, 1856, LV. — *id.*, Réponse de M. GUILLEMOT; discussion et décision de la Société, 1856, LXI.

**Pierret (Fonds)** : Adoption d'un timbre particulier pour les livres achetés avec ces fonds, 1856, LXXX. — *id.*, Un cliché de ce timbre sera reproduit dans le Bulletin des Annales, 1856, LXXXIII.

**Plomb (Lames de)** : Note sur leur perforation par la *Cetonia cardui*, par M. PICCIONI, 1844, XXXII. — *id.*, Observation sur l'objet de cette communication, par M. E. DESMAREST, 1844, XXXII.

**Préservatif** : Moyen indiqué par M. REICHE contre la moisissure et les Milles, 1835, LXVIII (1).

(1) La pagination des Annales devrait indiquer LXXVIII, et non LXVIII.

**Présidents de la Société :** Discours de M. le marquis de BRÊME, 1844, IV. — *id.*, de M. le colonel GOUREAU, 1845, 5. — *id.*, de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1847, III. — *id.*, de M. REICHE, 1847, IV. — *id.*, de M. GUENÉE, 1849, XI. — *id.*, de M. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, 1857, III. — *id.*, de M. J. BIGOT, 1859, III. — *id.*, de M. le docteur LABOULBÈNE, 1860, IX.

**Présidents honoraires :** Discours de M. LATREILLE à l'ouverture de la première séance de la Société, 1832, 22. — *id.*, Discours de M. A.-M.-C. DUMÉRIL, 1858, CXLII.

**Produits entomologiques :** Détails sur ceux de l'Exposition d'agriculture à Paris, 1860, LVIII.

**Poches aériennes :** Analyse d'un mémoire de M. G. NEWPORT sur leur formation et leur usage, par M. REICHE, 1851, LXXX.

**Pyrèthre (Poudre de) :** Note sur la conservation des collections zoologiques, par M. REICHE, 1858, CLIII. — *id.*, Autre note sur le même sujet, par M. ANDRÉ, de Beaune, 1858, CLV. — *id.*, Observations diverses sur le même sujet, 1858, CLVII. — *id.*, Expériences faites par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1858, CLXXIV. — *id.*, Nouvelles remarques sur les effets de cette poudre, 1860, XXI.

## R.

**RÉAUMUR :** Propositions diverses accueillies à l'unanimité par la Société, 1838, XXI.

**Rectifications grammaticales :** Invasion regrettable de ces rectifications dans les noms de genres déjà formés, 1854, L. — *id.*, Note de M. REICHE, 1858, LXI. — *id.*, Note de M. KIESENWETTER, 1859, LIX. — *id.*, Réponse de M. REICHE, 1859, LX. — *id.*, Note de M. DOHRN, 1859, LXII.

**Règlement de la Société :** 1832, 5. — *id.*, Avis à MM. les membres ; délibération du 6 mars 1832, 1833, XVII. — *id.*, Propositions de M. DUPONCHEL sur le payement des cotisations et l'envoi des Annales, 1838, LXIII. — *id.*, Adoption des propositions de M. DUPONCHEL ;

modification du Règlement à cet égard, 1838, LXIX. — *id.*, Additions au Règlement (art. 52 *bis*, art. 52 *ter*), 1839, LIV. — *id.*, Règlement modifié, 1839. — *id.*, Addition d'un article 12 *bis*, 1840, XXXIV. — *id.*, Article additionnel, 1841, LIX. — *id.*, Modification de l'article 8, sur la proposition de M. REICHE, 1843, LIII. — *id.*, Rapport sur la modification de l'article 28; décision de la Société, 1844, xv. — *id.*, Rapport sur la modification de l'article 36; nouvelle rédaction adoptée, 1844, XXIX. — *id.*, Adoption par la Société de son nouveau Règlement, 1850, XLIII.

**Respiration des Insectes** : Compte rendu par M. LEFEBVRE d'un mémoire de M. DUTROCHET, 1833, x.

## S.

**Sang (Circulation du)** : Mémoire de M. TYRREL sur celle des Insectes, 1835, XLV.

**Sécrétions urinaires chez les Insectes** : M. MILNE-EDWARDS fait part du résultat de ses expériences sur ce sujet, 1833, LXIV.

**Sens des Insectes** : Lecture d'un mémoire de M. LUCZOT et discussion sur l'organisation interne des Invertébrés, 1832, 237.

**Sessions extraordinaires** : Rapport sur celle de Montpellier, 1857, 619. — *id.*, Rapport sur celle tenue à Grenoble, 1858, 819. — *id.*, Rapport sur celle tenue à Clermont-Ferrand, 1859, 647. — *id.*, Rapport sur celle tenue à Hesançon, Pontarlier et Jougne, par M. EMM. MARTIN, 1860, 989.

**Sessions extraordinaires à Paris** : Résolutions prises par la Société, 1859, xxxv. — *id.*, Procès-verbal de celle du 27 avril 1859, 1859, LVII.

**Société entomologique belge** : Elle continue ses travaux préliminaires pour la publication des Insectes de la Belgique, 1858, LVIII.

**Sociétés entomologiques** : Essai pour servir à leur histoire, par M. LAPORTE DE CASTELNAU, 1837, 5.

**Société des Sciences naturelles de Liège** : Communication du résumé de ses travaux, 1835, XLIV.

**Sons** : Notes sur ceux insensibles produits par les Insectes, par M. GOU-  
REAU, 1837, 407.

**Sphæria Roberstia** trouvée sur des Insectes de divers ordres, Note  
par le P. MONTROUZIER, 1859, CXLV.

**Stridulation des Insectes** : Essai sur cette faculté, par M. GOU-  
REAU, 1837, 31, et 1838, 401 et LIV. — *id.*, Observations sur quelques par-  
ticularités de cette stridulation, par M. SOLIER, 1837, 199.

**Synonymie** : Note sur les citations synonymiques, par M. REICHE,  
1858, 311.

**Synonymie générique** : Question importante soumise à la Société  
par M. le marquis de LAFERTÉ-SÉNECTÈRE, 1846, XXII. — *id.*, Décision  
de la Société sur cette question, 1846, XXVI.

## T.

**Tables des Annales** : Décision de la Société à ce sujet, 1860, 1011.

**Thérantome** : Nouvel instrument de M. BLISSON, 1838, XXII. — *id.*,  
Autre, présenté par M. AUBÉ, 1839, X. — *id.*, Nouvel instrument  
inventé par M. AUBÉ, 1840, V. — *id.*, Note de M. GRASLIN sur un  
instrument de son invention, 1837, XXXI.

**Travaux de la Société** : Résumé de ceux de l'année 1832, par  
M. BRULLÉ, 1833, 321. — *id.*, Résumé par M. DESMAREST de ceux de  
1833 à 1843, 1844, 217. — *id.*, Résumé par le même de ceux de  
1844, 1845, 5. — *id.*, Note par M. J. BIGOT sur la direction à donner  
aux travaux de la Société, 1858, LIX.

## V.

**Vitalités des Invertébrés : Exemples cités par M. LEFEBVRE, 1832, 238.**

**VOYAGEURS POUR L'ENTOMOLOGIE :**

BAR. Communication d'une lettre écrite des bords du Maroni, 1856, XXI.

BASSI (le chevalier). M. LEFEBVRE annonce son retour d'un voyage en Sicile, 1833, XLVII.

BATES (H.-W.). Note de M. J. THOMSON sur les espèces recueillies à Santarem et autres lieux, 1857, XLVI.

BLANCHARD. Détails sur ses recherches en Sicile et en Calabre, 1844, LXXIX.

DEYROLLE fils. Nouvelles de son voyage en Portugal, 1839, v.

DURAZZO (le marquis CH. DE). Il est de retour de son voyage aux rives du Tanaro, 1836, L.

GAY, voyageur au Chili. Nouvelles communiquées par M. AUDOUIN, 1835, LXXII. — *id.*, Communication d'une lettre de M. GAY, 1836, XXI. — *id.*, Lettre donnant de ses nouvelles, 1837, LXL. — *id.*, Communication d'une lettre de San-Yago, 1839, II. — *id.*, M. SOLIER vient de recevoir de ses nouvelles, 1839, XXXII.

GOUDOT. Communication d'une lettre de Madagascar du 12 septembre 1832, 1833, XXXVI.

HELPER. Nouvelles détaillées datées de Malacca, 1838, XIX.

LEPRIEUR. Lettre sur les résultats de ses chasses aux environs de Bone, 1855, x.

LORQUIN. Envoi à M. BOISDUVAL de Lépidoptères et Coléoptères de Californie, 1856, XCVIII. — *id.*, Lettre faisant part de ses nouvelles découvertes, 1860, XCVIII.

LUCAS (H.). Détails sur ses excursions aux environs de Milianah, 1850, xxiii. — *id.*, Détails sur les résultats de son voyage en Algérie, 1850, xxxviii.

MILNE-EDWARDS. Observations de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE sur les résultats du voyage en Sicile de M. MILNE-EDWARDS, 1844, lxxvi. — *id.*, Réponse de celui-ci aux observations de M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1844, lxxxviii. — *id.*, Réplique de ce dernier, 1844, lxxix.

PÉRON. Indication des objets qu'il a rapportés des terres australes, Note de M. GIRARD, 1857, cliv.

PIERRET. Il voyage dans les Pyrénées, 1848, xlv.

POEY. M. LEFEBVRE donne de ses nouvelles venant de l'île de Cuba, 1833, iii.

RAMBUR. Il est arrivé récemment d'un voyage en Corse, 1832, 113.

ROUX (POLIDORE). M. AUDOUIN donne de ses nouvelles venant de Thèbes, 1833, ii.

SAHLBERG. Envoi de détails sur son voyage au Brésil, 1851, lxix.

SALLÉ. Extrait d'une lettre à M. CHEVROLAT sur son voyage au Mexique, 1855, lxxxiv.

SAULCY (DE). M. REICHE annonce son retour et parle de ses récoltes, 1856, xlvi.

SAUSSURE (DE). Lettre sur son exploration du Mexique, 1856, xi.

SPINOLA fils. Il est de retour de son voyage aux bords du Tanaro, 1836, l.

VILLA (J.-B.). Il a commencé ses excursions en Sardaigne, 1836, xxxvi.





## XVIII.

### NOMS DES AUTEURS.



#### A.

##### ABICOT.

**Lépidoptères.** La section de la trompe du *Sphinx Atropos* fait cesser le bruit de cet Insecte, 1843, 4.

La chenille de la *Cucullia blattariæ*, var. *caninæ*, se nourrit de *Scrophularia canina*, 1845, XII.

Notice sur les *Anthocharis belia* et *ausonia*, 1846, XVI.

Note sur la chenille de la *Zygæna balcarica*; sa description, 1849, 175.

##### ALESSANDRINI.

**Articles généraux.** Observations anatomiques sur l'absorption des matières ingérées chez les Insectes, 1848, IV.

##### ALLARD (E.).

**Coléoptères.** Diagnoses de quelques *Altises* nouvelles, 1859, c. .

Diagnoses des espèces d'*Alticides* d'Europe et d'Algérie du genre *Graptodera*, 1859, CLXV.

Note rectificative sur diverses espèces d'*Alticides*, 1859, CCXLI.

Quelques détails relatifs au genre *Orcestia*, 1859, CCXLI.

Diagnoses latines de quatre nouvelles espèces d'*Alticides*, 1859, CCLX.

Essai monographique sur les *Galérucites anisopodes*, ou description des *Altises* d'Europe et des bords de la Méditerranée, 1860, 39, 141, 369, 539 et 785.



**AMBLARD.**

**Diptères.** Note sur une galle du *Tamarix brachystylis*, 1856, 169.

**AMBLARD et LABOULBÈNE.**

**Articles généraux.** Communication d'une galle du *Quercus Mirbeckii*, 1853, xxvi.

**AMYOT.**

**Coléoptères.** Communication à la Société d'Agriculture, par M. Robert, de pains de Lapons perforés par des *Anobium*, quoique trempés dans une dissolution de *sublimé corrosif*, 1851, cxv.

Compte rendu des communications faites à la Société centrale d'Agriculture sur les Scolytes des pins, 1851, cxviii.

**Hémiptères.** Question soumise à la Société et résolue négativement : Peut-on prendre le nom d'une espèce pour en faire un nom de genre ? 1842, lxi.

Entomologie française, *Rhynchotes* de France, 1845, 369, 387 ; 1846, 73, 359 ; 1847, 143 et 453.

Observations sur les *Coccus*, 1847, lxxv.

Note à l'occasion du travail de M. Signoret sur les *Eurymèles*, 1850, 513.

**Lépidoptères.** Communication sur les moyens de s'opposer aux ravages de l'Alucite des blés, 1852, vi.

**Diptères.** Note sur la Tipule du froment (*Cecidomyia tritici*), 1851, lvi.  
Note sur la *Tipula tritici*, d'après M. Asa-Fitch, 1855, civ.

**Articles généraux.** Explication du phénomène de l'irisation ; discussion, 1843, xxi.

Détails sur un moyen de détruire les larves d'Insectes qui nuisent à l'agriculture, 1847, xliv.

Lecture de l'extrait d'une brochure de M. Millet sur la géographie entomologique du département de Maine-et-Loire, 1848, lxix.

Réponse à la lettre de M. Westwood sur la méthode mononymique, 1848, lxxi.

Analyse d'un travail de M. le docteur Godron intitulé : *de l'Espèce et des Races*, 1848, lxxxvii.

Note sur les Insectes nuisibles à l'agriculture et à la sylviculture, 1851, xxxvi.

Observations générales sur la nomenclature, 1854, xiv.

Notice biographique sur M. Fischer de Waldheim, 1855, 323.

Notice sur la vie et les travaux de M. Audinet-Serville, 1858, 343.

Mémoire sur la nomenclature entomologique, 1859, 571.

### AMYOT et SICHEL.

**Diptères.** Compte rendu des observations de M. Ch. Bazin sur la *Cecidomyia*, 1856, viii.

### ANDRÉ, de Beaune.

**Coléoptères.** Habitat du *Ptinus Aubei*, 1857, cxi.

**Articles généraux.** Note sur la conservation des collections zoologiques, 1858, clv.

### AUBÉ (Ch.).

**Coléoptères.** Description de deux Coléoptères nouveaux des genres *Ptilium* et *Hister*, 1833, 94.

Note sur la famille des *Psélaphiens*, 1833, 502.

Note sur les premiers états de l'*Agrilus viridis*, 1837, 189.

Essai sur le genre *Monotoma*, 1837, 453.

Observation curieuse au sujet de l'*Eumolpus pretiosus*, 1837, lviii.

Communication de recherches sur la structure des antennes chez les Anthrènes, 1838, lv.

Dégâts causés au bois de Boulogne par les *Hylurgus*, 1838; lvi.

Larves de *Notorus mollis* se nourrissant d'*Anobium*, 1838, lvi.

Moyen appliqué par M. de Waga pour préserver les arbres fruitiers des ravages du *Polydrusus oblongus*, 1839, viii.

L'*Oryctes grypus* ne vit pas aux dépens de l'olivier, 1840, ii.

Nymphe du *Thymalus limbatus* trouvée dans l'aubier pourri du chêne commun, 1841, xix.

Note sur quelques Coléoptères nouveaux, 1842, 225.

Note sur quelques espèces d'Altises confondues sous le nom d'*oleracea*, 1843, 5.

Description de deux Coléoptères nouveaux appartenant à la faune parisienne (*Monotoma punctaticollis* et *Abræus rombophorus*), 1843, 73.

Note sur deux espèces nouvelles de Brachélytres (*Œdichirus unicolor* et *Bledius tristis*), 1843, 89.

Note sur une nouvelle espèce de Coléoptère Tétramère qui devra servir de base à une coupe générique nouvelle (*Philothermus Montandoni*), 1843, 93.

Note sur le genre *Calyptobium*, 1843, 241.

Observation sur la publication de M. de Motschulsky, 1843, xx.

Révision de la famille des *Psélaphiens*, 1844, 73.

Note en réponse à celle de M. Guérin-Méneville sur le genre *Holoparamecus*, 1844, vi.

Identité et antériorité reconnues du genre *Calyptobium* de Curtis, 1844, x.

Le *Plilium apterum* de M. Guérin est un *Trichopteryx* bien et dûment muni d'ailes, 1844, x.

Entozoaire vivant dans le tissu cellulaire graisseux d'un *Hylurgus piniperda*, 1844, xiii.

Note sur l'habitat de certains Insectes Myrmécophiles et indication d'espèces recueillies sous des feuilles mortes, 1844, xxxvii.

Remarques critiques sur les résultats du voyage de M. Blanchard en Sicile, 1844, lxxxvi.

Confirmation de l'observation de M. Lepaige sur l'accouplement des *Campylus linearis* et *mesomelas*; conclusion à en tirer, 1845, xiii.

Description de quelques Insectes Coléoptères appartenant à l'Europe et à l'Algérie, 1850, 299.

Note sur le *Bolboceras mobilicornis*, 1852, 659.

Réflexions sur un mémoire de M. Focillon, 1852, lxxxiii.

Observation sur le *Cephenium Kieschewetteri* pris dans les Pyrénées, 1853, ix.

Quelques observations relatives à la note de M. Schaum sur le *Macropalpus pallipes*, 1853, xxxvi.

Remarques critiques sur le *Tomicus bicolor*, les *Haltica discedens* et *pallida*, et la nourriture de la *Crepidodera cicatrix*, 1859, ccxl.

Communication relative à une excursion entomologique dans le midi de la France, 1860, l.

Observations sur les espèces d'*Alticides* admises par MM. Foudras et Allard, 1860, c.

**Hyménoptères.** Description d'un appareil pour nourrir les Abeilles, 1853, xxii.

**Lépidoptères.** Influence de la nourriture sur la production des sexes chez les Vers à soie, 1844, Lxxxvi.

Éloge d'un mémoire de M. Doyère sur l'Alucite des céréales, 1852, Lxxxiii.

Mémoire sur les moyens d'améliorer les races de Vers à soie, 1854, 367.

Nécessité de mélanger et de croiser les races de Vers à soie pour les améliorer, 1856, vii.

**Diptères.** Observation sur les Mouches atteintes de la muscardine, 1837, Lxxxii.

Observation à l'occasion de la communication de M. le colonel Goureau sur la *Cecidomyia tritici*, 1857, xiv.

Note sur les deux Muscides qui attaquent le froment, 1858, Lxxiv.

**Arachnides.** C'est comme moyen de transport que les *Acarieus* s'attachent à certains Coléoptères, 1845, ix.

Communication sur leurs moyens de transport, 1857, CLviii.

**Articles généraux.** Communication d'un nouvel instrument pour la chasse aux Insectes, 1839, x.

Communication d'un nouveau Thérontôme dont il est l'inventeur, 1840, v.

### AUDINET-SERVILLE.

**Coléoptères.** Nouvelle classification de la famille des *Longicornes*, 1832, 118, 443 ; 1833, 570 ; 1834, 49, et 1835, 16.

Observations sur une lettre de M. Westermann à M. Wiedemann, 1833, 490.

D'après les expériences de M. Solier, tous les *Longicornes* ont cinq articles à tous les tarses, 1833, Lxviii.

Compte rendu de l'ouvrage de M. Vibert sur le Ver blanc, 1836, XLvi.

Revendication de priorité pour le placement du *Mormolyce phyllodes* parmi les *Troncatipennes*, 1837, Lxx et Lxxix.

Observations sur le travail de M. Solier : Des *Collaptérides*, 1838, VII.

Note sur les habitudes de l'*Oberca pupillata*, 1844, L.

Analyse de l'Essai monographique sur les *Clérites* par M. Max. Spinola, 1845, 227.

Quelques faits relatifs à l'accouplement du *Procrustes coriaceus*, 1849, LXXXII.

**Orthoptères.** Réclamation contre la réunion des *Forficula* avec les *Forficesilla*, 1834, VI.

Nouveaux genres d'Orthoptères de la famille des Mantides (*Toxodera denticulata*), 1837, 25.

**Hémiptères.** Rapport sur le mémoire de M. Desjardins, 1837, 263.

Note sur l'*Acridium peregrinum*, à l'occasion du dessin envoyé par M. Vacherot, 1845, CXV.

**Hyménoptères.** Notice sur une nouvelle espèce d'*Aulaque*, 1833, 411.

**Articles généraux.** Il propose de donner à M. Al. Lefebvre une marque de gratitude comme véritable fondateur de la Société, 1836, LXVI.

Note sur une composition pour remplacer le liège dans les boîtes de collections, 1837, LI.

Note nécrologique sur M. Arsène Maille, 1839, 603.

Note sur ses collections, 1844, LVIII.

Notice nécrologique sur M. Lepeletier de Saint-Fargeau, 1846, 193.

### AUDOUIN (V.).

**Coléoptères.** Quelques mots sur le mode de respiration des *Hydrophi-  
liens*, 1832, 111.

Observation sur l'accouplement, la ponte et l'éducation de la *Coccinella bipunctata*, 1832, 232.

Observation sur le mode d'accouplement du *Cebrio gigas*, 1833, LXVI.

Communication de deux coques de terre renfermant des *Copris his-  
panus*, 1833, LXXI.

Observations sur le mémoire de M. Thion relatif aux organes de la manducation chez les *Stènes*, 1835, 166.

Mesures prises contre les ravages du *Pissodes notatus*, 1835, LXXIX.

Calculs trouvés dans les canaux biliaires d'un *Lucanus capreolus*, 1835, LXXXI.

Détails sur l'histoire de la larve qui a fait périr les arbres du bois de Vincennes, 1836, xv et xxx.

Galeries creusées par une larve de Coléoptère dans des tiges de poirier, 1836, LXX.

Résumé du résultat des recherches de l'auteur sur les ravages des Scolytes, 1837, II.

Anomalie d'un *Scarites Pyracmon* trouvé en Sicile par M. Lefebvre, 1833, XLV.

Confirmation de l'observation de M. d'Hombres-Firmas sur les larves de *Dermestes* attaquant les cocons de Ver à soie, 1839, XLVI.

Considérations au sujet du *Sitaris Solieri*, 1839, XLVII.

**Orthoptères.** Nouveau groupe d'Orthoptères de la famille des *Mantides*, 1835, 449.

**Hémiptères.** Observations sur les effets produits par le *Puceron lanigère* sur les pommiers, 1835, ix.

Les *Cochenilles* vues au Muséum par M. Guérin-Méneville y ont été placées par l'auteur, qui fait connaître les essais tentés pour les y élever, 1836, LXVIII.

Considérations sur la *Cochenille* du *Nopal*, 1839, XLVI.

**Névroptères.** Quelques détails sur une empreinte d'aile d'un Névroptère inconnu, 1833, vii.

L'auteur rapporte que M. Léon Dufour s'est assuré que la larve du *Formica leo* était pourvue d'un *anus* auquel aboutit un *canal intestinal*, 1833, LXVII.

**Hyménoptères.** Observations sur les habitudes d'une larve d'*Ichneumon* vivant aux dépens des espèces du genre *Dosithea*, 1834, 417.

**Lépidoptères.** Observations sur les métamorphoses d'une chenille du genre *Dosithea*, 1834, 417.

Dégâts causés dans le Mâconnais par l'*Œnophthya Pilleriana*, 1837, LX.

Particularités curieuses dans la structure de l'*Œnophthya Pilleriana*, 1839, III.

**Diptères.** Ravages des seigles par la larve de la *Musca pumilionis*, 1839, XIII.

**Arachnides.** Observations sur la structure du nid de l'Araignée pionnaire, 1833, 69.

Observations sur le nid d'une Mygale américaine, 1837, L.

**Crustacés.** Observations sur la faculté qu'ont les *Crustacés* de reproduire leurs pattes, 1832, 238.

*Crustacés Branchiopodes* découverts dans les salines des environs de Marseille, 1836, LXI.

Communication de plusieurs Crustacés de la côte d'Afrique et de Russie, 1837, IX.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur Cuvier, 1835, 317.

Discours prononcé aux funérailles de Latreille, 1833, xxv.

Observations sur la muscardine, 1837, LXXXI.

Communication d'un travail sur les effets du froid sur les Insectes, 1838, XXXIX.

## AZAMBRE.

**Coléoptères.** Notes sur quelques Coléoptères recueillis en Italie et en Grèce, 1856, XII et XVII.

Sur les mœurs et métamorphoses de l'*Attagenus undatus*, 1857, XVII.

**Lépidoptères.** Remarque physiologique sur la chenille de la *Catocala fraxini*, 1855, CVIII.

Quelques mots sur la chrysalide de l'*Ophiusa illunaris* et son parasite, 1856, XXIV.

Note sur la géographie de quelques *Lépidoptères*, 1856, XXXIX.

Note sur quelques *Lépidoptères* de montagne, 1858, XII.

**Diptères.** Note sur l'élévation du vol de la *Musca domestica*, 1857, XLII.

**Articles généraux.** Note et observations sur les maladies des feuilles de tilleul, 1855, LXII.

Note sur les métamorphoses des Insectes et sur les côtés utile et philosophique de l'entomologie, 1856, xxxv.

**B.****BAGRIOT.**

**Lépidoptères.** Note sur une ponte de *Bombyx (Lasiocampa) pini* élevée en domesticité à Vaugirard, 1849, 455 et LV.

**BAR.**

**Lépidoptères.** Note sur le genre *Castnia*, 1852, LII.

Détails sur les chenilles observées près de Cayenne, 1854, XIX.

Détails sur les chenilles d'*Erycinides*, 1856, XCIX.

**BARAN (de).**

**Coléoptères.** Fait tendant à prouver que les *Blaps* sont carnassiers, 1857, XL.

**Orthoptères.** Note sur une espèce d'*Orthoptère* observée aux environs de Paris, 1854, XLIV.

**BARTHÉLEMY.**

**Coléoptères.** Observations sur le genre *Plochionus*, 1834, 429.

Deux Cicindèles nouvelles, 1835, 597.

Description d'une nouvelle espèce de *Procrustes*, 1837, 245, et 1838, IV.

**Aptères.** Description du *Ricin de l'Houbara*, 1836, 689.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur Polidore Roux, 1834, XLIV.

**BASSI (le chevalier).**

**Coléoptères.** Note sur le genre *Cardiomeria*, 1834, 319.

Notice sur une monstruosité du *Rhizotrogus castaneus*, 1834, 373.



Description de quelques nouvelles espèces de Coléoptères d'Italie, 1834, 463.

• *Melolontha* ayant trois cuisses à la patte antérieure droite, 1834, iv.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur Géné, 1848, 5.

Observation anatomique sur l'absorption des matières ingérées chez les Insectes, 1848, iv.

### **BAYLE, d'Aigueperse.**

**Coléoptères.** Cas particuliers de monstruosité chez deux Coléoptères, 1851, LXXXII.

### **BEAUVOYS (de).**

**Hyménoptères.** Note sur divers points de l'histoire naturelle des Abeilles, 1847, cxiv.

### **BECKE.**

**Hémiptères.** La *Fulgoria laternaria*, à l'état parfait, ne luit pas dans l'obscurité, 1848, xiv.

### **BECKER.**

**Hyménoptères.** Quelques mots sur un grand *Ichneumon* du genre *Ophion* sorti d'un *Bombyx cecropia*, 1846, xxxvi.

**Lépidoptères.** Quelques détails de mœurs sur la *Lasiocampa otus*, 1845, lvi.

La chrysalide du *Bombyx lanestris* peut vivre plus de sept ans en cet état, et la *Saturnia pyri* reste quelquefois plus de trois ans en chrysalide, 1846, xl.

Moyen de faire pondre les *Lépidoptères* en captivité, 1850, xxxv.

L'année précédente, les chenilles du *Sphinx Atropos* se sont portées sur les feuilles de tabac et en ont détruit un grand nombre, 1854, viii.

Il parle des *Lépidoptères* recueillis par M. Bar sur les bords du Maroni, 1857, xc.

Reçu d'Allemagne plusieurs exemplaires d'un *Agrotis* qui paraît être la *Livia*, 1857, cxxxvii.

**BEHN (W.), de Kiel.**

**Hémiptères.** Observations sur le fluide nutritif découvert par l'auteur dans les pattes de quelques *Hémiptères*, 1835, LV.

**BELLEVOYE.**

**Coléoptères.** Observations sur les mœurs du *Brachytarsus varius*, 1858, CXL.

**BELLIER DE LA CHAVIGNERIE.**

**Coléoptères.** Note sur un *Melolontha vulgaris* monstrueux, 1846, XVIII.  
Note sur les cocons du *Lucanus capreolus*, 1846, XXVIII.

*Silpha* rencontrée aux environs de Paris et dont l'une des élytres est granulée et l'autre entièrement lisse, 1851, xxx.

Tête de *Melolontha vulgaris* présentant un encroûtement de matière cornée, 1852, LXXVIII.

Coléoptères recueillis dans les Pyrénées orientales, 1858, 149.

Coléoptères trouvés aux environs de Larche (Basses-Alpes), 1857, 597, et 1859, 194.

Détails sur les résultats de ses chasses dans l'île de Corse, 1860, Lxx.

Remarque sur quelques Coléoptères de l'île de Corse, 1860, LXXXII.

**Orthoptères.** Orthoptères recueillis dans les Basses-Alpes, 1856, 27, et 1859, 200.

Orthoptères trouvés en 1856 aux environs de Larche par MM. Bellier de la Chavignerie et Berce, 1857, 599.

Orthoptères recueillis en Sicile, 1860, 714.

**Hyménoptères.** Note sur diverses espèces d'*Ichneumons* obtenus de chenilles, 1847, XXIII.

Détails sur un nid fort remarquable de *Pelopæus spirifex*, 1848, XXXII et LXXXII.

*Chalcidites* sortis des œufs du *Bombyx rubi*, 1852, LXXII.

Communication de trois grands *Ichneumons* éclos de chenilles étrangères à la faune parisienne, 1860, LXXXIX.

**Lépidoptères.** Note sur les chenilles de la *Melithæa maturna*, de la *Rhodocera Rhamni* et du *Satyrus Dejanira*, 1846, XII.

- Salurnia carpini* manquant d'aile inférieure gauche, 1846, XXXIV.
- Détails sur la chenille de l'*Abrostola asclepiadis*, 1846, LXIV.
- Variétés remarquables de *Plusia gamma*, 1846, XCVIII et CII.
- Observations à l'occasion du mémoire de M. Paris, de Gray, sur plusieurs espèces considérées comme variétés de régions, 1847, 307.
- Note sur la chenille de *Luperina conspicillaris*, 1847, XXXIV.
- Rapport demandé sur les chenilles qui rongent les feuilles de l'olivier, 1847, LI.
- Chenille et nymphe de *Lycæna bætica* observée aux environs de Chartres, 1847, XCIV.
- Commencement d'hermaphrodisme chez un *Liparis dispar*, 1847, XCVIII.
- Nouvelle note sur l'éclosion du *Lycæna bætica*, 1847, CV.
- Communication d'une chenille de *Deilephila tithymali*, et détails à ce sujet, 1848, XLV.
- Rapport de la commission de l'échenillage, 1848, LXXIV.
- Note sur une anomalie sexuelle, 1849, 173.
- Jolie variété du *Satyrus Janira*, 1849, VII.
- Indication de quelques espèces de l'Auvergne, 1849, LXXI.
- L'*Heterogynis* des environs de Dijon est la *penella* et non la *paradora*. 1850, XIV.
- Notice sur l'éducation d'une chenille de *Numcria Donzellaria*, 1850, XXVI.
- L'*Heterogynis erotica* n'est autre que la *penella* d'Hubner, 1850, LXIV.
- Note sur une variété du *Bombyx castrensis*, 1851, 101.
- Observations sur les *Lépidoptères* de la Lozère, 1851, 681.
- Chenilles de l'*Heliothis peltigera* trouvées aux environs de Paris, 1851, LXXVII.
- Procédé pour empêcher le corps des *Lépidoptères* de se détacher, 1851, LXXVIII.
- Chasse à la miellée, 1851, CIII.
- Note sur un cas d'hermaphrodisme, 1852, 325.
- Détails sur une nouvelle chasse dans la forêt de Compiègne, 1852, XXXVII.

Quelques observations sur les mœurs des chenilles de *Dicranura vinula*, 1852, XLVIII.

Détails sur la chenille de l'*Agrotis corticea*, 1852, XLVII.

Absence absolue des deux ailes gauches chez une *Geometra crataegaria*, 1852, LXIX.

Communication de deux grands *Ichneumonien*s éclos de chenilles du *Bombyx spartii*, 1860, LXXXIX.

Note sur le *Satyrus Lyssa*, 1853, 319.

Cas de monstruosité chez la *Dianthæcia carpophaga*, 1853, xxxix.

Observations sur les Lépidoptères des Basses-Alpes, 1854, 29; 1856, 5; 1857, 587, et 1859, 177.

Quelques mots sur la variété de *Callimorpha dominula* de M. Lucas, 1854, XLIII.

Une même éclosion lui a donné *Vanessa prorsa* et *levana*, 1854, LXXIV.

Communication sur une excursion dans le nord des Alpes de Provence, 1855, LXXXII.

Note sur le *Satyrus nuraq*, 1855, VIII.

Note sur l'*Arge Titea*, 1855, XIII.

Rapport de la Commission pour la conservation de la collection Pierret, 1855, XL.

Lettre à l'occasion de la collection Pierret, 1855, LXV.

Description d'une *Geometra* nouvelle, 1856, 23.

Communication de la *Cucullia scopariæ* récemment découverte en Autriche, 1856, XXIV.

Variété de la *Chelonia villica*, 1856, LIII.

Variété de *Melitæa Cinxia*, 1856, LXIV.

Note sur les éclosions tardives, 1856, LXVIII.

Détails au sujet de la *Cleogene illibaria*, 1856, XLVIII.

Éclosion tardive du *Papilio Alexanor*, 1856, LXXXII, et 1857, c.

Quelques mots sur la *Diasemia litteralis*, 1856, xc.

Chenilles et chrysalides de *Gortina flavago* dans les tiges du *Cirsium palustre*, 1856, xci.

Observation sur quelques Lépidoptères d'Islande, 1857, 5.

Description d'une *Noctuelle* nouvelle du genre *Cleophana*, 1857, 13.

Détails sur la *Lithosia lacteola*, 1857, xxv.

Communication de plusieurs chenilles du genre *Bryophila*, 1857, LXXIV.

Détails sur une excursion dans les Pyrénées orientales, 1857, xcix.

Notice sur l'*Erebia Arete*, 1858, 485.

Description et figure de la chenille du *Sphinx tithymali*, 1858, 488.

Descriptions de variétés de Lépidoptères, 1858, 703.

Note sur une hybride de *Dicranura Erminca* avec *vinula*, 1858, XXIX.

Communication de deux Noctuelles, *Anarta Zetterstedti* et *Simyra Büssneri*, 1858, XLI.

Note sur deux individus mâles du *Bombyx quercus*, 1858, LXXXI et CLXXXIII.

Réponse aux observations de M. Bruand sur les *Psychides*, 1858, c.

Diagnose de l'*Agrotis celsicola*, 1858, CCLIII.

Note sur l'*Acidalia pallidata*, 1859, 111.

Description de l'*Agrotis occidentalis*, 1860, 665.

Observations sur la faune entomologique de la Sicile, 1860, 667.

Catalogue des Lépidoptères observés en Sicile, 1860, 705.

Communication de plusieurs exemplaires de la *Pieris Kruperi*, 1860, XX.

Remarques sur les Lépidoptères recueillis en Corse, 1860, XLII.

Papillons sortis des gros cocons de *Saturnia carpini*, 1860, LXXXIII.

Communication du produit de l'accouplement des *Bombyx pyri* et *spini*, 1860, XCIV.

**Diptères.** Communication sur les larves qui habitent les galles du hêtre, 1857, CXVI.

**Articles généraux.** Rapport en réponse à la demande de M. Guérin-Méneville sur la *Muscardine*, 1847, LXV.

Discours comme président de la Société, 1857, III.

Vœu tendant à la réunion de matériaux pour de bonnes faunes locales, 1858, LXI.

Détails sur les chasses de l'auteur dans l'île de Corse, 1860, LXX.

**BERCE.**

**Lépidoptères.** Coque remarquable de *Saturnia carpini*, 1847, CXII.

Variété remarquable de *Melitæa Parthenia*, 1850, XLV.

Chenille de *Cidaria variaria* trouvée aux environs de Paris, 1856, LXVII.

Réponse aux notes de M. Bruand sur les chenilles de *Cidaria variaria*, de l'*Erastria venustula* et sur la *Polia nigrocincta*, 1857, XXIII.

Chenille de *Zerene pentaria* non encore décrite ni figurée en France, 1858, CXVII.

**Diptères.** Note sur les galles du hêtre, 1858, xci.

**BIGOT (Jacques).**

**Coléoptères.** Espèces récoltées dans les Pyrénées orientales, 1856, LXXXI.

**Diptères.** Note sur les différences sexuelles que présente la *Volucella bombylans*, 1845, LXIV.

Essai d'une classification méthodique et synoptique de l'ordre des *Diptères*, 1852, 471 et LXXXII; 1853, 295 et LXII; 1854, 447; 1856, 51 et xc; 1857, 517 et CLII; 1858, 569.

Diptères nouveaux provenant du Chili, 1857, 277.

Quelques remarques sur les critiques du docteur Gerstaecker, 1858, 597.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Helcromyza*, 1858, CCXLIX.

Diptères de Madagascar, 1859, 115, 415 et 533.

Diptères exotiques nouveaux, 1860, 219.

Diptères de Sicile : description de nouvelles espèces, 1860, 765.

Notice sur deux espèces du genre *Elaphomyia*, 1860, xxix.

Note en réponse à une critique de M. Schaum, 1860, xxxv.

Diptères contenus dans un morceau de succin, 1860, cix.

**Articles généraux.** Note nécrologique sur Robineau-Desvoidy, 1857, CXXXII.

Note sur la direction à donner aux travaux de la Société, 1858, LVIII.  
 Quelques mots comme Président de la Société, 1859, III.

### BLANCHARD (Émile).

**Coléoptères.** Notice sur un Insecte de la famille des *Longicornes* (*Purpuricenys Loreyi*), 1842, 49.

Remarque sur les métamorphoses observées chez les *Buprestides*, 1843, 221.

Résultats d'un voyage en Sicile, 1844, LXXIX.

Communication de quelques *Eumolpides* recueillis en Sicile, 1845, IV.

La *Dorcus striatus* diffère du *Lucanus striatus* Fabr., 1845, V.

Caractères à tirer de la lèvre inférieure des Insectes pour leur classification, 1845, XXXIX.

Proposition de rapprocher le groupe des *Buprestides* de celui des *Longicornes*, 1845, CXVI.

**Orthoptères.** Monographie du genre *Ommexca*, 1836, 603.

Monographie du genre *Phoraspis*, de la famille des *Blattiens*, 1837, 271.

**Hyménoptères.** Observations sur le *Masaris vespiformis*, 1853, VI.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur A.-G. Desmarest, membre honoraire, 1838, XLII.

### BLANCHARD (le major).

**Coléoptères.** Coléoptères rencontrés à Fouras (Charente-Inférieure), 1853, III.

### BLISSON.

**Coléoptères.** Description des larves du *Stenoderus ferrugineus*, de l'*Agrypnus varius* et du *Silpha opaca*, 1846, 65.

Description de la larve et de la nymphe du *Silvanus 6-dentatus*, 1847, 163.

Description de la larve et de la nymphe de la *Nebria brevicollis*, 1848, 73.

Note pour servir à compléter l'histoire des mœurs et des métamorphoses de la *Cicindela campestris*, 1848, 155.

Description de la larve et de la nymphe du *Cryptophagus hirtus*, 1849, 315.

**Névroptères.** Mémoire sur la préparation des *Æshnes* et des *Libellules*, 1840, 413, et 1844, XLV.

**Lépidoptères.** Analyse d'une brochure sur une méthode propre à faciliter la recherche et l'étude des larves de *Lépidoptères*, 1840, IX.

Mémoire sur les mœurs des chenilles des *Sésies*, 1846, 207.

Observations sur les mœurs de la *Scsia cynipsiformis*, 1849, XXXV.

**Articles généraux.** *Thérentome* : instrument pour faire périr et conserver les Insectes, 1838, XXII.

Appareil pour faire périr et conserver les Insectes, 1847, 315.

### BOIELDIEU.

**Coléoptères.** *Pterostichus externe-punctatus* présentant un renflement à l'extrémité de l'antenne gauche, 1852, LXX.

Liste de toutes les espèces et diagnoses latines des espèces nouvelles composant la monographie des *Pliniores*, 1854, LXVII.

Monographie de la famille des *Pliniores*, 1856, 285, 487 et 629.

Description d'espèces nouvelles de Coléoptères, 1859, 463.

### BOISDUVAL.

**Coléoptères.** Observation sur le *Carabus* monstrueux communiqué par M. Pierret, 1846, LXXXV.

Remarque au sujet de la communication de M. Fairmaire sur la variété de *Cicindela trisignata*, dont celui-ci avait déjà parlé, 1846, CVI.

Détails sur les mœurs de *Rhynchites conicus*, 1859, XCVI.

**Lépidoptères.** Observations sur un mémoire de M. Zinken-Sommer sur les Insectes de Java, 1832, 416.

Critique du fait d'accouplement rapporté par M. de Villiers, 1832, 426.

Anomalie du genre *Urania*, 1833, 248.

Description de quatre nouvelles espèces de *Noctuides*, 1833, 374.



- Cas de monstruosité et d'hermaphrodisme : une *Lithosia* étant d'un côté *aurita* ♂ et de l'autre *ramosa* ♀, 1834, v.
- Observation curieuse au sujet de deux chenilles de l'*Urania pygmaea*, 1834, xxix.
- Nouveau caractère spécifique dans quelques espèces du genre *Colias*, 1836, x.
- Rapport sur le dessin de l'empreinte de Lépidoptère fossile envoyé par M. de Fonscolombe, 1839, xi.
- Rapport sur une empreinte de Lépidoptère trouvée dans les marnes des environs d'Aix en Provence, 1840, 371.
- Observation intéressante sur la *Noctua communi-macula* qui la réunirait au genre *Limacodes*, 1844, lxx.
- Identité de l'*Anthocharis Ausonia* avec *Belia*, et de *Belcminia* avec *Glaucis*, 1845, xxxvi.
- Observations relatives aux *Psyches*, 1844, lxvi.
- Observations sur la longue végétation qu'on remarque sur les chenilles communiquées par M. Doué, 1846, xciii.
- Quelques détails sur les Lépidoptères recueillis par M. Kindermann dans les environs d'Odessa et au pied du Caucase, 1848, xxviii.
- Communication d'un mémoire de M. Malapert sur les mœurs du *Bombyx castrensis*, 1851, xc.
- Quelques mots de réplique aux observations de M. Lefebvre sur l'empreinte de Lépidoptère fossile envoyée par M. de Fonscolombe, 1851, xcvi.
- Lépidoptères de la Californie, 1852, 284.
- Note sur trois nouvelles espèces de *Psyches* découvertes en France, 1852, xxii.
- Lépidoptères rencontrés à Compiègne, 1852, xxxiii.
- La note de MM. Bar justifie le système de l'auteur pour la classification des *Castniaires*, 1852, liv.
- MM. Bar ont découvert à Cayenne des chenilles de la famille des *Erycinides*, 1852, lxvi.
- Monstruosité observée dans un *Zygana occitanica*, 1853, lxviii.
- Quelques mots sur deux *Bombyx* de l'Inde produisant de la soie, 1854, 755.

Lecture d'une notice sur le *Bombyx Cynthia*, 1854, LXIX.

Note sur quelques chenilles de *Sphinx* observées dans les jardins de Paris, 1856, LXXXVII.

La chenille de l'*Erastria venustula* vit sur la fougère, 1857, XXIV.

Communication d'une variété de *Melithæa Artemis* présentant un cas remarquable d'albinisme, 1857, CXXX.

Communication de Lépidoptères de la Sibérie orientale donnés par M. Ménétriés; notice à ce sujet, 1860, LV.

**Articles généraux.** Observations sur la Muscardine, 1837, LXXXII.

Notice nécrologique sur le comte Dejean, 1845, 499.

Discours comme président du Congrès de Grenoble, 1858, CXXVIII.

### BONAFOUS.

**Hémiptères.** Description d'une nouvelle espèce de Pucerons, 1835, 657.

### BONVOULOIR (vicomte de).

**Coléoptères.** Description de plusieurs espèces nouvelles de la famille des *Throscides*, 1860, 351.

### BOTTIN-DESYLLES.

**Lépidoptères.** Notice sur la chenille de l'*Urapterix sambucata* et sur la manière dont elle construit sa coque, 1837, 401.

### BOUDIER.

**Coléoptères.** Communication de deux *Brius mercurialis*, desquels, vivants et piqués, sont sortis des larves de *Braconides*, 1833, LXXIII

Description du genre *Psammæchus*, 1834, 367.

**Hyménoptères.** Observations sur divers Parasites, 1834, 327.

Observations sur les habitudes de larves d'Ichneumons vivant aux dépens de la chenille du *Bombyx* du chêne, 1836, 357.

**BOULARD (Désiré).**

**Coléoptères.** Observations faites aux environs de Paris sur le *Platycerus caraboides*, 1839, XXII.

Note sur un *Melolontha vulgaris* monstrueux, 1846, XLVIII.

Exemple de longévité chez un *Blaps obtusa*, 1854, VII.

**BOURDIN (l'abbé).**

**Coléoptères.** Lettre à M. Jules Cordier sur les ravages causés aux colzas par l'Altise, 1845, xv.

**BOURLET (l'abbé).**

**Aptères.** Lecture d'un mémoire et observations sur les *Podurides* et les *Sminthurides*, 1841, XL.

Lecture d'un mémoire contenant la description de 14 espèces de *Podurides*, 1841, LVII.

Observations sur une notice publiée sur la famille des *Podurellus*, dans la *Bibliothèque universelle* de Genève, 1842, 45.

**BOYER DE FONSCOLOMBE.**

**Coléoptères.** Deuxième mémoire sur les Insectes qui attaquent l'olivier, 1840, 101.

**Hémiptères.** Description des *Kermès* qu'on trouve aux environs d'Aix, 1834, 201.

Description des *Puccerons* qui se trouvent aux environs d'Aix, 1841, 157.

**Névroptères.** Monographie des *Libellulines* des environs d'Aix, 1837, 129, et 1838, 75.

Note sur deux espèces de Névroptères trouvées aux environs d'Aix, 1846, 48.

**Hyménoptères.** Notice sur les genres *Lithurgus* et *Phyllocera*, 1834, 219.

Description du *Ceramius Fonscolombii*, 1835, 421.

Quelques observations sur l'*Anthophora parietana*, 1838, LI, et 1845, xv.

Notice sur six espèces nouvelles d'Hyménoptères trouvées aux environs d'Aix, 1846, 39 et LXIX.

Ichneumonologie provençale, 1847, 51, 397; 1849, 211; 1850, 361; 1851, 103; 1852, 29, 427 et XL.

**Lépidoptères.** Description de la *Psyche febratta*, nouvelle espèce de Bombycites, 1835, 107.

Notice sur deux *Teignes* qui attaquent l'olivier, 1837, 179, et 1851, XVII.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Teigne*, 1840, 61.

Description de la chenille de la *Tortrix compressana*, 1840, 62.

Quelques détails de mœurs relatifs à deux espèces de Bombycites, 1844, LX.

Note sur le *Papilio Feisthamelii*, 1849, XLVIII.

Note sur l'identité de l'*Elachista olivella* avec l'*Œcophora olivella*, 1851, XVII.

## BRANDT.

**Orthoptères.** Mémoire pour servir à l'histoire des *Blattes* antédiluviennes, 1836, 539.

**Myriapodes.** Nouvelle classification des Myriapodes, 1837, LXVI.

## BRÈME (marquis de).

**Coléoptères.** Insectes Coléoptères nouveaux ou peu connus, 1844, 287.

**Diptères.** Note sur le genre *Ceratitis* de Mac-Leay, 1842, 183.

**Articles généraux.** Allocution comme Président de la Société, 1844, III.

Discours à l'occasion de l'installation de la Société à l'Hôtel-de-Ville, 1844, 213.

Don de ses collections au Muséum de Turin, 1850, XIX.

**BREMI, de Zurich.**

**Articles généraux.** Collection de feuilles desséchées préparées pour étudier les travaux des larves mineuses, 1850, v.

**BRISOUT DE BARNEVILLE (Charles).**

**Coléoptères.** Diagnoses de plusieurs espèces nouvelles d'*Homalota*, 1859, CCXVIII.

Description de quelques espèces nouvelles de Coléoptères français, 1859, CCXXXI.

Description de quelques Coléoptères nouveaux propres à la faune française, 1860, 339.

**BRISOUT DE BARNEVILLE (Henri) et GOUGELET.**

**Coléoptères.** Description de Coléoptères nouveaux de Galice et d'Algérie, 1859, CCXXXVII.

Description de nouvelles espèces de Coléoptères et synonymies de quelques *Ceutorhynchus*, 1860, 335.

**BRISOUT DE BARNEVILLE (Louis).**

**Orthoptères.** Note relative à l'*Acridium smilacum*, 1847, LXXVI, et 1848, XXXVIII.

Catalogue des Acrididés qui se trouvent aux environs de Paris, 1848, 411; 1849, LXXIX; 1851, XC.

Notice contenant des détails sur les *Blattes*, 1848, XIX, et 1849, XXX.

Note sur le *Tetrix Harpagon*, 1848, XXXIV.

*Forficula auricularia* placée dans un local avec une *Blatte* qu'elle a dévorée, 1848, XLII.

Description d'une nouvelle espèce d'*Acridium* (*brevipenne*), 1848, LXXXIII.

Catalogue des Orthoptères recueillis aux environs d'Agen, 1849, VIII.

Nouvelle note sur la variation du nombre des articles des tarses chez les *Blattes*, 1849, XXX.

Notice sur les métamorphoses des Orthoptères sauteurs, 1849, XLIII.  
Description d'une nouvelle espèce de *Sauterelle* trouvée aux environs de Paris, 1849, LXXX.

Note sur la classification parallélique des Orthoptères, 1850, 59.

Diagnose et description d'une nouvelle espèce d'*Acridium (amarum)*, 1850, LVI.

Diagnoses de trois Orthoptères nouveaux, 1850, LXIII.

Communication de plusieurs Orthoptères trouvées en Algérie, 1851, XLVIII.

Communication et description d'un *Acridium* nouveau qui habite le Gabon, 1851, LXVIII.

Rectification de l'habitat de la *Phylloptera marginella*, 1851, LXVIII.

Rectification synonymique de la *Locusta lineata*, qui est la *L. mandibularis* de Touss.-Charpentier, 1851, LXXVI.

Communication de plusieurs Orthoptères de la France méridionale, 1851, LXXXV.

Communication de plusieurs Orthoptères habitant la France, 1851, XCIII.

L'auteur a reconnu 111 Orthoptères en France, 1851, cxx.

Description de deux Orthoptères nouveaux, 1852, LXVII.

Communication de plusieurs Orthoptères intéressants des environs de Paris, 1853, LIII.

Communication et description de deux espèces nouvelles du genre *Eremiaphila*, 1854, LXX.

Communication et description de l'*Acridium syriacum*, 1854, LXXIII.

Réponse à la note de M. Lucas sur l'*Eremiaphila barbara*, 1855, xi et xv.

Communication de l'*Acridium petræum* pris à Lardy ; quelques détails, 1855, CXIV.

Note sur les espèces rapportées des Basses-Alpes par M. Bellier de la Chavignerie, 1856, 27.

Catalogue des Orthoptères des environs de Larche récoltés par MM. Berce et Bellier de la Chavignerie, 1857, 599.

Liste des Orthoptères de Sicile recueillis par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 714.

**BRONGNIARD (Alexandre).**

**Hyménoptères.** Communication d'une branche de saule présentant des altérations considérables causées par des piqûres d'Insectes, 1845, LII.

**BRUAND D'UZELLE.**

**Hyménoptères.** Détails sur les *Ichneumons* qui vivent aux dépens de la chenille du *Deilephila celerio*, 1847, LIV.

**Lépidoptères.** Description de la chenille de l'*Eriopus pteridis*, 1842, 37.  
Description de la chenille de *Gnophos variegata*, 1843, 349.  
Manière de débarrasser les chenilles des œufs d'Ichneumons, 1843, XXXVIII.

Notice sur diverses chenilles, 1844, 187.

Note sur l'accouplement de *Satyrus janira* ♂ avec *Vanessa urtica* ♀. 1844, VI.

Description de Lépidoptères nouveaux, 1846, 201.

Description de la *Nephopteryx angustella*, 1847, 289.

Note sur les *Deilephila celerio* et *nerii* et sur leurs parasites. 1847, LIV.

Notes sur divers Lépidoptères, 1849, 39.

Deux mots de réponse à M. Guenée à propos des *Noctuelles Batis* et *Derasa*. 1851, 89, et 1852, XXXIX.

Observations sur la classification adoptée par MM. Herrich-Schæffer et Delaharpe, 1852, 51.

Deux mots à propos de la notice de M. Nylander sur la *Psyche helix*. 1854, LX.

Note sur la vitalité des organes génitaux chez quelques Lépidoptères après la mort de l'Insecte, 1854, LXI.

Note sur deux Lépidoptères nouveaux, 1855, LIX.

Note sur l'habitat et les mœurs de l'*Erastria renustula*, 1857, XXI.

Classification et examen des caractères des *Tinécides* et de leur importance relative, 1857, 807, et 1858, 601.

Note sur les époques de l'apparition de la *Cidaria variata*, 1857, XXII.

Note sur l'habitat et les mœurs de la *Polia nigrocincta*, 1857, xxiii.  
Communication de la *Psyche longuliformella* dont le genre est incertain, 1857, lxxv.

Note sur les Lépidoptères recueillis près de la Grande-Chartreuse, 1857, cvi.

Note sur les Microlépidoptères envoyés de Montpellier par M. Daube, 1857, clxiii.

Note sur une Tinéide constituant un genre nouveau (genre *Patula*), 1858, 177.

Observations sur divers Lépidoptères et description d'espèces nouvelles, 1858, 461.

Note sur l'*Hypsolopha congressariella* prise dans une grotte à Parizet, 1858, 471.

Description de la *Larentia Millierata*, 1858, 473.

Description de l'*Eubolia larentiaria*, 1858, 475.

Observations entomologiques, 1858, 477.

Quelques remarques relatives à divers Lépidoptères, 1858, xvii.

Proposition de s'occuper de l'examen des genres *Eupithecia* et *Hesperia* pour le Congrès de Paris, 1858, lxxv.

Communication relative à divers Lépidoptères, 1858, cxv.

Observations sur la notice de M. Bellier de la Chavignerie sur les Lépidoptères des Pyrénées orientales, 1858, xcvi.

Note au sujet de la réponse de M. Bellier de la Chavignerie, 1858, xcvi.

Essai monographique sur le genre *Colcophora*, 1859, 375.

Microlépidoptères recueillis aux environs d'Hyères, 1860, xiv.

Note sur une espèce de *Sericoris*. 1860, xlii.

**Articles généraux.** Proposition à l'occasion du Congrès entomologique, 1857, cxxii.

### **BRULLÉ (Auguste).**

**Coléoptères.** Examen des genres *Brachinus* et *Ditomis* de la tribu des Carabiques, 1835, 621.

Observation extraite de l'Horticulteur belge sur l'*Altica napi*, 1835, viii.



Le genre *Leptosopus* a été publié par M. Audouin sous le nom de *Psilocera*, 1835, XI.

Différence entre les deux sexes chez les Anthrènes, 1837, LXXX.

Nouvelle remarque au sujet des tarses chez les Lamellicornes Coprophages, 1838, XVIII et XIX.

**Névroptères.** Note sur une nouvelle disposition de l'ordre des Névroptères, 1832, 239.

Observations sur la bouche des Libellulines, 1833, 343.

**Hyménoptères.** Sur les transformations du *Gladius difformis* de la famille des *Tenthredines*, 1832, 308.

Mémoire sur un Hyménoptère parasite et voisin du genre *Alyson*, 1833, 403.

**Diptères.** Mémoire sur un nouveau genre (*Xyphura*) de *Diptères* de la famille des *Tipulaires*, 1832, 205.

Notice sur le genre *Xyphura* formé aux dépens de celui de *Stenophora* de Meigen, 1833, 398.

**Articles généraux.** Résumé des travaux de la Société pendant l'année 1832, 1833, 321.

Bulletin des séances de la Société depuis et y compris le 16 novembre 1836 jusqu'au 15 avril 1840, fin des volumes de 1836 à 1840.

## BRILLÉ et le comte LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU.

**Hyménoptères.** Monographie du genre *Crabro* de la famille des Hyménoptères fouisseurs, 1834, 683.

## BUGNON, de Lausanne.

**Lépidoptères.** Description de quatre nouvelles espèces de Lépidoptères de la Syrie et de l'Égypte, 1837, 439 et LXII.

Note sur les *Deilephila critica* et *Boisduvalii*, 1839, 413.

**BUQUET (Lucien).**

**Coléoptères.** Description de deux Insectes nouveaux du genre *Oodes*, 1834, 473.

Description de onze espèces nouvelles du genre *Lebia*, rapportées de Cayenne par M. Leprieur, 1834, 674.

Description d'un Coléoptère nouveau du genre *Goliathus*, 1835, 135.

Description de quelques Coléoptères nouveaux de la famille des Carabiques, 1835, 605.

Description de quelques nouvelles espèces de Lamellicornes, 1836, 201.

Rectification de l'habitat de l'*Ectigonia Buqueti*, 1837, LVIII.

Description d'une nouvelle espèce de *Lucanides*, 1840, 375.

Notice sur le genre *Anacolus* et description de trois nouvelles espèces, 1840, 379.

Notice sur un nouveau genre de *Longicornes* de la famille des *Cerambycins* (genre *Pteroplatus*) et description de plusieurs espèces qui s'y rattachent, 1840, 385.

Description de plusieurs Coléoptères nouveaux, 1840, 314, et 1841, XXII.

Liste des Coléoptères qui se trouvent à la fois en France, en Algérie, en Espagne, en Sicile et en Sardaigne, 1840, 396.

Communication d'un *Buprestide* monstrueux, 1840, XXVII.

Description abrégée de l'*Ergates Huberti*, 1840, XXVIII.

Le *Diccroderes* de Solier doit être rapporté au *Prosomenes mexicanus* Dej., 1840, XXIX.

Communication d'un *Longicorne* nouveau et monstrueux de Colombie, 1840, XXIX.

Description de plusieurs *Longicornes* appartenant au genre *Pteroplatus*, 1841, 151.

Observations relatives à un Longicorne décrit et figuré par M. Duponchel sous le nom de *Purpuricenys Loreyi*, 1841, 325.

Communication et description du *Pholidotus Dejeanii*, 1841, XXI.

Description de la *Solenoptera Taslei*, 1841, XXXIX.

## TABLES DES ANNALES.

- Description d'une nouvelle espèce de *Prionien* du genre *Derobrachus*, 1842, 203.
- Description d'une nouvelle espèce de *Lucanides* appartenant au genre *Dorcus* de Meg., 1842, 283.
- Note sur l'identité de *Dinutes Jupiter* avec *Scarabæus Jupiter*, et de l'*Hexaphyllum æquinoctiale* avec l'*Hex. Westwoodii*, 1842, iv.
- Notice sur une monstruosité observée dans l'antenne droite d'un *Julodis Clouci*, 1843, 97.
- Note monographique sur le genre *Ctenoscelis* de la tribu des *Prioniens*, 1843, 231.
- Description du *Dorcus Luxerii*, 1843, LI.
- Confirmation par la femelle de l'établissement du genre *Heteropalpus*, 1845, XI.
- Compte rendu du premier volume de l'ouvrage de M. Boheman (*Monographia Cassidarum*), 1851, LXXIII.
- Note monographique sur le genre *Trachysomus* de la tribu des *Lamiaires*, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de *Criodion*, 1852, 349.
- Description d'une nouvelle espèce de *Longicornes* du genre *Chlorida* Serv., 1852, 655.
- Description d'une nouvelle espèce de *Prioniens* du genre *Derobrachus* Dej., Serv., 1852, 657.
- Note sur les espèces recueillies par M. Lorquin en Californie, 1852, xx.
- Description d'un *Longicorne* nouveau de la tribu des *Prioniens* (*Ancistrotus uncinatus*), 1852, xc; 1853, 41 et xxiv.
- Description de deux espèces nouvelles de *Longicornes* du genre *Polyraphis* Serv., 1853, 443.
- Communication d'une magnifique espèce de *Polybothris* trouvée à Madagascar, 1853, xxxv.
- Analyse abrégée du premier volume du *Genera* de M. Lacordaire, 1854, ix.
- Description d'une nouvelle espèce de *Lamiaires* du genre *Sternotomis*, 1855, 77.
- Mémoire sur deux genres nouveaux de Coléoptères de la famille des *Longicornes* (*Oxilus* et *Stethenus*), suivi de la description de plusieurs espèces, 1859, 619.

Le *Trachysomus Elephas* doit être rapporté au *Cerambyx verrucosus* d'Oliv. et s'appeler *Trachysomus verrucosus*, 1859, CLXXXV.

Description de quelques Longicornes nouveaux, 1860, 617.

La décortication des arbres n'est pas un préservatif contre les attaques des Insectes (*Scolytes*), 1860, LI.

**Articles généraux.** Paroles prononcées sur la tombe du général Feisthamel, 1851, ix.

Notice nécrologique sur M. Blutel, 1858, 905.

La benzine produit les mêmes effets que le sulfure de carbone et n'altère pas les couleurs des Insectes, 1859, CCXLIX.

### **BUREAU (Édouard).**

**Lépidoptères.** Aberration remarquable offerte par un *Polyommatus Chryseis*, 1833, xxxix.

Persistance de la vie dans l'appareil de la génération, 1834, xxii.

Sur la chasse des Noctuelles, dite *chasse à la miellée*, 1855, 215.

Réunion dans des localités différentes du *Botys hybridalis* et de la *Plusia gamma*, 1855, xvi.

Procédé pour féconder artificiellement les œufs de *Saturnia Pernyi*, 1855, LX.

•

### **BURMESTER.**

**Coléoptères.** Extrait d'Observations sur les affinités naturelles de la famille des *Paussidae*, 1841, xxxi.

## **C.**

### **CAILLETTE D'HERVILLIERS.**

**Articles généraux.** Reflexions sur l'utilité de l'entomologie, 1845, xcviii.

**CARLIER.**

**Diptères.** Description de l'*Anglicaria antennata*, Diptère trouvé à Liège. 1835, 659.

**CARRENO.**

**Hémiptères.** Description d'un nouveau genre de l'ordre des *Hémiptères* (*Odontoptera*), 1841, 275.

**Lépidoptères.** Réponse aux observations de M. Rambur, 1841. xviii.

**Articles généraux.** Notice sur un Insecte dont l'ordre est incertain. 1841, 205.

**CHAUDOIR (baron de).**

**Coléoptères.** Descriptions de quelques genres et espèces de *Carabiques* nouveaux, 1835, 429.

Monographie du genre *Colpodes*. 1859, 287.

**CHAVANNE (A.).**

**Hémiptères.** Note sur deux *Cicadas* nouveaux du Brésil. 1848, 139.

**CHEVROLAT Aug..**

**Coléoptères.** Monographie des *Carabiques* nouveaux du Brésil. 1848, 139.

**Mémoires.** De la *Carabique* nouvelle du Brésil. 1848, 139.

**Testament.** De la *Carabique* nouvelle du Brésil. 1848, 139.

**Notes.** De la *Carabique* nouvelle du Brésil. 1848, 139.

Mémoire sur quelques chasses entomologiques à Fontainebleau, 1833, 466.

Des *Chrysomèles* exotiques et des *Erotylus* ont cinq articles aux larses, 1834, III.

*Lucanus parallelipipedus* trouvé dévorant un *Helops caraboides*, 1834, XI.

L'auteur fait observer qu'il vient de publier le *Scarabæus Hector* de M. Gory sous le nom de *Scarabæus anubis*, 1836, xx.

Habitudes herbivores de l'*Amara trivialis*; discussion à ce sujet, 1837, LIV.

L'*Enoplium dulce* et le *Tillus ruficollis* se rapportent au *Tillus Weberi* de Fabr., 1837, LIV.

Description de 24 nouvelles espèces de *Térédiles*, 1843, 31.

La *Leptura rubra* se trouve à la fois en Espagne et en Bretagne, 1843, XLIV.

Larves de *Clythrines* (le texte dit *Chrysomélides* porte-fourreaux) vivant de substances ligneuses, 1845, XLIX.

Lecture d'une note sur les résultats d'une chasse entomologique à Fontainebleau, 1846, LXXIV.

Observations sur le *Cyrtinus Dufouri*, 1847, CIV.

L'*Hoplia* trouvée à Fontainebleau par M. Berce n'est pas la *squamosa*, mais la *pulverulenta*, 1850, LXVI.

Le *Purpuricenus barbarus* Lucas doit être rapporté à l'*affinis*, 1850, LXVI.

Note sur les *Longicornes* de la collection de Banks rapportés aux genres actuels, 1851, 657.

Reçu l'*Aræscus caudatus*, qui est le mâle, et le *4-maculatus*, qui est la femelle de la même espèce (*Hispa cornuta* Ol.), 1851, XXI.

Rencontré à Saint-Germain une vingtaine de *Bradybatus Creutzeri*; leur mode d'accouplement, 1851, L.

Coléoptères trouvés dans de l'orge avariée, 1851, LXXXVII.

La *Rhina* rapportée de Saint-Domingue par M. Sallé est la *scrutator* d'Oliv.; la *Rhina scrutator* de Cuba est bien distincte et nouvelle, 1851, LXXXVII.

Remarques sur les ravages des *Scolytes*, 1851, CXIX.

Rappel aux genres actuels des Coléoptères décrits par Palissot de Beauvois, 1852, 629.

Nouveau genre de *Carabiques* (*Agrius*), 1854, 665.

*Plinus muscorum* trouvé dans une coquille d'*Helix*, 1855, cx.

Belle espèce de *Callidium* découverte à Auteuil, 1855, cxl.

Note sur la synonymie de quelques Coléoptères exotiques, 1856, cv.

Rectification sur l'*Erirhinus filirostris*, 1857, xxx.

Réponse à la note de M. J. Thomson sur la synonymie de certains Coléoptères et spécialement de la *Cicindela lutco-signata*, 1857, XLVII.

Description de nouvelles espèces de Coléoptères, 1858, 315.

Note synonymique sur divers Coléoptères, 1859, v.

Description de deux nouvelles espèces de Curculionites propres à la faune française (genre *Ceutorhynchus*), 1859, xviii.

Quelques détails sur les mœurs de divers Coléoptères, 1859, cxxx.

Note rectificative sur le genre *Mesus*, 1859, cxxx.

Note monographique sur le genre *Prinobius*, 1859, cxxxiv et cc xxvii.

Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique, 1860, 451.

Description d'espèces nouvelles de *Curculionites* d'Europe, 1860, 505.

Nouvelle note sur l'habitat de l'*Apion Germari* et de la *Crepidodera cicatrix*, 1860, lxxiii.

Communication de deux *Laccobius globosus* et d'un *Dinutus* voisin du *grandis*, présentant des particularités intéressantes, 1860, lxxxvi.

Remarques sur quelques espèces du groupe des *Alticides*, 1860, cli.

**Lépidoptères.** Observation sur le double habitat de *Zygana balcarica*, 1843, xliii.

### COLIN, d'Arras.

**Coléoptères.** Note sur les mœurs des *Necrophorus cadaverinus* et de la *Spelotus præcox*, 1847, cx.

**CONSTANT fils, d'Autun.**

**Lépidoptères.** Notice sur trois variétés d'*Orthosia gothica*, 1855, 209.

Observations entomologiques à l'occasion d'un accouplement anormal, constaté par M. Landa, d'*Hibernia progemma* avec *Cerastis vaccinii*, 1857, xli.

**COQUEREL.**

**Coléoptères.** Observations entomologiques sur divers Insectes recueillis à Madagascar, 1848, 177, 275 ; 1852, 359, et 1855, 167.

Observations entomologiques sur divers Coléoptères recueillis aux Antilles, 1849, 441.

Note sur les métamorphoses du *Silvanus bidentatus*, 1849, 672.

Propriété qu'a la *Cicindela trilinearis* de marcher sur l'eau de la mer, 1849, lxii.

Note sur la prétendue poussière cryptogamique qui recouvre le corps de certains Insectes, 1850, 13.

Note pour servir à l'histoire de l'*Æpus Robinii* et description de sa larve, 1850, 529.

Quelques Insectes recueillis à Lisbonne au mois de juin, sur les eaux du Tage, après un orage, 1850, xliv.

Coléoptères recueillis à Hyères, 1850, xliv.

Description d'un nouveau genre d'*Histérides* des environs de Mers-el-Kébir (*Dimerocerus sociator*), 1858, lxxxix.

L'auteur reconnaît l'erreur relevée par M. Lacordaire sur le nombre des segments de la larve du *Fornax madagascariensis*, 1858, clxii.

Note sur quelques Insectes de Madagascar et de Bourbon, 1859, 239.

Note sur la larve de la *Megacephala euphratica*, 1859, 615.

**Orthoptères.** Remarque curieuse de jeunes *Sauterelles* venant d'éclore, trouvées à Hyères dans un vieux chêne, 1850, xliv.

**Hémiptères.** Note sur une espèce nouvelle du genre *Phyllomorpha* (*madagascariensis*), 1848, 182.



Observations entomologiques sur diverses espèces de Madagascar, 1856, 505.

Note sur quelques Insectes de Madagascar et de Bourbon, 1859, 258.

**Hyménoptères.** Observations sur deux espèces de *Scolia* vivant aux dépens des larves d'*Oryctes*, 1855, 170.

**Lépidoptères.** Observations sur divers Insectes recueillis à Madagascar, 1855, 520.

**Diptères.** Description d'un Diptère de Madagascar (*Phora camariana*), 1848, 188.

Note sur des larves appartenant à une espèce nouvelle de Diptères (*Lucilia hominivorax*), 1858, 171.

Nouveau cas de mort produit par la larve de la *Lucilia hominivorax*, 1859, 233.

**Aptères.** Podurelle trouvée constamment sur les cocons de *Scolia oryctophaga*, 1855, 172.

### COQUEREL et FAIRMAIRE.

**Coléoptères.** Essai sur les Coléoptères de Barbarie, 1858, 743 ; 1860, 145 et 419.

### CORDIER (Jules).

**Articles généraux.** Discours prononcé sur la tombe de Latreille, 1833, XXIII.

### COSTA (Achille), de Naples.

**Coléoptères.** Diagnoses de deux espèces de Coléoptères de Java (genre *Aspongopus*), 1847, XXVII.

**Hémiptères.** Mémoire pour servir à l'histoire des Hémiptères Hétero-  
*roptères* des Deux-Siciles, 1841, 279.

**Lépidoptères.** Note sur les *Callimorpha dominula* et *donna*, 1842, 239.

**Articles généraux.** Détails sur les travaux entomologiques de l'Académie des aspirants naturalistes de Naples, 1841, xxxv.

Notes entomologiques, 1847, LXXXVII.

**COTTY (Ernest).**

**Coléoptères.** Observations sur la *Megacephala euphratica*, 1860, 327.

**CURTIS (John).**

**Coléoptères.** Note sur la larve de l'*Elater pomorum*, 1853, 43.

Note sur la larve de l'*Elater rhombeus*, 1853, 417.

**CUSSAC (Émile).**

**Coléoptères.** Description d'un genre nouveau de *Curculionites* propre à la faune française (*Elmidomorphus*), 1851, 203.

Description d'une nouvelle espèce de *Stenus* (*Leprieuri*), 1851; xxix.

Description d'un genre nouveau de *Brachélytres* propre à la faune française (*Macropalpus*), 1852, 643.

Mœurs et métamorphoses du *Spercheus emarginatus* et de l'*Helochares lividus*, 1852, 617, et 1853, xl.

Réponse à une note de MM. Jacquelin Duval et Lareynie, à l'occasion du genre *Elmidomorphus*, 1853, xxxi.

Notice concernant les métamorphoses du *Ceutorhynchus raphani* et du *Mycetochares linearis*, et remarque sur les mœurs de l'*Hydrobius fuscipes*, 1855, 241.

L'*Atomaria linearis* attaque les feuilles de betteraves, et l'auteur rapporte au *Silpha obscura* les larves qui en attaquent les racines, 1857, LXXIII.

Note relative aux métamorphoses de l'*Eucnemis capucinus*, 1857, LXXIV.

## D.

**DAHLBOM (A.-G.).**

**Hyménoptères.** Note sur le genre *Ctenocerus*, 1856, 345.

Lettre à M. Sichel sur quelques espèces européennes du genre *Sirex*, 1859, LXXXIII.

**DARDOUIN.**

**Lépidoptères.** Description d'une nouvelle espèce de Lépidoptères (*Nemeria agaritharia*), 1842, 201.

**DAT (Ch.).**

**Coléoptères.** Rectification de l'habitat du *Pristonychus latebricola*, 1858, CCXLVI.

**DAUBE.**

**Coléoptères.** Mode d'accouplement du *Cebrio gigas*, 1834, xx.

Moyen de détruire la *Colaspis barbara*, 1836, XLV.

**Lépidoptères.** Variétés accidentelles de divers Lépidoptères, 1836, XXIII.

Opinion de l'auteur sur la non-identité des *Anthocharis belia* et *ausonia*, 1846, xvii.

Note relative à des chenilles de *Lépidoptères*, 1860, xxviii.

**DAUMONT (le major).**

**Coléoptères.** Le *Brachinus crepitans* vit de cadavres dans les hautes Pyrénées, 1851, cii.

La nymphe du *Lampyris noctiluca* présente deux points très-lumineux qui paraissent dès que l'air frappe dessus, 1851, cii.

**DAVAINE.**

**Vers.** Détails anatomiques et physiologiques sur une espèce de *Mermis* trouvée par M. Paul Lambert dans un Coléoptère, 1851, cxiii.

**DEFILIPPI.**

**Articles généraux.** Observations anatomiques sur l'absorption des matières ingérées chez les Insectes, 1848, iv.

**DEJEAN (comte).**

**Coléoptères.** Adhésion à l'avis de M. Audinet-Serville sur le placement parmi les *Troncatipennes* de la *Mormolyce phyllodes*, 1837, Lxxx.

Observations sur l'absence des tarsi chez quelques *Lamellicornes*, 1838, viii.

Observations sur un Insecte de la tribu des Mélolonthides, 1838, xx.

Observations au sujet du dernier mémoire de M. Solier sur l'habitat des *Mélasomes*, 1838, xxxvi.

Réflexions critiques sur le *Species* des *Hydrocanthares* de M. Aubé, 1839, 67.

Observations sur l'histoire naturelle des Coléoptères de France de M. Mulsant, 1840, 69.

Note sur les différences sexuelles des *Malachius* d'Europe, 1840, 205.

Observations sur la monographie des *Érotyliens* de M. Th. Lacordaire, 1842, 285.

**Arachnides.** Suivant l'auteur, le *Xenillus clypeaster* de M. Robineau-Desvoidy doit être rapporté à la tribu des *Acaridiens*, 1839, xii.

**Articles généraux.** Observations sur l'inefficacité des moyens pour détruire les Insectes, 1839, xli.

**DELAFFRESNAY.**

**Névroptères.** Note sur l'accouplement de l'*Ascalaphus longicornis*, 1846, CXV.

**DELAMAIN.**

**Lépidoptères.** Communication de chenilles vivantes du *Bombyx cal-lunæ*; observations, 1847, CLI.

**DELAROUZÉE.**

**Coléoptères.** Descriptions diagnostiques de trois Coléoptères nouveaux trouvés dans la caverne de Bétharram (hautes Pyrénées), 1857, XCIII.

Quelques détails sur divers Coléoptères nouveaux ou rares trouvés aux environs d'Hyères (Var), 1858, CV.

Note sur les habitudes naturelles de quelques larves de *Longicornes*, 1858, CXLVI.

Description de deux Coléoptères nouveaux (un genre nouveau de *Carabiques* et une nouvelle espèce d'*Amaurops*, 1859, 65.

Réponse à la question de M. Reiche à l'occasion d'une publication relative au *Lucanus pentaphyllus*, 1859, XLII.

Rectifications relatives à l'habitat de Coléoptères décrits par M. Fair-maire, 1859, CXXXIX.

Description de deux nouvelles espèces de Coléoptères des cavernes, 1860, XXVI.

Description d'une nouvelle espèce de *Catopsimorphus* (*Fairmairii*), 1860, XXXII.

Note sur le *Paussus Favieri*, 1860, XLVI.

**Névroptères.** Remarques sur le *Myrmeco libelloides*, 1858, CLII.

**DÉMARY.**

**Lépidoptères.** Analyse d'une brochure de M. Blisson sur une méthode propre à faciliter les recherches et l'étude des larves de Lépidoptères, 1840, ix.

**Arachnides.** Rapport sur le *Xenillus clypeaster* de M. Robineau-Desvoidy, 1839, 463.

**Articles généraux.** Observations critiques relatives au mémoire de M. Duponchel sur l'usage des antennes chez les Insectes, 1840, v.

**DEPUISET.**

**Lépidoptères.** Quelques détails sur des chasses faites en juin dans le département de l'Indre, 1857, LXXXVII.

**DESBROCHERS DES LOGES.**

**Coléoptères.** Note sur une particularité des mœurs du *Silpha nigrita*, 1859, CCLIX.

**DESJARDINS (Julien).**

**Hémiptères.** Note sur un Insecte nouveau de l'île Maurice (*Naucoris rugosa*), 1837, 239.

**Lépidoptères.** Note sur l'*Alucite xylostella*, 1837, 229.

**Myriapodes.** Description d'un Insecte Myriapode du genre *Iule*, 1835, 171.

**Crustacés.** Note sur quelques Crustacés de l'île Maurice (*Limnadia*), 1835, II.

**DESMAREST (Eug.).**

**Coléoptères.** Description de deux nouvelles espèces de *Buprestides* du genre *Hyperantha*, 1843, 17.

Clichés typographiques percés par l'*Apate capucina* ; observations à ce sujet, 1844, XXIV.

Creusets en plomb percés par le *Callidium sanguineum*, 1844, XXVI.

Observations à l'occasion de la communication de M. Piccioli sur des lames de plomb perforées par des Cétoines, 1844, XXXII.

Perforation par des *Dermestes* et des *Anthrènes* d'un mur en calcaire grossier, 1844, XXXIII.

Communication d'un *Lucanus cervus* avec un seul œil, 1845, LIII et LVIII.

Anomalie dans la forme des antennes chez un *Melolonta hippocastani*, 1846, LI.

Analyse de deux notices sur l'emploi de la *Cetonia aurata* contre la rage, 1851, XLIV.

Nombre considérable de larves et de nymphes d'*Endomychus coccineus* prises dans un tronc pourri et au pied d'un bouleau, 1856, v.

Irrégularité dans la détermination des familles, 1860, LXIII.

La décortication des arbres ne les préserve pas des attaques des Insectes, 1860, LII.

**Lépidoptères.** Lyonnet rapporte que des chenilles de *Dicranura vinula* renfermées dans des boîtes de plomb en ont rongé le plomb pour en faire leur cocon, 1851, XVI.

**Crustacés.** Note sur une disposition anormale des organes génitaux observée dans l'*Astacus fluviatilis*, 1848, 479.

Description d'un nouveau genre de Crustacés de la section des *Décapodes Macroures*, famille des *Salicoques*, tribu des *Palémoniens* (genre *Leander*), 1849, 87.

**Articles généraux.** Courte note sur M. Pitois, 1843, XXIII.

Résumé des travaux de la Société de 1833 à 1843, 1844, 217.

Résumé des travaux de la Société en 1844, 1845, 15.

Morceau de bois fossile paraissant perforé par des larves d'Insectes, 1845, XXVI.

Quelques considérations sur les règles de la nomenclature entomologique, 1859, LXXII.

Tous les Bulletins des séances de la Société placés à la fin de chaque volume depuis et y compris le 6 mai 1840.

**DEYROLLE (Ach.).**

**Coléoptères.** *Oryctes* de Chine présentant deux gibbosités aux élytres, 1846, LXIV.

Quantité considérable de *Carabiques* rejetés par la mer sur les bords de la côte du Brésil, 1847, xcvi.

Note pour servir à l'histoire des *Carabus* d'Espagne et de Portugal, et remarques sur quelques espèces du nord de l'Afrique, 1852, 237.

Détails sur la faune entomologique française de MM. Fairmaire et Laboulbène, 1854, LXII.

Découverte de la femelle du *Cebrio Carrenoi* dans les environs de Madrid, 1847, LXIII.

**DEYROLLE (Émile).**

**Lépidoptères.** Notice sur cinq *Morpho* nouveaux, 1860, 207.

**DOHRN.**

**Coléoptères.** Lettre relative à plusieurs notes publiées dans le Bulletin des Annales de la Société sur le Catalogue de Stettin, 1858, xxiv.

La discussion avec M. Schaum devenant plus personnelle que scientifique, M. Dohrn croit inutile de la continuer, 1858, cxcvii.

**Articles généraux.** Note sur les rectifications grammaticales des noms de genres, 1859, LXII.

**DONZEL (Hugues).**

**Lépidoptères.** Crocalle du lentisque, 1837, 13.

Observations sur l'accouplement de quelques genres de Lépidoptères diurnes et sur le genre *Pieride*, 1837, 77.

Description de cinq espèces de Noctuérites et de deux Phalénites, 1837, 471.



Description de trois nouvelles espèces de Lépidoptères des Pyrénées orientales, 1838, 429.

Description d'une nouvelle Phalène du genre *Crocallis*, 1840, 59.

Notice sur la *Noctua jaspidea* ♂ de de Villiers, 1841, 241.

Description de deux Lépidoptères nouveaux recueillis en Barbarie par le capitaine Charlon (*Anthocharis Charlonia* et *Bombyx philopatus*), 1842, 197.

Description d'une nouvelle espèce de Lépidoptères (*Polia felicina*), 1844, 199.

Description de Lépidoptères nouveaux, 1847, 525.

Observations sur l'indigénéité des *Sphinx nerii* et *celerio*, 1850, 225.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur M. Chardiny, de Lyon, 1837, xxvi.

Extrait d'une notice nécrologique sur M. le capitaine Charlon, 1842, xxviii.

### **DOR (H.), de Vevay.**

**Orthoptères.** Note sur une apparition en Suisse d'une horde immense de *Sauterelles*, 1858, ccxxiv.

### **DORMOY.**

**Lépidoptères.** Note sur le grand nombre de chenilles du *Sphinx* du laurier rose trouvées en France pendant l'année 1835, 1836, 363.

### **DOUBLEDAY (Ed.).**

**Lépidoptères.** Description de deux nouvelles espèces de *Charaxes* des Indes orientales, 1843, 217.

Quelques détails sur un Lépidoptère de la terre de Kerguelen, 1848, lxiii.

### **DOÛÉ.**

**Coléoptères.** Exemple de longévité remarquable chez une *Cassida* venant de Montauban, 1846, xci.

Masse énorme de *Coccinella 19-punctata* observée au pied d'un peuplier, 1847, xciv.

Monstruosités remarquables chez deux Coléoptères, 1847, xcvi.

*Harpalus ferrugineus* trouvé plusieurs fois à Fère-en-Tardenois et présentant des élytres d'un fauve brun clair, 1847, xcvi.

Divers Coléoptères dont les élytres présentent des dissemblances remarquables, 1848, xv.

Série de la dégradation successive de la couleur typique chez la *Cicindela trisignata*, 1848, xxxv.

Exemple de longévité chez une *Cicindela campestris*, 1848, lx.

Communication d'un *Heilipus trachypterus* couvert de très-petits parasites jaunâtres, 1851, xxi.

*Curculionites* divers trouvés en très-grande quantité sur les poulies en fer du port de Dieppe, 1851, lxxxiv.

*Anomala* présentant sur les élytres deux teintes excessivement tranchées, 1853, ix.

Larves et nymphes de l'*Eudomychus coccineus* trouvées en grand nombre au pied et dans les racines d'un bouleau, 1856, v.

Communication d'une variété de *Cratosomus Raddami*, 1857, xxxix.

Communication du *Cryptocranium laterale* du Brésil, 1857, xlviii.

Une vingtaine de *Margus ferrugineus* trouvés dans le corps desséché d'un *Phileurus*, 1857, cxxv.

Plusieurs *Margus ferrugineus* vivants trouvés dans une boîte d'Insectes envoyés de Californie, 1859, cliv.

**Orthoptères.** Lecture de l'extrait d'une lettre de M. Bouteiller qui envoie des œufs et des larves de *Xyphidium fuscum*, 1857, lxxxvi.

**Hémiptères.** Note sur une nuée de *Puccrons* verts observés à Paris, 1847, lxxiv.

**Lépidoptères.** Trois chenilles de la Nouvelle-Zélande présentant des végétations bien marquées, 1846, xcii.

Larves et chrysalides de Lépidoptères trouvées dans un champignon, 1851, xxiii.

**Diptères.** Dégâts causés dans des champs de céréales par la *Tipula tritici*, 1855, CIII.

**Articles généraux.** Rapport de la Commission des comptes du monument Latreille, 1837, XLII.

Note nécrologique sur M. Contamine, 1846, LXII.

Notice nécrologique sur Alexandre Pierret, 1850, 351.

Explication relative au don de la collection Pierret et levant tous scrupules au sujet de l'emploi des fonds en provenant, 1855, XLV.

### DOUMERC.

**Coléoptères.** Dessin d'une anomalie remarquable chez un *Melolontha vulgaris*, 1833, XLV.

Note sur quelques monstruosités entomologiques, 1834, 171.

Note sur les mœurs de l'*Erirhinus vorax*, 1856, LXXXIV.

Fait tératologique curieux chez une *Coccinella*, 1859, CCXIX.

**Orthoptères.** Observations sur les habitudes de plusieurs espèces de *Blattes*, 1837, XLVI.

**Hyménoptères.** Note sur le *Microgaster perlae*, parasite de l'Hémérobe perle, 1855, LXXXI.

Notice sur les métamorphoses des *Eulophus*, 1859, 107.

Notice sur les mœurs de l'*Ichneumon fasciatus*, 1860, 317.

**Lépidoptères.** Observations sur les mœurs de la *Pyrallis ribeana*, 1839, XXVIII.

Larve de *Teigne* se nourrissant de la pulpe des châtaignes, 1839, XLIV.

Note sur la *Teigne* du chanvre, 1860, 322.

Note sur la *Teigne* à losange de l'*Orthotriche*, 1860, 579.

**Diptères.** Note sur la *Psalidomyia fucicola*, 1833, 89.

### DOYÈRE.

**Hémiptères.** Observations sur quelques genres d'Hémiptères, 1837, 261.

Observations sur les organes de perforation chez les Cigales, 1837, XVII.

Observations sur les organes générateurs chez les Cigales, 1837, XXXIX.

**Lépidoptères.** Observations sur quelques genres de *Lépidoptères*, 1837, 264.

### **DREWSSEN, de Strandmöllen.**

**Hyménoptères.** Note sur le *Cimbex femorata* et le *Paniscus glaucop-terus*, 1835, 169.

**Diptères.** Récolte de navette ravagée par les larves d'une espèce du genre *Cecidomyia*, 1835, LXII.

### **DUCELLIER (Florent).**

**Lépidoptères.** Notice sur les chenilles de *Deilephila neriï*, 1839, IX.

### **DUFOUR (Léon).**

**Coléoptères.** Notice sur les dévastations de la larve du *Colaspis bar-bara*, 1836, 371.

Description des métamorphoses du *Stenocorus inquisitor*, 1840, 63.

Histoire des métamorphoses d'une *Œdemera*, 1841, 5.

Histoire des métamorphoses du *Triplax nigripennis*, 1842, 191.

Note sur la composition segmentaire de quelques larves de Coléop-tères, 1843, 253.

Histoire des métamorphoses du *Choragus Sheppardi* et du *Xylctinus hederæ*, 1843, 313, et 1844, XL.

Nouvelles observations sur la situation des stigmates thoraciques dans les larves de *Buprestides*, 1844, 203, et 1845, 493.

Note sur les métamorphoses et le genre de vie des *Baris cuprirostris* et *picinus*, 1846, 453.

Note sur le *Cyrtonus Dufouri*, 1847, CIII.

Note sur le *Xylographus bostrichoides* et sur ses métamorphoses, 1850, 549.

Note sur le *Calicnemis truncatifrons*, 1850, LIV.

Mélanges entomologiques, 1851, 55, et 1852, 443.

Un dernier mot sur les coques de *Clytra* et de *Cryptocephalus*, 1852, LXXXV.

Note sur le *Gtenocerus Klugii*, 1852, LXXXVI.

Histoire des métamorphoses de divers Coléoptères, 1854, 656.

Note sur le *Stenus rusticus*, 1856, xci.

Note sur un nouvel habitat du *Carabus hispanus*, 1856, xcv.

Note sur l'habitat de la *Pimelia coronata*, 1858, xcv.

**Hémiptères.** Mémoire sur les genres *Xylocoris*, *Leptopus* et *Velia*, 1833, 104.

Descriptions et figures de trois Hémiptères européens nouveaux ou mal connus, 1834, 341.

Le *Postemma brachelytrum* est identique avec le *Reduvius guttula* de Fabr., 1834, 356.

Expérience sur la découverte de M. Behn d'un fluide nutritif dans les pattes des Hémiptères, 1835, LXXIII.

Description de deux espèces nouvelles d'*Aradus* des Pyrénées et remarques sur les Hémiptères de ce genre, 1844, 447.

Nouvelle espèce d'*Aradus*, 1845, 225.

Note sur la *Fulgora obliqua* de Panzer, 1846, XLV.

Un mot sur la *Sigura minuta*, 1846, XCIII.

Mélanges entomologiques : Sur l'habitat du *Serenthia læta* et sur l'*Issus grylloides* de Fabr., 1851, 56.

Description et figure d'une nouvelle espèce de Lygéites, le *Rhyparochromus brachiidens*, 1851, 327.

Mélanges entomologiques : Sur quelques espèces algériennes du genre *Ophthalmicus*, 1857, 68.

**Névroptères.** La larve du *Formicalco* est pourvue d'un anus avec canal intestinal, 1833, LXVII.

Communication d'une note sur l'absence d'un système nerveux appréciable chez la *Nemoptera lusitanica*, 1856, xxv.

**Hyménoptères.** Observations sur une espèce d'*Anoplus* qui n'offre qu'un seul ocelle, 1833, 483.

Mémoire sur une galle de la bruyère à balais et sur les Insectes qui l'habitent, 1837, 83.

Observations sur le genre *Stizus*, 1838, 269.

Recherches sur l'*Andrena lagopus*, 1838, 281.

Notice sur l'*Ammophila armata* de Latreille, 1838, 291.

Observations critiques sur quelques espèces de *Crabro*, 1838, 409.

Notice sur la *Nomus diversipes*, 1839, 583.

Histoire des métamorphoses des *Chalcis* et description d'une espèce peu connue de ce genre d'Hyménoptères, 1841, 11.

Notice sur le *Misocampus stigmatizans*, 1847, 441.

Études pour servir à l'histoire du *Nematus ribis*, 1847, 571.

Dissertation sur le *Nematus Degeri*, 1847, 583.

Mélanges entomologiques, 1851, 58 ; 1852, 448 ; 1853, 385.

Note sur le *Ctenocerus Klugii*, 1852, LXXXVI.

Signalement de quelques espèces nouvelles ou peu connues d'Hyménoptères algériens, 1853, 375.

Note sur la *Formica barbara*, 1856, 341.

Mélanges entomologiques : Sur le *Micromyrma pygmaea*, nouveau genre de *Formicide*, 1857, 60.

**Lépidoptères.** Note sur un fait remarquable de géographie entomologique relatif à une chenille d'*Hydrocampa*, 1849, LXXI.

**Diptères.** Note pour servir à l'histoire des *Cédidomyies* et description d'une nouvelle espèce de ce genre de Diptères, 1838, 293.

Observations sur le *Sybiotroma Dufourii* Macq., 1839, 129.

Histoire des métamorphoses de la *Lucilia dispar*, 1846, 205.

Observations sur les métamorphoses du *Ceratopogon geniculatus* Guér., 1845, 215.

Histoire des métamorphoses de la *Drosophila pallipes*, 1846, 321.

Histoire des métamorphoses du *Rhynchomyia columbina*, 1846, 327.

Histoire des métamorphoses de l'*Aulacigaster rufitarsis* et observations critiques sur ce genre de *Muscides acalyptères*, 1846, 455.

Quelque chose sur le *Brachyopa bicolor* Meig. et le *Subula cilripes* Duf., 1846, XLVII.

Note sur le *Rhingia femorata*, 1846, LVI.

Histoire des métamorphoses de la *Ceria conopsoides*, 1847, 19.

Note pour servir à l'histoire des métamorphoses du genre *Phasia*, 1848, 427.

Histoire des métamorphoses du *Tetanocera ferruginea*, 1849, 67.

Histoire des métamorphoses du *Rhyphus fenestralis* et du *Mycetobia pallipes*, 1849, 195.

Description et iconographie de quelques Diptères de l'Espagne, 1850, 131 ; 1852, 5.

Note sur la chrysalide du *Scenopinus fenestralis* et sur le poste de ce Diptère dans la classification, 1850, 493.

Mélanges entomologiques, 1851, 63; 1852, 443, 460; 1853, 383; 1857, 39.

Histoire des métamorphoses du *Bombylius major*, 1858, 503.

Note sur une nouvelle espèce d'*Hippobosque*, 1858, CIII.

**Aptères.** Description et iconographie de trois espèces du genre *Philopteris*, parasites de l'*Albatros*, 1835, 669.

**Arachnides.** Moyen qu'emploient les Araignées pour se transporter en l'air d'un lieu dans un autre, 1834, XXI.

Observations sur la *Filistrata bicolor*, 1836, 527.

Sur la *Micrommata spongitaris*, 1852, XLII.

Un mot et un portrait sur la femelle du *Galeodes barbara*. 1853, 5.

Description de deux nouvelles espèces d'Araignées du genre *Epeira* et sur une nouvelle espèce de *Theridion*, 1855, 5.

Mélanges entomologiques : *Galeodes phalangista* d'Algérie, 1857, 64.

Sur le *Drabsus segestriiformis*, 1858, 255.

**Crustacés.** Consultation sur un Crustacé fluviatile voisin du genre *Pandalus*, 1834, 477.

**Articles généraux.** Mélanges entomologiques : Étude de l'Entomologie, 1851, 55.

**DUFOUR (Léon) et Ed. PERRIS.**

**Hyménoptères.** Mémoire sur les Insectes *Hyménoptères* qui nichent dans l'intérieur des tiges sèches de la ronce, 1840, 5.

**DUGÈS.**

**Arachnides.** Découverte des organes de la respiration chez les *Ara-néides*, 1835, XII.

**DUMÉRIE.**

**Coléoptères.** Communication d'une substance que l'on vend à Constantinople sous le nom de *Trehala* et qui est produite par une coque de *Curculionite* du genre *Larinus*, 1858, CXLVII.

**Hyménoptères.** C'est à l'*Urocerus juvencus* à l'état parfait, et non à sa larve, qu'il faut attribuer la perforation des balles de plomb en Crimée, 1858, CXLVII.

**Arachnides.** Observations sur le *Theridium civicum*; lettre à M. Lucas, 1850, 5.

**Articles généraux.** Allocution aux funérailles de Duponchel, 1846, VII.

Notice sur la vie et les ouvrages de Duponchel, 1847, 5.

Lecture de deux chapitres de la Faune entomologique des Insectes de France, 1859, xxxviii et cxvii.

Note accompagnant l'offre de son ouvrage sur l'histoire naturelle des Insectes, 1860, I.

Liste des travaux entomologiques de l'auteur, 1860, 653.

**DUPONCHEL.**

**Coléoptères.** Description d'une nouvelle espèce du genre *Amphicoma* (*Anthipna Carcelii* Lap.), 1833, 254.



Catalogue des Coléoptères remarquables trouvés dans la Lozère, 1834, 286.

Nécrophore pris deux fois près de Loudun (Vienne) par M. Crémère aîné, et qui paraît nouveau, 1835, xxxviii.

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères du genre *Purpuricenus*, tribu des *Cerambycins*, famille des *Longicornes*, 1837, 309.

Communication d'un *Carabus lotharingus* anormal, 1841, 199 et xx.

**Orthoptères.** Communication d'une espèce d'*Acridites* qui, pendant quelques jours, a couvert les murs du centre de Paris, 1834, xl.

**Lépidoptères.** Notice sur une espèce de *Tinéite* (*Tinea decuriella*) dont la chenille vit et se métamorphose dans la résine du pin sylvestre, 1832, 300.

Division du genre *Satyre* en neuf groupes d'après des caractères tirés à la fois des nervures et des antennes, 1833, 97.

Description d'une nouvelle espèce de *Noctuelles* appartenant au genre *Xylina*, 1833, 257.

Division de la tribu des *Platyomides* en 23 genres d'après des caractères tirés principalement de la forme des palpes et de celle des ailes, 1834, 433.

Notice sur un Lépidoptère hermaphrodite de la tribu des *Phalénites* (*Angerona prunaria*), 1835, 143.

Notice sur deux nouvelles espèces de Noctuélites (*Episoma unicolor* et *Bryophila Germainii*), 1835, 193.

Description d'une nouvelle espèce de Noctuélides du genre *Heliothis*, 1835, 632.

Observations sur des chrysalides de *Thais medesicaste* rapportées de la Lozère en 1833 et dont les Papillons ne sont éclos qu'en 1835, 1835, 661.

Observations sur la *Tinea accersella*, à la suite d'un mémoire de M. Boyer de Fonscolombe, 1837, 187.

Note sur les particularités que présentent les changements de peau de la chenille du *Charaxes Jasius*, 1837, 193.

Rapport sur le mémoire de M. J. Desjardins sur l'*Alucite xylostella*, 1837, 235.

Mémoires sur la question de savoir si les caractères fournis par les chenilles doivent prévaloir sur ceux tirés de l'Insecte parfait dans une bonne classification de Lépidoptères, 1837, 411, et 1838, 247.

Les auteurs allemands ne regardent pas l'*Oenophthya pilleriana* comme nuisible à la vigne, 1837, LVIII.

Observations sur l'engourdissement estival de quelques espèces, 1837, LXI.

Division de la tribu des Tinéites en 32 genres, 1838, 141.

Communication du compte rendu des expériences faites chez l'auteur à l'effet de découvrir l'organe du cri dans le Sphinx à tête de mort, 1839, II.

Chenille de *Noctua aprilina* ayant rendu un Entozoaire par l'anus, 1841, XXI.

Variétés fort curieuses de *Zygæna achilleæ* et de *Vanesse polychlore* présentées au nom de M. Joanny Bruyat, 1841, XXX.

Les chenilles de *Callimorpha dominula* se réunissent et forment une coque commune pour se métamorphoser, 1845, LXXXII.

**Articles généraux.** Il rend compte du mémoire de M. Becquerey sur la chaleur des Invertébrés, 1834, X.

Notice sur la vie et les travaux d'Audouin, 1842, 95.

Analyse des travaux d'Audouin, 1842, 113.

## DUPONT.

**Coléoptères.** Rectification de la synonymie de la *Lamia radiata* Gory, 1835, 665.

Communication d'un *Scarabæus* dont le corselet est tout perforé, 1846, xciv.

## E.

## EMY.

**Lépidoptères.** Nouveau mode d'impression des Lépidoptères, 1833, L.

## F.

**FAIRMAIRE (Léon).**

**Coléoptères.** Description de trois nouvelles espèces de Coléoptères de l'Océanie, 1843, 11.

Liste de Coléoptères fort rares aux environs de Paris trouvés à Fontainebleau, 1846, LIV.

La larve du *Pogonocherus pilosus* vit dans les tiges du guy de l'acacia, 1847, xvii.

Description de quelques Coléoptères nouveaux, 1848, 167.

Espèces européennes du genre *Cryptocephalus*, extrait de M. Suffrian, 1848, 285 ; 1849, 143 ; 1850, 271.

Description du genre *Chalcas*, 1849, 5.

Description de quelques Coléoptères nouveaux d'Europe et de France, 1849, 419.

Le *Buprestis Solicri* est carnassier à l'état parfait, 1849, iv.

Communication de plusieurs *Calosoma sycophanta* dont les élytres bien formées ne recouvrent guère que la moitié de l'abdomen, 1849, iv.

Monstruosité observée dans le chaperon d'une *Anisoplia floricola*, 1849, lx.

*Pimelia* d'Algérie présentant un fait curieux de tératologie, 1849, LXXXII.

Description d'un nouveau genre de Lucanides (*Streptocerus*), 1850, 53.

Monographie du genre *Cyrtonus*, 1850, 535.

Très-jolie variété de *Cicindela hybrida* prise à Fontainebleau par M. Berce, 1850, xvi.

L'auteur propose de faire de la *Cymindis Fanninii* un nouveau genre sous le nom de *Platytarus*, 1850, xvii.

Larves et nymphes de *Dasytes cæruleus* trouvées dans la forêt de Saint-Germain, 1850, xix.

*Pterostichus niger* présentant une anomalie singulière, 1851, LIII.

Insectes rares pour la faune parisienne pris dans la forêt de Saint-Germain, 1851, LIII.

*Agrilus undatus*, *Masoreus luxatus* et *Apion Chevrolatii* trouvés à Saint-Germain-en-Laye, 1851, LXXXVII.

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères (*Pausus Favieri*), 1851, cx; 1852, xxxv.

Quelques Coléoptères nouveaux du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, 1852, 69.

Excursion entomologique dans la baie de la Somme, 1852, 663.

Quelques réflexions critiques sur le tableau méthodique et synonymique des Coléoptères des environs d'Abbeville par M. Marcotte, 1852, 690.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Sandatus*, 1852, 693.

Cas particulier de pathologie chez un *Trichodes alvearius*, 1852, xxx.

Diagnose d'une nouvelle espèce d'*Astynomus* trouvée en Sicile, 1852, LXII.

Traduction de la Monographie des Chrysomèles d'Europe par M. Suffrian, 1853, 91; 1854, 313, et 1858, 431.

*Apate nigriventris* prise à la Teste avec des *Apate capucina*, 1853, XLVI.

Rectifications et descriptions d'espèces nouvelles de Coléoptères de la faune méditerranéenne, 1855, 307.

Rapport de la Commission nommée sur la demande de M. Ghiliani, relativement aux *Cicindela Ritchii* Vig. et *Petetieri* Luc., 1855, xxiii.

Communication de quelques individus de l'*Anisotoma picea* trouvés par M. Caulle dans les sables de Cayeux, et diagnose de l'*Anisotoma ornata*, nouvelle espèce découverte aux environs de Paris, 1855, xxx.

L'Insecte de MM. Dohrn et Lucas a été décrit par M. Guérin-Ménéville sous le nom de *Loxoprosopus cecramboides*, 1855, LIII.

Larve d'*Omophron* trouvée en Égypte par M. Schaum, 1855, LXXIII

Courte description de l'*Hydnobius Perrisii* et de l'*Anisotoma lucens*, 1855, LXXV.

*Timarcha tenebricosa* et *Chrysomela hæmoptera* tous deux mâles et accouplés ensemble, 1855, xeviii.

Note sur le genre *Eurymorpha*, 1856, 93.

*Miscellanea entomologica*, 1856, 517, 630; 1857, 725; 1859, 21.

Quelques détails sur l'excursion entomologique dans les bois de Lardy, 1856, LVII.

Coléoptères récoltés lors de l'excursion à Bouray et à Lardy, 1856, LVII.

Insectes intéressants rapportés de Savoie, 1856, LXXVI.

Rapport sur la session extraordinaire tenue à Montpellier, 1857, 619.

Insectes recueillis aux environs de Montpellier et de Cette pendant la session de 1857, 1857, 627.

Réponse aux observations de M. Jacquelin Duval sur le *Strophosomus subnudus*, 1857, LIX.

L'auteur accepte la rectification de M. Jacquelin Duval sur le *Stenus impressipennis* et *carenifrons*, 1857, LX.

Diagnose latine d'un *Carabe* nouveau découvert dans le nord de l'Afrique, 1857, CLVI.

Liste des Insectes récoltés en Corse par M. Ph. Lareynie et description des espèces nouvelles, 1859, 266.

Diverses remarques sur plusieurs Coléoptères de Barbarie et diagnoses, 1859, L.

Diagnoses de trois espèces françaises des genres *Cleonus*, *Mesites* et *Hydaticus*, 1859, LI.

Diagnoses de plusieurs nouvelles espèces de Coléoptères d'Europe, 1859, CIII.

Description du *Prinobius lethifer*, 1859, CXXXVIII et CXLIX.

Nouvelles chasses de M. Linder dans les grottes des Pyrénées et de l'Ariège; résultats obtenus, 1859, CXXXIX.

Diagnoses de deux nouveaux Coléoptères d'Europe des genres *Trechus* et *Otiorhynchus*, 1859, CXLIX.

Description de quelques nouvelles espèces de Coléoptères récoltées par M. Gougelet pendant son voyage en Galice, 1859, CL.

Note sur les *Carabus Thomsonii* et *cychrocephalus*, 1859, CLIII.

Diagnoses de quelques Coléoptères nouveaux de France, 1859, CLXIII.

Description de l'*Anthaxia Ariasi* de M. Robert, qui appartient au genre *Melanophila*, 1859, CLXXIV.

Diagnoses de quelques Coléoptères européens, 1859, CLXXXIV et CCXV.

Diagnoses de quelques espèces nouvelles de Coléoptères européens et algériens, 1859, CCXXXV.

Diagnoses de nouvelles espèces de Coléoptères, 1860, 338 et 629.

Diagnoses de deux Coléoptères nouveaux d'Algérie (*Cyclomaurus* (n. g.) *velutinus* et *Sciaphilus giganteus*), 1860, XXXI.

Diagnose du *Faronus telonensis*, 1860, XLIV.

Sur les notes synonymiques de MM. Schaum, Kiesenwetter, Kraatz et autres, publiées dans l'Entom. Zeitung de Berlin, 1860, XLV.

Irrégularités dans la dénomination des familles, 1860, LXIII.

**Orthoptères.** *Heminotus Servillei* décrit par erreur sous le nom de *Xerophyllum Servillei* comme un Hémiptère de la tribu des *Membracides*, 1848, IX.

**Hémiptères.** Revue de la tribu des *Membracides*, 1846, 235 et 479.

Note relative aux mœurs d'une nouvelle espèce d'Hémiptères du genre *Schyzoncura*, 1851, CVII.

Description d'une nouvelle espèce européenne du genre *Centrotus* (*C. chloroticus*), 1851, LXXXVI.

**Hyménoptères.** Excroissances recouvrant la base d'une branche de saule, dues au *Cynips pallidus*, 1846, XXX.

Rapport de la Commission nommée pour reconnaître et constater le nombre des articles des antennes du *Masaris vespiformis*, 1853, XVI.

**Lépidoptères.** Chrysalides transformées en papillons quoique traversées par une épingle, 1853, LI.

Lépidoptères recueillis pendant la session extraordinaire de Montpellier en 1857, 1857, 643.

**Diptères.** Note sur le genre *Baryphora* de M. Læw, dont tous les caractères s'appliquent parfaitement au *Xestromyza helianthemis*, 1850, 155.

Larves de Mouches rendues vivantes par une femme, à la suite de violentes douleurs d'entrailles, 1851, CIX.

Rapport sur un ouvrage manuscrit de Robineau-Desvoidy sur les Diptères des environs de Paris, 1858, 339.

**Articles généraux.** Note nécrologique sur M. Jules Cordier, 1847, xv.

Rapport sur la session extraordinaire tenue à Montpellier au mois de juin 1857, 1857, 619.

Notice nécrologique sur Ph. Lareynie, suivie d'observations sur les Coléoptères de l'île de Corse, 1859, 261.

Observations à l'occasion de la nomenclature entomologique, 1859, CCIV.

### **FAIRMAIRE (Léon) et Ch. COQUEREL.**

**Coléoptères.** Essai sur les Coléoptères de Barbarie, 1858, 743; 1860, 445 et 449.

### **FAIRMAIRE (Léon) et P. GERMAIN.**

**Coléoptères.** Révision des Coléoptères du Chili, 1858, 709; 1859, 483.

### **FALDERMANN.**

**Coléoptères.** Note sur les mœurs de l'*Otiorhynchus Macquardtii*, 1837, LXX.

### **FALLOU.**

**Lépidoptères.** Aberration d'*Arge Galathea* prise à Auch, 1858, xli.

### **FARKAS.**

**Coléoptères.** On tire en Hongrie du *Melolontha vulgaris* une substance huileuse pour graisser les roues des voitures, 1832, 237.

### **FEISTHAMEL (baron).**

**Coléoptères.** Détails sur les ravages d'une larve de *Scolytus* observée dans le bois de Vincennes, 1836, xi.

Note sur la *Pachypus excavatus*, 1837, 257.

Observations sur la cause de la mortalité des arbres dans le parc de Vincennes, attribuée aux *Scolytes*, 1837, 393.

Opinion de l'auteur sur les causes des ravages attribués aux *Scolytes*, 1837, v.

Description d'une nouvelle espèce de *Carabe* de la Chine, 1845, 103.

**Lépidoptères.** *Chimera funebris*, 1833, 259.

Femelle de la *Chelonia Latreillei* obtenue de chenilles, 1834, xli.

Description de trois Lépidoptères nouveaux de la tribu des *Phalénites* (genres *Acidalia*, *Chesias* et *Cabera*), 1835, 131.

*Heliconia Leprieuri*, 1835, 631.

Notice sur trois Lépidoptères nouveaux, dont un de Sicile et deux d'Espagne (genres *Cleophana*, *Acontia* et *Anthocharis*), 1837, 299.

Description de quelques Lépidoptères *Rhopalocères* nouveaux ou peu connus provenant de la Cazamance (Afrique), 1850, 247.

**Articles généraux.** Détails sur les effets des orages sur les Insectes, 1835, liv.

Note nécrologique sur Picard, 1839, 587.

### FISCHER DE ROSLERSTAMM.

**Lépidoptères.** Histoire de la *Pædisca parmatana*, 1834, xl.

### FISCHER DE WALDHEIM.

**Coléoptères.** Détails sur le genre *Callisthènes*, 1842, xliii.

**Orthoptères.** Lettre à M. Audinet-Serville sur quelques genres d'Orthoptères, 1833, 317.

Trois espèces nouvelles d'Acridiens de la Daourie, 1839, xxiv.

Établissement de quelques sous-genres dans les espèces aptères de Locustes, 1839, xxiv.

### FOLLIN et LABOULBÈNE.

**Coléoptères.** Note sur la matière pulvérulente qui recouvre la surface du corps des *Lixus* et de quelques autres Insectes, 1848, 301.



**FOULQUES DE VILLARET.**

**Hyménoptères.** Mémoire sur quelques nouvelles espèces de *Tenthredines*, 1832, 303.

**FRAY.**

**Articles généraux.** Considérations physiologiques sur le développement de l'instinct dans les Invertébrés, 1833, 361.

**G.****GACHET.**

**Arachnides.** Extrait d'une lettre relative au *Tetranychus lintearius*, 1834, 397.

Lettre relative à une Mygale des environs de Bordeaux, 1834, 399.

**GAEDE, de Liège.**

**Coléoptères.** *Catandra securifera*, 1833, 458.

**GAUBIL.**

**Coléoptères.** Extrait d'une lettre sur les résultats de ses chasses dans l'Aude et en Algérie, 1852, VII.

**GAUTIER DES COTTES (baron).**

**Coléoptères.** Description de deux espèces de Coléoptères nouveaux (genres *Anchomenus* et *Peritelus*), 1857, CXXXV.

Notes entomologiques, 1858, LXVII, et 1859, CCXI.

Description de trois Coléoptères nouveaux d'Europe (genres *Feronia*, *Anchomenus* et *Carabus*), 1859, CCIX.

Description d'une nouvelle espèce d'*Ocypus* d'Europe, 1860, 368.

Réponse aux observations de M. Tournier sur le *Carabus glacialis*, 1860, XLVII.

Observations relatives à divers Coléoptères propres à la faune de la Corse, 1860, LIII.

Observations sur la *Feronia æraria*, 1860, LXXXVII.

Coléoptères remarquables récoltés près du Sahara égyptien, 1860, CXII.

Description d'un Curculionite nouveau propre à la faune française (genre *Otiorhynchus*), 1860, CXII.

### GAY.

**Coléoptères.** Lettre à M. Audouin sur les Insectes du Chili, 1836, XXI.

### GAY et SOLIER.

**Coléoptères.** Mémoire sur deux genres remarquables de Curculionites du Chili (genres *Eublepharus* et *Physothorus*), 1839, 5.

### GÉHIN.

**Articles généraux.** Note sur l'action des poudres insecticides, 1859, XV.

### GÉNÉ.

**Coléoptères.** Phrases spécifiques de 17 Coléoptères de Sardaigne, 1836, II.

### GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore).

**Diptères.** Rapport sur trois notices relatives à l'existence de l'*Œstrus hominis*, 1833, 518.

**Articles généraux.** Discours prononcé sur la tombe de Latreille, 1833, XVIII.

**GERMAIN (P.) et FAIRMAIRE (Léon).**

**Coléoptères.** Révision des Coléoptères du Chili, 1858, 709; 1859, 483.

**GERVAIS (Paul).**

**Coléoptères.** Deux Vers intestinaux retirés du corps d'un *Blaps mortisaga*, 1835, LXX (1).

Quelques détails sur la larve du *Nanodes tamarisci*, 1847, xciv.

**Diptères.** Note sur des larves de *Tipulaires culiciformes* ramenées par la pompe d'un puits artésien, 1851, LXX.

**Aptères.** Rapport sur un mémoire de M. Langle intitulé : Recherches sur la famille des *Oribates*, 1840, xxvii.

Communication d'une quinzaine d'Insectes Aptères, 1842, xlv.

Détails sur quelques familles d'Insectes Aptères, 1844, xxvii et xlii.

Réponse à la note de M. Westwood sur le genre *Campodea*, 1844, lxii.

**Arachnides.** Détails sur l'*Acarus* de la gale des chameaux, 1840, xxxii.

**Myriapodes.** Note sur le genre *Polydesmus*, 1836, 373.

Notice sur une nouvelle espèce de *Polydesme Iuliforme* (*P. Guerinii*), 1836, 685.

*Iulus lucifugus* trouvés abondamment dans les serres du Muséum, 1836, lvi.

Recherches sur les demi-métamorphoses des *Myriapodes*, 1837, vii, ix.

Description d'un genre nouveau de la famille des *Scolopendres* (genre *Scolopendrella*), 1839, xxxvi.

Description de trois espèces de *Scolopendra* signalées par Leach, 1844, xxi.

(1) Ce numéro de la pagination devrait être LXXX.

Description de la *Cambala lactaria*, 1844, xxi.

Communication de plusieurs espèces de *Myriapodes* de Colombie, 1844, xxvii.

**Annélides.** Détails à l'occasion des observations de M. de Blainville sur le genre *Peripatus* de Guilding, 1836, xv.

### GERVAIS (Paul) et Justin GOUDOT.

**Myriapodes.** Description des Myriapodes les plus intéressants recueillis en Colombie par M. Goudot, 1844, xxvii.

Rectification du nom générique de la *Syphophora luteola*, 1844, xlii.

### GILIANI.

**Coléoptères.** Mémoire sur la station de quelques Coléoptères dans les différentes régions du Piémont, 1847, 83.

Note contenant des détails sur les habitudes nocturnes du *Brachinus complanatus* et de la *Megacrphala affinis*, 1847, xxxviii.

Coléoptères recueillis dans les Alpes maritimes, 1848, xliii.

Quelques faits se rapportant à la géographie entomologique de certains Coléoptères, 1851, xcvi.

Caractères distinctifs entre les *Cicindela Audouini* et *Ritchii*, 1853, 645, et 1855, xii.

**Hyménoptères.** Note sur les mœurs des *Melipones*, 1847, xxxviii.

**Lépidoptères.** Nouveaux renseignements sur la stridulation du *Sphinx Atropos*, 1844, lxxii.

Note contenant des observations importantes sur plusieurs espèces de Lépidoptères, 1851, liv.

**Arachnides.** Détails sur les *Acaricus* trouvés au Para, 1847, xxxvi.

*Argas reflexa* mort après vingt-six mois et demi de jeûne absolu, 1851, lxi.

### GIRARD (Maurice).

**Coléoptères.** *Epicaula adspersa* ravageant les plantations des betteraves à Montévidéo, 1860, lxxiii.

**Névroptères.** Note sur une nouvelle espèce (*trimaculatus*) du genre *Hemerobius*, 1859, 163.

**Hyménoptères.** Influence fâcheuse du mauvais temps sur les Abeilles, 1860, LXXIX.

**Lépidoptères.** Sur les apparitions de quelques Lépidoptères, 1859, CCXI.

Sur la vitalité de la *Aylina exoleta*, 1859, CCXXI.

Sur la *Coleophora* (*Ornix*) *gallipennella* et son fourreau rencontré sur le baguenaudier, 1859, CXXI.

**Anoploures.** Sur le *Lipcurus baculus* vivant sur des pigeons-paons, 1859, CXL.

**Arachnides.** Communication d'un *Phrynus bassamiensis*, nouvelle espèce, et d'une *Mygale* de Leblond avec ses dimensions, 1858, CCXXXIII.

**Crustacés.** Communication de Crustacés fossiles et actuels ; lectures de notes à ce sujet, 1858, CCXXXII.

Remarques sur l'*Astacus fluvialilis*, 1859, 137.

Note monographique sur les genres *Grabe* et *Platycarcin*, avec indication d'espèces nouvelles, 1859, 143.

**Articles généraux.** Détails sur divers animaux articulés recueillis par Péron dans son voyage aux terres Australes, 1857, CLIV.

Sur la rigidité musculaire qui suit l'action toxique de la benzine chez certains Insectes, 1858, CCXVIII, et 1859, 172.

Action de la benzine sur le *Sphinx convolvuli*, 1859, CCXX, et sur des Libellules et des Diptères, 1860, xcvi.

Considérations sur l'appareil alaire chez les Insectes, 1860, cx.

### GODART (le capitaine).

**Coléoptères.** *Staphylinus Mulsanti* trouvé dans les montagnes de l'Aude ; sa diagnose, 1850, LV.

*Balaninus cerasorum* sortis des noyaux du *Prunus spinosa*, 1850, LV.

Remarques sur les différences spécifiques des organes mâles de la génération dans les espèces françaises du genre *Cetonia*, 1851, 665.

Note sur la matière pulvérulente des *Larinus*, *Lixus*....., 1851, XIII.

Cas de monstruosité chez un *Lixus angustatus*, 1851, LXXXII.

Détails sur les dispositions sexuelles des *Geotrupes*, 1852, x.

### GODET.

**Lépidoptères.** Passage considérable de *Vanessa urticae* sur les bords du lac de Neuchâtel, 1832, 237.

**Articles généraux.** Quelques observations sur la manière de travailler en histoire naturelle, 1832, 34.

### GORY.

**Coléoptères.** Description d'un *Tetralobus* nouveau, 1832, 220.

Trois espèces de Coléoptères nouveaux (genres *Buprestis*, *Allocerus* et *Elater*), 1832, 883.

Description de deux Coléoptères nouveaux des genres *Rutela* et *Buprestis*, 1833, 67.

Centurie de *Carabiques* nouveaux, 1833, 168.

Deux *Rutela* nouvelles, 1834, 111.

Monographie du genre *Notiophygus*, 1834, 453.

Description de deux *Lamia* nouvelles, 1835, 139.

Description de deux Coléoptères nouveaux, 1836, 209.

*Tetralobus* et *Scarabæus* nouveaux, 1836, 513.

Note monographique sur le genre *Macrodonia* d'Audinet-Serville, 1839, 124.

### GOUDOT (Jules).

**Hémiptères.** Détails sur une espèce de *Cercope écumeuse*, de grande taille, commune à Madagascar, 1833, xxxvi.

### GOUDOT (Justin).

**Diptères.** Note relative à une nouvelle espèce de *Cuterebre*, 1844, xli.

**GOUDOT (Justin) et P. GERVAIS.**

**Myriapodes.** Description des espèces les plus intéressantes recueillies en Colombie par M. Goudot, 1844, xxvii.

Rectification du nom générique de la *Symphora luteola*, 1844, xlii.

**GOUGELET.**

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur M. le docteur Boucher, d'Eu, 1859, xxviii.

**GOUGELET et H. BRISOUT DE BARNEVILLE.**

**Coléoptères.** Description de Coléoptères nouveaux de Galice et d'Algérie, 1859, ccxxxvii.

Description de nouvelles espèces de Coléoptères, 1860, 335.

Synonymie de quelques espèces du genre *Ceutorhynchus*, 1860, 337.

**GOUREAU (le colonel).**

**Coléoptères.** Observations détachées pour servir à l'histoire de quelques Insectes, 1839, 531.

Note pour servir à l'histoire de l'*Attelabus curculionides*, 1841, 21.

Note pour servir à l'histoire du *Pissodes pini*, 1842, 53.

Note pour servir à l'histoire des métamorphoses des Coléoptères, 1842, 173.

Note pour servir à l'histoire de l'*Agrilus biguttatus*, 1843, 23.

Note pour servir à l'histoire du *Callidium sanguineum*, 1843, 99.

Réponse à la note de M. L. Dufour sur la composition segmentaire de quelques larves de Coléoptères, 1843, 257.

Note pour servir à l'histoire du *Phytonomus rumicis*, 1844, 49.

Note pour servir à l'histoire du *Morimus lugubris* et de la *Saperda scalaris*, et recherches sur la constitution céphalique des larves de *Longicornes*, et sur la position de la première paire de leurs stigmates, 1844, 427.

Note sur l'*Aspisoma candellaria*, 1845, 345.

Note pour servir à l'histoire des Insectes qui vivent dans les gousses du genêt épineux, 1847, 245.

Ravages causés aux pommiers par la larve de l'*Anthonomus pomorum*, 1852, LXXIX.

Note sur une larve de *Phytonomus fuscescens* trouvée sur une feuille de menthe officinale, 1856, XVIII.

*Balaninus villosus* éclos de la galle en pomme du chêne, 1856, CIV.

Differentes remarques sur plusieurs Insectes, 1857, XXVI.

Note sur l'*Erirhinus taniatus* dont la larve vit dans les chatons de la fleur femelle du saule marceau, 1858, XI.

Note sur les mœurs du *Rhynchites auratus*, 1860, V.

**Orthoptères.** Note sur la *Mante religieuse*, 1841, XVII.

**Hémiptères.** Remarques sur divers parasites qui ont blessé des *Aphis* et des *Coccus*, 1855, XXXVII.

**Hyménoptères.** Observations détachées pour servir à l'histoire de quelques Insectes, 1839, 531.

Note pour servir à l'histoire des Abeilles maçonnes et à celle de leurs parasites, 1840, 117.

*Ichneumon* innommé, parasite du *Callidium sanguineum*, 1843, 104.

Note sur le *Microgaster globatus*, 1845, 355.

*Ichneumon nigricornis* parasite de la *Plusia festuca*, 1845, 361.

Note sur le *Merismus obscurus*, 1846, 477.

Note sur la Mouche dont la larve mine les feuilles de l'iris des marais et sur d'autres larves mineuses, 1847, XLI.

*Cynips rosea* trouve en fauchant; note à ce sujet, 1852, LXXIV.

*Ichneumonides* et *Chalcidites* parasites de la chenille de l'*Ipomoeuta malinella*, 1852, LXXX.

Métamorphoses des *Eulophites*, 1853, LXIX.

Note sur une espèce de *Cimonus* se trouvant dans les tiges de char-don à bonnetier, 1855, VII.

Quelques faits relatifs à divers parasites qui vivent aux dépens des chenilles des *Ipomoeutides*, 1855, XXXV.

Communication sur les mœurs de la *Celia troglodytes*, 1856, CVIII.



Note sur les mœurs de divers Hyménoptères, 1857, CLVII.

*Figites* parasites des Diptères de la famille des Muscides, 1858, XVI.

Note sur les Hyménoptères de l'intérieur des tiges de la ronce, 1858, XXXIX.

Communication relative aux mœurs du *Cephus compressus*, 1858, CCKXXI.

**Lépidoptères.** Note sur la stridulation du *Sphinx Atropos*, 1840, 125.

Description de la chenille de *Plusia festucae*, 1845, 361.

Chenilles de la *Grapholitha succedana* trouvées dans les gousses de l'ajonc, 1847, 247.

Ravages que cause aux haies d'aubépine l'*Yponomeuta padella*, 1845, LXXX.

Note pour servir à l'histoire de l'*Yponomeuta padella* et à celle de ses parasites, 1847, 239.

Insectes des gousses du genêt épineux, 1847, 245.

Ravages causés aux pommiers par les chenilles de l'*Yponomeuta padella*, 1848, LXV.

Note pour servir à l'histoire de la *Sericoris antiquana*, 1851, 333.

Chenilles nuisibles aux pommiers, 1852, LXXIX.

Chenilles de *Myelophila cribrella* vivant dans les têtes du chardon à bonnetier, 1855, VI.

Note sur une dérogation aux habitudes de la *Perdisca corticana*, 1856, XIII.

Note sur les mœurs de la *Nepticula acerella*, 1860, XXII.

Exemple de parasitisme double, 1860, XXXIII.

**Diptères.** Note sur un Diptère dont la larve vit dans l'*Helix conspurcata* (*Melanophora heliocivora*), 1843, 77.

Mémoire sur les balanciers des Diptères, 1843, 299.

Réponse à la revendication de M. Robineau-Desvoidy sur l'usage des balanciers des Diptères, 1845, XII.

Note pour servir à l'histoire des Diptères dont les larves minent les feuilles des plantes, 1846, 233.

Note sur la larve qui mine les feuilles de l'iris des marais (*Oscinis nigerrima*), 1847, XL.

Note pour servir à l'histoire de l'*Anthomyia platura* et à celle de son parasite, 1849, 81.

Sur les mœurs, les ravages et les parasites de la *Cecidomyia tritici*, 1857, XII.

Insectes qui vivent dans les têtes de la *Carlina vulgaris*, 1857, XXVI.

**Articles généraux.** Essai sur la stridulation des Insectes, 1837, 31, 397; 1838, 401; 1839, 551.

Note sur les sons insensibles qui sont produits par les Insectes, 1837, 407.

Observations détachées pour servir à l'histoire de quelques Insectes, 1839, 531.

Observations sur les fonctions des antennes, 1841, XII.

Mémoire sur l'irisation des ailes des Insectes, 1843, 201.

Observations sur l'utilité de l'entomologie, 1844, 261.

Discours comme Président de la Société, 1845, 5.

Note pour servir à l'histoire des Insectes qui vivent dans le chardon penché, 1845, 75.

Lettre à M. Duponchel contenant des détails entomologiques, 1845, LXXIX.

Note sur les Insectes nuisibles à l'agriculture et à la sylviculture, 1851, XXXV.

Note sur les Insectes de la truffe, 1852, LXXV.

Note sur les Insectes nuisibles aux pommiers, 1852, LXXIX.

Réponse à la note de M. Mocquerys sur l'organe de l'odorat chez les Insectes, 1857, XVI.

Communication sur les moyens préservatifs contre les Insectes nuisibles, 1857, XXVIII.

**GOUREAU (le colonel) et LABOULBÈNE.**

**Lépidoptères.** Histoire des métamorphoses de la *Gelechia carlinella*, 1858, 263.

**GRAELLS (Mariano de la Paz).**

**Coléoptères.** Observations sur la cause de l'apparition des *Cebrio*, 1837, 93.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Dasytes*, 1842, 221.

Description de cinq espèces nouvelles de Coléoptères d'Espagne, 1847, 306.

Description de deux variétés nouvelles de la *Cicindela campestris*, 1847, 309.

Plusieurs *Megtucephala euphratica* trouvées en Espagne, 1847, cvi et cviii.

Note sur un *Mesites* que l'on avait cru nouveau, 1848, xxxvii.

Description de quelques Coléoptères nouveaux de la faune centrale de l'Espagne, 1851, 5.

**Lépidoptères.** Notice sur les métamorphoses de la *Chelonia Latreillei*, 1843, 359.

Description d'un Lépidoptère nouveau de la tribu des *Saturnides*, appartenant à la faune centrale d'Espagne, 1850, 241.

**Arachnides.** Notice sur divers faits qui confirment la propriété venimeuse du *Latrodectus malmignatus* Walk., 1842, 205.

**GRASLIN (de).**

**Lépidoptères.** Note sur une exploration entomologique en Andalousie, suivie de la description accompagnée de figures de plusieurs Lépidoptères nouveaux trouvés dans cette partie de l'Espagne, 1836, 547.

Notice sur la *Stilbia stagnicola* et description de cette espèce sous ses divers états, 1842, 303.

Histoire des mœurs et description de la chenille de la *Dianthæcia luteago*, 1842, 313.

Lettre tendant à établir que les *Anthocharis belia* et *ausonia* sont deux espèces distinctes, 1846, LXVI.

Exploration entomologique dans la France occidentale, 1848, 49.

Observation sur le travail de M. Abicot relatif à la *Zygana balearica*, 1849, LXXXII.

Notice sur quelques Lépidoptères nouveaux trouvés dans les Pyrénées orientales en 1847, 1850, 391.

Mémoire sur deux espèces nouvelles de *Leucania* trouvées sur les côtes de la France occidentale et sur une espèce inédite de Lépidoptères de la France méridionale (*Stilbia Philopalis*), 1852, 407 et LXXXII.

Notice sur une nouvelle espèce d'*Heliothis* trouvée sur la côte de la France occidentale, 1855, 65.

**Articles généraux.** Note sur le thérontome de son invention, 1857, XXXI.

### GRATIOLET.

**Diptères.** Larves de Diptères nourries aux dépens du *Lacerta viridis-sima* vivant, 1851, LXIII.

### GUENÉE.

**Lépidoptères.** Notice sur les mœurs de la chenille d'une espèce de *Nonagria* décrite par Treitschke et figurée par Hubner sous le nom de *paludicola*, 1833, 447.

Mémoire sur quelques chenilles des environs de Châteaudun, nouvelles ou peu connues, 1834, 193, et 1836, XLII.

Observations sur les coques du *Gastropacha lanestris*, 1835, LXIII.

Note sur les mœurs de la *Bryophila algæ*, 1837, 123.

Les *Bryophila algæ* et *receptricula* ne forment qu'une seule et même espèce, à laquelle il faut probablement rapporter comme variétés *calligrapha* et *mendacula*, 1837, 124.

Description d'un Lépidoptère du centre de la France, de la tribu des *Noctuides* (*Agrotis Villiersii*), 1837, 173.

Notice sur quelques nouveaux genres à établir dans l'ordre des Lépidoptères et principalement dans le genre *Noctua* de Linné, 1837, 219, 311; 1838, 107, 201; 1839, 473; 1841, 53 et 217.

Mémoire en réponse à celui publié par M. Duponchel sur la marche à suivre pour arriver à une bonne classification des Lépidoptères, 1838, 231.

Lecture d'une note tendant à expliquer les néologismes introduits dans la classification des Noctuéliides, 1838, vi.

Lettre en réponse aux observations de M. Duponchel sur la classification des Lépidoptères, 1838, LXV.

Réponse au second mémoire de M. Duponchel sur la manière d'établir une bonne classification dans l'ordre des Lépidoptères, 1839, 99.

*Noctuarum europæarum index methodicus*, 1841, 235.

Note sur l'*Ennonos illunaria*, 1842, 243.

Annonce d'un travail sur les *Microlépidoptères*; détails à ce sujet, 1842, LV.

Note sur trois espèces de Lépidoptères nocturnes, la *Zygæna balcarica*, le *Crambus pedriolellus* et la *Carpocapsa amplana*, 1843, XL.

Essai sur une nouvelle classification des *Microlépidoptères* et Catalogue des espèces européennes connues jusqu'à ce jour, 1845, 105, 135, 297.

Monographie du genre *Talæporia*, 1846, 5.

La variété de la chenille de l'*Acherontia Atropos* signalée par M. Bellier de la Chavignerie est décrite dans plusieurs auteurs et figurée dans Hubner, 1846, CXII.

De quelques espèces de *Tortrix* de Linné connues sous d'autres noms et des variétés de la *Pædisca solandriana*, 1847, 421.

Études sur les principaux auteurs en *Lépidoptérologie*, Fischer von Röslerstamm, 1848, 23.

Observations sur le genre *Thyathira* et réponse à la note de M. Bruand, 1850, 107.

Note sur la conformation du front dans plusieurs espèces de *Noctuelles* et sur les divisions du genre *Cleophana*, 1850, 233.

Particularité curieuse découverte sur le front de la *Polia felicina*, 1850, XVII.

Détails sur le procédé de décalcage des Lépidoptères, 1850, XXVII.

Note relative à la discussion avec M. Bruand touchant les *Noctuelles Batis* et *Dersa*, 1850, XXXIX.

Réclamation du droit de priorité, à l'égard de M. Herrich-Schæffer, relativement à beaucoup de genres de *Geometra* et aux *Crambus*, *Tortrix* et *Tinea*, 1856, XLVIII.

Communication de trois *Geometres* des plus curieuses, 1856, cx.

Note en réponse à M. Lucas sur la *Sesamia nonagrioides*, 1856, cxiv.

Note monographique sur les *Bombyx* européens du groupe du *Bombyx quercus* Linné, 1858, 435.

Note monographique et rectificative sur un groupe du genre *Morpho* Latr., 1859, 365.

**Articles généraux.** Note au sujet du nécrotome de M. Boisduval, 1838, xxvii.

Note nécrologique sur de Villiers, 1847, 619.

Discours comme Président de la Société, 1848, xi.

### GUENÉE et de VILLIERS.

**Lépidoptères.** Note sur une *Orgyia* nouvelle (*aurorimbata*), 1835, 635.

### GUÉRIN-MÈNEVILLE.

**Coléoptères.** Mémoire sur deux nouveaux genres de Coléoptères (*Pseudolytus* et *Calochromus*) et description des espèces qui le composent, 1833, 155.

Détails sur une quatrième espèce de *Callisthenes* trouvée en Perse, 1842, xlii.

Note sur les métamorphoses de l'*Apion apricans* et sur ses parasites, 1843, 65.

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères du genre *Myrmexenus*, 1843, 69.

Revue critique de la tribu des *Eucnemides*, 1843, 163.

Caractères d'un nouveau genre de *Cicindelètes* (*Callidema*), 1843, ix.

Détails sur une nouvelle espèce de Coléoptères du genre *Adesmia*, 1843, xlvii.

Lecture d'une note sur le genre *Holoparamesus* et sur sa synonymie, et description d'une espèce nouvelle de ce genre, 1844, v.

L'auteur reconnaît l'identité de son *Holoparamecus Pankouckii* avec le *Calyptobium caularum* Aubé, 1844, x.

Réponse à M. Aubé relativement à l'absence d'ailes chez le *Ptilium apterum* (*Trichopteryx aptera*), 1844, xi et xvi.

L'auteur fait connaître un travail de M. Redtenbacher intitulé : *Tentamen dispositionis generum et specierum Coleopterorum Pseudotrimerorum archiducatis Austriæ*, etc., 1844, xli.

Le *Curculio frumentarius* de Linné est certainement la *Calandra granaria* et non l'*Apion frumentarium*, 1845, v.

Note sur quelques Coléoptères trouvés dans la racine du *Squina*, 1845, xvi.

Nouvelle classification du groupe des *Bostrichides*, 1845, xvi.

Communication de quelques individus vivants de l'*Hylesinus crenatus* pris dans le parc de Saint-Cloud, 1845, xxviii.

Observations sur les mœurs et les métamorphoses du *Ceutorhynchus sulcicollis*, 1845, xxxiii.

Détails sur les mœurs de l'*Agapanthia marginella*, 1845, lxvi.

Détails sur les mœurs de l'*Altica oleracea*, 1845, lxvii.

Note sur les métamorphoses des *Mordella*, 1845, lxix.

Note sur la maladie des pommes de terre, 1845, lxxxvi.

Os celtiques perforés par des Insectes qui peuvent être des larves de *Corynetes*, 1845, lxxxvii.

Caractères d'un nouveau genre de *Cicindélites* découvert dans le Texas par M. Pilate (genre *Dromochorus*), 1845, xcv.

Lucanide nouveau de la Nouvelle-Zélande (*Ptilophyllum Godcyr*), 1845, xcvi.

L'auteur constate l'existence de 39 espèces d'*Anthia*, 1845, cix.

Larve de Hanneton renfermant deux Helminthes de plus d'un pied de long, 1845, cix.

Note sur le genre *Margus*, 1845, cxvii.

Communications à l'occasion des dégâts causés aux vignobles par l'*Eumolpus vitis*, 1846, xxxv.

Note sur la *Megaccephala* trouvée en Algérie par M. le major Blanchard, 1846, xxxviii et cii.



Note sur les mœurs du *Scolytus destructor* et de l'*Hyletinus varius*, 1846, LXIX.

Feuilles de betteraves ravagées par des larves de *Cassida nebulosa*, 1846, LXXI.

Note sur la manière de vivre d'une espèce de *Silpha*, 1846, LXXII.

Note sur les métamorphoses des *Donacia*, 1846, LXXV et LXXIX.

Lecture d'observations sur les mœurs et l'anatomie des *Scolytus des cerres* et spécialement sur le *Scolytus destructor*, 1846, LXXVII.

Communication de deux individus du *Diaprepes Doublierii* de Saint-Domingue, 1846, CIII.

Note sur deux *Carabiques* de la Nouvelle-Hollande (*Dicrochile Fabrii* et *anchomenoides*), 1846, CIII.

Larves de *Clythra* trouvées dans leurs coques près de Marseille, 1846, CV.

Communication d'une magnifique espèce d'*Ampedus* de France, 1846, CV.

Réclamation relative à la publication par l'auteur de l'histoire des métamorphoses du *Lirus turbatus*, 1847, VII.

Sur un insecte qui nuit aux moissons dans l'arrondissement de Barbezieux (*Calomobius*), 1847, XVII.

*Matachius bipustulatus* obtenu par M. Vallot, des tiges d'*Echium*, 1847, XXIII.

Note entomologique sur les travaux de l'auteur en entomologie appliquée, 1847, XLIV.

*Trachys nana* trouvée en assez grande quantité aux environs de Rouen, 1848, X.

*Dytiscus lapponicus* trouvé dans un lac des Alpes à une grande hauteur, 1849, XC.

*Gymnetron* trouvé dans les racines de la linaine, 1851, CI.

Tiges de rose trémière dont la moelle est percée de galeries qui contiennent une espèce d'*Apion*, 1851, CI.

Diagnose de la *Cicindela Truquii*, 1855, I.

L'*Atopa cervina* est très-abondante dans les Alpes, parce qu'on y trouve beaucoup d'Orchidées dont les tubercules servent de nourriture aux larves de cet insecte, 1855, LXXXIII.



Quelques détails de mœurs sur deux Coléoptères encore vivants et recueillis dans les Basses-Alpes (*Capnodis tenebrionis* et *Lyrus cylindricus*), 1856, LXX.

Note relative à l'emploi de la *Cetonia aurata* comme remède contre l'hydrophobie, 1857, xcvi.

Communication de diverses espèces de Coléoptères exotiques trouvés dans des substances coloniales, 1857, cxiv.

Communication de Coléoptères recueillis dans les oasis d'Ouargla (Algérie), 1857, cxv.

Description de deux Coléoptères du genre *Sepidium*, 1858, LXX.

Larves du *Trichoides alvearius* trouvées dans les nids de l'*Abrille maçonne*, 1858, CXI.

Note sur une nouvelle espèce de *Bruchus* parasite des semences de l'*Icama*, 1858, CCXXX.

Quelques-uns des résultats du voyage de l'auteur en France et en Algérie, 1859, CLXXXVI.

Réflexions sur l'étude des *Graphipterus* et tableau des espèces de ce genre, 1859, CCXXIV.

**Hémiptères.** Description d'une nouvelle espèce de *Fulgoro* de Java, 1845, xcvi.

Communication d'une petite *Lygæ* prise le 4 novembre à dix lieues de Toulon, 1846, civ.

Quelques mots sur la Cochenille de la fève, 1856, LXXIV.

Extrait d'un mémoire sur trois espèces d'Insectes Hémiptères dont les œufs servent à faire du pain au Mexique, 1857, CXLVIII.

Communication d'entomologie appliquée sur l'*Euricerus ceriferus* de Chine, 1858, LXVII.

**Névroptères.** Communication de la dépouille d'une nymphe de *Raphidia* qui, pendant sa vie, courait très-rapidement, 1845, XXXIV.

L'*Ascalaphus* communiqué par M. Pierret n'est pas l'*italicus*, mais le *longicornis* Linné, 1845, LXXV. (Voyez la note au bas de la page des Annales.)

La *Phryganea costata* de M. Boyer de Fonscolombe est identique avec la *Scricostoma collaris* des auteurs, 1846, 48. (Voyez la note au bas de la page des Annales.)

Détails, d'après M. de Cerisy, sur la larve de l'*Ascalaphus longicornis*. 1846, cxv.

Note sur des Termites que l'auteur a vus par troupes nombreuses à cinq ou six lieues d'Oran (Algérie), 1860, cv.

**Hyménoptères.** Lecture d'un extrait d'un grand mémoire sur les Insectes qui nuisent aux oliviers dans le midi de la France, 1844, LXXVI.

Communication de tronçons de saule défigurés et comme boursoufflés par la piqûre de petites larves jaunâtres que l'auteur présume appartenir à des Chalcidites, 1845, XXIX, XLI, LXX.

Ichneumonides paraissant être du genre *Calyptus*, parasites du *Centothyrus sulcicollis*, 1845, XXXIII.

L'appendice qu'on remarque entre les yeux d'une *Chrysanthida* mâle, dont le dessin a été communiqué par M. de Romand, paraît être une espèce de *Cryptogame*, 1848, LXXXVI.

Observations au sujet des parasites de l'*Abeille maçon*, 1858, cxi.

Galles de la *Cynips aptera* trouvées à Vincennes dans la terre au pied d'un chêne par M. le maréchal Vaillant, 1860, xciii.

Sur la galle en parasol dite *galle étoilée du chêne*, 1860, civ.

**Lépidoptères.** Ravages occasionnés par une espèce d'Alucite qui détruit les grains de blé dans le département de l'Indre, 1836, XLIII.

Branche de marronnier d'Inde dans laquelle a vécu une chenille de *Bryophila alga*, 1836, XLVI.

Aperçu rapide des mœurs d'*Œcophora olivella*, 1844, LXXVI.

Individu d'*Œcophora* trouvé dans une branche de saule, 1845, xli.

A Constantinople on nourrit le Ver à soie avec de la laitue, 1846, XIX.

Grande espèce de *Bombyx* prise à Nossi-Bé, 1846, cv.

Feuilles de betteraves rongées par la chenille de la *Noctua brassica*, 1846, cxvi.

Observations sur la *Muscardine*, 1847, cii; 1848, viii et LXVIII.

Observations sur le *Deilephila porcellus* qui présentait une sorte de végétation sur les yeux, 1847, cxviii.

Ravages faits par la chenille de l'*Yponomeuta padella* dans les plantations de pommiers, 1848, LXV.

Petite chenille parasite de la *Cochenille*, 1848, LXXIX.

Torts causés aux amandiers par la chenille de la *Pieris crataegi* et par celle de la *Procris pruni*, 1849, xv.

Influence du mode d'alimentation sur les Vers à soie, 1853, LX.

Quelques détails sur le *Bombyx cynthia* et sur les travaux de l'auteur, 1854, xxvii.

Considérations sur le Ver à soie du chêne, 1855, LV.

Sur la soie du *Bombyx mylitta*, 1855, LXVIII.

Note relative à l'éducation tentée par l'auteur du *Bombyx mylitta*, 1855, LXXXIX, xcix; 1856, xcvi, ci.

Cocons du *Bombyx aurota* rapportés du Paraguay, 1855, cviii.

Quelques faits d'entomologie appliquée, 1856, vi.

Grand nombre de chrysalides du *Papilio Alexanor* élevées à Paris, 1856, LXXIII.

Quelques détails sur la maladie régnante des Vers à soie, 1856, LXXIV.

Moyen d'obtenir des éclosions complètes des chrysalides, 1856, LXXXIII.

Causes de l'épizootie actuelle des Vers à soie; remèdes pratiques, 1857, x.

Quelques faits d'entomologie appliquée relatifs à l'industrie séricicole, 1857, xcvi.

Deux espèces confondues sous le même nom de *Bombyx cynthia*, 1857, xcvi.

Remarques sur trois individus éclos en France d'une *Saturnia* de Chine, 1857, cxvii.

Sur l'épidémie actuelle des Vers à soie, 1857, cxix.

Résultats d'un travail sur la richesse en soie des cocons du Ver à soie du ricin, 1857, cxxxviii.

Observations sur la maladie appelée *Gatine*, 1858, cix.

Communications sur la maladie des Vers à soie, 1858, cxliiv.

Détails sur le *Bombyx cynthia*, 1858, cli.

Communications sur la maladie de la *Gutine* et sur les essais faits pour s'en préserver, 1858, CLXV.

Nouvelles des éducations du *Saturnia Prometheus*, 1858, CLXVIII.

Remarques sur l'éducation du vrai *Bombyx cynthia*, 1858, CLXXXIII.

Observations sur l'éducation de l'*Attacus Prometheus*, 1858, CLXXXIV.

Observations sur le *Bombyx* du ricin (*cynthia*), 1858, CXCIII.

Remarques sur l'hybridation des Vers à soie du ricin et du vernis du Japon, 1858, CCIX.

Extrait d'un rapport sur l'emploi industriel de la bourre de soie des cocons du Ver à soie du ricin, 1858, CCXIV.

Communication des Vers à soie du ricin et du vernis du Japon et de ceux provenant du croisement de ces deux espèces, 1858, CCXV.

Quelques détails sur plusieurs éducations en France du Ver à soie de l'*aylante*, 1860, LXIV.

Note sur une *Muscide* parasite qui a nui aux éducations en plein air du Ver à soie de l'*aylante*, 1860, LXXXIX.

**Diptères.** Notice sur les métamorphoses des Cératopogons et description de deux espèces nouvelles des environs de Paris, 1833, 161.

Note sur les Insectes qui attaquent l'olivier et sur les mœurs du *Dacus oleæ*, 1845, LXVIII; 1847, X.

Note sur les migrations des larves de la *Sciara Thoma*, 1846, VIII.

Extrait d'un mémoire sur deux parasites de la Cochenille, 1848, LXXIX.

Note sur une petite larve aquatique qui a la propriété de s'attacher aux pierres du fond des eaux courantes au moyen d'un fil membraneux et contractile, 1860, CVII.

**Arachnides.** Communication d'une lettre de M. Recluz sur les effets produits par la piqure d'une *Araignée*, 1843, XLVII.

Quantités innombrables de larves d'*Acariens* sur les bourgeons des pêchers atteints de la maladie nommée le *meunier*, 1851, V.

**Crustacés.** Description d'un nouveau genre de *Crustacés Macroures* (*Isca elongata*), 1832, 295.

Notice monographique sur le genre *Lamnadia*; explications en réponse aux observations de M. Audouin, 1836, XIX.

Reçu de l'île de Cuba, par M. Poëy, une espèce nouvelle de *cellion*, 1837, VI.

Description d'un nouveau genre de Crustacés du groupe des *miens* (*Hypoconcha*), 1854, 329.

Communications de plusieurs petits Crustacés du genre *Phyllon* des naturalistes, mais qui ne sont que le premier état des *La goustes*, 1858, XLIV.

**Articles généraux.** Discours prononcé aux funérailles de Duponchel, 1846, IV.

Discours prononcé comme Président sortant, 1847, III.

Il ajoute quelques détails à la note de M. Goureau sur les Insectes de la truffe, 1852, LXXVI.

Détails sur les produits entomologiques présentés à l'Exposition d'Agriculture, 1860, LVIII.

### **GUËX.**

**Articles généraux.** Note nécrologique sur M. Melly, 1851, XXIV.

### **GUILLEMOT, de Thiers.**

**Lépidoptères.** Notice sur une hybridation des *Dicranura vinula* et *herminea*, 1856, 29.

### **GUYOT.**

**Coléoptères.** Communication d'une femelle de *Dytisque* à élytres presque lisses et faisant le passage entre le *circumcinctus* et le *dubius*, 1837, XVI.

## H.

**HAGEN, de Königsberg.**

**Névroptères.** Examen des Névroptères (non *Odonates*) recueillis en Sicile par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 746.

**HAROLD (baron de).**

**Coléoptères.** Diagnoses de nouvelles espèces d'*Aphodius*, 1860, 614.

**HELFER, de Prague.**

**Coléoptères.** Nova Species Europæa sectionis Trichidum, 1833, 495.

**HERMANN-ASMUS, de Dorpat.**

**Coléoptères.** Notice sur les *Apate elongata* et *substriata*, 1836, 625.

**HERPIN.**

**Coléoptères et Lépidoptères.** Note sur une machine de son invention propre à détruire les larves de *Charançons* et d'*Atucites*, 1849, xxvi.

**HOMBRES-FIRMAS (baron d').**

**Coléoptères et Lépidoptères.** Larves de *Dermestes lardarius* attaquant les cocons et les larves de Ver à soie, 1839, xlv.

**Orthoptères.** Notice sur les dégâts commis sur les mûriers aux environs d'Alais par la Sauterelle porte-selle (*Locusta ephippiger*), 1839, xxvii et xxx.

**HOPE.**

**Hyménoptères et Lépidoptères.** Il pense que plusieurs Lépidoptères d'un même groupe naturel, et se nourrissant des mêmes plantes, peuvent être attaqués par une même espèce d'*Ichneumon*, 1846, xxxix.

**Articles généraux.** Discours prononcé comme Vice-Président de la Société entomologique de Londres, 1834, xxix.  
Notice sur le docteur Leach, 1837, xxxiv.

**J.****Jacquin DU VAL.**

**Coléoptères.** Note sur les mœurs du *Claviger testaceus* (Duvallii), 1849, LXXII.

Belle aberration d'un *Calosoma sycophanta* pris à Toulouse, 1849, LXXIII.

Description d'un genre nouveau (genre *Chevrolatia*) et de quelques espèces nouvelles de Coléoptères, 1850, 45.

Note sur le mâle du *Vesperus Xatarti* Muls., 1850, 347.

Palpe monstrueux observé sur un *Bembidium*, 1850, 533.

Note sur quelques observations recueillies dans un récent voyage à Prades, 1850, xxiv.

De Bembidiis europæis, 1851, 441; 1852, 101, 523; 1855, 647.

Description de deux genres nouveaux (genres *Vulda* et *Meira*) et de plusieurs espèces nouvelles de Coléoptères propres à la faune française, 1852, 695.

Observations sur le lobe externe des mâchoires des *Gyrinus*, 1853, XLV.

Quelques remarques à l'occasion d'un *Mylabris* du midi de la France et qui doit être rapporté au *Myt. armeniaca*, 1853, LXVI.

Diagnoses de six espèces nouvelles et de deux genres nouveaux (genres *Phantazomerus* et *Moronillus*), 1854, xxvi.

Quelques remarques relatives à divers points de la classification des Coléoptères, 1854, lxxv.

Quelques détails sur le résultat de ses classes dans les Pyrénées Orientales, 1855, lxxx.

Discussion avec M. J. Thomson sur la pièce basilaire des palpes labiaux chez les Cicindélides, 1856, xciv.

Glanures entomologiques, 1857, 85.

Le *Strophosomus subnudus* Fairm. doit rentrer dans le genre *Metalites*, 1857, liii et lxxvii.

Le *Stenus carinifrons* Fairm. et Laboulb. ne peut être séparé de l'*impressipennis*, 1857, liv.

Notifs de la réunion par l'auteur des genres *Philhydrus* et *Helochares*, 1857, liv et lxxviii.

Explications sur la forme et la composition de la lèvre inférieure des *Histérides*, 1857, lv.

Le *Meligethes arvensis* est très-nuisible aux Crucifères dans le département de l'Oise, 1857, xci.

**Orthoptères.** Observations sur les mœurs de la *Meconema varia*, de la famille des *Locustes*, 1850, xlix.

**Hémiptères.** Observations sur les Hémiptères, 1849, xv.

Pris à Toulouse le *Micropus Genei*, détails sur cet Insecte, 1849, xvi.

Trouvé à Perpignan le *Pyrhocoris ægyptiaca*, et à Toulouse le *Stenocephalus neglectus*, deux *Micrclytra fossularum* Rossi, et un *Nabis subaptera* ayant des hémélytres atteignant l'extrémité de l'abdomen, 1849, xvii.

**Arachnides.** *Acarus* fort curieux extrait de l'épiderme d'une femme atteinte d'une maladie de la peau, 1856, cii.

### Jacquelin DU VAL et LAREVNIÉ.

**Coléoptères.** Quelques observations sur les Coléoptères des environs de Montpellier, 1852, 719 ; 1854, xxxviii.



**JAVET.**

**Coléoptères.** M. Haliday croit l'*Heterocerus sabulosus* identique avec l'*H. femoralis*, 1850, xxiv.

Diagnose de la *Loricera Wollastonii*, découverte à Madère par M. Wollaston, 1852, xxiii.

Dessin envoyé par M. Schmidt, représentant une tête très-grossie du *Polydrusus corruscus*, avec un ocelle au-dessus de l'œil droit, 1852, xxix.

Communication d'une larve rapportée à l'*Æpus fulvescens*, 1850, lxiii.

**JEKEL.**

**Coléoptères.** Lettre à M. Jacquelin Du Val sur le *Barypeithes rufipes*, 1855, xxvi.

Note relative à quelques points de la géographie de certains Curculionites, 1856, xlvi.

Communication sur trois espèces de Curculionites (les *Platytarsus setiger* et *aurosus* et le *Mitomerus hystria*), 1856, lxxii.

**JEKEL et SAUNDERS.**

**Coléoptères.** Description de quelques Curculionites, 1855, 289.

**K.****KIESENWETTER.**

**Coléoptères.** Énumération des Coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne, 1851, 385 et 577.

**Articles généraux.** Note sur les rectifications grammaticales des noms de genres, 1859, lix.

Note sur la nomenclature entomologique, 1859, cxcvii.

**KLUG.**

**Coléoptères.** Notes synonymiques, 1834, xxiv.

Note sur la description de deux genres nouveaux de Coléoptères de Madagascar (genres *Colobodera* et *Aulonocnemis*), 1837, LXXXVIII.

Note sur un mémoire de l'auteur sur la distribution systématique des espèces de la famille des Clairiens, 1838, XL.

**Névroptères.** Note sur un mémoire sur la famille des *Panorpates*, 1836, LXXV.

**KRAATZ.**

**Coléoptères.** Note sur les genres *Boreaphilus*, *Harpognathus* et *Macropalpus*, 1857, LIII.

Communication de plusieurs Coléoptères provenant principalement des grottes de la Carniole et de la Hongrie, 1858, LXXXVIII.

**L****LABOULBÈNE (Alex.).**

**Coléoptères,** Description d'une nouvelle espèce française de *Læmophlæus*, 1848, 295.

Observations qui indiqueraient que le *Ludius crocatus* est carnassier, 1848, xxxvii.

Études sur le genre *Æpus* de Leach et description d'une nouvelle espèce française, 1849, 23.

Détails anatomiques sur les larves des *Anobium abietis* et *striatum*, 1849, 311.

La *Ptosima 9-maculata* a pour parasite le *Chrysis ignita*, 1849, xxviii.

Note sur un palpe monstrueux observé sur un *Bembidium*, etc., 1850, 534.

Réponse à la note de M. Ch. Coquerel sur la prétendue poussière cryptogamique qui recouvre le corps de certains Insectes, 1850, 17.

Le gésier des Staphylins est revêtu intérieurement de séries de poils très-distincts, 1850, XLVIII.

L'*Elaphrus pyrenæus* Motsch. n'est qu'une variété de l'*uliginosus*, 1850, LXVII.

Le nombre des vaisseaux biliaires est de six et non de huit chez l'*Aro-bium tessellatum* comme chez les *An. striatum* et *abietis*, 1851, XLVII.

Le gésier de l'*Elater murinus* présente à l'intérieur quatre séries de poils, 1851, LXVII.

Éclosion de plus de mille *Triongulinus* qui seraient le premier âge des *Meloe*, 1851, LXVII.

Notes sur l'anatomie des Insectes, 1852, 335.

Description de plusieurs nouvelles espèces du genre *Gyretes*, 1853, 47.

Fruits d'*Ophris nidus-avis* perforés par l'*Otiorhynchus ovatus*, 1853, XLVIII.

Un *Hesperophanes* a dû vivre pendant dix ans dans le bois d'une chaise, 1853, LXIV.

Réflexions sur la nature de la poussière des *Lixus*, 1854, xvii.

Histoire des métamorphoses du *Ceutorhynchus Drabæ*, 1856, 145.

*Ceutorhynchus sulcicollis* obtenu de galles trouvées sur le *Synapis arvensis*, 1856, LXXXV.

Sur les mœurs et l'anatomie de la *Micralymma brevipenne*, 1858, 73.

Note sur des siliques de colza attaquées par des Insectes, 1857, 791.

Histoire des métamorphoses du *Larinus carlinæ*, 1858, 279.

Histoire des métamorphoses de l'*Orchestes rufus*, 1858, 286.

Description des métamorphoses du *Dasytes cæruleus*, 1858, 514.

Note sur les caroncules thoraciques du *Malachius bipustulatus*, 1858, 522.

Rapport sur la session extraordinaire de juillet 1858, 1858, 819.

Coléoptères de Grenoble, de la Grande-Chartreuse et du département des Hautes-Alpes (Congrès de Grenoble), 1858, 870.

Métamorphoses du *Gymnetron campanulæ* (Congrès de Grenoble), 1858, 900.

De la larve du *Rhinocyllus antiodontalgicus*, décrite par Gerbi, 1858, CCXLVI.

Examen anatomique de deux mâles accouplés du *Melolontha vulgaris*, 1859, 567.

Note sur une monstruosité de l'*Oryctes Silenus*, 1859, 645.

**Orthoptères.** Quelques détails sur l'*Acridium brevipenne*, 1849, xxiv.  
Détails anatomiques sur le *Bacillus gallicus*, 1857, cxxxvi.

**Hémiptères.** L'auteur parle de la génération alternante des Pucerons, 1852, LVI.

**Névroptères.** L'auteur n'a trouvé aucune trace du système nerveux chez la *Panorpa lusitanica*, 1856, xcvi.

**Hyménoptères.** Sur une éducation d'une centaine de *Cynips*, l'auteur n'a obtenu qu'un seul sexe, 1852, LVI.

Les *Conops* sont bien parasites des *Bombus*, 1854, LIX.

Histoire d'un *Ichneumon* parasite des Araignées, 1858, 797.

Observations sur les parasites de l'*Odynerus spinipes*, 1858, cxii.

**Lépidoptères.** L'une des ailes d'une *Vanessa Atalanta* plus petite que la correspondante, 1851, cxii.

Note sur le cocon du *Bombyx paphia*, 1852, 535.

Fleurs du *Chrysanthemum leucanthemum* habitées par des chenilles de Microlépidoptères, 1857, LXXXIX

Chenilles de *Cochylis rosrana* prises sur des ceps de vignes à Villefranche-sur-Saône, 1857, xc.

Lépidoptères recueillis pendant la session extraordinaire de Grenoble en 1858, 1858, 882.

La Tintide des têtes de la *Carlina* est, selon M. Stainton, la *Parasia carlinella*, 1858, xxxii.

**Diptères.** Métamorphoses de la *Cecidomyia papaveris* et remarques sur plusieurs espèces du genre *Cecidomyia*, 1857, 565.

Note sur la nymphe de l'*Anthrax sinuata*, 1857, 781.

Nids d'Hyménoptères dont il est sorti deux *Anthrax morio*, 1857, xc.

Note sur des Helminthes trouvés dans l'*Asilus crabroniformis*, 1857, cxliii.

Larve qui vit dans les siliques de colza et qui, probablement, n'est autre que la *Cecidomyia brassicæ*, 1857, xc.

*Anthrax sinuata* parasite de l'*Odynerus spinipes*, 1858, cxii.

Trouvé dans Schæffer les figures de la larve et de la nymphe d'un *Anthrax*, 1858, cxiii.

**Arachnides.** Description de quelques *Acarieus* et d'une *Hydrachne*, 1851, 295.

Description et figure du *Tyroglyphus* (*Cheyletus*) *Mericourti*, 1851, 301.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur M. Émile Charre, 1848, xxxix.

Galles observées sur une branche de Tamarix, et petites nymphes trouvées dans un herbier, 1855, xviii.

Note sur des siliques de Colza attaquées par des Insectes, 1857, 791.

Note sur les galles du *Calligonum comosum* et du *Limoniastrum Guyonanum*, 1857, lx.

Rapport sur la session extraordinaire tenue à Grenoble, 1858, 819.

L'auteur présente quelques considérations générales sur l'asphyxie par la benzine, 1859, ccxxi.

Allocution prononcée le 16 août 1860 aux funérailles de M. Duméril au nom de la Société entomologique de France, 1860, 651.

Paroles prononcées comme Président de la Société à la séance du 25 janvier 1860, 1860, ix.

### **LABOULBÈNE et AMBLARD.**

**Articles généraux.** Communication d'une galle de *Quercus Mirbeckii*, de la Kabylie, 1853, xxvi.

### **LABOULBÈNE et FOLLIN.**

**Coléoptères.** Note sur la matière pulvérulente qui recouvre la surface du corps des *Lixus* et de quelques autres Insectes, 1848, 301.

**LABOULBÈNE et colonel GOUREAU.**

**Lépidoptères.** Histoire des métamorphoses de la *Gelechia cartinella*, 1858, 263.

**LABOULBÈNE et REICHE.**

**Coléoptères.** Note sur quelques espèces de Coléoptères que M. Gaubil se propose de décrire dans les Annales de la Société, 1852, xxxvi.

**LACERDA (Antonio de).**

**Lépidoptères.** Détails sur les éducations de Vers à soie tentées à Bahia, 1860, LXIX.

**LACORDAIRE (Ch.).**

**Coléoptères.** Notice sur l'entomologie de la Guyane française, 1832, 348.

Note tendant à rectifier l'habitat de quelques Mélasomes, 1836, 247.

Remarques à l'occasion du genre *Metonius* créé par Th. Say dans un recueil américain, 1849, LXXVIII.

Note relative au *Macropalpus pallipes* de M. E. Cussac, 1854, xviii.

**Hémiptères.** Observations relativement à la phosphorescence des *Fulgora*, 1834, LXIII.

**Lépidoptères.** Notice sur les habitudes des Lépidoptères Rhopalocères de la Guyane française, 1833, 379.

L'auteur a vu souvent des chrysalides de *Sphinx* résistant à une chaleur de 60°, 1834, xxiv.

Lettre à M. Duponchel sur la discussion entre lui et M. Guenée relativement au rôle que doivent jouer les chenilles dans la classification des Lépidoptères, 1839, 595.

**Articles généraux.** Notice sur M. Ch. Robert, 1837, xxxi.

**LAFERTÉ-SÉNECTÈRE (marquis de).**

**Coléoptères.** Notice sur un nouveau genre de *Carabiques* de la tribu des *Harpaliens* (genre *Gynandrotarsus*), 1841, 201.

Notice sur les *Anthicus* recueillis aux environs de Perpignan et description de quelques espèces nouvelles, 1842, 247.

Question de synonymie soumise à la Société à l'occasion du genre *Notoxus*, 1846, xxii.

Description de quelques Carabes nouveaux de l'Espagne et du Portugal, 1847, 445.

Révision de la tribu des *Patellimanes* de Dejean, 1851, 209.

**Articles généraux.** Détails sur l'état grassey des Insectes dans les collections, 1843, xviii.

**LAFONT (E.).**

**Articles généraux.** Notice biographique sur Jules Pradier, 1858, ccvii.

**LALLEMANT.**

**Coléoptères.** Note sur les mœurs du *Prinobius lethifer*, 1859, cxxxvii.

**LAMBERT (Paul).**

**Coléoptères.** Quelques détails sur deux cas de parasitisme observés sur des Coléoptères, 1851, xxii.

Entozoaire extrait du corps d'une *Amara*, 1851, lxxxiii.

Monstruosité chez un *Ptinus fur*, 1851, lxxxviii.

**LAPORTE (comte de CASTELNAU).**

**Coléoptères.** Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'Insectes, 1832, 386.

Essai d'une révision du genre *Lampyre*, 1833, 122

Monographie du groupe des *Rhypicériles* (Coléoptères pentamères), 1834, 225.

Larve que l'auteur regarde comme celle du *Carabus hortensis* ; détails de mœurs, 1837, LV.

Communication des *Goliathus cacicus* et *princeps*, dont le premier serait le mâle et l'autre la femelle d'une même espèce, 1841, LVIII.

Quelques observations entomologiques recueillies pendant un voyage dans l'Amérique du Nord, 1842, XII.

**Hémiptères.** Notice sur un nouveau genre de l'ordre des Homoptères (genre *Heteronotus*), 1832, 95.

Mémoire sur quelques nouveaux genres de l'ordre des Homoptères, 1832, 221.

Note sur un nouveau genre et un nouvel Insecte Homoptère (*Caliscelis heterodoxa*), 1833, 251.

Réponse au mémoire de M. L. Dufour sur le *Prostemma guttula*, 1884, VII.

Rectification des Homoptères de la 29<sup>e</sup> livraison des Illustrations de Zoologie de M. Lesson, 1836, VII.

**Articles généraux.** Notice sur le système nerveux des Insectes, 1836, XXXII.

Essai pour servir à l'histoire des Sociétés entomologiques, 1837, 5.

### **LAREYNIE (Philippe).**

**Coléoptères.** Détails sur les *Quedius curtus*, *Cyrtonus Dufourii* et *Phytæcia ephippium*, 1851, LIII.

Description de trois nouvelles espèces de *Ptiniores*, 1852, xc ; 1853, 127.

Liste des Insectes récoltés en Corse par l'auteur, 1859, 266.

**Arachnides.** Note sur le *Theridium malmignatha*, 1859, 284.

### **LAREYNIE (Philippe) et Jacquelin DUVAL.**

**Coléoptères.** Quelques observations sur les Coléoptères des environs de Montpellier, 1852, 719.



**LATREILLE.**

**Coléoptères.** Distribution méthodique et naturelle des genres de diverses tribus d'Insectes Coléoptères de la famille des *Serricornes*, 1834, 113.

**Articles généraux.** Discours prononcé à l'ouverture des séances de la Société, 1832, 22.

**LAVICE, d'Avesnes.**

**Lépidoptères.** Les *Peronea christana* et *nyctemerana* trouvés accouplés ensemble, 1834, LXI.

**LEDoux.**

**Coléoptères.** Nouvelle espèce du genre *Enoplium*, 1833, 474.

**LEFEBVRE (Alexandre).**

**Coléoptères.** Lecture d'une lettre sur une apparition extraordinaire de *Melolontha vulgaris*, 1832, 236.

Quelques renseignements sur le *Graphipterus variegatus*, 1832, 311.

*Gyrinus lineatus* trouvé au pied du dernier cône de l'Etna, à 10,000 pieds au-dessus de la mer, 1832, 425, et 1833, xxxviii.

Observations sur l'identité de la *Megacephala Adonis* avec la *M. Laportei*, 1834, xxv.

Description d'un Coléoptère nouveau du genre *Clerus* sous ses divers états, 1835, 575.

Extrait du travail de M. Wesmaël sur les Coléoptères carnassiers de la Belgique, 1835, xxxviii.

Critique sur l'opinion de M. le marquis Spinola sur la cause des anomalies, 1835, xl.

**Orthoptères.** Communication d'un article de la *Gazette des Hôpitaux* qui rapporte que près de Marseille des paysans ont, en trois jours, recueilli 380 kilog. d'œufs de *Sauterelles*, 1832, 314.

Lecture d'une monographie du genre *Eremiaphila* ; discussion à l'occasion du nombre d'articles de leurs tarses, 1833, LXVIII.

Nouveau groupe d'Orthoptères de la famille des *Mantides*, 1835, 449.

M. Géné n'a point rencontré en Sardaigne le *Gryllus megacephalus* qu'il avait découvert en Sicile, 1835, LXXVII.

**Hémiptères.** Système ptérogaphique applicable à la classification d'une tribu d'Hémiptères Homoptères, celle des *Membracides*, 1842, xx.

Réclamation adressée à MM. Amyot et Serville au sujet du nom du genre *Macrocerina*, 1848, 199.

**Névroptères.** Larve d'un Névroptère du genre *Ascalaphus* découverte par M. de Cerisy près du Fort-Rouge, à Toulon ; détails à ce sujet, 1842, xvii.

**Hyménoptères.** Extrait des observations de M. Wesmâël sur les Hyménoptères du genre *Sphecodes*, 1835, LXV (1).

**Lépidoptères.** Caractère distinctif entre quelques *Satyres* européens de la section des *Leucomelanien*s, 1832, 80 et 440.

Observations sur les *Pardisca semimaculana* et *ratana* trouvés accouplés, 1832, 231.

Remarque sur l'accouplement de *Zygana ephialtes* ♂ avec *Zyg. filipendula* ♀, 1832, 232.

Observations sur la phosphorescence de la chenille de la *Noctua occulta*, 1832, 424.

Note sur le *Satyre d'Arcet* et description latine qu'en donnent MM. Emprich et Ehrenberg dans leur *Symbolæ physicae*, 1832, 440.

L'auteur a trouvé en Égypte diverses chrysalides qui, bien que propres à nos climats tempérés, résistent à un soleil d'aplomb de plus de 60°, 1834, xxiv.

Note sur l'identité de *Satyrus Anthelia* avec *Telephassa*, 1834, xxv.

Observations sur le *Bombyx rubi* qui, après avoir été gelé, continue de se chrysalider et de se métamorphoser au printemps, 1834, xxxiii.

Rectification de la *Nyssia pomonaria*, 1835, 101.

(1) Le folio de cette page devrait être LXXV.

Description d'un *Argus Alexis* hermaphrodite, 1835, 145.

Divers autres exemples d'hermaphrodismes, 1835, 146.

M. Gén   n'a rencontr   en Sardaigne aucun L  pidopt  re du group des Leucom  laniens (genre *Arge*), 1838, LXXXVII (1).

Description d'une nouvelle esp  ce de *Coliade* (*Hecla*), 1836, 383.

Description de quelques L  pidopt  res nocturnes hyperbor  ens, 1836, 389.

L'auteur regarde comme vari  t  s de l'*Eupheno* les *Anthocharis gallo-algirus* de M. Barth  lemy et *Do  lei* de Pierret, 1836, VI.

Sur les variations que pr  sentent les taches noires dans les ailes des *Satyres leucomelaniens*, 1836, LXXII. (Voyez l'*errata*    la fin du volume.)

Description de l'*Argynnis Selenis* (Eversmann), 1837, 15.

Observations relatives    l'empreinte d'un L  pidopt  re fossile (*Cylo-sepulta*) du docteur Boisduval, 1851, 71 et xcvi.

Note sur une chenille qui est venimeuse seulement quand la plante dont elle se nourrit l'est elle-m  me, 1851, xxv.

**Dipt  res.** D  g  ts caus  s sur les bl  s dans le d  partement de l'Eure par une esp  ce de *Cecidomyia*, 1835, LV.

Note sur l'*Empis platyptera*, 1851, 125.

**Arachnides.** Observations de M. le docteur Joffre sur la propri  t   f  brifuge de la toile d'Araign  e, 1833, ix.

**Myriapodes.** *Scolopendre* rejet  e par une femme de ses sinus frontaux par des   ternuements, 1833, LXV.

Annonce, de la part de M. le docteur Huet, qu'un enfant, paraissant atteint d'une maladie vermineuse, se r  tablit peu    peu, apr  s avoir rendu, au dire de sa m  re, une *Scutigera coleoptrata*, 1834, xxviii et xxxviii.

**Crustac  s.** *Trilobite* nouveau (*Brongniartia trilobitoides*) d  couvert par M. Eights aux   les de la Nouvelle-Sh  tland, 1835, XLIV.

**Articles g  n  raux.** Compte rendu d'un m  moire de M. Dutrochet ayant pour titre : Du m  canisme de la respiration des Insectes, 1833, x.

(1) Le texte des Annales indique par erreur LXXVII.

Il fait part des expériences de MM. van der Weghe et Morren sur l'effet des décharges électriques sur les Insectes, 1834, xxxviii

Note au sujet d'un mémoire de M. J. Tyrrell sur la circulation du sang chez les Insectes, 1835, xlv.

Note sur le sentiment olfactif des antennes, 1838, 395.

Note sur certains Insectes qui prennent la couleur des terrains sur lesquels ils se tiennent, 1851, xxiv.

### LEGRAND.

**Vers.** Description du *Gordius dytiscorum*, Entozoaire rendu vivant par un *Dytiscus marginalis*, 1858, clxxxv.

### LE GUILLOU.

**Hyménoptères.** Catalogue raisonné des Insectes Hyménoptères recueillis dans le voyage de circumnavigation des corvettes l'*Astrolabe* et la *Zélée*, 1841, 311.

### LEPAIGE.

**Coléoptères.** Note sur l'accouplement du *Campylus linearis* ♂ avec le *C. mesomelas* ♀, 1845, xiii.

### LEPELETIER comte DE SAINT-FARGEÂU.

**Hyménoptères.** Mémoire sur le genre *Gorytes*, 1832, 52.

Observations sur l'ouvrage intitulé : *Bombi Scandinaviæ monographice tractati* par Gustave Dahlbom, 1832, 366.

Description de trois nouvelles espèces du genre *Cimbex*, 1833, 454.

Remarque sur les caractères donnés par M. Klug au genre *Syzygonia*, 1833, 456.

Exemples d'Insectes qui semblent carnassiers et ne le sont pas, 1834, xl.

Réponse aux observations de M. L. Dufour sur les *Crabro*, 1838, 415.

**Arachnides.** Faculté qu'ont les Araignées pour la reproduction de leurs pattes cassées, 1832, 238.

**LEPELETIER comte DE SAINT-FARGEAU  
et BRULÉ.**

**Hyménoptères.** Monographie du genre *Crabro*, de la famille des *Hyménoptères fouisseurs*, 1834, 683.

**LEPRIEUR.**

**Coléoptères.** Détails sur les Coléoptères des environs de Dieuze, 1845, XCIV.

Détails sur les Coléoptères des environs de Metz et de Dieuze, 1846, CV.

Antenne droite d'un *Colymbetes bipustulatus* offrant un faciès anormal, 1847, LXIV.

Mœurs et métamorphoses du *Spercheus emarginatus*, 1850, XXXIV.

Méthode dichotomique appliquée au genre *Stenus*, 1851, 191 et CXVII.

Description du *Stenus deficiens*, 1851, 199.

Détails sur les chasses de l'auteur aux environs de Bone. 1852, VII; 1853, LVII; 1855, X; 1859, CCXI.

Quelques mots sur l'*Hydrophilus inermis*, 1854, 69.

L'auteur pense, d'après plusieurs observations, que le *Teretrius picipes* est parasite des *Xylopertha*, 1859, CXCIII.

**Articles généraux.** Observations sur l'action de la benzine et du chloroforme sur les Insectes, 1859, CCXXI.

**LESPÈS (Ch.).**

**Coléoptères.** Note sur les mœurs de la *Lomechusa paradoxa*, 1855, LI.

**Névroptères.** Apparition nombreuse de *Termites* signalée il y a une quinzaine d'années à quelque distance de Toulouse; détails sur l'anatomie et les mœurs de ces Névroptères, 1860, CVI.

**Hyménoptères.** Communication relative au nid et aux larves d'une espèce d'*Odynères*, 1855, LVIII.

**LEVAILLANT (général).**

**Lépidoptères.** Notice sur le *Papilio Feisthamelii*, 1848, 407.

**LHERMINIER.**

**Coléoptères.** Observations sur les habitudes des Insectes à la Guadeloupe, 1837, 497.

**LINDER, de Strasbourg.**

**Coléoptères.** Détails sur une excursion dans les Pyrénées et aux environs d'Auch, 1858, CLVIII.

Description de trois nouvelles espèces d'*Anophthalmus* trouvées en France, 1859, 71.

Description d'un nouvel *Anophthalmus* français, 1859, CCLVIII.

Description de deux nouveaux Coléoptères pyrénéens (genres *Anophthalmus* et *Harpalus*), 1860, 611.

**LOREY.**

**Coléoptères.** Notice sur la découverte d'un *Cryptocéphale* nouveau, 1837, 125.

**LORQUIN.**

**Lépidoptères.** Détails entomologiques sur les Lépidoptères de Californie, 1852, LVI.

**Articles généraux.** Extrait d'une lettre adressée à M. le docteur Boisduval sur son exploration des îles Philippines, 1860, xcviil.

**LUCAS (Hippolyte).**

**Coléoptères.** Notice sur une monstruosité qui se trouve dans une antenne droite d'un *Corymbetes coriaceus* Hoffm., 1843, 55.

Note sur plusieurs Coléoptères nouveaux du nord de l'Afrique nés à Paris, et leurs diagnoses, 1843, xxiv; 1846, LIII, et 1848, LXIII.

Observations pour servir à l'histoire naturelle de l'*Ergates faber*, 1844, 161.

Observations pour servir à l'histoire naturelle du *Buprestis (Chalcophora) mariana*, 1844, 315.

*Carabus auratus* dont le corselet et les élytres présentent diverses anomalies, 1845, xxxvii.

Deux variétés remarquables du *Melolontha vulgaris* rencontrées aux environs de Bicêtre, 1845, xxxviii.

Communication d'un *Ergates faber* dont les élytres et une partie des pattes sont avortées, 1845, LXXX.

Communication de plusieurs branches de *Populus tremula* attaquées par des larves de Longicornes (*Campsidia populnea*), 1846, XLVII.

Cas de difformité chez un *Carabus nodulosus*, 1847, xxxix, et 1848, XVIII.

Communication des Coléoptères recueillis dans le Djebel-Amour par M. le colonel Levaillant, 1847, cix.

Détails sur la larve de l'*Heterophaga opatroides*, 1848, XIII, et 1855, XVIII.

Communication et description d'un Curculionide du genre *Coniatus* (*C. chrysochlora*), 1848, xvii, 1849, xxvii; 1850, 29.

Cas de monstruosités fort remarquables offerts par un *Solenophorus strepens*, 1848, xviii.

Communication et diagnoses de deux Coléoptères du nord de l'Afrique (*Elaphocera rubripennis* et *Clytus 5-punctatus*), 1848, XLVII.

Communication à l'occasion du *Bostrichus nigriventris*, 1849, xxx.

Communication d'un Coléoptère du genre des *Arrhenodes* dont les pattes, les parties buccale et gastrique sont envahies par un *Uropoda*, 1849, xxxiv.

Larve de Coléoptères présentant sur sa partie céphalique une plante parasite du genre *Sphaeria*, 1849, xxxix.

Communication et description de l'*Aspidimorpha quadriremis*, 1849, LII.

Communication d'un *Carabus cancellatus* présentant un cas particulier d'anatomie pathologique, 1849, Lxi.

- Communication d'une variété curieuse du *Zonitis nigripennis*, 1849, LXIII.
- Note sur les mœurs du *Nanodes tamarisci*, 1849, LXIV.
- Note sur la *Gracilia timida* obtenue d'éclosion à Paris, 1849, LXVI.
- Communication d'un *Carabus punctato-auratus* offrant un cas de tératologie curieux, 1849, LXXXVII.
- Communication d'un *Carabus* nouveau qu'il désigne sous le nom d'*Aumontii*, 1849, XCII; 1857, CLVI.
- Observation sur un nouveau genre de l'ordre des Coléoptères qui habite le nord de l'Afrique (genre *Stenomera*), 1850, 31.
- Description de trois nouvelles espèces de *Dasisterna*, 1850, 515.
- Communication et courte description de la *Morica Jeveni*, 1850, III.
- Description de l'*Eurychora Levaillantii*, 1850, VI.
- Idesmia Courcyi* reçue de l'Algérie; sa description, 1850, XI.
- Dégâts causés aux *Pinus laricio* du Jardin-des-Plantes par le *Dendroctenus piniperda*, 1850, XLVIII.
- Note sur la manière de vivre du *Graphipterus exclamatoris*, 1850, LXI.
- Observations sur les métamorphoses de la *Titubiza (Clythra) octo-signata*, Fabr., 1851, 20.
- Réponse à M. Chevrolat sur le *Purpuricenus barbarus*, 1851, x.
- Description d'une nouvelle espèce de Longicornes d'Algérie (*Clytus consobrinus*), 1851, XXXI.
- Description d'une nouvelle espèce de *Phytæcia* des environs de Tlemcen (Algérie), 1851, XLII.
- Communication et description d'un Longicorne de la famille des Priornites (*Mallaspis Moreletii*), 1851, LXV.
- Le bruit et les secousses n'empêchent pas les *Valgus hemipterus* de se métamorphoser, 1851, LXXXIII.
- Communication et courte description d'un Longicorne du groupe des Callidiites, la *Sympiezocera Lauasii*, d'Algérie, 1851, CVI.
- Mémoire sur les métamorphoses observées chez les *Elaterides* et description et figure de la larve de l'*Igrypnus atomarius* Fabr., 1852, 261.



Nouvelles observations sur les fourreaux de la *Titubana* (*Clythra*) *alsignata* Fabr. et de la *Lachnæa vicina* Lacord., 1852, 463.

Note sur les mœurs de la larve du *Clerus formicarius*, 1852, v.

Note relative à une variété du *Broscus* (*Cephalotes*) *politus*, 1852, XIV.

Communication d'une planche représentant deux genres nouveaux de Coléoptères, *Oochrotus* et *Merophysia*; note à ce sujet, 1852, XXVIII, et 1854, XLIII.

Communication de plusieurs *Megacephala euphratica* prises entre Totana et Murcie (Espagne); note à ce sujet, 1853, iv.

*Bolboceras Bocchus* et *Hybalus cornifrons* trouvés souvent dans l'estomac d'un *Bufo pantherinus*, 1853, v.

Note au sujet de la synonymie du *Thorectes rotundatus*, 1853, xi.

Note sur l'*Hybalus Doursii*, 1853, xxii.

Communication de plusieurs branches de mûrier provenant d'Espagne profondément perforées par des larves d'*Apate francisca*, 1853, LVII.

Note sur le *Buprestis* (*Ancylocheira*) *Bellemaræi*, 1853, LXVII.

Communication d'un *Anoplognatha analis* présentant un cas pathologique curieux, 1854, III.

Note sur un nouveau genre de la famille des Longicornes (*Icosium tomentosum*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique, 1854, VIII, et 1857, 609.

Communication d'un fragment de planche de peuplier creusé de galeries profondes, 1854, XXXIV.

Note sur une espèce algérienne et nouvelle du genre *Faronus*, le *Faronus Aubci*, 1854, XXXIV.

Note sur l'*Atomaria linearis*, qui nuit beaucoup aux betteraves, 1854, XXXIX.

Communication d'un Coléoptère curieux devant former une coupe générique nouvelle, 1854, XLII.

Communication de larves et de coques de l'*Acanthophorus serraticornis*, Coléoptère abondant dans l'Inde, 1854, XLVII.

Note sur le *Tribolium castaneum* (*Mergus ferrugineus*) et ses métamorphoses, 1854, LI, et 1855, 249.

Remarques synonymiques sur les genre *Hybalus* et observations sur les espèces qui habitent les possessions françaises du nord de l'Afrique, 1855, 535.

Note sur l'*Harterius punctulatus* trouve dans une fourmilière en Algérie, 1855, III.

Communication d'une planche représentant un genre nouveau de la famille des *Melanosomes*; note sur le *Micipsa rufitarsis*, 1855, XXXIV.

Note sur le *Carabus Adonis*, 1855, LXXII.

Communication de faits relatifs à la géographie entomologique de deux Coleoptères : l'*Hopophus atriplicis*, dont l'auteur donne la synonymie, et le *Chilanius holosericeus*, 1855, CII.

Communication d'un *Trichops ephippiger*, Longicorne trouvé vivant à l'Exposition universelle sur des bois provenant de la Nouvelle-Galles du Sud, 1855, CVI.

Note sur quelques nouvelles espèces de *Tentyria* qui habitent le sud des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, 1856, 697.

Note sur une nouvelle espèce du genre *Morica* (*M. Jeceni*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique, 1856, 711.

Note sur le *Micipsa Douci*, 1856, XLV.

Quelques remarques sur la viviparité de certains Coleoptères, 1856, LXXXVII.

Note sur les métamorphoses de l'*Alphitobius mauritanicus*, précédées de quelques remarques synonymiques sur les espèces de ce genre, 1857, 71.

Un nouveau genre de la famille des Longicornes (*Icosium tomentosum*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique, 1857, 609 et CLXV.

Note sur le mâle du *Clytus Hartwegii*, 1857, XLVIII.

Espèces recueillies par le docteur Mares au Sahara algérien, 1857, LV.

*Rhizotrogus Guyonii*, nouvelle espèce d'Algérie, 1857, LXXXVI.

Remarques sur plusieurs Coleoptères du sud de l'Algérie, 1857, LV.

Communication et description d'un Curculionite nouveau (*Amanchus Cottyi*), 1857, CXXIV.

Communication de plusieurs individus des deux sexes du *Carabus melancholicus* provenant de Tanger, 1858, IV.

Note sur le *Spermophagus semi-fasciatus* trouvé dans des haricots de La Plata, 1858, xxviii.

Note sur les mœurs de l'*Altica anchusæ*, 1858, lxxx.

Note sur des Coléoptères d'Algérie et diagnoses, 1858, clxxvii.

Note au sujet de la *Gracilia pygmæa*, 1858, cl.

Note contenant la description du *Piestognathus Douei*, 1858, clxxxvii.

Description de plusieurs Mélanosomes nouveaux du nord de l'Afrique, 1858, ccxx.

Description de deux nouvelles espèces de *Chlænius*, 1858, ccxxvii.

Quelques remarques synonymiques sur les *Dasysterna hirticollis* et *unicolor*, et description de plusieurs nouvelles espèces, 1859, 445.

Note sur une variété curieuse du *Carabus lotharingus*, 1859, vi.

Note sur le *Rhizotrogus suturalis*, 1859, xvii.

Note contenant les diagnoses de trois nouvelles espèces du genre *Pachydema*, 1859, xxx.

Note contenant la description de la *Phyllopertha deserticola*, nouvelle espèce d'Algérie, 1859, lii.

Nouvelle coupe générique de *Cétonides* (*Enoplolarsus*), 1859, xcvi.

Note sur une rectification synonymique du *Rhythirinus humilis*, 1859, xcix.

Communication et description de deux espèces nouvelles de Mélanosomes du nord de l'Afrique (*Morica Favieri* et *Akis tingitana*), 1859, cxiii.

Rectification au sujet du *Chlænius Favieri*, 1859, clxxxi.

Diagnoses de deux nouvelles espèces de *Julodis* (*cicatricosa* et *Jamini*), 1859, clxxxii.

Note sur les mœurs de la *Sitaris muralis*, 1860, xviii.

Description d'une nouvelle espèce de Buprestide du genre *Julodis* (*J. Aristidis*), 1860, xxvii.

Note sur les mœurs de la larve de l'*Anobium pertinax*, 1860, xxx.

Note au sujet des dégâts causés au *Glaucium flavum* par le *Ceuthorrhynchus Raphaëlis*, 1860, lxvi.

Rapport sur l'identité ou la non-identité des *Oxythyrea Noemi* et *albopicta*, 1860, xcix.

- Orthoptères.** Communication de trois individus de l'*Acridium peregrinum* envoyés de Constantine; note sur cet Insecte, 1845, xxxi, xxxix et l.
- Communication de plusieurs Orthoptères de l'Algérie et d'une planche les reproduisant, 1845, lx.
- Note sur la *Forficula annulipes* et sa description, 1847, lxxxiv.
- Détails sur la *Tryxalis procera*, 1849, lxix.
- Nids de l'*Acridium peregrinum*, 1849, xciv.
- Quelques remarques géographiques sur les *Acridites* qui habitent les possessions françaises du nord de l'Afrique et description de deux nouvelles espèces de cette famille, 1851, 349.
- Communication de deux individus gigantesques de l'*Hetrodes Guyonii* formant une variété fort remarquable, 1851, iv.
- Communication d'un *Trigonidium cicindeloides* sur lequel l'auteur donne quelques détails synonymiques, 1851, xix.
- Communication et diagnose de l'*Eremobia Jamunii*, 1853, lxv; 1854, 709.
- Un mot sur les organes sexuels des Orthoptères employés comme caractères pour distinguer l'état parfait ou non parfait de ces Insectes, 1855, 759.
- Lecture d'une notice sur une nouvelle espèce de Mantides (*Eremiaphila denticollis*), 1855, xi et lviii.
- Note sur l'*Œdipoda azurea*, distincte de l'*Œd. carutana*, 1856, xxxvii.
- Communication d'une variété curieuse d'*Œdipoda mauritanica*, 1856, lxvi.
- Note sur les caractères que l'on peut tirer du développement des organes du vol pour distinguer l'état parfait ou non parfait des espèces composant le genre *Eremiaphila*, 1857, 321.
- Communication de plusieurs Orthoptères provenant du sud de l'Algérie, 1857, cv.
- Communication et description d'un Orthoptère du genre *Phyllium*, le *Ph. Magdelaini*, 1857, cxlvii.
- Note sur une nuée de *Gryllus domesticus*, 1858, xcvi.
- Note sur l'*Hetrodes Guyonii*, rarissime Locustaire d'Algérie, 1860 xlvi.

**Hémiptères.** Hémiptère fort curieux de la Nouvelle-Hollande (*Cystosoma Saundersii*), 1846, CI.

Note sur le *Gerris lacustris*, 1850, LI.

Macules sur des feuilles de *Ziziphus pinnachristi* dues à la présence de *Coccus*, 1853, XXVIII.

Dégâts causés aux pois et haricots par l'*Halticus pallicornis*, 1854, XXXI.

Note sur plusieurs *Coccus* vivant dans les serres du Muséum, 1855, CVII.

**Névroptères.** Communication relative à un Termite du Sénégal, 1851, L. Quelques remarques sur la larve de l'*Embia mauritanica*, 1859, 441.

**Hyménoptères.** Observations sur les mœurs de la *Chrysis ignita* vivant aux dépens de l'*Odynerus spinipes*, 1847, XC.

Communication d'un nid d'Hyménoptère de la famille des *Osmides*, construit par la *Chalidoma sicula* et rencontré en Algérie, 1851, XLIV.

Description et figure d'un Hyménoptère de la famille des *fouisseurs* devant former une coupe générique voisine du *Pompilius* (*Clavelia pompiliiformis*), 1851, LXXV; 1852, 417; 1853, XIV.

Note sur le nombre des articles des antennes des genres *Masaris* et *Celonites*, 1851, XCIV.

Communication de plusieurs Hyménoptères du genre *Lophyrus* qui doivent être rapportés non au *L. pini*, mais au *L. piceæ* de Fabricius, 1852, LXXII.

Note sur la *Typhlopona oraniensis*, 1853, XXXVII.

Note sur deux *Sirex gigas* rencontrés dans une pièce de bois d'un métier à tisser, 1853, LXIII.

Note sur une nouvelle espèce du genre *Clavelia* des environs de Pontéba (*Cl. melas*), 1853, XXXI.

L'auteur confirme le parasitisme du *Conops* sur des Hyménoptères du genre *Bombus*, 1854, LIX.

Note sur une *Formica* des plus remarquables (*Myrmecocystus mexicanus* Westw.), 1855, LIV.

Communication sur l'*Acænites perlæ* à Saint-Germain-en-Laye et à Batignolles, 1855, LXXXIX.

Communication de plusieurs Hyménoptères vivants du genre *Förnicia*, provenant de Cayenne et habitant depuis six à huit ans dans les serres chaudes du Muséum, 1855, cxii.

Note sur es caractères qui différencient le genre *Clavelia* Luc. de celui du *Ctenocerus* Dahlb., 1856, 349 et xxix.

Communication d'un travail de M. Gust. Mayr sur le *Cremathogaster scutellaris*, 1856, xx.

Note sur l'*Aphænogaster testaceo-pilosus*, synonymie, 1856, xxxiv.

Communication des deux sexes du *Cimbex americanæ*, 1857, xxx.

Note sur le *Mesochorus testaceus* parasite du *Cimbex americanæ*, 1858, xvi.

Quelques mots sur les parasites du genre *Chalicodoma*, 1858, cxii.

Note au sujet des transformations d'un Hyménoptère gallicole (genre *Diptolepis*), 1860, lix.

Communication de plusieurs galles remarquables recueillies sur le *Quercus pedunculata* et rectification de la note précédente, 1860, lxxxiii.

Observations au sujet des galles attribuées à des *Diptolepis* que l'auteur regarde comme les parasites des *Cynips*, véritables auteurs de ces galles, 1860, civ.

**Lépidoptères.** Notice sur une nouvelle espèce de Lépidoptères appartenant au genre *Papilio*, 1839, 91.

Observation sur un nouveau genre de la tribu des *Nymphalites* (genre *Godartia*), 1842, 295.

Note sur plusieurs chenilles de la *Saturnia cecropia* que l'auteur a obtenues d'éclosion, 1845, li.

Observations sur des cocons bisexuels du *Bombyx* (*Serica*) *mori*, 1845, lxxxi.

Note contenant quelques nouveaux détails sur le *Bombyx cecropia*, 1846, xxxvii, lxi.

Note sur deux générations par an du Ver à soie, 1846, lxxx.

Communication d'un cocon anormal du *Saturnia pyri*, 1846, lxxxviii.

Communication des larves, des nymphes et des Insectes parfaits de la *Galleria cerella*, 1846, cviii.

- Communication et caractéristique de l'*Anthocharis Levaillantii* trouvé aux environs d'Alger, 1847, XLIX.
- Note sur la forme des œufs du *Satyrus Briseis*, 1847, LXXIX.
- Communication d'une portion du nid construit par la *Galleria cerella*, 1848, XXVII.
- Observation sur la chenille du *Deilephila tithymali*, 1848, XLVII.
- Observations sur les Lépidoptères des genres *Papilio*, *Anthocharis*, *Cigaritis* et *Cerocala* du nord de l'Afrique, 1850, 83.
- Communication des chenilles de l'*Attacus luna* nées au laboratoire d'entomologie, 1851, LXXVII.
- Revue du genre *Trichosoma*, de la section des *Chalinoptères* et de la tribu des *Chélonides*, 1853, 391.
- Communication de plusieurs nids de *Bombyx (Cnethocampa) pityocampa*; note à ce sujet, 1853, x.
- Note sur une nouvelle espèce de Lépidoptères appartenant au genre *Leptalis* de Dalman, 1854, 51.
- Communication d'une variété remarquable de la *Callimorpha dominula*, 1854, XL.
- Communication sur les chenilles du *Bombyx cynthia* élevées au Muséum, 1854, XLV, LXVII; 1855, XXI.
- Deux chenilles de *Saturnia* trouvées dans l'estomac d'un *Trigonoccephalus histrionicus*, 1855, XXII.
- Note sur la non-identité du *Papilio Zelichaon* avec le *P. Machaon*, 1856, LXVII.
- Note sur une variété très-remarquable de *Smerinthus ocellatus* trouvée en Algérie par M. Cotty, 1856, XCII.
- Description et figure de deux nouvelles espèces de Lépidoptères de la tribu des *Sphingiens* (*Zonilia Schimperi* et *Smerinthus abyssinicus*), 1857, 601.
- Variété de l'*Arctia fuliginosa* rencontrée aux environs de Tanger, 1857, XIX.
- Variété de *Clostera reclusa* rencontrée près de Tanger, 1857, XXXIV.
- Observations sur des larves de *Carpocapsa Dchaisiana* habitant les graines d'une Euphorbiacée, 1858, x, XLI; 1859, 561.
- Les *Deilephila* rencontrés aux environs d'Alger sont bien des *D. euphorbiæ*, 1858, XIII.



Note sur l'éducation des chenilles de *Saturnia cecropia* et *Polyphemus*, 1858, xcvi, cxiv, clxi.

Note sur l'éducation du *Saturnia Prometheus*, 1858, clxi.

Communication de plusieurs individus de la *Chelonia atropis*; observations à ce sujet, 1858, cxvi.

Communications de Lépidoptères rares dans les collections, avec une note synonymique sur plusieurs d'entre eux, 1858, cxlviii.

Note sur l'éclosion au Jardin-des-Plantes des *Saturnia Mylitta* et *Seleno* et sur les tentatives faites pour leur reproduction, 1860, vii.

**Diptères.** Détails sur deux Diptères appartenant au genre *Helomyia* (*pallida* et *ustulata*), 1848, l.

Détails sur les mœurs des *Laphries*, 1848, lxxvii.

Note sur deux Diptères du genre *Exorista*, parasites de l'*Orgyia multibunda*, 1849, xlix.

Note sur la *Braulta caca*, parasite de l'*Apis mellifica*, 1850, lxvii.

Larves de *Calliphora fulvilabris* et *vomitaria* vivant dans les intestins d'un Saurien d'Algérie, 1851, lxii.

Note sur les transformations du *Bombylius boghariensis*, 1852, 11.

Quelques mots sur les parasites du genre *Chalicodema*, 1858, cxii.

**Aptères.** Observations sur les travaux qui, depuis Latreille, ont été publiés sur l'ordre des Thysanoures et particulièrement sur la famille des Podurelles, 1843, 269.

Notice sur une espèce d'*Epizoique* appartenant au genre *Harmatopinus*, 1847, 531.

Description et figure de l'*Harmatopinus tuberculatus* qui vit parasite sur le buffle d'Italie, 1852, 529.

Mode d'accouplement du *Phlebotomus platalea*, 1852, xxxviii.

**Arachnides.** Description d'une nouvelle espèce d'Arachnide appartenant au genre *Argyope* de M. Savigny, 1833, 86.

Mémoire sur plusieurs Arachnides nouvelles appartenant au genre *Atta* de M. Walckenaer, 1833, 476.

Mémoire sur un nouveau genre d'Aranéide de l'ordre des Pulmonaires (genre *Pachyloscelis*), 1834, 359.

Notice sur une nouvelle espèce d'Aranéide appartenant au genre *Lycosa*, 1836, 521.



- Quelques observations sur la manière de pondre chez les *Ixodes* e addition à un travail ayant pour titre : Mémoire sur plusieurs Arachnides nouvelles appartenant au genre *Atte* de M. Walckenaër 1836, 629.
- Quelques observations sur le genre *Atype* et description d'une espèce nouvelle appartenant à ce genre, 1837, 213.
- Observations sur les Aranéides du genre *Pachyloscelis* et synonymie de ce genre, 1837, 869.
- Observations sur un travail de M. Mac-Leay ayant pour titre : *On some new forms of Arachnida*, 1839, 117.
- Note monographique sur les Aranéides composant le genre *Tegenaria*, 1844, 455.
- Note sur une nouvelle espèce d'Aranéide appartenant au genre *Actinopus* de M. Perty, 1845, 57.
- Note sur une nouvelle espèce d'Arachnide qui appartient au genre *Ixodes* et qui vit dans le contour interne de la cavité orbitaire du *Python Sebae*, 1845, 61.
- Notice sur une nouvelle espèce d'Aranéide appartenant au genre *Scytodes* de M. Walckenaër, 1845, 67.
- Note sur l'identité des *Scytodes rufipes* et *longipes*, 1845, xci.
- Notice sur quelques espèces nouvelles d'*Ixodes* qui vivent parasites sur les Serpents *Boa constrictor* et *Python Sebae* et sur l'Ornithorhynque, 1846, 53.
- Note au sujet d'une ponte obtenue provenant d'une *Scytodes thoracica*, 1847, viii.
- Communication du *Latrodectus martius* trouvé aux environs de Paris et en Algérie, 1847, xlviii.
- Variété de l'*Epeira diadema* rencontrée dans la forêt de Bondy, 1847, lxxvii.
- Description de deux *Ixodes* nouveaux (*I. Gervaisii* et *fusco-lineatus*). 1847, xcix.
- Trogulus nepesiformis* découvert dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, 1848, v.
- Description et figure d'une nouvelle espèce d'Aranéide appartenant au genre *Theridion*, 1849, 179.

- Communication d'un *Tyroglyphus* nouveau trouvé dans le pus d'un abcès, 1849, xxviii.
- Note sur l'authenticité de la *Galeodes barbara*, 1849, xxvi.
- Note sur le *Sarcoptes auricularum* trouvé dans les oreilles d'un chien, 1849, xxxiv.
- Espèce nouvelle d'*Uropoda* (*denticulata* Luc.) sur un *Arrhenodes*, 1849, xxxiv.
- Note sur le *Theridion civicum*, 1850, 11.
- Description de l'*Ixodes Poortmani*, 1850, xli.
- Communication de trois Aranéides du genre *Ptilistata*, 1851, xxviii.
- Quelques détails sur une Aranéide du genre *Mygale*, 1851, xci (page indiquée par erreur lxi).
- Communication au sujet du jeune âge de la *Segestria perfida*, 1851, xcix (et non lclix).
- Description d'une femelle vivante de l'*Ixodes flavo-maculatus*, 1851, cxx.
- Description de l'*Olios albifrons* provenant de l'île Bourbon, 1852, lxxvi.
- Description de l'*Ixodes variegatus*, parasite d'un Saurien, 1852, lxxxviii.
- Communication d'une variété fort remarquable de l'*Epeira scalaris*, 1853, liv.
- Communication d'un *Stagobius troglodytes* et d'un *Blethrus spelaeus* privé d'yeux, 1853, lxi.
- Note sur une espèce d'Aranéide (*Mygale luctuosa*) qui habite l'Espagne méridionale, 1855, 15.
- Note sur trois espèces du genre *Galeodes*, 1855, lxvi.
- Communication de plusieurs Arachnides de la famille des *Scorpio-nides* (*Androctonus funestus*), 1856, xiv.
- Arachnides nouvelles pour la faune parisienne (*Homalonotus bispinosus*), 1856, cxi.
- Diagnoses de deux Aranéides nouvelles du genre *Olios*, 1857, clx.
- Description et figure d'une Arachnide nouvelle pour la faune française (*Sclerosoma bispinosum*), 1858, 489.
- Communication d'une jeune femelle de la *Mygale aviculaire* vivante venant de la Martinique, 1858, clxxi.

Description de la *Mygale bicolor*, espèce de Bahia, 1859, CVIII, et 1860, xv.

Quelques remarques sur la manière de vivre de la *Segestria florantina*, Aranéide de la tribu des Quadripulmonées, 1860, 309.

Diagnose d'une nouvelle espèce d'*Ixodes* (*I. globulus*), 1860, 538.

Note sur le *Scololemon Leprieurii*, nouvelle espèce d'Arachnide trachéenne, 1860, 984.

**Myriapodes.** Description et figure d'une nouvelle espèce d'*Iulc* trouvée aux environs de Paris, 1840, 55.

Observations sur un nouveau genre de la classe des *Myriapodes* appartenant à la famille des *Iulites* (genre *Platydesmus*), 1843, 43.

Note sur une nouvelle espèce de *Iulus* rencontrée dans les environs de Toulon, 1845, 365.

*Polyzonium germanicum*, synonymie, 1848, LVII.

Communication de plusieurs *Blaniulus guttulatus* trouvés en grande quantité sur les fraises qu'ils dévorent, 1849, LVIII.

Communication et description d'un *Iulus* de Cayenne, 1849, LIX.

Note relative à la *Scolopendra Scopoliana*, commune en Algérie, 1853, L.

Note sur l'*Iulus ferrugineus* de la Martinique, 1858, CLXXI.

Note sur la découverte de la *Strongilosoma speluncarum* dans la grotte de l'Ours, par M. Leprieur, 1850, XLVIII.

Communication avec détails descriptifs d'une espèce de *Myriapode* nouvelle pour la faune française, le *Lithobius Coquereii*, 1860, LXXIII.

**Crustacés.** Observation sur un nouveau genre de Crustacé de l'ordre des *Décapodes brachyures* (genre *Thealia*), 1839, 573.

Notice sur quelques monstruosités observées dans des Crustacés appartenant aux genres *Carcinus*, *Lupa*, *Homarus* et *Astacus*, 1844, 41.

Observations sur quelques espèces nouvelles qui habitent les possessions françaises du nord de l'Afrique, 1849, 457.

Communication de l'*Apus cancriformis* trouvé dans le désert en Algérie; détails à ce sujet, 1849, 17.

Communication de plusieurs individus de la *Limnoria terebrans* et note sur les dégâts que cette espèce cause aux bois dans les ports, 1849, XIX.

Observations sur un nouveau genre de l'ordre des *Décapodes Macroures* (*Solenocera Philippii*), 1850, 215.

Communication d'une variété rouge de l'*Astacus fluviatilis* prise aux environs de Bougival, 1851, XLVIII.

Note sur un cas de pathologie chez un *Platycarcinus pagurus*, 1853, XLIX.

Communication d'un *Cænobita Diogenes* habitant la Havane, 1854, LIV.

Communication d'un *Astacus pellucidus* qui vit dans les lacs souterrains des cavernes du Kentucky, 1856, CII.

Note monographique sur le genre *Ixa*, Crustacé brachyure de la famille des *Oxystomes* et de la tribu des *Leucosiens*, 1858, 178.

Communication d'un Crustacé de l'ordre des *Isopodes* (*Platyarthrus Hoffmanseggii*), 1858, CCXII.

Sur l'habitat du *Leptopodia sagittaria*, 1860, 326.

Note au sujet des dégâts causés par un Crustacé isopode (*Oniscus murarius*), 1860, LVI.

Note sur un Crustacé édriophthalme des environs de Paris (*Platyarthrus Hoffmanseggii*), 1860, CX.

## LUCCIANI.

**Coléoptères et Hyménoptères.** Notes sur quelques Coléoptères et un Hyménoptère d'Italie, 1845, CX.

## LUTRAND, de Montpellier.

**Articles généraux.** Communication sur l'asphyxie des Insectes, 1857, LXXI.

## M.

## MACQUART.

**Hémiptères.** Notice sur une nouvelle espèce de Gallinsecte, le *Coccus salicis*, 1849, 47.

**Diptères.** Description d'un nouveau genre d'Insectes Diptères de la famille des *Tanystomes* (genre *Euthyneura*), 1836, 517.

Notice sur le genre *Pangonie*, 1837, 429.

Notice sur trois Diptères nouveaux des genres *Medeterus* et *Scatophaga*, 1838, 421.

Notice sur un nouveau genre de Diptères de la famille des *Dolichopodes* (genre *Sybistroma*), 1838, 425.

Description d'un nouveau genre d'Insectes Diptères (genre *Exochostoma*), 1842, 41.

Description d'un nouveau genre d'Insectes Diptères (genre *Blepharicera*), 1843, 59.

Nouvelles observations sur l'Insecte Diptère formant le type du genre *Blepharicère*, 1844, 66.

Notice sur les différences sexuelles des Diptères du genre *Dolichopus* tirées des nervures des ailes, 1844, 177.

Nouvelles observations sur les Insectes Diptères de la tribu des *Tachinaires*, 1845, 237; 1848, 85; 1849, 353; 1850, 419; 1854, 373; 1855, 21 et 177.

Observations sur une notice de M. le docteur Robineau-Desvoidy, intitulée : Coup d'œil rétrospectif, etc., 1847, 71.

Notice sur un nouveau genre de Diptères de la famille des *Pupiparcs*, tribu des *Phthiromides*, sous le nom de *Megistopoda* (*Pilateri*), 1852, 331.

Notice sur une nouvelle espèce d'*Aricie*, Diptère de la tribu des *Anthomyzides*, 1853, 657.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur Meigen, 1847, 323 et LXXVI.

**MARIANO DE SANS.**

**Coléoptères.** Envoi de deux exemplaires de la *Cicindela marocana*, qui ne serait qu'une variété de *campestris*, 1835, LXIX (ce devrait être LXXIX).

**MARLOY.**

**Lépidoptères.** Observations sur quelques chenilles de *Satyræ* et description de trois espèces inédites, 1838, 263.

**MARSEUL (l'abbé de).**

**Coléoptères.** Essai monographique sur la famille des Histerides, 1853, 131, 447; 1854, 161, 525, 671; 1855, 83, 327, 677; 1856, 97, 259, 549; 1857, 109, 397; 1860, 581, 835.

**MARTIN (Emmanuel).**

**Coléoptères.** Coléoptères recueillis aux environs de Clermont-Ferrand et au mont Dore, 1859, 670.

Espèces recueillies pendant l'excursion en Franche-Comté, 1860, 1004.

**Lépidoptères.** Communication de variétés curieuses de *Lycæna Ægon* et de *Aspilates calabraria*, 1857, cvl.

Lépidoptères recueillis pendant le Congrès de Clermont-Ferrand, 1859, 674.

Lépidoptères recueillis pendant l'excursion en Franche-Comté, 1860, 1008.

**Articles généraux.** Rapport sur la session extraordinaire tenue à Clermont-Ferrand en juin et juillet 1859, 1859, 647.

Rapport sur l'excursion provinciale faite à Besançon, Pontarlier et Jougne en juin 1860, 1860, 989.

**MELLÉ.**

**Coléoptères.** Monographie de l'ancien genre *Cis* des auteurs, 1848, 205 et 313.

Détails sur les larves des *Ropalodontus perforatus* et de l'*Enncarthron cornutum*, 1849, XL.

**MELLY.**

**Coléoptères.** Quelques observations sur diverses espèces du genre *Golyathus*, 1847, LV.

**MERCK aîné.**

**Lépidoptères.** Mémoire sur la *Psyche albida*, 1843, 81.

**MILLIÈRE (Pierre).**

**Hémiptères.** Observations relatives à l'empreinte d'un Hémiptère fossile, 1853, 9.

**Lépidoptères.** Note sur les propriétés vénéneuses de la chenille du *Deilephila euphorbiæ*, 1851, LXXVIII.

Note sur des chenilles ichneumonisées de *Deilephila vespertilio*, 1852, XVI.

Note relative à l'habitat de chrysalides de la *Dicranura vinula* sur l'écorce rugueuse du pin sylvestre, 1852, XLVII.

Notice sur le *Bombyx (Saturnia) cecropia*, 1852, LXIV.

Note sur la variété de la *Gnophos obscuraria* Hubn., 1853, 389.

Description de nouvelles espèces de *Microlépidoptères*, 1854, 59.

Note sur une variété de la *Catocala electa* Guen., 1855, 205 et LXXIV.

Histoire du *Choreutes dolosana*, 1856, 39.

Note sur la *Diascna Ramburialis*, 1856, LXXXIX.

Description d'un *Platyomide* nouveau (*Hastula hircana*) et histoire des métamorphoses de sa larve, 1857, 799, et 1858, LXXIII.

**MILNE EDWARDS (Henri).**

**Coléoptères.** L'auteur a constaté la présence de l'acide urique chez la *Calandra granaria*, 1833, LXIV.

**Hyménoptères.** Description d'un nid d'*Epipona tatua*, 1843, XXXIV.  
Quelques détails relatifs à l'existence des glandes cirières chez les Abeilles à miel, 1843, LIV.

**Lépidoptères.** Extrait d'une note sur l'éducation et la soie du *Bombyx cynthia*, 1854, LIX.

**Crustacés.** Compte rendu d'un travail sur l'anatomie comparée des *Crustacés décapodes*, 1832, 234.

Note sur un nouveau genre de Crustacés de l'ordre des *Stomapodes* (genre *Amphion*), 1832, 336.

Description du genre *Leucippe*, 1833, 512.

Observations sur quelques espèces de Crustacés fossiles, 1837, LXVIII.

**Annélides.** Quelques observations sur une monstruosité d'une Annélide du genre *Phyllodorce*, 1833, LXXVI.

**Articles généraux.** Observations sur le phénomène de l'irisation chez les Insectes, 1843, XXII.

Discours aux funérailles de Duméril, 1860, 647.

**MNISZECH (le comte de).**

**Coléoptères.** Lettre à M. Buquet contenant d'intéressants détails entomologiques, 1854, XXIII.

**MOCQUERYS.**

**Coléoptères.** Quelques détails sur le *Plochionus Bonfilsii*, 1852, XXIII.

Note relative aux Coléoptères nuisibles et utiles, 1856, 731.

**Articles généraux.** Note sur l'organe de l'odorat chez les Insectes, 1857, XVI.

Note relative à la destruction des Insectes nuisibles, 1857, LXXI.



**MONCEAUX (H.), d'Auxerre.**

**Diptères.** Notice sur un ouvrage manuscrit du docteur J.-B. Robineau-Desvoidy, intitulé : Diptères des environs de Paris, 1858, 331.

**MONTET, de Vendôme.**

**Lépidoptères.** Moyen de conserver les chenilles du *Bombyx rubi* pendant l'hiver, 1844, LXVIII.

**MONTROUZIER (le P.)**

**Coléoptères.** Extrait d'une lettre datée de Lifu, adressée à M. Doué et contenant quelques observations entomologiques, 1859, CXLV.

Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Calédonie, 1860, 229 et 867.

**MORINEAU.**

**Articles généraux.** Extrait d'une lettre à M. Alex. Lefebvre, contenant des observations entomologiques, 1834, LX.

**MORISSE, du Havre.**

**Lépidoptères.** Essai sur les genres *Erycina*, *Diorina* et *Zconia*, 1837, 417.

**MORREN.**

**Hémiptères.** Rapport à l'Académie des Sciences de Bruxelles sur un mémoire contenant des considérations générales sur les Pucerons et sur le genre *Aphis* en particulier, 1836, LXXVI.

**MOTSCHULSKY (le comte de).**

**Coléoptères.** Note sur un *Elaphrus* nouveau des Pyrénées et du midi de la France, 1850, LXVI.

Note sur quelques rectifications relatives à des espèces de Coléoptères, 1859, CCV.

Note en réponse à la réplique de M. Reiche sur les *Oxythyrea Noem* et *Cetonia albopicta*, 1860, xcii.

Indication des espèces de *Staphyliniens* de France et d'Algérie parmi celles décrites par l'auteur, 1860, xcii.

### MOUFFLET.

**Coléoptères.** Détails sur l'entomologie de la Guadeloupe, 1858, xiv.

### MULSANT.

**Coléoptères.** Détails sur les mœurs de la *Sitaris humeralis*, 1848, liv.

### MURRAY.

**Coléoptères.** Description de deux *Buprestides* nouveaux (*Stygmodera cruentata* et *Temognatha trifasciata*), 1852, 253.

## N.

### NEWPORT (Georges).

**Articles généraux.** Lecture de la traduction d'un mémoire anglais sur l'usage des antennes chez les Insectes, 1841, x.

### NICOLET.

**Aptères.** Essai sur une classification des Insectes aptères de l'ordre des *Thysanures*, 1847, 335.

### NYLANDER.

**Hyménoptères.** Notice sur la *Formica gracilescens* communiquée par M. Sichel, 1856, xxviii.

Note sur les *Formicidés* du mont Dore, 1856, lxxviii.

**Lépidoptères.** Note sur le mâle du *Psyche helix*, 1854, 335.

## O.

## ORMANCEY.

**Coléoptères.** Réclamation de priorité pour la découverte de la valeur spécifique des caractères que l'on peut tirer des organes génitaux chez les Insectes, 1852, III.

## P.

## PACCARD.

**Lépidoptères.** Lettre sur les habitudes de certains *Lépidoptères nocturnes*, 1837, LXXV.

## PARIS, d'Épernay.

**Lépidoptères.** Note sur les habitats différents et sur les différentes époques d'apparition des *Anthocharis Ausonia* et *Belia*, 1845, XXXI.

La chenille du *Drilephila nerii* a reparu en 1850 à Épernay et l'auteur en a obtenu des chrysalides, 1852, LXXIII.

Note sur les mœurs de la chenille de la *Cucullia scrophulariæ*, 1858, CLXXII.

## PARIS, de Gray.

**Lépidoptères.** Note sur le cri particulier du *Sphinx Atropos*, 1846, xcv et cxii.

De plusieurs espèces de Lépidoptères devant être considérées comme variétés de région, 1848, 191.

**PASSERINI (Ch.), de Florence.**

**Coléoptères.** Note sur une larve qui cause de grands dommages aux plantes de la fève, 1852, XLIX.

**PAUL DE SAINT-MARTIN.**

**Articles généraux.** Note sur une nymphe qu'on trouve souvent dans des pommes de terre malades, 1849, XLV.

**PÉCCHIOLI.**

**Coléoptères.** Description de deux Coléoptères nouveaux d'Italie (*Aptomus rufithorax* et *Anthaxia Passerinii*), 1837, 445.

Description d'une nouvelle espèce de *Sitaris* (*S. Solieri*), 1839, 527 et XVII.

**PERRIS (Édouard).**

**Coléoptères.** Observations sur les Insectes qui habitent les galles de l'*Ulex nanus* et du *Papaver dubium*, 1840, 90.

Notes sur les métamorphoses du *Tachyporus cellaris* et du *Tachinus humeralis* pour servir à l'histoire des Brachélytres, 1846, 331.

Note pour servir à l'histoire des *Megatoma serra* Latr., *Dermestes serra* Fabr., *Anthrenus viennensis* Herbst, 1846, 339.

Note pour servir à l'histoire du *Lygistopterus sanguineus* (*Lycus sanguineus*, *Dictyopterus sanguineus*), 1846, 343.

Notes pour servir à l'histoire des *Trichopterix*, 1846, 465.

Note pour servir à l'histoire de l'*Anaspis maculata* Fourcr. et du *Tillus unifasciatus* Fabr., 1847, 29.

Observations complémentaires pour l'histoire du *Melasis flabellicornis* Fabr., 1847, 541.

Observations sur les larves du *Clytus arictis*, de la *Saperda punctata* et de la *Grammoptera ruficornis*, 1847, 547.

Histoire des métamorphoses de la *Donacia sagittaria*, 1848, 33.

Notes pour servir à l'histoire du *Lixus angustatus*, 1848, 147.

Note sur les mœurs du *Coniatus chrysochlora* Luc., 1850, 25.

Mœurs et métamorphoses de l'*Apate capucina* Fabr., de l'*Apate sexdentata* Oliv., de l'*Apate sinuata* Fabr. et de l'*Apate Dufourii* Latr., 1850, 555.

Quelques mots sur les métamorphoses de Coléoptères mycétophages, le *Triphyllus punctatus* Fabr., le *Diphyllus lunatus* Fabr., l'*Agathidium seminulum* Linné, et l'*Eucinetus* (*Nycteus* Latr.) *meridionalis* de Casteln., 1851, 39.

Histoire des Insectes du pin maritime, 1852, 491; 1853, 555; 1854, 85, 593; 1856, 173, 423, et 1857, 341.

Histoire des métamorphoses du *Clambus enshamensis* Westw., du *Cryptophagus dentatus* Herbst, du *Latridius minutus* Linné, du *Corticaria pubescens* Illig., de l'*Orthoperus piccus* Step., et du *Malachius æneus* Fabr., 1852, 571.

Histoire des métamorphoses du *Blaps producta* Dej., et du *Blaps fatidica* Sturm, 1852, 603.

Réunion en une seule espèce des *Chasmatopterus hirtulus* et *villosus* Illiger, 1855, 273.

Diagnoses de sept Coléoptères nouveaux pris dans le département des Landes, 1855, LXXVII.

Adoption en grande partie des observations faites par M. Reiche à l'occasion du mémoire sur les *Chasmatopterus*, 1855, LXXX.

**Hyménoptères.** Observations sur les Insectes qui habitent les galles de *Ulex nanus* et de *Papaver dubium*, 1840, 89.

Observations sur les Insectes qui vivent dans la galle de l'ortie dioïque, *Urtica dioica* Linné, 1840, 401.

Notes pour servir à l'histoire des *Crabronites*, 1840, 407.

*Braconides* parasites de l'*Apate capucina*, 1850, 565.

Note additionnelle sur les habitudes et les métamorphoses de l'*Exmenes infundibuliformis* Oliv., 1852, 557.

**Lépidoptères.** Métamorphoses de la *Cochylis hilarana* H.-Schæff., 1856, 33.

**Diptères.** Mémoire sur la *Lonchæa parvicornis* (Meigen) et la *Teromyia laticornis* (Macq.), 1839, 29.

Notice sur une nouvelle espèce de *Syphonella* (Macq.), 1839, 39.

Notice sur quelques Diptères nouveaux, 1839, 47.

Description de la *Cecidomyia urticæ* vivant dans la galle de l'ortie dioïque, 1840 403.

Notes sur les métamorphoses de la *Trichocera annulata* Meig. et de la *Scathopse punctata* Meig. pour servir à l'histoire des *Tipulaires*, 1847, 37.

Notes pour servir à l'histoire des *Ceratopogon*, 1847, 555.

Notes pour servir à l'histoire des métamorphoses de diverses espèces de Diptères, 1849, 51 et 331.

Histoire des métamorphoses de la *Sapromyza 4-punctata*, 1852, 594.

**Articles généraux.** Introduction à l'histoire des Insectes du pin maritime, 1852, 491.

### **PERRIS (Ed.) et L. DUFOUR.**

**Hyménoptères.** Mémoire sur les Insectes Hyménoptères qui nichent dans l'intérieur des tiges sèches de la ronce, 1840, 5.

### **PERROUD, de Lyon.**

**Coléoptères.** *Anomala devota* et *Anoxia scutellaris* prises aux environs de Fréjus ; détails de mœurs, 1853, LXX.

### **PEYRON (Édouard).**

**Coléoptères.** Description d'une nouvelle espèce du genre *Procrustes*, 1854, 669.

Description de deux genres et de quatre espèces de Coléoptères provenant d'Orient, 1856, 715.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Hister*, découverte aux environs de Marseille, 1856, 727.

Note monographique sur le genre *Thorictus* de Germar, 1857, 697.

Description de quelques Coléoptères nouveaux et observations diverses, 1857, 715.

Note contenant quelques rectifications spécifiques, 1857, cix.

Le genre *Orthoperus* doit appartenir à la famille des *Trichoptérydes*, 1857, CXIV.

Catalogue des Coléoptères des environs de Tarsous (Caramanie), avec la description des espèces nouvelles, 1858, 353.

**Articles généraux.** Proposition pour la rédaction d'une faune entomologique française, 1859, LXXV.

### PICTET.

**Névroptères.** Analyse d'un travail général sur l'ordre des *Névroptères*, 1840, xx.

### PIERRET (Alexandre).

**Coléoptères.** Individus monstrueux du *Carabus cancellatus* pris en Aragon, 1846, LXXXII.

**Lépidoptères.** Note sur le *Polyommatus Ceronus*, 1833, 119.

Effets d'un orage sur les chenilles et les chrysalides, 1842, XXXVIII.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Anthocharis*, 1836, 367.

Description de trois nouvelles espèces de Lépidoptères, 1837, 19.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Hadena* Boisduval, 1837, 177.

Description de deux nouvelles espèces du genre *Satyrus* Latr., 1837, 303.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Gortyna* Treits., 1837, 449.

Accouplement, signalé par M. Blondel, du *Satyrus janira* ♀ avec l'*Argynis Paphia* ♂; même observation à Vaugirard par M. Bagriot, 1838, LIV.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Agrotis* Treits., 1839, 95.

Rectifications d'erreurs commises dans les publications de l'auteur, 1859, LII.

Variétés de *Satyrus arcanius* et de *Zygæna filipendulæ* recueillies dans la forêt de Fontainebleau, 1840, III.

Patte d'une *Cleophana platyptera* revêtue d'une végétation cryptogamique, 1840, xx.

*Entozoaire* sortant de l'extrémité de l'abdomen d'un *Agrotis Desilii* (*ripæ*), 1841, II.

Cas d'hermaphrodisme chez un *Sphinx convolvuli*, 1842, LIV.

Communication d'une seule chenille vivante sur un envoi de 149 du *Deilephila Dahlii*; causes auxquelles l'auteur attribue cette grande mortalité, 1842, LXIV.

Cas d'hermaphrodisme chez un *Diptera cænobita*, 1843, VII.

Accouplement de deux mâles du *Zygæna achilleæ* avec une seule femelle, 1843, XXXI.

Le *Zegris Eupheme* habite à la fois l'Espagne et les confins de la Russie orientale, 1844, IX.

Les deux sexes de l'*Anthocharis Damone* sont identiques avec l'espèce de M. Feisthamel, 1844, LXIV.

Communication des deux sexes de *Psyche febretta* conservés dans l'esprit-de-vin; mode de son accouplement, 1844, LXV.

L'identité d'*Anthocharis Belia* avec *Ausonia* et de *Belemia* avec *Glauce* a encore besoin de nouvelles observations pour être admise, 1844, LXIX; 1845, XXXVI; 1846, XVII.

Réponse aux détails donnés par M. Becker sur le *Bombyx Otus*, 1845, LVII.

Nouvelles observations sur les variétés de *Vanessa prorsa*, 1845, LXXVI.

Observations sur l'habitat en France de la *Melithæa maturna*, 1846, XIII.

L'éclosion tardive de certains Lépidoptères doit être attribuée à la dureté de leurs coques, 1846, XL.

Domages causés aux arbres fruitiers par la chenille de la *Pieris crataegi*; réflexions à ce sujet, 1846, XLIII.

Épidémie qui a régné sur les chenilles du *Charaxes Jasius*, 1846, LII.

Observations sur l'habitat et les mœurs du *Satyrus Œdipus*, 1846, LVIII.

Influence que la nature du sol dans les montagnes exerce sur les Lépidoptères, 1846, xc.

Discussion entre l'auteur et M. Boisduval sur les apparitions périodiques en France du *Sphinx nerii*, 1846, cvi.



Réflexions au sujet de Lépidoptères des Canaries, 1846, CXIV.

Note sur une belle variété du *Deilephila Dahlii*, 1847, LXXII.

Observations rectificatives d'une opinion touchant les *Satyrus Œdipus* et *hyperanthus*, 1847, LXXVII.

Anomalie fort singulière dans un individu de l'*Himera pennaria*. 1847, LXXXV.

Deux individus du *Deilephila porcellus* présentant un commencement de végétation parasite, 1847, CVII.

Observations faites pendant les mois de juillet et août 1848 sur les Lépidoptères qui se trouvent aux environs de Gavarnie, 1848, 397.

Note relative à l'*Erebia Sthennyo* de M. de Graslin, 1850, 417.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur M. de la Montagne, 1836, LXXX.

Observations critiques à l'occasion du mémoire de M. G. Newport sur l'usage des antennes chez les Insectes, 1841, x.

Courte note sur M. Merck aîné, 1849, LXVIII.

## PILATE.

**Articles généraux.** Note sur l'entomologie de l'*Yucatan*, 1846, xcvi.

## POEY (Ch.), de la Havane.

**Lépidoptères.** Observations sur le crin des Lépidoptères nocturnes et crépusculaires, 1832, 91 et 441.

## R.

## RAMBUR.

**Coléoptères.** Monographie du genre *Elaphocera*, 1843, 329.

**Névroptères.** Observations sur le mémoire de M. Boyer de Fonscolombe sur les *Libellules*, 1837, LXXIV.

**Lépidoptères.** Catalogue des Lépidoptères de l'île de Corse, avec la description et la figure des espèces inédites, 1832, 245; 1833, 5.

Le *Sphinx vespertilioides* est un hybride du *Sphinx vespertilio* et du *S. hippophaes*, et le *S. epilobii* un hybride des *S. vespertilio* et *cuphorbiæ*, 1832, 426.

Rectification d'une erreur commise à l'égard des chenilles des *Cucullia umbratica* et *lucifuga*, 1834, 179.

Descriptions de plusieurs espèces inédites de *Lépidoptères nocturnes* du centre et du midi de la France, 1834, 379.

Notice sur plusieurs Lépidoptères du midi de l'Espagne, parmi lesquels se trouve le *Papillon Eupheme* d'Esper, 1836, 573.

Engourdissement pendant l'été des jeunes chenilles du genre *Zygæna*, 1837, LXI.

L'insecte communiqué par M. Carreño est un *Trichosoma*, que l'auteur propose de nommer *Pierreti*, 1841, xxvii.

Description de l'*Agrotis Graslinii*, précédée de quelques observations critiques sur la distribution de la famille des *Agrotides*, avec la description d'une *Episema* et d'un autre *Agrotis* inédits, 1848, 65.

### **RAUTOU, de Nantes.**

**Lépidoptères.** Note sur l'éducation des Vers à soie, 1858, CCLI.

### **REEB.**

**Lépidoptères.** Détails sur les chenilles qui ravagent le canton de Phalsbourg, 1848, LVI.

### **REICHE (Louis).**

**Coléoptères.** Note sur le genre *Amblycheila* de Say et description d'une nouvelle espèce, 1839, 557.

Note sur la famille des Longicornes et description d'un genre nouveau (*Amphion*), 1839, 563.

Espèces de Coléoptères à élytres soudées volant comme les Cétoines, 1840, xviii.

- Essai d'une classification méthodique de la tribu des *Coprophages*, famille des *Lamellicornes*, division des *Scarabæides*, 1842, 59.
- Recherches sur les *Helluonides*, ou révision du genre *Helluo* Bonelli, et Dej., 1842, 323.
- Résultat de recherches sur le caractère sexuel apparent des espèces du genre *Ateuchus*, 1842, x.
- Note sur l'*Anthrenus musæorum*, suivie de la classification synonymique des espèces connues d'*Anthrenus* d'Europe, 1843, xxviii.
- Description de l'*Aspisoma candellaria*, 1845, 353.
- L'auteur partage l'avis de M. Aubé sur la réalité de l'accouplement des *Campylus linearis* et *mesomelas*, 1845, xiii.
- Observations relativement à l'ouvrage de M. Lacordaire sur les *Coléoptères subpentamères phytophages* et détails sur les *Hispides*, 1845, xlv.
- Note relative au *Carabe* monstrueux communiqué par M. Pierret, 1846, lxxxviii.
- Le *Mastigus palpalis* de M. Ghiliani doit probablement constituer une espèce distincte, 1848, xliii.
- Note sur la *Laphyra Ritchii* Vigors (*Audouini* Barthelemy), 1848, xcii.
- L'*Onitis Chevrolatii* de M. Lucas n'est autre que l'*On. Menalcas* ♂, 1849, lvi; 1851, xii.
- Pterostichus Xatartii* dont l'antenne droite se bifurque à partir du neuvième article, 1849, lxxxix.
- Mémoire sur les genres *Psalidognathus* et *Chiasognathus*, 1850, 263.
- Revue de l'ouvrage intitulé : *Diagnosen neuer Colcoptera aus Abyssinien*, von docteur J. R. Roth, 1852, 95.
- Examen de la monographie des *Anthicus* et genres voisins de M. de Laferté-Sénectère, 1852, 257.
- Liste des Coléoptères recueillis à Compiègne par l'auteur et M. Aubé, 1852, xxxi.
- Rectifications synonymiques de quelques Insectes décrits à tort comme nouveaux, 1852, lviii.
- Note relative à quelques points de synonymie entomologique, 1852, lxvi.

Notes synonymiques sur les espèces de la famille des *Pectinicornes* décrites dans le V<sup>e</sup> volume de l'*Handbuch der Entomologie*, par M. Burmeister, 1853, 67.

Note sur l'*Hybosorus arator* auctorum et sur le *Trox granulatus* Fabr., 1853, 87.

Description du *Trox italicus*, nouvelle espèce, 1853, 89.

Espèce nouvelle de Coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des Longicornes (genre *Thaumasus*), 1853, 419.

Notes entomologiques, 1853, 425.

Observations entomologiques, 1854, 77.

Rapport de la Commission chargée de l'examen de l'*Etmidomorphus Aubi* communiqué par M. Cussac, 1854, 521.

La *Coptodera massiliensis* doit être rapportée au genre *Lebia* : c'est la *L. univittata* Dej., 1854, XLV.

Note sur la *Cicindela Ritchii* Vigors (*C. Audouini* Barthélemy), 1854, LVI.

Remarques sur le mémoire de M. Perris concernant quelques espèces du genre *Chasmatopterus*, 1855, 235.

Étymologie critique du genre *Cholovocera*, 1855, LXXV (note).

Confirmation de l'opinion de M. Burmeister sur l'existence des tarses antérieurs chez les *Deltochilum hypona* et *arrogans*, 1855, cii.

Note sur le genre *Cnemaptalia* Costa et les espèces qui s'y rapportent, 1855, cxi.

Notes synonymiques sur quelques espèces de Coléoptères, 1856, xxii.

Critique d'un nouvel ouvrage de M. Gistel sur les noms des genres, 1856, xxxvi.

Communication sur les Coléoptères trouvés dans des ballots de laine vendus comme de l'Australie, 1856, XLVII, et 1858, CCXXIII.

Remarques sur la soudure des élytres chez les *Acmaeodera*, quoique les ailes soient éminemment propres au vol, 1856, LXXI.

Description sommaire de quatre nouvelles espèces de Coléoptères provenant de l'expédition aux mers arctiques, 1857, viii.

Note en réponse à la communication de M. Jacquelin Duval sur le genre *Helochares*, 1857, LXXVII.

Note sur l'*Olisthopus orientalis*, qui n'est autre que l'*Ol. græcus* de M. Brullé, 1857, xcv.

Note en réponse à M. Schaum sur le *Brachinus hebraicus*, l'*Hydrocanthus diophthalmus* et le *Nomius pygmæus*, 1857, CLXII.

Note sur les citations synonymiques, 1858, 311.

Note sur la *Coptodera (Lebia) unifasciata*, 1858, CLXXXI.

Le *Leptoderus Querilhacii* paraît appartenir au genre *Drimcotus*, 1848, CXCII.

Notes synonymiques sur le V<sup>e</sup> volume de l'*Handbuch der Entomologie* de M. Burmeister, Coléoptères Lamellicornes Xylophiles, 1859, 5.

Note sur la nomenclature entomologique, 1859, 607.

Notes entomologiques sur divers Coléoptères, 1859, 637.

Note relative au genre *Phlæozeteus* de M. Peyron, 1859, CXLIII.

Réponse à la note de M. Motschulsky sur l'*Oxythyrea Noemi*, 1859, CCVIII.

Réponse à la note de M. Schaum sur le genre *Phlæozotcus* et sur le *Pentodon puncticollis*, 1859, CCLV.

Remarques entomologiques, 1860, 331.

Description d'une nouvelle espèce de Coléoptères du genre *Microctus*, 1860, 334.

Réponse à quelques points de la note de M. Schaum, 1860, 640.

Coléoptères de Sicile recueillis par M. Bellier de la Chavignerie et description de dix espèces nouvelles, 1860, 717.

Note relative à la synonymie de deux espèces du genre *Corymbites*, 1860, CVIII.

**Orthoptères.** Le *Tetrix harpago* Serv. est aquatique et nage avec facilité, 1848, XXXIII.

**Hyménoptères.** Quelques détails sur une Fourmi (*Œcodoma cephalotes*), 1844, LXVII.

**Lépidoptères.** Chenilles qui ravagent les forêts du canton de Phalsbourg, 1848, LVI.

Papillons de *Tinèides* éclos dans une cave à Paris dans les premiers jours de l'année, 1855, VIII.

**Diptères.** Description sommaire d'un Diptère provenant de l'expédition aux mers arctiques, 1857, VIII.

**Articles généraux.** Préservatif proposé pour la conservation des collections, 1835, LXXVIII.

Notice nécrologique sur sir Patrick Walker, 1837, xcvi.

Quelques détails sur des Insectes de divers genres recueillis en Angleterre dans la gomme copale, 1844, lvi.

Discours comme Président de la Société pour 1847, iv.

Proposition à l'occasion du Catalogue de M. Gaubil, 1849, LXXXVII.

Lecture de l'analyse de divers mémoires contenus dans la 3<sup>e</sup> partie du XX<sup>e</sup> volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres, 1851, LXXX.

Note sur l'invasion regrettable de rectifications grammaticales dans les noms de genres, 1854, L.

Note sur les citations synonymiques en entomologie, 1858, 311, xxix et LXI.

Note sur les moyens de conserver les collections (poudre de Pyrèthre), 1858, CLIII.

Note sur la nomenclature entomologique, 1859, 607.

Réponse à la note de M. Kiesenwetter relative aux corrections des noms, 1859, LX.

Vœu touchant l'établissement d'un Musée d'histoire naturelle dans chaque chef-lieu de département, 1859, LXXX.

Réponse à quelques points de la note de MM. Schaum et Kiesenwetter, 1859, CCI.

Mémoire sur l'application de l'entomologie au commerce, 1860, 331.

### **REICHE (L.) et LABOULBÈNE.**

**Coléoptères.** Note sur quelque espèces de Coléoptères que M. Gaubil se proposait de décrire dans les Annales de la Société, 1852, xxxvi.

### **REICHE et Félicien de SAULCY.**

**Coléoptères.** Espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères recueillies par M. Félix de Saulcy, membre de l'Institut, dans son voyage en Orient, 1851, 561 ; 1856, 353 ; 1857, 169, 649, et 1858, 5.

**REICHENBACH.**

**Coléoptères.** Note sur l'habitat et les mœurs des *Byrrhus*, 1844, LIX.

**REPOS (V.), d'Avignon.**

**Lépidoptères.** Observations sur un nouveau moyen de nourrir le Ver à soie, 1848, XII.

**ROBERT (Ch.), de Liège.**

**Diptères.** Description de trois nouvelles espèces du genre *Diasta* et d'une nouvelle espèce du genre *Opomyza*, 1834, 459.

Description d'un Diptère nouveau du genre *Paramesia*, 1836, 537.

**ROBINEAU-DESVOIDY.**

**Coléoptères.** Mémoire sur le *Xenillus clypeator*, cru un Coléoptère, 1839, 455.

**Diptères.** Mémoire sur trois espèces nouvelles de *Malacomydes*, 1841, 251.

Notice sur l'*Herbine du Lys*, *Herbina liliorum*, 1841, 263.

Notice sur le genre Fucellie, *Fucellia*, et en particulier sur la *Fucellia arenaria*, 1841, 269.

Note sur le *Thyreophora cynophila*, 1841, 273.

Note sur le *Phasia crassipennis*, 1841, 274.

Études sur les *Myodaires* des environs de Paris, 1844, 5; 1846, 17; 1847, 285, 591; 1848, 429; 1850, 177.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Brachyopa*, 1844, 39.

Revendication de priorité sur l'usage des balanciers, 1845, XII.

Coup d'œil rétrospectif sur quelques points de l'entomologie actuelle, 1846, 347.

Note sur la vie d'une *Muscine* et d'une *Délie* dans du vinaigre de colchique, 1846, LXXXI.

Observations à l'occasion du mémoire de M. L. Dufour sur les *Phasies*, 1848, xciv.

Détails sur les mœurs de la *Scatella urinaria*, 1848, xciv.

Observations sur la *Lucilia dispar*, 1849, iv.

Note sur le genre *Thyreophora* et sur les trois espèces qui le composent, 1849, v.

Larves de diverses *Myodaires* ayant vécu aux dépens de l'homme, 1849, xvii.

Mémoire sur plusieurs espèces de *Myodaires entomobies*, 1850, 157.

Le genre *Trixa* doit cesser d'être placé parmi les *Myodaires entomobies* et être reporté dans la tribu des *Macropodies*, 1850, viii; 1855, xcv.

Note contenant la description d'une nouvelle espèce de *Myodaires* (*Rhinomyia Lamberti*), 1851, xxvi.

**Crustacés.** Mémoire sur les Crustacés fossiles du terrain néocomien de Saint-Sauveur, 1849, 95.

**Articles généraux.** Énumération des mémoires d'entomologie par lui présenté à l'Académie des Sciences, 1836, LXXVII.

Lettre sur l'usage des antennes chez les Insectes, 1842, xxiii.

### **ROJAS (Marc-Aurèle de).**

**Coléoptères.** Description d'un nouveau *Buprestide* (genre *Hyperantha*), 1855, 261.

Description de trois nouvelles espèces de Coléoptères de Venezuela, 1856, 693.

Observations sur quelques Coléoptères de la république de Venezuela, 1857, 329.

Remarque sur l'*Arcscus caudatus* Sallé, 1858, 61.

### **ROMAND (de), de Tours.**

**Coléoptères.** Note sur le *Clytus 4-punctatus*, 1846, xxxiii.

**Névroptères.** Note relative à la larve du *Myrmelco formicarium*, 1850 XLV.



**Hyménoptères.** *Epomidiopteron Julii*, nouveau genre et nouvelle espèce d'Hyménoptères de la famille des *Fouisseurs*, tribu des *Scolietes*, 1835, 653.

Description d'une nouvelle espèce de *Paxillomme*, 1838, 433.

Lettre à l'occasion des recherches de M. Léon Dufour sur l'*Andrena lagopus*, 1840, xxvi.

Notice sur un Insecte nouveau, *Formila Chevrolatii*, 1846, xxxii.

Détails sur l'appendice que présente la tête d'un *Chrysanteda* ♂, 1849, xxxvi.

Lettre à M. L. Dufour en réponse à ses *Mélanges entomologiques*, 1851, li.

**Lépidoptères.** Lettre à M. Pierret sur trois Lépidoptères retenus par la trompe dans les corolles d'une *Oenothera speciosa*, 1850, xl.

**Diptères.** Notes sur la larve du *Leptis vermilio*, 1833, 498.

## RONDANI.

**Diptères.** Species Italicæ generis *Hebelomi*, ex Ins. Dipteris : fragmentum septimum ad inserviendum Dipterologiam Italicam, 1843, 263.

Species italicæ generis *Calliceræ*, ex Ins. Dipteris distinctæ et descriptæ : fragmentum octavum ad inserviendum Dipterologiæ Italicæ, 1844, 61.

Species Italicæ generis *Chrysotoxi*, ex Ins. Dipteris observatæ et distinctæ : fragmentum decimum ad inserviendum Dipterologiæ Italicæ, 1845, 193.

Note contenant la description latine de l'*Agromyza æneiventris*, 1845, xlvii.

Nota septima ad inserviendum Dipterologiæ Italicæ, nova species generis *Ochtheræ*, 1847, xxix.

Species Italicæ generis *Eumeri* observatæ et distinctæ : fragmentum decimum sextum ad inserviendum Dipterologiæ Italicæ, 1850, 117.

Nota sexta pro Dipterologia Italica de nova specie generis *Cerix*, *Fabricii*, detecta et descripta, 1850, 211.

**ROUGET (Auguste).**

**Coléoptères.** Notice sur l'*Homalopus Loreyi*, 1844, 207.

Note sur le *Cryptocephalus informis* Suffr., 1849, 159.

Notice sur une monstruosité observée dans une antenne de *Scraptia fusca*, 1849, 437.

Notice sur une production parasite observée sur le *Brachinus crepitans*, 1850, 21.

Détails sur l'habitat du *Bolboceras mobilicornis* aux environs de Dijon, 1853, xxv.

Description d'une nouvelle espèce de *Lathrobium*, 1854, 83.

Description de deux espèces nouvelles de Coléoptères des environs de Dijon (genres *Microrhagus* et *Ceutorhynchus*), 1857, 749.

Note sur l'habitat et les différences sexuelles du *Catopsimorphus arenarius* Hampe, 1857, 756.

**Lépidoptères.** Lettre sur une apparition nombreuse à Dijon de la chenille de la *Phalène*, que Geoffroy nomme la *décolorée*, 1849, lv.

**ROUSSEAU (Emmanuel).**

**Coléoptères.** Observations relatives à la distinction des sexes chez les *Dermestes*, 1838, lIII.

**ROUZET.**

**Coléoptères.** Note sur deux espèces de Coléoptères de la faune parisienne (genres *Abræus* et *Philothermus*), 1848, xIII.

Histoire des métamorphoses des *Anobium abietis* et *striatum*, 1849, 305.

Description d'une nouvelle espèce de *Curculionites* constituant un genre nouveau, *Sophrorhinus Duvernoyi*, 1855, 79.

## S.

**SALLÉ.**

**Coléoptères.** Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 1849, 297 et 429.

Description d'une nouvelle espèce de *Prionia* provenant de la république de Venezuela (genre *Metopocælus*), 1853, 649.

Description de dix espèces nouvelles de Coléoptères de la république dominicaine, 1855, 263, et 1856, 687.

Description d'une *Gymnétide* nouvelle, 1857, 627.

**Lépidoptères.** Diagnose de la *Saturnia Montezuma*, 1856, xcii.

Note sur la soie sauvage du Mexique et description du *Bombyx* qui la produit, 1857, 15.

Note sur le *Capullo de Madroño*, 1857, 20.

**SAPORTA (comte de).**

**Lépidoptères.** Notice sur l'*Orgyia trigotephra*, le *Phlogophora adulatrix*, le *Satyrus epistygne* et le *Bombyx pytiocampa*, 1834, 183.

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur M. Boyer de Fonscolombe, 1853, xiii.

**SAULCY (Félicien de).**

**Coléoptères.** Note contenant des détails sur divers Coléoptères, 1860, LXVII.

**SAULCY (Félicien de) et L. REICHE.**

**Coléoptères.** Espèces nouvelles ou peu connues des Coléoptères recueillis par M. Félix de Saulcy dans son voyage en Orient, 1855, 561 ; 1856, 353 ; 1857, 169, 649, et 1858, 5.

**SAUNDERS et JEKEL.**

**Coléoptères.** Description de quelques *Curculionites*, 1855, 289.

**SAUSSURE (de).**

**Hyménoptères.** Description du genre *Ischnogaster*, Hyménoptère de la famille des *Vespides*, 1852, 19.

Note sur un nouveau genre de *Guêpe* (genre *Synacca*), 1852, 549.

Résumé d'une note sur la tribu des *Masariens*, 1853, xvii et lxxi.

Note sur les *Polistes* américains, 1857, 309.

Description de quelques *Vespides* nouveaux, 1857, 315.

Description de diverses espèces nouvelles ou peu connues du genre *Scolia*, 1858, 192.

**Articles généraux.** Lettre à M. Sichel sur son exploration scientifique du Mexique, 1856, xi.

**SCHAUM.**

**Coléoptères.** Observations critiques sur la famille des *Lamellicornes Mélitophiles*, 1844, 333.

Note relative à la distinction des espèces dans le genre *Goliathus*, 1848, li.

Quelques observations sur le travail de M. Jacquelin Duval, *De Bem-bidius europæis*, 1853, 61.

Quelques observations sur le groupe des *Panagéites* et description de sept nouvelles espèces, 1853, 429.

L'*Elmidomorphus Aubei* de M. Cussac est le *Bagous petrosus* Herbst ou *B. latirostris* Dej., 1853, ix.

Le *Macropalpus pallipes* est le *Coryphium angusticolle* Kirby, 1853, xxxv.

Réponse aux observations de M. Aubé sur le *Macropalpus* Cussac, 1853, xxxvii.

Erratum : Le synonyme de *Bagous petrosus* est *latirostris* et non *laticollis*, 1853, li.

Mélanges entomologiques, 1857, LXXVIII.

Réponse à la notice de M. Dohrn relative au Catalogue de Stettin, 1858, LXXXVII.

Note sur les genres *Singilis* et *Phlæozetcus*, sur les *Xylomotrogus* et *Elaphropus*, ainsi que sur diverses observations de M. de Motschulsky, 1860, 633.

**Hyménoptères.** Note sur le *Masaris vespiformis* et le *Celonites dispar*, 1852, LXXXVI; 1853, 653.

**Articles généraux.** Note sur la vie et les travaux entomologiques de Germar, 1853, 689.

Note sur la nomenclature entomologique, 1859, CXCVII.

### **SCHEMBRI, de Malte.**

**Hyménoptères.** Note contenant la description du *Leucopsis Costæ*, 1847, LXXXVI.

### **SELLA, de Turin.**

**Coléoptères.** Diagnose du *Carabus olympiæ*, 1855, LXXXVI.

### **SELYS-LONGCHAMPS (de).**

**Névroptères.** Note sur quelques *Libellules* d'Europe, 1843, 107.

Observations à propos de sa publication des *Libellules* d'Europe, 1847, XCII.

Catalogue des *Odonates* de la Sicile, 1860, 741.

**Articles généraux.** Détails sur les chasses faites aux Eaux-Bonnes, au Cirque de Gavarnie et à Biarritz, 1858, LXXII et CCX.

### **SICHEL.**

**Coléoptères.** Analyse d'une lettre de M. Passerini sur les habitudes d'une espèce de *Lixus*, 1855, XCVII.

Observations sur la note de M. Lucas touchant les mœurs de la *Sitaris muralis*, 1860, XIX.

**Névroptères.** Observations sur l'absence d'un système nerveux chez la *Nemoptera lusitanica*, 1856, xxv.

**Hyménoptères.** Note sur la rareté relative de certains Hyménoptères, 1852, 561.

Plusieurs individus du *Bombus lapponicus* trouvés aux environs de Paris; observations à ce sujet, 1852, XLVI.

Analyse de la revue critique des *Hyménoptères fouisseurs* par M. Wesmaël, 1852, LXIII.

Remarques sur trois espèces de *Polistes* qui ne sont que des variétés de la même espèce, 1854, XII.

Quelques espèces rares trouvées aux environs de Paris et accouplements dont le mâle et la femelle étaient désignés comme espèces nouvelles, 1854, XLVIII.

Communication de plusieurs individus du *Metæcus paradoxus* pris dans des nids de *Vespa vulgaris*, 1854, LIII et LVIII.

Larves de deux espèces de *Braconides* éclos de *Timarcha tenebricosa*; observations à ce sujet, 1854, LVII.

Le *Cirrospilus acasta* vit dans le nid de l'*Anthophora retusa*, 1854, LVIII.

*Conops* trouvés en grand nombre dans des boîtes de *Bombus*, 1854, LVIII.

*Trigonalis anglicana* trouvée près de Paris, 1854, LXVII.

Communication et diagnose du *Rophites bifoveolatus*, 1854, LXXIV.

Communication et diagnose de l'*Anthophora pubescens*, 1854, LXXVI.

Détails sur les mœurs des *Pemphrédonides*, 1855, VII.

Deux individus de la *Formica flava* trouvés dans une boîte de Coléoptères; réflexions à cette occasion, 1855, XIX.

Deux femelles blanches du *Bombus sylvarum* reçues des Basses-Alpes, 1855, LXXIII.

Pris à Charenton et par un temps couvert les deux sexes de la *Scolia 4-punctata*, 1855, LXXXI.

Examen de l'Hyménoptère parasite de l'*Hemerobius perlæ*, 1855, LXXXVIII.

Les *Conopides* sont parasites de plusieurs Hyménoptères mellifères, 1855, CXIII, et 1856, LXIII.

Présentation et diagnose de l'*Anthophora Passerinii*, 1856, XIX.

Communication sur les *Fourmis* des serres du Jardin-des-Plantes, 1856, XXIII.

Identité du *Tetramorium Kollar*i avec l'espèce de l'Inde, 1856, XXIII.

La *Formica aliena* n'est qu'une variété de la *F. flava*; preuve à l'appui, 1856, XXXI.

Les parasites de la *Cecidomyia tritici* sont du genre *Platygaster*, 1856, XXXVIII.

Diagnose de l'*Abia aurulenta*, 1856, LXXVII.

La *Lissonota insignita* ne forme qu'une seule espèce avec *L. verberans*, 1856, LXXVIII.

Le *Bassus ornatus* ne forme qu'une seule espèce avec *B. rufipes*, 1856, LXXVIII.

Rapporter à l'*Hemiteles floricator*, ou à une espèce nouvelle très-voisine, le parasite de l'*Hemerobius perlæ* envoyé par M. Doumerc, 1857, XCVI.

Réaumur a trouvé un *Trichodes* dans les nids de l'*Abeille maçon*, 1858, CXIII.

Note sur un *Bombus lapidarius* hermaphrodite, 1858, CCXLVIII.

Liste des Hyménoptères recueillis dans les Basses-Alpes, 1860, 215.

Liste de ceux recueillis en Sicile, avec diagnoses et descriptions d'espèces nouvelles, 1860, 749 et 751.

**Articles généraux.** Proposition relative aux Tables des Annales, 1856, LXI.

Remarques sur l'intérêt que présente l'étude des parasites, 1858, CXIII.

### SICHEL et AMYOT.

**Diptères.** Compte rendu des observations de M. Ch. Bazin sur la *Cecidomyia*, 1856, IX.

### SIGNORET (V.).

**Hémiptères.** Description de deux *Hémiptères-Homoptères*, tribu des *Octicelles*, groupe des *Cicadides*, 1847, 293.

- Description de deux *Cigales* de Java, du genre *Cicada*, 1847, 297.
- Description d'un *Hémiptère Hétéroptère* formant le type d'un nouveau genre (genre *Petascelis*), 1847, 301.
- L'*Agonosoma spectabile* Costa a été depuis assez longtemps décrit et figuré par Herrich-Schæffer sous le nom d'*Agonosoma flavicinctum*, 1848, XXI.
- Description d'une nouvelle espèce d'*Hémiptère Homoptère* du genre *Odontoptera* Carreño, 1849, 177.
- Description d'une nouvelle espèce de *Lystra*, 1850, 65.
- Description de plusieurs *Hémiptères* nouveaux recueillis par M. Bocardé dans la Guyane portugaise, 1850, 67.
- Observations sur le *Phricodus hystrix*, *Hémiptère Hétéroptère*, 1850, 327.
- Note sur le groupe des *Eurymélides*, 1850, 497, et 1851, 669.
- Quelques détails sur les dégâts causés aux poiriers et aux pommiers par le *Tingis pyri*, 1850, LI.
- Description d'une nouvelle espèce d'*Hémiptères Hétéroptères* du groupe des *Mictides*, genre *Pctascelis*, 1851, 121.
- Description de nouvelles espèces d'*Hémiptères*, 1851, 329.
- Note rectificative du travail de l'auteur sur de nouvelles espèces d'*Hémiptères*, 1851, CVIII.
- Notice sur quelques *Hémiptères* nouveaux ou peu connus, 1852, 539.
- Notice sur un nouveau genre d'*Hémiptères* de Java (*Centrocnemis*), 1852, 545.
- Communication de plusieurs *Homoptères* recueillis dans le bois du Vésinet, 1852, LV.
- Moyen de découvrir les mâles des *Coccus* du laurier-rose et du rosier, 1852, LVI.
- Revue iconographique des *Tettigonides*, 1853, 13, 323, 661, 1854, 5, 21, 483; 1855, 49, 225 et 766.
- L'habitat de quelques *Hémiptères* et rectification synonymique, 1853, XXXIII.
- Description d'une espèce nouvelle faisant genre dans l'ordre des *Hémiptères Hétéroptères*, famille des *Azopides* (*Leptolobus*), 1855, 61.
-



Note sur plusieurs espèces de la famille des *Fulgorites*, 1855, v.

Essai monographique du genre *Micropus* Spinola, 1857, 23; 1858, xxx.

Description d'un nouveau genre du groupe des *Emésides* (genre *Stenosemus*), 1858, 251.

Description de nouvelles espèces d'Hémiptères (*Eucophora Dufourii*), 1858, 497.

Note sur des *Hémiptères Hétéroptères*, 1858, 499.

Note sur un groupe nouveau d'*Homoptères* publié par M. Stål, de Stockholm, 1858, xxxviii.

Note rectificative de synonymie, 1858, xxxix.

Monographie du genre *Corizus*, 1859, 75.

Faune des Hémiptères de Madagascar, 1860, 177 et 917.

Hémiptères de Sicile recueillis par M. Bellier de la Chavignerie, 1860, 738.

**Articles généraux.** Insectes conservés dans un flacon contenant des feuilles hachée de laurier-cerise, 1860, lxix.

## SOLIER.

**Coléoptères.** Essai sur les *Buprestides*, 1833, 261, et 1834, xcix.

Observations sur les deux genres *Brachinus* et *Aptinus* du *Species* de M. le comte Dejean, et description d'une nouvelle espèce de *Gyrinus*, 1833, 450.

Observations sur la tribu des *Hydrophiliens* et principalement sur le genre *Hydrophilus* de Fabricius, 1834, 299.

Extrait d'une lettre sur les tarsi des Longicornes, 1834, 400.

Essai d'une division des *Coléoptères hétéromères* et d'une monographie de la famille des *Collaptérides*, 1834, 479; 1835, 132, 249 et 507; 1836, 5, 303, 403, 635; 1837, 151; 1838, 5, 159; 1840, 307; 1841, 29.

Nouvelles observations sur les genres *Aptinus*, *Pheropsophus* et *Brachinus*, 1834, 655.

Observations sur le genre *Ditomus*, 1834, 659.

Lettre à M. Al. Lefebvre sur les tarsi chez les *Hétéromères*, 1834.

Description de quelques nouvelles espèces de la famille des *Carabiques*, 1835, 111.

Description de la *Parmena pilosa* sous tous ses états, 1835, 123.

Prodrome de la famille des *Xystropides*, 1835, 229.

Mémoire sur quatre genres de la famille des *Carnassiers terrestres*, 1836, 589.

Description d'une nouvelle espèce du genre *Cryptocephalus*, 1836, 687.

Réponse à l'examen par M. Brullé des genres *Brachinus* et *Ditomus*, 1836, 691.

Observations sur quelques particularités de la stridulation des Insectes et en particulier sur le chant de la *Cigale*, 1837, 199.

Réponse à la note de M. Lacordaire sur l'habitat de quelques *Mélasomes*, 1837, 481.

### **SOLIER et GAY.**

**Coléoptères.** Mémoire sur deux genres remarquables de *Curculionites* du Chili (genres *Eublepharus* et *Physothorus*), 1839, 5 et XLIX.

### **SOMMER (M.-C.).**

**Coléoptères.** Description d'une nouvelle espèce appartenant au groupe des *Carabiques patellimanes* (genre *Isotarsus*), 1852, 653.

### **SPENCE (Robert), de Londres.**

**Coléoptères.** Description d'une nouvelle espèce de *Carabe*, 1833, 500.

### **SPINOLA (marquis Max.), de Gènes.**

**Coléoptères.** Note sur un Coléoptère monstrueux, 1835, 587.

Lettre sur un groupe de *Buprestides*, 1837, 101.

Essai sur les espèces des genres *Steraspis* et *Acmaeodera*, famille des *Buprestides*, 1838, 303.

Note sur le *Phyllocerus* de Sicile, 1858, XLI.

**Hémiptères.** Essai sur les *Fulgorelles*, sous-tribu de la tribu des *Cicadaires*, ordre des *Rhyngotes*, 1839, 130 et 339.

**Hyménoptères.** Compte rendu des Hyménoptères recueillis par M. Fischer de Waldheim pendant son voyage en Égypte, 1838, 464.

Note sur les *Odynèrcs* des environs de Gênes, 1839, xxxvii.

Hyménoptères recueillis à Cayenne par M. Leprieur, 1840, 129, et 1841, 309.

Synonymies, 1842, xxxv.

Note sur quelques Hyménoptères peu connus recueillis en Espagne, 1843, 127.

### STANTON (N.-C.).

**Lépidoptères.** Note sur une chenille qui vit dans l'intérieur des feuilles de la vigne (genre *Elachista*), 1855, 211.

Quelques mots sur les mœurs des chenilles de *Tinéites* pour servir d'introduction à l'étude des *Lépidoptères* de cette tribu et pour faciliter leur chasse, 1856, 749, 1858, 159.

### STAL (C.), de Stockholm.

**Hémiptères.** Description du genre *Copicerus* Swartz, 1857, 337.

Description du *Micropus fulvipes*, 1858, xxxi.

### STAUDINGER.

**Lépidoptères.** Description d'un Lépidoptère nouveau des Hautes-Pyrénées (genre *Psyche*), 1860, 663.

### STEUART.

**Coléoptères.** Description d'une nouvelle espèce de *Carabe* du nord de la Chine, 1855, 75.

### STRAUS-DURKHEIN.

**Crustacés.** Observations sur l'*Etheria Dehalacensis*, 1837, xxii.

**SUFFRIAN.**

**Coléoptères.** Extraits de ses monographies (*Cryptocephalus* et *Chrysomela* (Voyez Fairmaire), 1848, 285 ; 1849, 143, 1850, 271 ; 1853, 91 ; 1854, 313 ; 1858, 531.

**T.****TAPPES (Gabriel).**

**Articles généraux.** Notice sur la vie et les travaux de Passerini, 1858, 187.

**THIBÉZARD.**

**Coléoptères.** Il a trouvé près de Laon l'*Engis sanguinicollis* et un grand nombre d'espèces d'*Harpalus*, 1853, xxix.

**THION.**

**Coléoptères.** Description des organes de la manducation chez les *Stènes*, 1835, 153.

**THOMSON (James).**

**Coléoptères.** Description de quelques Coléoptères nouveaux ou peu connus, 1856, 317.

Description de trois *Carabes*, 1856, 336.

Palpe labial de *Manticora* ayant cinq articles au lieu de quatre ; discussion à ce sujet, 1856, xciv.

Réponse à la note de M. Chevrolat sur la synonymie de quelques Insectes exotiques, 1856, cvi.

Remarques sur le genre *Triammatus*, de la famille des *Cerambycides*, 1857, 107.

Diagnose du *Golofa imperialis*, 1858, CXLVI.

Diagnose spécifique d'un nouveau *Psalidognathe* (*P. Salleri*), 1858, CCXLVI.

Monographie de la famille des *Monommides*, 1860, 5.

### TOURNIER.

**Coléoptères.** Diagnoses de trois Coléoptères nouveaux, 1859, xcvii CLXIII (attribuées par erreur à M. de Saussure).

Le *Carabus glacialis* n'est qu'une variété du *C. depressus*, 1860, xxv.

La *Feronia Tournieri* n'est qu'une variété du *Molops terricola*, 1860, xxv.

L'*Anchomenus antennatus* ne doit pas être séparé du *pallipes*, 1860, xxvi.

Description de la variété *Linderi* du *Carabus depressus*, 1860, xxvi.

Diagnoses de deux nouvelles espèces de Coléoptères propres à la faune de l'Europe (genres *Aubeomysus* et *Tanymecus*), 1860, LXXXI.

### TROBERT.

**Coléoptères.** Note contenant la description d'une nouvelle espèce de Coléoptères (*Cicindela syriaca*), 1844, xxxvi.

### TRUQUI.

**Coléoptères.** *Novæ Histerinorum et Cryptocephalorum species*, 1852, 61.

Le genre *Psilodema* de M. Blanchard doit entrer en synonymie du genre *Amphicoma* de Latreille, 1855, xviii.

Note sur la synonymie de *Cicindela Ritchii* avec la *Peltieri*, 1855, XLIX.

### TURPIN.

**Arachnides.** Compte rendu de l'examen de l'*Acarus horridus*, 1837, XCIII.

### TYRRELL (J.).

**Articles généraux.** Mémoire sur la circulation du sang chez les Insectes, 1835, XLV.

## V.

**VALLOT.**

**Hyménoptères.** Parasites de la *Noctua persicariæ*, 1834, LXIII.

Observations sur les Insectes de l'ordre des *Hyménoptères*, 1849, LXIII.

**VILLA (Ant.).**

**Coléoptères.** Observations sur le *Cryptocephalus Loreyi*, 1838, XXXIII.

**Articles généraux.** Note nécrologique sur M. de Cristofori, 1837, XCVII.

**VILLARET (Foulques de).**

**Coléoptères.** Description d'une nouvelle espèce du genre *Lampyris*, 1833, 352.

**VILLIERS (de).**

**Coléoptères.** Détails sur les premiers états du *Lucanus cervus*, 1842, XI.

**Lépidoptères.** Observations sur le *Bombyx pityocampa* de Godart, 1832, 201.

Observations sur l'*Écaille pudique* de Godart, 1832, 203.

Note sur un accouplement de deux *Zygènes* d'espèces différentes, 1832, 421.

Morceau de toile de soie paraissant être le produit du travail de quelques chenilles vivant en société, 1841, VII.

Quelques observations sur les mœurs de certains Lépidoptères nocturnes, 1842, XI.

**Crustacés.** Notice sur le *Brachiopode stagnal* de Latreille, *Gammarus stagnalis* de Fabr., 1836, LXXIII.

**VILLIERS (de) et GUENÉE.**

**Lépidoptères.** Note sur une *Orgyia* nouvelle, 1835, 635.

## W.

**WACHANRU, de Marseille.**

**Lépidoptères.** Éclosion en avril d'une chrysalide de *Saturnia pyr* piquée d'une épingle en septembre, 1852, xli.

**WAGA (de).**

**Coléoptères.** Quelques détails sur les mœurs du *Rhyzodes europæus*, 1841, v.

Description d'un Insecte Coléoptère indigène de la Chine trouvé dans du thé du commerce (*Anisoplia theicola*), 1842, 273.

**Orthoptères.** Observations sur diverses migrations de *Sauterelles*, 1860, xc.

**Hémiptères.** Description d'une nouvelle espèce d'*Ophthalmicus*, 1839, 523.

*Diraphia*, Novum Insectorum genus *Liviæ* proximum, 1842, 275.

Note sur l'*Ophthalmicus dispar*, 1848, vi.

**Diptères.** *Adapsilia*, genre de Diptère de la sous-tribu *Dolichocères* de Macquart, 1842, 279.

**Aptères.** Description d'un Insecte Aptère qui se trouve en quantité aux environs de Varsovie (*Achorutes biclancensis*), 1842, 264.

**Myriapodes et Crustacés.** Description d'une nouvelle espèce européenne de Crustacés, *Philoscia notata*, et d'un nouveau Myriapode, *Gervaisia costata*, 1857, 827.

**Crustacés.** Nouvelle espèce de Crustacés du genre des *Branchips*, 1842, 261.

**Articles généraux.** Note sur les Insectes qui exercent leurs ravages en Pologne, 1857, cxxvi.

**WALCKNAER (baron).**

**Arachnides.** Mémoire sur une nouvelle classification des *Aranéides*, 1833, 414.

Mémoire sur une nouvelle espèce de *Mygale*, sur les *Théraphoses* et les divers genres dont se compose cette tribu d'*Aranéides*, 1835, 637.

Atrophie du deuxième œil antérieur chez une *Clubione corticalis*, 1835, LXX.

Rectification de la synonymie de l'*Aranea domestica*, 1834, XIX.

Lettre sur les *Scytodes longipes* et *rufipes*, 1845, XC.

Note sur une nouvelle famille du genre *Tetragnathe* dans les *Araignées*, 1847, LXIV.

**Articles généraux.** Recherches sur les Insectes nuisibles à la vigne, 1835, 687, et 1836, 219.

Discours à l'occasion de l'inauguration du buste de Latreille, 1835, XXIII.

**WALKER (Francis).**

**Hyménoptères.** Description des *Chalcidites* trouvés au Bluff-de-Saint-Jean, dans la Floride orientale, 1843, 145.

**WENCKER.**

**Coléoptères.** Description de trois nouvelles espèces du genre *Apion*, 1858, CV.

Description de plusieurs Coléoptères nouveaux, 1858, CCXXXVI.

**WESMAEL.**

**Coléoptères.** Extrait du travail de l'auteur sur les *Coléoptères carnassiers* de la Belgique, 1835, XXXVIII.

Moyen qui permet aux *Elmis* et aux *Dryops* de vivre sous l'eau ; mais les *Georyssins* vivent hors de l'eau, 1835, XXXIX.



**Hémiptères.** Observations sur la phosphorescence du *Fulgore porte-lanterne*, 1837, LXVII.

**Hyménoptères.** Supplément à la monographie des *Odynères* de Belgique, 1836, xvii.

Notice sur une nouvelle espèce d'*Ichneumon*, 1837, xxiii.

Mœurs des *Bracons*, 1837, LXVII.

**Lépidoptères.** Notice sur une *Argynnis paphia* hermaphrodite, 1837, LXIII.

Note sur un cas de difformité de la *Nymphalis populi*, 1837, xci.

**Diptères.** Notice sur les métamorphoses de plusieurs larves de *Diptères*, 1837, LXXXIX.

### WESTWOOD (P.-O.).

**Coléoptères.** Erreurs et omissions signalées dans la notice de M. Le-fevre et la figure du *Thaneroclerus Bugueti*, 1838, xiii et xviii.

Note sur deux espèces de Coléoptères du genre *Cholovocera* rapportés de Madère par M. Wollaston, 1850, LIX.

**Hémiptères.** Mémoire sur les genres *Xylocoris*, *Hylophila*, *Microphysa*, *Leptopus*, *Velia*, *Microvelia* et *Hebrus*, avec quelques observations sur les *Amphibicorisæ* de M. Dufour, et sur l'état imparfait mais identique de certaines espèces, 1834, 637.

Observations sur la famille des *Fulgorides*, 1838, xxxviii.

**Hyménoptères.** Note sur les habitudes de certaines espèces d'*Hyménoptères fouisseurs*, 1836, 297.

**Lépidoptères.** Chenille de *Lépidoptère* nocturne observée en Chine comme parasite de la *Fulgora candelaria*, 1850, LX.

**Diptères.** Insectorum nonnullorum novorum (ex ordine Dipterorum) descriptiones, 1835, 681.

**Aptères.** Note sur le genre *Campodea*, 1844, LII.

**Articles généraux.** Lettre à M. Amyot sur la méthode mononymique, 1848, LXX.

**WILD (Ph.).**

**Hémiptères.** Lettre de Baltimore relative aux mœurs de la *Cicada septendecim*, 1852, xviii.

**WOLF, de Berne.**

**Articles généraux.** Notice nécrologique sur M. Neuwyler, de Dissenhofen, 1845, cv.

**Y.****YERSIN.**

**Orthoptères.** Extrait d'une lettre à M. L. Brisout de Barneville sur les *Orthoptères* et quelques *Hémiptères* des environs d'Hyères en Provence, 1856, 737.

Observations sur le *Gryllus Heydenii*, 1857, 761.

Note sur un Orthoptère nouveau (*Pterolepis alpina*), 1858, 111.

Note sur quelques Orthoptères d'Europe nouveaux ou peu connus, 1860, 509.

**Z.****ZETTERSTEDT.**

**Diptères.** Monographia *Scatophagarum Scandinaviæ*, 1835, 175.





## XIX.

### TABLE DES PLANCHES.



#### COLÉOPTÈRES.

**Acmæodera**, D. (1), 1833, pl. 10.

**Adellum austro-caledonicum**, 1860, pl. 7.

**Adelostoma**, D., 1837, pl. 7.

**Adesmia**, D., 1835, pl. 15.

**Æpus Robinii**, D., 1849, pl. 2, expl. p. 37, et larve 1850, pl. 16.

**Agapanthia Osmanlis**, 1858, pl. 1.

**Agathidium seminulum**, larve, 1854, pl. 2, expl. p. 53.

**Agrilus**, D., 1833, pl. 12. — *biguttatus*, larve, 1843, pl. 2 et 10. —  
*viridis*, larve, 1837, pl. 8.

**Agrius fallaciosus**, D., 1854, pl. 19.

**Agrypnus atomarius**, métamorphoses, D., 1852, pl. 4; 1854, pl. 5,  
fig. 228 à 232. — *Judaicus*, 1856, pl. 12. — *varius*, D., 1846, pl. 2.

**Akis punctata**, D., 1836, pl. 24.

**Alaus nobilis**, D., 1855, pl. 14.

**Allocerus dilaticornis**, 1832, pl. 12.

**Allorhina Lansbergei**, D., 1857, pl. 13.

**Alphitobius mauritanicus**, métamorphoses, D., 1857, pl. 4, expl. p. 84.

(1) La lettre D qui suit les noms de genres ou d'espèces indique que la planche contient des détails anatomiques ou autres.

**Altica** *discedens, variipennis*, 1859, pl. 8.

**Alurnus** *cyaneus*, 1844, pl. 9. — *Lansbergei*, D., 1849, pl. 13. — *undatus*, 1844, pl. 9.

**Amaurodes** *Passerinii*, D., 1844, pl. 11.

**Amaurops** *Aubei*, D., 1852, pl. 3. — *gallicus*, 1859, pl. 1.

**Amblychella** *Piccolomini*, D., 1839, pl. 19.

**Ammophorus**, D., 1838, pl. 2.

**Amphion** *vittatum*, D., 1839, pl. 19.

**Anallista** *Lafertei*, D., 1844, pl. 9.

**Anaspis** *maculata*, D., 1847, pl. 1, expl. p. 35.

**Anatolica**, D., 1835, pl. 8.

**Anchomenus** *novæ-zelandiæ*, D., 1843, pl. 1.

**Anchonus** *cribricollis*, D., 1849, pl. 14.

**Ancistrotus** *aduncus*, 1853, pl. 1.

**Ancylocheira** *flavo-maculata*, fig. 189-194, *8-guttata*, fig. 195-199, D., 1854, pl. 4.

**Ancystrosoma** *farinosum*, D., 1849, pl. 8.

**Anisoplia** *theicola*, 1841, pl. 11.

**Anoblum** *abietis*, D., 1849, pl. 9, expl. p. 210. — *molle*, D., 1854, pl. 18, fig. 284-289. — *striatum*, 1849, pl. 9.

**Anochila** *republicana*, 1848, pl. 8.

**Anodesis** *Cleryi*, D., 1834, pl. 14. — *giganteus*, 1847, pl. 5.

**Anomala** *rugatipennis*, D., 1851, pl. 1.

**Anophthalmus** *crypticola*, *Doriæ*, *gallicus*, *Ghilianii*, *orcinus*, *Pandellei*, 1849, pl. 1.

**Anthaxia**, D., 1833, pl. 12. — *divina*, 1846, pl. 12. — *morio*, 1854, pl. 5, fig. 210-216. — *Passerinii*, 1837, pl. 16.

**Anthia** *alvcolata*, 1844, pl. 7. — *costata*, 1836, pl. 5. — *Melly*, 1844, pl. 7.

**Anthipna** *Carcelii*, D., 1833, pl. 9.

**Anthicus** *Antonix*, *Bremei*, ♂, ♀, *brunneus*, *instabilis*, ♂, ♀, *melanophthalmus*, *minutus*, *variabilis*, 1842, pl. 10.

**Anthoblum** *impressicolle*, 1851, pl. 11.

**Anthocomus** *lateralis*, 1854, pl. 18, fig. 254-259.

**Anthribus metallicus**, 1860, pl. 7.

**Antodon Burmeisteri**, D., 1844, pl. 8.

**Apate capucina, sexdentata, sinuata**, D., 1850, pl. 16, [expl. p. 570.

**Aphanisticus**, D., 1833, pl. 12.

**Aphodius carpetanus**, 1847, pl. 4. — *dilatatus*, 1856, pl. 12.

**Aplon apricans**, D., 1843, pl. 2. — *Truquii*, 1858, pl. 1. — *ulicicola*, D., 1840, pl. 6, expl. p. 99. — *ulicis*, D., 1847, pl. 3, expl. p. 253.

**Apobletes errans**, 1860, pl. 15, x, n° 11. — *Migneauxii*, 1860, pl. 15, x, n° 2. — *Montrouzieri*, 1860, pl. 15, x, n° 6. — *Parensis*, 1860, pl. 15, x, n° 8. — *ridens*, 1860, pl. 15, x, n° 7. — *Schaumet*, 1860, pl. 15, x, n° 4. — *tener*, 1860, pl. 15, x, n° 5.

**Apotomus rufithorax**, 1837, pl. 16.

**Apriona gracilicornis**, 1859, pl. 14.

**Aptinus**, D., 1834, pl. 16.

**Arachnosphærus megacephalus**, D., 1856, pl. 8.

**Arescus caudatus**, D., *4-maculatus*, D., 1849, pl. 13.

**Aristus capito**, D., *sulcatus*, D., 1834, pl. 17.

**Arthrodeis rotundatus**, D., 1834, pl. 13.

**Asida**, D., 1836, pl. 11.

**Aspisoma candellaria**, D., 1845, pl. 7.

**Athous rhombeus**, D., 1853, pl. 13, et 1854, pl. 5, fig. 243-246. — *rufus*, D., 1854, pl. 5, fig. 233-242.

**Attelabus curculionoides**, D., 1841, pl. 1.

**Aulacium carinatum**, D., 1842, pl. 5.

**Aulacosternus Edwardsii**, 1853, pl. 6, VII, n° 2. — *zelandicus*, D., 1853, pl. 6, VII, n° 1.

**Auladera**, D., 1836, pl. 7.

**Aulonium bicolor**, D., 1853, pl. 18, fig. 101-109.

**Bacanius**, D., 1856, pl. 14. — *humicola*, 1856, pl. 14, XLI, n° 1. — *misellus*, D., 1856, pl. 14, XLI, n° 3. — *punctiformis*, 1856, pl. 14, XLI, n° 4. — *rhombophorus*, D., 1856, pl. 14, XLI, n° 2.

**Baridius tabaci**, D., 1855, pl. 14.

**Bellionota**, D., 1833, pl. 12.

**Bembidium**, D., 1854, pl. 12 et 13. — *latum*, 1858, pl. 9. — *striatum*, palpe monstrueux, D., 1850, pl. 16.

**Blaps** *fatidica*, *producta*, D., 1852, pl. 15, expl. p. 612.

**Böletobius** *distigma*, 1852, pl. 3.

**Brachinus**, D., 1834, pl. 16. — *crepitans*, productions parasites, D., 1850, pl. 3. — *hebraicus*, 1855, pl. 22.

**Brachycaulus** *ferrugineus*, D., 1843, pl. 1.

**Brontes** *planatus*, D., 1853, pl. 19, fig. 127-137.

**Bryaxis** *furcata*, D., 1858, pl. 16.

**Buprestis**, D., 1833, pl. 10. — *carbunculus*, 1833, pl. 5. — *lepida*, 1832, pl. 12.

**Cacicus**, D., 1836, pl. 23.

**Calandra** *aurofasciata*, D., 1844, pl. 9. — *securifera*, D., 1833, pl. 17.

**Calathus** *Solieri*, 1834, pl. 11.

**Callidium** *biguttatum*, D., 1836, pl. 20. — *sanguineum*, D., 1843, pl. 4, et 1844, pl. 10.

**Callirhipis** *Lherminieri*, D., 1834, pl. 2.

**Callyntra**, D., 1836, pl. 7.

**Calochromus** *glaucopterus*, D., 1833, pl. 7.

**Calymmaphorns** *cucullatus*, *ursinus*, D., 1840, pl. 10.

**Calyptribium** *caularum*, *Kunzei*, 1843, pl. 10. — *Kunzei*, D., 1848, pl. 7, expl. p. 181. — *nigrum*, *Villæ*, D., 1843, pl. 10.

**Calyplocerus** *Leboucherii*, D., 1843, pl. 5, expl. p. 197.

**Calyptopsis**, D., 1835, pl. 6. — *Jeremias*, 1857, pl. 5.

**Capnodis**, D., 1833, pl. 11.

**Carabus** *Adonis*, D., 1856, pl. 9. — *auratus*, antenne anormale, D., 1834, pl. 1. — *bæticus*, 1852, pl. 6. — *cancellatus*, difforme, D., 1846, pl. 9. — *cantabricus*, D., 1852, pl. 6. — *cælestis*, 1855, pl. 7. — *Cristoforii* et variétés, 1833, pl. 17. — *cychrocephalus*, 1858, pl. 16. — *cychropalpus*, 1858, pl. 9. — *Deyrollei*, D., 1852, pl. 5. — *Eggsippii*, D., 1852, pl. 6. — *Elysii*, D., 1856, pl. 9. — *errans*, 1852, pl. 5. — *fiduciarius*, 1856, pl. 9. — *gallæcianus*, 1852, pl. 5. — *guadarramus*, D., 1852, pl. 5. — *Ghilianii*, D., 1852, pl. 6. — *Infossei*, ♂, ♀, D., 1845, pl. 2. — *lateralis*, 1852,

pl. 5. — *lotharingus*, déformé, 1841, pl. 4. — *Lucasii*, D., *rugosus*, 1852, pl. 6. — *Steuarti*, D., 1852, pl. 5. — *Thomsonii*, *trabucearius*, 1857, pl. 14.

**Cardigenius**, D., 1836, pl. 12.

**Cardiomera** *Genei*, D., 1834, pl. 3.

**Cardiophorus** *maculicollis*, 1856, pl. 12.

**Carpophilus** *sempustulatus*, 1853, pl. 18, fig. 69-76.

**Carterus** *tomentosus*, 1858, pl. 16.

**Casnonia** *ludoviciana*, 1849, pl. 8.

**Cataplesis** *nitida*, D., 1836, pl. 19.

**Catopsimorphus** *meridionalis*, D., *orientalis*, D., *quadraticollis*, 1850, pl. 11.

**Catoxantha**, D., 1833, pl. 10.

**Cebrio** *Carrenoi*, 1847, pl. 4. — *Carrenoi*, *rufifrons*, D., 1851, pl. 1.

**Centrura** *armata*, 1852, pl. 9.

**Cephalostenus** *Dejeanii*, D., 1838, pl. 7.

**Cerostena**, D., 1836, pl. 6.

**Cerylon** *histeroides*, D., 1859, pl. 19, fig. 115-121.

**Ceutorhynchus** *drabæ*, galle du *Draba verna*, D., 1856, pl. 4, expl. p. 168. — *raphani*, D., 1855, pl. 13, expl. p. 247.

**Chærorhinus** *squalidus*, D., 1857, pl. 14.

**Chalcas** *Bremei*, *cyaneus*, *humeralis*, *lateralis*, *lineaticollis*, *obesus*, *trabeatus*, *unicolor*, D., 1849, pl. 1, expl. p. 22.

**Chalcophora**, D., 1833, pl. 10.

**Charopus** *formicarius*, D., 1857, pl. 5. — *grandicollis*, 1851, pl. 11.

**Chasmatopterus** *hispidulus*, D., 1847, pl. 4.

**Chevrolatia** *insignis*, D., 1850, pl. 1.

**Chilocorus** *uva*, D., 1849, pl. 14.

**Chlænus** *Lucasii*, 1858, pl. 9. — *ophonoides*, 1843, pl. 1. — *palæstinus*, 1855, pl. 22.

**Chlorida** *obliqua*, 1852, pl. 12.

**Cholovocera** *punctata*, D., 1860, pl. 6.

**Choragus** *Shepardi*, D., 1843, pl. 11.



**Chrysesthes**, D., 1833, pl. 11.

**Chrysobothris**, D., 1833, pl. 12. — *Solieri*, D., 1854, pl. 4, fig. 200-204.

**Chrysochroa**, D., 1833, pl. 10.

**Chrysodema** *convexa*, *Varennesi*, 1860, pl. 7.

**Chrysomela** *angelica*, 1858, pl. 1. — *Peirolerii*, 1834, pl. 11.

**Cleindela** *Audouini*, D., 1835, pl. 17. — *campestris*, D., 1848, pl. 7, et variétés *farellensis*, *guadarramensis*, *maroccana*, 1847, pl. 4. — *Cherubin*, D., 1858, pl. 8. — *fallax*, 1852, pl. 9. — *flammeola*, 1856, pl. 8. — *lugubris*, ♂, ♀, 1844, pl. 7. — *Rouxii*, 1835, pl. 17.

**Cillenum** *Leachii*, D., 1852, pl. 11.

**Circellum** *Bacchus*, D., 1842, pl. 5.

**Cis** (Monographie de l'ancien genre), 1848, pl. 9, 10, 11 et 12, expl. p. 395. — *Mellyi*, D., 1849, pl. 14.

**Clambus** *enshamensis*, D., 1852, pl. 14, p. 599.

**Cleogonus** *Fairmairei*, D., 1849, pl. 14.

**Ciconus** *ornatus*, 1858, pl. 1.

**Clerus** *Buqueti*, D., 1835, pl. 16.

**Clythra** *Guerinii*, 1834, pl. 11.

**Clytus** *arietis*, D., 1847, pl. 9, expl. p. 554.

**Cneorhinus** *lateralis*, D., 1851, pl. 1.

**Cælochraera** *costifera*, D., 1857, pl. 11, xxxiv bis.

**Cælorrhina** *Thoreyi*, 1844, pl. 11.

**Cælus** *hirticollis*, D., 1840, pl. 9.

**Colobogaster**, D., 1833, pl. 12.

**Colymbetes** *coriaceus*, D., 1843, pl. 1.

**Coniatus** *Mimonti*, 1859, pl. 8.

**Conognatha**, D., 1833, pl. 11.

**Contipus** *didymostrius*, 1853, pl. 16, xviii, n° 1. — *digitatus*, 1853, pl. 16, xviii, n° 2. — *subquadratus*, 1853, pl. 16, xviii, n° 3.

**Copræcus** *hemisphæricus*, 1842, pl. 5.

**Coptodera** *plagiata*, D., 1855, pl. 22.

**Corticarla** *pubescens*, D., 1852, pl. 14, expl. p. 600.

- Corticus foveolatus**, 1848, pl. 7.  
**Cratomerus**, D., 1833, pl. 12.  
**Cremastochilus mexicanus**, 1844, pl. 11.  
**Crlocephalus rusticus**, D., 1856, pl. 5, fig. 359-361.  
**Criodion Feisthamelii**, 1852, pl. 7.  
**Cryptobium Jacquelinii**, 1859, pl. 8.  
**Cryptocephalus Loreyi**, 1836, pl. 20, et 1844, pl. 6.  
**Cryptochile costatum**, D., 1840, pl. 10.  
**Cryptoglossa bicostata**, D., 1836, pl. 24.  
**Cryptophagus dentatus**, D., 1852, pl. 14, expl. p. 600. — *hirtus*, D.; 1849, pl. 9, expl. p. 325.  
**Crypturgus pusillus**, D., 1856, pl. 5, fig. 314, 315.  
**Crypturus ænescens**, D., 1853, pl. 7, xi, n° 1.  
**Ctenistes barbipalpis, integricollis**, D., 1858, pl. 16.  
**Ctenognathus novæ-zelandiæ**, 1843, pl. 1.  
**Ctenoscellis dyrrachus, nausithous**, 1843, pl. 9.  
**Curis Chloris**, 1858, pl. 15.  
**Cyllistus cylindricus**, D., 1853, pl. 7, x, n° 1.  
**Cymindis etrusca**, 1834, pl. 11.  
**Cyphogenia aurita**, D., 1836, pl. 24.  
**Cyria**, D., 1833, pl. 10.  
  
**Dallognatha**, D., 1835, pl. 5.  
**Dasysterna Delessertii**, D., 1856, pl. 12. — *hirticollis*, D., 1850, pl. 17. — *Reichei*, ♂, ♀, D., 1856, pl. 12. — *rubripennis*, D., 1850, pl. 17. — *Saulcyi*, D., 1856, pl. 12.  
**Dasytes ciliatus**, D., 1842, pl. 10. — *cæruleus*, D., 1858, pl. 13, expl. p. 520. — *flavipes*, D., 1854, pl. 18, fig. 260-268.  
**Dendrophilus**, 1857, pl. 11. — *punctatus*, D., 1855, pl. 9, xxx, n° 1. — *punctulatus*, 1857, pl. 11, xxx, n° 1. — *pygmæus*, 1855, pl. 9, xxx, n° 2.  
**Dermestes mustelinus**, D., 1853, pl. 19, fig. 152-160.  
**Derobrachus agyleus**, 1852, pl. 12. — *Levoiturieri*, 1842, pl. 9.

- Desmocerus aureipennis**, 1858, pl. 8.  
**Diastoleus**, D., 1838, pl. 3.  
**Diceroderes mexicanus**, D., 1841, pl. 2.  
**Dichomma**, D., 1835, pl. 6.  
**Dichtyopterus sanguineus**, D., 1846, pl. 9.  
**Diesia 4-dentata**, D., 1836, pl. 1.  
**Dimerocerus sociator**, D., 1858, pl. 16.  
**Diodontes porcatus**, D., 1834, pl. 13.  
**Diodyrhynchus attelaboides**, D., 1856, pl. 5, fig. 349, 350.  
**Diphyllus lunatus**, D., 1851, pl. 2, expl. p. 53.  
**Dischromus opacus**, D., 1855, pl. 10.  
**Ditoma crenata**, D., 1853, pl. 18, fig. 110-114.  
**Ditomus caledonicus**, D., *robustus*, D., 1834, pl. 17. — *Samson*, 1855, pl. 22.  
**Donacia sagittaria**, D., 1848, pl. 2, expl. p. 47.  
**Dorcadion Perczii**, D., 1851, pl. 1.  
**Dorcus Lessonii**, ♂, ♀, 1842, pl. 12. — *parallelipipedus*, D., 1854, pl. 4, fig. 184-188. — *Peyronis*, 1856, pl. 12.  
**Drapetes frater**, *retrofasciatus*, *sanguinicollis*, *signatipennis*, 1860, pl. 8.  
**Drimostoma 4-pustulatum**, 1858, pl. 9.  
**Dromica gigantea**, 1844, pl. 7.  
**Dromius sacerdos**, 1858, pl. 9.  
**Dryophorus Lymexylon**, D., 1856, pl. 5, fig. 324, 325.  
**Duvalius Raymondi**, D., 1859, pl. 1.  
**Dymusia punctata**, 1844, pl. 11.  
**Dyschromus opacus**, D., 1835, pl. 10.  
  
**Eburia bicolor**, D., 1855, pl. 14.  
**Ega anthicoides**, D., 1836, pl. 18.  
**Elaphocera Bedcaui**, ♂, ♀, *obscura*, D., 1843, pl. 12.  
**Elater madagascariensis**, 1832, pl. 12. — *pomorum*, D., 1853, pl. 3. — *sanguineus*, D., 1834, pl. 5, fig. 247-258.

**Elenophorus**, D., 1836, pl. 23.

**Elmldomorphus Aubei**, D., 1852, pl. 4.

**Elophorus frigidus**, D., 1847, pl. 4.

**Elytrocallus Chevrolati**, 1860, pl. 7.

**Elytrodon Chevrolatii**, 1858, pl. 1.

**Elytrurus alatus, marginatus**, ♂, ♀, D., 1855, pl. 15.

**Emathion cuneatum**, D., 1843, pl. 5, expl. p. 197.

**Endecatomois**, D., 1848, pl. 9.

**Enearthron cornutum**, D., 1854, pl. 18, fig. 290-298.

**Enicopus acutatus, Bonvouloiri**, D., 1859, pl. 8.

**Enoplium Dulce**, D., 1833, pl. 17.

**Enoplus tridens**, D., 1860, pl. 7.

**Entomoderes**, D., 1836, pl. 7.

**Epipedonota**, D., 1836, pl. 7.

**Eretmotus Lucasii**, D., 1855, pl. 20, xxix, n° 1.

**Ergates faber**, D., 1856, pl. 6, fig. 362-368.

**Erodites**, D., 1834, pl. 12.

**Erodus**, D., 1834, pl. 14.

**Erymanthus variolatus**, 1844, pl. 7.

**Eublepharus Germari**, D., *Rouleti*, D., *Sch  nherri*, D., *Servillei*, D., 1839, pl. 1.

**Eucalosoma versicolor**, D., 1843, pl. 5, expl. p. 198.

**Euchroma**, D., 1833, pl. 11.

**Eucnemis capucinus**, D., 1843, pl. 6, et 1857, pl. 12. — *Feisthamelii*, D., 1844, pl. 4 — *orientalis*, *Wicardi*, D., 1843, pl. 6, expl. p. 198.

**Eucranium arachnoides**, D., 1842, pl. 6.

**Eucynetus meridionalis**, D., 1851, pl. 2, expl. p. 53.

**Eudactylus Wapleri**, D., 1855, pl. 14.

**Eudorus javanicus**, D., 1843, pl. 5.

**Eurhipis senegalensis**, D., 1834, pl. 2.

**Euryptera venusta**, 1844, pl. 9.

**Eurychora**, D., 1837, pl. 7.

**Eurydera mormolycoïdes**, 1852, pl. 9.

**Eutelocera viatica**, D., 1840, pl. 9.

**Faronus Lafertei**, D., 1850, pl. 11.

**Feronia Reicheana**, 1858, pl. 9.

**Fornax Chevrolatii**, D., 1843, pl. 5. — *madagascariensis*, 1843, pl. 5, et 1856, pl. 15. — *obrutus*, *Petitii*, 1843, pl. 5, expl. p. 198.

**Galba flavicornis**, D., 1843, pl. 6, expl. p. 199.

**Galbodemus Mannerheimii**, D., 1843, pl. 6, expl. p. 199.

**Galerita Lecontei**, D., 1849, pl. 8, expl. p. 298.

**Gastraulacus atratus**, *Leprieuri*, D., 1843, pl. 6, expl. p. 199.

**Gedeon hierichonticus**, D., 1857, pl. 5.

**Gibblum scotias**, D., 1856, pl. 19.

**Glymma Candezii**, D., 1856, pl. 11, xxxix, n° 1.

**Glyphiderus sterquilinus**, D., 1842, pl. 6.

**Gnatocera guttata**, 1836, pl. 5.

**Gnophalostetha Bonvoisini**, D., 1856, pl. 12.

**Gnorimus 10-punctatus** et variétés, 1833, pl. 17. — *variabilis*, D., 1854, pl. 4, fig. 179-183.

**Gollathus Daphnis**, ♂, ♀, 1835, pl. 2. — *Fornassinii*, ♂, ♀, 1856, pl. 7. — *Grallii*, 1836, pl. 5.

**Gonogenius**, D., 1838, pl. 2.

**Grammoptera ruficornis**, D., 1847, pl. 9, expl. p. 554.

**Graphipterus trivittatus**, 1836, pl. 5. — *Westwoodii*, 1844, pl. 7.

**Gymnetron campanulæ**, métamorphoses, D., 1858, pl. 17, expl. p. 904.

**Gynandrotarsus harpaloides**, D., 1841, pl. 4.

**Gyretes nitidulus, sericeus**, D., 1853, pl. 1.

**Hallomenus flexuosus**, 1857, pl. 9, fig. 473-480, *humeralis*, D., 1857, pl. 9, fig. 481-490.

**Hammoderus Buquetii**, 1856, pl. 8.

**Harminius castaneus**, D., 1852, pl. 3.

**Harpalus Langloisii**, 1858, pl. 9.

**Hogeter**, D., 1835, pl. 8.

**Helodes nurella**, 1858, pl. 1.

**Helops striatus**, 1857, pl. 9, fig. 458-465. — **tuberculiger**, 1857, pl. 5.

**Hemileyrus Serreni, Villiersi**, 1860, pl. 7.

**Herpiscus Spinola**, D., 1838, pl. 8.

**Heterius brunnipennis**, 1867, pl. 11, XVIII, n° 1. — **punctulatus**, 1857, pl. 11, XVIII, n° 2. — **quadratus**, D., 1855, pl. 9, XVIII, n° 1.

**Heterocerus aragonicus**, 1851, pl. 11.

**Heterorhina induta**, D., 1844, pl. 11.

**Heteroscellus**, D., 1836, pl. 13.

**Heterosoma collata**, 1844, pl. 11.

**Hælochares lividus**, métamorphoses, D., 1852, pl. 13.

**Holonychus camelus, saxosus**, 1859, pl. 7.

**Homalirhinus rufirostris**, D., 1833, pl. 3.

**Homalota celata**, 1853, pl. 17., fig. 9-15, **cuspidata**, D., 1853, pl. 17, fig. 16.

**Hoplíderes aquilus**, 1859, pl. 7.

**Horatoma parvulum**, D., 1840, pl. 10.

**Horonotus Montrouzieri**, D., 1860, pl. 7.

**Hybomorphus melanosomus**, D., 1855, pl. 15.

**Hydrobius fuscipes**, D., 1855, pl. 13, expl. p. 248.

**Hydrocanthus diophthalmus**, 1855, pl. 22.

**Hydrophilus aterrinus, incermis, piceus, pallens**, 1854, pl. 3.

**Hydroporus exornatus**, 1855, pl. 22.

**Hylastes ater**, 1856, pl. 5, fig. 321, **palliatu**, D., 1856, pl. 5, fig. 322, 323.

**Hylithus**, D., 1835, pl. 9.

**Hyleobius abietis**, D., 1856, pl. 5, fig. 343-348. — **Atphus**, 1858, pl. 1.

**Hylotrupes bajulus**, D., 1856, pl. 6., fig. 369-375.

**Hylargus ligniperda**, 1856, pl. 5, fig. 316-318, **piniperda**, D., 1856, pl. 5, fig. 319, 320.

**Hyperantha Sallei**, D., 1856, pl. 20. — **stigmaticollis**, 1843, pl. 1. — **Vargasii**, D., 1855, pl. 13. — **vittaticollis**, 1843, pl. 1.

**Hyperops**, D., 1835, pl. 6.

**Hypophlœus ferrugineus**, 1857, pl. 8, fig. 430-438, *linearis*, D., 1857, pl. 8, fig. 439-443.

**Hyporhagus brasiliensis**, *castaneus*, *cayennensis*, *costulatus*, *lævipunctatus*, *Lecontei*, *marginatus*, *pertinax*, *venezuelensis*, *yucatanus*, 1860, pl. 3.

**Icosium tomentosum**, D., 1857, pl. 13.

**Ips ferruginea**, D., 1853, pl. 18, fig. 77-83.

**Isariotes hierochonticus**, D., 1855, pl. 22.

**Isomerinthus barbipes**, D., 1855, pl. 15.

**Isotarsus eximius**, 1852, pl. 11. — *insignis*, 1853, pl. 13.

**Julodis**, D., 1833, pl. 10. — *Clouei*, D., 1843, pl. 4.

**Lachenus rugatifrons**, D., 1858, pl. 8.

**Lamia jucunda**, *radiata*, 1835, pl. 2.

**Lampyris Sencki**, D., 1833, pl. 15.

**Langelandia anophthalma**, D., 1842, pl. 9.

**Larinus carlinæ**, métamorphoses, D., 1858, pl. 7, expl. p. 284.

**Lasiostola**, D., 1836, pl. 2.

**Lathridius minutus**, D., 1852, pl. 14, expl. p. 600.

**Latipalpis**, D., 1833, pl. 11.

**Lebia arcuata**, *lepida*, D., 1855, pl. 22.

**Leptinoderes**, D., 1838, pl. 2.

**Leptodes Boisduvalii**, D., 1838, pl. 8.

**Leptomastax hypogeum**, 1856, pl. 16.

**Leptonychus Maillei**, D., 1834, pl. 12.

**Leptura militaris**, 1858, pl. 12. — *rubrotestacea*, D., 1857, pl. 8, fig. 397-400.

**Lethrus brachiicollis**, ♂, ♀, 1856, pl. 16.

**Leucoscelis custalacta**, 1848, pl. 8.

**Lissomus mastrucatus**, *ustulatus*, 1860, pl. 8.

**Lithinus humeralis**, *niveus*, D., 1859, pl. 7.

- Lithocharis brevicornis**, D., 1857, pl. 14.  
**Lixus angustatus**, D., 1848, pl. 7. — **venustus**, 1854, pl. 19, expl. p. 664.  
**Lemophilus Dufourii**, D., 1853, pl. 19, fig. 422-426.  
**Lonchophorus obliquus, parvulus**, 1832, pl. 5.  
**Longicorne** (larve d'un), D., 1844, pl. 10.  
**Lophoma**, D., 1835, pl. 6.  
**Lucanus cervus** dans son cocon, 1846, pl. 2.  
**Lycomedes Reichei**, ♂, ♀, D., 1844, pl. 8.  
**Lycoperdina bovista**, D., 1854, pl. 19, expl. p. 663.  
  
**Machia**, D., 1836, pl. 12.  
**Macraspis pretiosa**, 1844, pl. 8.  
**Macrochellus Saulcyi**, D., 1855, pl. 22.  
**Macrodonia Dejeanii**, 1839, pl. 9. — **flavipennis**, D., 1833, pl. 3.  
**Macroma nigripennis, sulcicollis**, 1844, pl. 11.  
**Macropalpus pallipes**, D., 1852, pl. 13, et 1853, pl. 17, fig. 44-48.  
**Macropoda**, D., 1835, pl. 14.  
**Magdalinus carbonarius**, D., 1856, pl. 5; fig. 334-339.  
**Malachius aeneus**, D., 1852, pl. 15, expl. p. 601. — **bipustulatus**,  
caroncules thoraciques, D., 1853, pl. 13, expl. p. 528.  
**Malanerus laevigatus**, D., 1857, pl. 5.  
**Mallonia albosignata**, 1858, pl. 8.  
**Mallesoma bicolor**, 1856, pl. 20.  
**Malthinus chelifer, hamatus, modestus, quadripinus**, D., 1851, pl. 11.  
**Margarinotus scaber**, D., 1853, pl. 16, xix, n° 1.  
**Mecopa**, D., 1835, pl. 15.  
**Megacephala euphratica**, D., 1859, pl. 14.  
**Megagenius**, D., 1835, pl. 14.  
**Megatoma terra**, D., 1846, pl. 9.  
**Melanerus laevigatus**, 1857, pl. 5.  
**Melanophila tarda**, D., 1854, pl. 4, fig. 205-209.  
**Melanotus rufipes**, D., 1854, pl. 5, fig. 219-227.



- Melasis flabellicornis**, D., 1843, pl. 5, expl. p. 197, et 1847, pl. 2, expl. p. 546.
- Meloe Chevrolatii**, 1852, pl. 9. — *sericellus*, 1857, pl. 5.
- Melolontha hypocausti** à antenne monstrueuse, 1846, pl. 8. — *ut-garis*, patte anormale, 1834, pl. 1. — déformé, 1846, pl. 2. — à patte déformée, 1846, pl. 8.
- Menophilus curvipes**, D., 1857, pl. 8, fig. 444-457.
- Mesites pallidipennis**, D., 1856, pl. 5., fig. 332, 333.
- Mesostena**, D., 1835, pl. 9.
- Metepocœlus Rojasi**, ♂, ♀, 1853, pl. 20.
- Metriopus**, D., 1835, pl. 15.
- Micipsa philistina**, 1857, pl. 5.
- Micralymma brevipenne**, anatomie, D., 1858, pl. 2 et 3, expl. p. 106 et 107.
- Microdera**, D., 1835, pl. 7.
- Microrhagus Manuelli**, 1856, pl. 16.
- Microschatia**, D., 1836, pl. 11.
- Microtelus**, D., 1838, pl. 1. — *careniceps*, 1857, pl. 5.
- Misolampus scabricollis**, D., 1851, pl. 1.
- Mitragenius**, D., 1836, pl. 7.
- Mnematum Ritchii**, D., 1842, pl. 6.
- Monohammus galloprovincialis**, D., 1856, pl. 6, fig. 383-392.
- Monolepta lepida**, 1858, pl. 1.
- Monomma angustatum**, *brunneum*, *brunnipes*, *gibbosum*, *gigantum*, *grandis*, *gyrinoides*, *indistinctum*, *irroratum*, *maculatum*, *minutissimum*, *philippinarum*, *proletarium*, *sepultum*, *tristum*, D., 1860, pl. 1, 2 et 3.
- Monoplius inflatus**, D., 1855, pl. 8, XXIV, n° 1.
- Monotoma americana**, *angusticollis*, *brevicollis*, *conicicollis*, *longicollis*, *picipes*, *quadricollis*, *quadrifoveolata*, *spincollis*, 1837, pl. 17. — *punctaticollis*, 1843, pl. 1.
- Morica**, D., 1836, pl. 23. — *Jevinii*, D., 1856, pl. 21.
- Morimus lugubris**, D., 1844, pl. 10.
- Mycetochares linearis**, D., 1855, pl. 13, expl. p. 248.

**Mylabris** *Dufourii*, D., 1851, pl. 1.

**Myrmacoleolus** *bistriatus*, D., 1833, pl. 15.

**Myrmecixenus** *vaporariarum*, D., 1843, pl. 2.

**Myrmedonia** *tuberiventris*, 1856, pl. 16.

**Myzomorphus** *scutellatus*, D., 1849, pl. 13.

**Nacerdes** *maritima*, D., 1848, pl. 7, expl. p. 177. — *melanura*, D., 1857, pl. 9, fig. 501. — *Moorii*, 1860, pl. 7.

**Nanodes** *hemisphaericus*, D., 1854, pl. 19, expl. p. 664.

**Nebria** *brevicollis*, métamorphoses, D., 1848, pl. 1, expl. p. 83. — *crenatostrata*, *fulviventris*, 1834, pl. 11.

**Niptus** *elongatus*, *exiguus*, *hololeucus*, *niveus*, 1856, pl. 19.

**Nosoderma**, D., 1841, pl. 2.

**Notiophygus** *cinereus*, *dentipennis*, *maculicornis*, *nigropunctatus*, *parvulus*, D., 1834, pl. 10.

**Notodoma** *globatum*, D., 1835, pl. 9, xxvii, n° 1.

**Nyetelia**, D., 1836, pl. 6.

**Ochina** *hederæ*, D., 1843, pl. 11.

**Ocypus** *bellicosus*, 1860, pl. 6.

**Odogenius** *barbarus*, *fulvipes*, D., 1834, pl. 18.

**OEdemera** *dispar*, D., 1841, pl. 1.

**OEdilis** *grisea*, 1856, pl. 6, fig. 382, *montana*, D., 1856, pl. 6, fig. 376-381.

**Omalium** *pusillum*, fig. 56-59, *vile*, fig. 49-55, D., 1853, pl. 17.

**Omus** *Audouini*, *californicus*, *Dejeanii*, D., 1838, pl. 10.

**Onthophagus** *excisus*, 1856, pl. 12.

**Opilus** *Mimonti*, 1859, pl. 8. — *mollis*, D., 1856, pl. 18, fig. 277-288.

**Orchestes** *rufus*, métamorphoses, D., 1858, pl. 7, expl. p. 297.

**Orthogenium** *femorale*, 1835, pl. 10.

**Orthoperus** *piceus*, D., 1852, pl. 14, expl. p. 600.

**Orthorhinus** *lætus*, ♂, ♀, *Leseleuci*, *variegatus*, D., 1855, pl. 15.

**Oryctes** *colonicus*, *insularis*, *Radama*, *Ranavalo*, *simiar*, 1852, pl. 10. — *simiar*, D., 1855, pl. 10.

**Oserius incisicrurus**, D., 1848, pl. 7, expl. p. 180.

**Otiocephalus americanus, flavipennis, formicarius, mexicanus, pilosus, Poeyi**, D., 1832, pl. 3.

**Oxilus terminatus**, D., 1859, pl. 14.

**Oxycara**, D., 1835, pl. 5.

**Oxycorynus melanocerus**, D., *melanops*, 1832, pl. 5.

**Oxypoda analis**, D., 1853, pl. 17, fig. 17-19.

**Oxysternus maximus**, D., 1853, pl. 5, iv, n° 1.

**Oxythyrea amabilis**, ♂, ♀, 1848, pl. 8. — *amina*, 1860, pl. 6.

**Oxæna cyanipes**, 1856, pl. 8.

**Pachycarus cæruleus**, D., 1834, pl. 18.

**Pachychile**, D., 1835, pl. 7.

**Pachylopus dispar**, D., 1856, pl. 3, xxxiv, n° 1. — *rubifrons*, 1856, pl. 3, xxxiv, n° 2.

**Pachynotelus albiventris**, D., 1840, pl. 10.

**Pachypus excavatus**, ♂, ♀, 1837, pl. 8.

**Pachyscelis**, D., 1836, pl. 3.

**Pachysoma Æsculapius**, D., 1842, pl. 6.

**Pachystola texata**, 1858, pl. 8.

**Pantheropterus Pfeifferii**, D., 1856, pl. 7.

**Parachilia Lcroyi**, 1859, pl. 7.

**Paramecosoma abictis**, D., 1853, pl. 19, fig. 144-151.

**Parmena pilosa**, D., 1835, pl. 3.

**Paussus Favieri**, D., 1852, pl. 3. — *Olcesii*, D., 1860, pl. 6.

**Pediacus costipennis**, D., 1852, pl., 3.

**Pedinus ulomoides**, 1852, pl. 3.

**Pelecopselaphus**, D., 1833, 11.

**Pelecyporus**, D., 1836, pl. 11.

**Peiorus bruchoides**, 1855, pl. 8, xlv, n° 1.

**Pheropsophus**, D., 1834, pl. 16.

**Philhydrus melanocephalus**, œuf, 1852, pl. 13.

**Philothermus Montandonii**, D., 1843, pl. 4.

- Phloeopora reptans**, D., 1853, pl. 17, fig. 1-8.
- Pholeuon Querilhaci**, 1859, pl. 1.
- Phtora crenata**, D., 1857, pl. 8., fig. 421-429.
- Physothorus**, D., 1839, pl. 2.
- Phytæcia Betzeba, Jezabel**, 1858, pl. 1.
- Phytonomus rumicis**, D., 1844, pl. 2.
- Pimella**, D., 1836, pl. 4.
- Pissodes notatus**, D., 1856, pl. 5, fig. 340-342.
- Placodes caffer**, D., 1853, pl. 5, vi, n° 1, et 1860, pl. 15, vii, n° 1.
- Placusa pumilio**, D., 1853, pl. 17, fig. 20-25.
- Plagionotus Fabricii, regalis**, 1860, pl. 9.
- Plagiopisthen paradoxus**, D., 1856, pl. 7.
- Platydema curopæa**, D., 1857, pl. 8, fig. 404-412.
- Platyhelmus dilaticollis**, D., 1840, pl. 9.
- Platynus crythrocephalus, Pcirolerii**, 1834, pl. 11.
- Platyope lineata**, D., 1836, pl. 1.
- Platyprosopus hierichonticus**, 1856, pl. 12.
- Platypus oxycerus**, 1850, pl. 11.
- Plectrocerum cribratum**, 1856, pl. 20.
- Plectroscelis balanomorpha**, 1859, pl. 8. — *Fairmairei*, 1852, pl. 11.  
— *obesa*, 1859, pl. 8.
- Plegaderus**, D., 1856, pl. 11, et 1857, pl. 11. — *discisus*, D., 1854, pl. 4, fig. 172-178. — *sanatus*, 1852, pl. 2.
- Plinthus granulipennis**, 1852, pl. 3.
- Podhomala suturalis**, D., 1836, pl. 4.
- Pœcilonota**, D., 1833, pl. 12. — *Chabrillacii*, 1856, pl. 8.
- Pogonobasis**, D., 1837, pl. 7.
- Pogonotarsus Vescoi**, 1852, pl. 9.
- Polpogenia asidioides**, D., 1836, pl. 4.
- Polybothris auroclavata**, 1852, pl. 9. — *aurocyanea*, 1848, pl. 8. — *Lelieuri*, 1854, pl. 3. — *pyropypa*, 1852, pl. 9.
- Polycesta**, D., 1833, pl. 11. — *carnifex*, 1858, pl. 15.
- Polypleurus geminatus**, D., 1838, pl. 8.

**Præcis**, D., 1840, pl. 9.

**Prionotheca**, D., 1836, pl. 2.

**Prionychus ater**, D., 1857, pl. 9, fig. 466-472.

**Pristonychus Jacquelinii**, 1859, pl. 8. — *nigritus*, 1855, pl. 22.

**Procnoma**, D., 1835, pl. 9.

**Procrustes Duponchelii**, 1837, pl. 8.

**Proepodes albo-squamosus**, D., 1855, pl. 14.

**Psammeticus**, D., 1838, pl. 1.

**Psammœchus bipunctatus**, D., 1834, pl. 7.

**Psectrascelis**, D., 1836, pl. 6.

**Psélaphiens**, organes buccaux. D., 1844, pl. 3, expl. p. 159.

**Pselaphus longipalpis**, 1851, pl. 11. — *Sencieri*, 1858, pl. 16.

**Pseudolyceus marginatus**, D., 1833, pl. 7.

**Psiloptera**, D., 1833, pl. 11. — *Guerinii*, 1856, pl. 8.

**Psiloscells Harrisii**, D., 1853, pl. 16, xvii, n° 1.

**Pterobothris corrosus**, 1858, pl. 15.

**Pterocoma sarpæ**, D., 1836, pl. 3.

**Pterolasia squalida**, D., 1836, pl. 3.

**Pteroplatus nigriventris**, *transversalis*, 1844, pl. 9. — *variabilis*, D., 1839, pl. 13.

**Pterotarsus Escholtzii**, D., *histrion*, D., *tuberculatus*, D., *Walckenaerii*. D., 1843, pl. 6, expl. p. 199.

**Ptilium apterum**, D., 1853, pl. 18, fig. 60-68. — *trisulcatum*, 1833, pl. 5.

**Ptinus abbreviatus**, 1856, pl. 13. — *alpinus*, 1856, pl. 10. — *Aubei*, 1856, pl. 17. — *brunneus*, 1856, pl. 18. — *dilophus*, 1856, pl. 10. *Duvalii*, 1856, pl. 13. — *exulans*, 1856, pl. 17. — *farinosus*, 1856, pl. 10. — *foveolatus*, 1856, pl. 13. — *frigidus*, 1856, pl. 19. — *intermedius*, 1856, pl. 18. — *irroratus*, 1856, pl. 10. — *italicus*, 1856, pl. 17. — *lepidus*, ♂, ♀, 1856, pl. 18. — *lusitanus*, 1856, pl. 13. — *niveicollis*, 1856, pl. 19. — *phlomidis*, ♂, ♀, 1856, pl. 17. — *pulchellus*, 1856, pl. 18. — *Reichei*, 1856, pl. 10. — *Spitzii*. 1856, pl. 18. — *variegatus*, 1856, pl. 17. — *xylopertha*. ♂, ♀, 1856, pl. 13.

**Ptiocerus** *attenuatus*, D., *brasiliensis*, D., *Goryi*, D., *mystacinus*, D., 1834, pl. 2.

**Ptosima**, D., 1833, pl. 10.

**Ptycholæmus** *Troberti*, 1858, pl. 8.

**Purpuricen** *ætnensis*, 1836, pl. 11. — *Loreyi*, 1837, pl. 12.

**Pylades** *Coquereli*, D., 1856, pl. 16.

**Quedius** *scintillans*, D., 1853, pl. 17, fig. 37-43.

**Ranzania** *splendens*, ♂, ♀, D., 1856, pl. 7.

**Rhagium** *indagator*, D., 1857, pl. 8, fig. 393-396.

**Rhagodactylus** *brasiliensis*, 1835, pl. 10.

**Rhina** *nigra*, D., 1848, pl. 7, expl. p. 181.

**Rhinocyllus** *latirostris*, D., 1845, pl. 2, expl. p. 102.

**Rhizophagus** *depressus*, 1853, pl. 18, fig. 84-92.

**Rhizotrogus** *castaneus*, D., 1834, pl. 7.

**Rhopalodontus**, D., 1848, pl. 9.

**Rhopalomerus** *Actæon*, *Cacicus*, *Ion*, *mundus*, D., 1860, pl. 9.

**Rhyncholus** *porcatus*, 1856, pl. 5, fig. 326-329, *strangulatus*, D., 1856, pl. 5, fig. 330, 331.

**Rhypochares** *saprinoides*, D., 1853, pl. 16, xv, n° 1.

**Rhytidophlæus** *albipes*, D., 1859, pl. 7.

**Rutela** *cyanitarsis*, 1833, pl. 5. — *gracilis*, *granulata*, 1834, pl. 1. — *pulchella*, *monstruosa*, 1835, pl. 17.

**Sandalus** *Sichelii*, 1852, pl. 11.

**Saperda** *punctata*, D., 1847, pl. 9, expl. p. 554. — *scalaris*, D., 1844, pl. 10.

**Saprinus**, D., 1855, pl. 16, 17, 18, 19, 20, et 1857, pl. 11. — *Marseuli*, *mersinæ*, 1858, pl. 9. — *portus-magni*, 1858, pl. 16.

**Scapomegas**, D., 1855, pl. 9. — *auritus*, 1855, pl. 9, xxvi, n° 1. — *gibbus*, 1855, pl. 9, xxvi, n° 2.

**Scarabæus** *Hector*, ♂, ♀, 1836, pl. 14.

**Seaurus** *aratus*, D., 1838, pl. 7.

**Seciosodia**, D., 1835, pl. 6.

**Scenopinus fenestralis**, 1850, pl. 16,

**Seirtes**, D., 1843. (Cette planche, étrangère aux Annales, est sans numéro.)

**Scotinus**, D., 1836, pl. 13.

**Scotobius**, D., 1838, pl. 3.

**Scraptia fusca**, anomalie, D., 1849, pl. 14.

**Scydmænus abditus**, D., *angustatus*, D., *furtivus*, D., *intrusus*, D., *promptus*, D., *protervus*, D., *spissicornis*, D., *truncatus*, D., 1860. pl. 6.

**Semlotus caracasanus**, D., 1856, pl. 20.

**Silpha obscura**, D., 1846, pl. 2. — *opaca*, D., 1852, pl. 11,

**Silvanns sexdentatus**, D., 1849, pl. 6, expl. p. 171. — *unidentatus*, D., 1853, pl. 19, fig. 138-143.

**Sitaris Solieri**, 1839, pl. 18.

**Solenoptera femorata**, 1851, pl. 14.

**Sophrorhinus Duvernoyi**, 1855, pl. 7.

**Spercheus marginatus**, métamorphoses, D., 1852, pl. 13.

**Sphærosoma ovum**, 1855, pl. 9, xxxii, n° 1.

**Spheniscus Chevrolati**, D., 1856, pl. 20.

**Sphenophorus liratus**, D., 1849, pl. 14.

**Sphenoptera**, D., 1833, pl. 12.

**Sphodrus planus**, tarse antérieur, D., 1834, pl. 3.

**Sphyracus gryphus**, 1860, pl. 15, xvi, n° 1 (1). — *omalodellus*, 1853, pl. 14, xiv, n° 1. — *uncipes*, 1853, pl. 14, xiv, n° 2.

**Spondylis buprestoides**, D., 1856, pl. 5, fig. 351-358.

**Steatoderus ferrugineus**, D., 1846, pl. 2.

**Steirastoma acutipenne**, D., 1856, pl. 20.

**Stenus**, organes de manducation, D., 1835, pl. 3.

**Stenholma**, D., 1835, pl. 9.

**Stenochella Salzmanni**, D., 1836, pl. 18.

**Stenochia saracena**, 1857, pl. 5.

(1) Voir la description de cette espèce au volume de 1861, page 175.

**Stenocorus inquisitor**, D., 1840, pl. 5.

**Stenogaster**, D., 1833, pl. 12.

**Stenomera Blanchardii**, D., 1850, pl. 1.

**Stenomorpha**, D., 1836, pl. 12.

**Stenosides**, D., 1836, pl. 12.

**Stenotarsia corpulenta**, 1852, pl. 9.

**Steraspis**, D., 1833, pl. 10.

**Sternocera**, D., 1833, pl. 10.

**Sternotomis Thomsonii**, 1855, pl. 7.

**Sthelenus ichneumoneus**, 1859, pl. 14.

**Stigmodera**, D., 1833, pl. 11. — *amplicollis*, *chalybeiventris*, *chiliensis*, *costipennis*, *cribricollis*, 1858, pl. 15. — *cruentata*, 1852, pl. 4. — *hastaria*, *picta*, *Roussellii*, *semivittata*, *Souverbii*, *viridiventris*, 1858, pl. 15.

**Streptocerus speciosus**, ♂, ♀, 1850, pl. 1.

**Strigoderma fulgicollis**, *insignis*, 1844, pl. 8.

**Sunius latus**, 1860, pl. 6.

**Tachinus humeralis**, D., 1846, pl. 9. — *pictus*, 1852, pl. 3.

**Tachyporus cellaris**, D., 1846, p. 9.

**Tagenia**, D., 1838, pl. 1.

**Tefflus Thomsonii**, 1856, pl. 8.

**Temnochila cærulea**, D., 1853, pl. 18, fig. 93-100.

**Temognatha**, D., 1833, pl. 11. — *trifasciata*, 1852, pl. 4.

**Tentyria**, D., 1835, pl. 7. — *acuminipennis*, 1856, pl. 21. — *collatina*, 1857, pl. 5. — *gibbicollis*, *Godartiana*, *longicollis*, *Mulsanti*, *Ottii*, 1856, pl. 21.

**Tessarodon hollandiæ**, D., 1842, pl. 5.

**Tetralobus australasiæ**, 1836, pl. 14. — *cinereus*, 1832, pl. 4.

**Tetraphyllus mirificus**, 1852, pl. 9.

**Thaipophila**, D., 1835, pl. 8.

**Thanasimus formicarius**, 1854, pl. 18, fig. 269-275, *quadrimaculatus*, 1854, pl. 18, fig. 276.



**Thaumasus gigas**, 1853, pl. 13.

**Thinobatis**, D., 1835, pl. 9.

**Thorictus mauritanicus**, D., 1860, pl. 6.

**Thriptera Varvasi**, D., 1836, pl. 3.

**Throscus calocerus, constrictor, Schaumii**, 1860, pl. 8.

**Thylacites oblongus**, D., 1852, pl. 1.

**Tillomorpha Æsopus**, D., 1860, pl. 9.

**Tillus unifasciatus**, D., 1847, pl. 1, expl. p. 35.

**Titubæa 8-signata**, D., 1851, pl. 2.

**Tomicus bidens**, D., 1856, pl. 5, fig. 307, 308. — *decolor*, 1859, pl. 8.

— *curygraphus*, D., 1856, pl. 5, fig. 312, 313. — *laricis*, D., 1856, pl. 5, fig. 305, 306. — *ramulorum*, D., 1856, pl. 5, fig. 309–311.

— *stenographus*, D., 1856, pl. 5, fig. 299–304.

**Trachelizus rufus**, D., 1836, pl. 19.

**Trachyderma**, D., 1836, pl. 2.

**Trachysomus camelus, dromedarius, elephas, gibbosus**, 1852, pl. 7.

**Trachys**, D., 1833, pl. 12. — *Pandellei*, 1852, pl. 3.

**Tragischoschema gracilicornis**, 1858, pl. 8.

**Trechus angusticollis**, 1851, pl. 11.

**Tretus loripes**, D., 1833, pl. 3.

**Tribalus**, D., 1855, pl. 9, et 1857, pl. 11.

**Tribolium castaneum**, D., 1855, pl. 13.

**Trichopteryx, métamorphoses**, D, 1846, pl. 11.

**Trichoxys bilineatus**, D., *fortunatus, labyrinthicus, sulfurifer*, D., 1860, pl. 9.

**Trientoma**, D., 1835, pl. 5.

**Trigonops dispar**, ♂, ♀, D., 1855, pl. 15.

**Trigonosceles**, D., 1836, pl. 1.

**Triphyllus punctatus**, D., 1851, pl. 2, expl. p. 52.

**Triplax nigripennis**, D., 1842, pl. 7.

**Trochoideus Desjardinsii**, D., 1859, pl. 6.

**Trogocephala formosa**, 1858, pl. 8.

**Tropinota Fatima**, 1860, pl. 6. — *vittula*, 1856, pl. 12.

**Trotoma pubescens**, D., 1851, pl. 11.

**Trox granulipennis**, 1852, pl. 3.

**Tychus Jacquelinii**, 1859, pl. 8.

**Uloma Perroudi**, D., 1857, pl. 8, fig. 413-420.

**Ulomascus caviventris**, D., 1848, pl. 7.

**Urophora cuspidata**, D., 1845, pl. 2.

**Vesperus Xatartii**, 1850, pl. 11.

**Xanthochroa carniolica**, D., 1857, pl. 9, fig. 491-500.

**Xantholinus collaris**, D., 1853, pl. 17, fig. 26-36.

**Xenoderus Janus**, ♂, ♀, D., 1844, pl. 7.

**Xiphonotus Chevrolati**, D., 1856, pl. 3, xxxvii, n° 1.

**Xylographus**, D., 1848, pl. 9. — *bostrichoides*, D., 1850, pl. 16.

**Xylotrechus Sartorii**, 1860, pl. 9.

**Xystrocera globosa**, larve et nymphe, 1848, pl. 7, expl. p. 180.

**Zabrus Caramaniæ**, 1858, pl. 9. — *tumidus*, 1855, pl. 22.

**Zopherus Bremeri**, 1844, pl. 9. — *Jourdani*, 1849, pl. 8. — *nervosus*, D., 1841, pl. 2.

**Zoposis**, D., 1834, pl. 15.

**Zuphium cilicicum**, 1858, pl. 9

**Zygia rostrata**, 1857, pl. 5.

---

## ORTHOPTÈRES.

**Aeridium** *peregrinum*, D., 1851, pl. 8.

**Anostostoma** *cuniculator*, D., 1848, pl. 8.

**Bacilus** *Rossii*, D., 1860, pl. 10, fig. 1, 2.

**Blattes** dans de l'ambre jaune, D., 1836, pl. 16.

**Encophora** *Dufourii*, 1858, pl. 12.

**Ephippigera** *maculata*, D., 1860, pl. 10, fig. 3-6.

**Eremiaphila**, D., 1835, pl. 11. — *Audouin*, D., *Bové*, D., *Cerisy*, D., *Géné*, D., *Kamsin*, D., *Luxor*, D., *Typhon*, *Zetterstedt*, D., 1835, pl. 12 et 13.

**Eremobia** *Clavelii*, D., 1851, pl. 8. — *Jaminii*, D., 1854, pl. 20.

**Forficula** *arachidis*, ♂, ♀, D., 1860, pl. 10, fig. 33-35.

**Gryllus** *Heydenii*, D., 1857, pl. 15.

**Helopeltis** *Antonii*, D., 1858, pl. 12.

**Heteronutarsus**, D., 1835, pl. 13.

**Mantis** *brevipennis*, ♂, ♀, D., 1860, pl. 10, fig. 36-40.

**Mecomena** *brevipennis*, D., 1860, pl. 10, fig. 7-9. *varia*, 1860, pl. 10.

**Odontoptera** *spectabilis*, D., 1841, pl. 5.

**Ommexeca**, D., 1836, pl. 20. — *Audouini*, *cyanopterum*, 1836, pl. 21. *gracile*, *homalodemum*, *liaspis*, *lugubre*, 1836, pl. 22. — *macrop-terum*, 1836, pl. 21. — *oxypterum*, *pallidum*, *Servillei*, *trachyp-terum*, *virens*, 1836, pl. 22.

**Phoraspis**, D., 1837, pl. 10. — *atomaria*, D., *conspersa*, D., 1837, pl. 10. — *fastuosa*, D., *flavipes*, D., *leucogramma*, D., *luteola*, D., *nigra*, D., 1837, pl. 11. — *pallens*, 1837, pl. 10. — *pantherina*, D., *picta*, 1837, pl. 11.

**Porthetis Raulinii**, ♂, ♀, 1860, pl. 10, fig. 26-29, *simillima*, 1860, pl. 10, fig. 30-32,

**Pterolepis alpina**, D., 1858, pl. 4. — *Brisoutii*, D., 1860, pl. 10, fig. 11-16. — *Raymondii*, ♂, ♀, 1860, pl. 10, fig. 17-20,

**Thamnotrizon fallax**, ♂, ♀, 1860, pl. 10, fig. 24-25.

**Toxodera denticulata**, 1837, pl. 2.

---

## HÉMIPTÈRES.

---

**Acanalonia Servillei**, D., 1839, pl. 16.

**Acanthia rotundata**, D., 1852, pl. 16.

**Acanthicus Desmarestii**, D., 1832, pl. 6.

**Acanthosoma**, 1845, pl. 8.

**Acanthothorax sculus**, 1841, pl. 6.

**Achilius bicinctus**, D., 1839, pl. 16.

**Acocephalus**, 1847, pl. 7.

**Acostemma marginalis**, D., 1860, pl. 5.

**Aerometopus punctipes**, D., 1860, pl. 5.

**Æthallon**, caractères génériques, D., 1851, pl. 14. — *multicolor*, *ner-rosopunctatum*, *parviceps*, *Servillei*, 1851, pl. 14.

**Agonosoma 4-guttata**, 1851, pl. 10.

**Aleurodes**, 1847, pl. 7.

**Amphibrachia**, 1845, pl. 8.

**Anthecoris**, 1846, pl. 10.

**Aphis**, D., 1847, pl. 7. — *longicaudatus*, 1853, pl. 3. — *zeæ*, ♂, ♀, 1835, pl. 20.

**Aphœna farinosa**, D., 1839, pl. 15. — *nigromaculata*, D., 1839, pl. 12.

**Aphrophora**, 1847, pl. 7.

**Aradus dilatatus, ellipticus**, D., 1844, p. 10. — *Perrisi*, D., 1845, pl. 3.

**Arma**, D., 1845, pl. 8.

**Arocatus**, 1845, pl. 9.

**Arocera circumcinctum**, 1851, pl. 10.

**Asopus Genei**, D., 1841, pl. 6.

**Astemma Mulsanti**, D., 1852, pl. 16.

**Atelocerus femoralis**, D., 1860, pl. 13.

**Atractophora 4-punctata**, D., 1860, pl. 14.

**Atypa gibba**, D., 1832, pl. 6.

**Brachystethus dilatatus, rubromaculatus**, D., 1851, pl. 10.

**Bythoscopus**, D., 1847, pl. 7.

**Cæloglossa lyncea**, 1841, pl. 6.

**Calliscells Bonellii**, D., 1839, pl. 17. — *heterodoxa*, D., 1838, pl. 9.

**Calyptoproctus lystroides**, D., 1839, pl. 12.

**Capsus**, 1845, pl. 9. — *Fairmairei*, D., 1852, pl. 16.

**Carenoscaphus maculipes**, D., 1851, pl. 10.

**Centrocnemis Deyrollei**, D., 1852, pl. 16.

**Centrotus**, 1847, pl. 2.

**Cephalocteus histeroides**, D., 1834, pl. 5.

**Cerataulax 4-vittatus**, D., 1851, pl. 10.

**Chlorocoris distinctus**, 1851, pl. 10.

**Cicada**, 1847, pl. 2.

**Cicadatra**, 1847, pl. 2.

**Cicado**, 1847, pl. 2.

**Cixius**, 1847, pl. 2. — *centralis*, 1860, pl. 4.

**Cladodiptera macrophthalma**, D., 1839, pl. 13.

**Clethropsylla**, 1847, pl. 7.

**Coccus caricæ, crispus, festucæ, fimbriatus, hirticornis, oleæ, persicæ, pieridis, radicum-graminis, rorismarini**, ♂, ♀, 1834, pl. 3. — *salicis*, D., 1849, pl. 2.

**Conchyoptera unicolor**, D., 1860, pl. 5.

**Coplecerus Swartzii**, 1857, pl. 12.

**Coquerella pectoralis**, D., 1860, pl. 13.

**Coreus**, 1845, pl. 9.

**Corixa**, 1846, pl. 10.

**Cyphonia ornata**, D., 1832, pl. 6.

**Delphax**, D., 1847, pl. 2.

**Deraulax versicolor**, D., 1860, pl. 4.

**Deribia Signoreti**, D., 1859, pl. 6.

**Dermatinus aurantiacus**, 1860, pl. 14.

**Diaspidius dilatatus**, 1860, pl. 14.

**Dichoptera hyalinata**, aile supérieure, 1839, pl. 13.

**Dilobura corticina**, D., 1839, pl. 14.

**Diraphia limbata**, 1842, pl. 11.

**Discocephala polita**, 1851, pl. 10.

**Dyctiophora proboscidea**, D., 1839, pl. 12.

**Dysdereus**, 1845, pl. 9.

**Edessa**, 1845, pl. 8.

**Elasmoscells cimicoides**, D., 1839, pl. 16.

**Elidiptera advena**, D., *callosa*, *marginicollis*, D., 1839, pl. 15.

**Enchophora Dufourii**, 1858, pl. 12. — *fuscata*, 1839, pl. 12. — *recurva*, ♂, ♀, D., 1839, pl. 10. — *Servillei*, 1839, pl. 11. — *variegata*, D., 1839, pl. 12. — *viridipennis*, D., 1839, pl. 11.

**Enoplops**, 1845, pl. 9.

**Epilodera annulipes**, D., 1860, pl. 14.

**Episcinlus Guerinii**, D., 1839, pl. 13.

**Eurydema**, 1845, pl. 8.

**Eurygaster**, 1845, pl. 8.

**Eurymela**, D., 1850, pl. 17, expl. p. 513.

**Eurysaspi transversalis**, 1851, pl. 10.

**Exphora Guerinii**, D., 1860, pl. 4.

**Flatoides vicinus**, 1860, pl. 5.

**Gargara**, 1847, pl. 2.

**Germaria cucullata**, 1832, pl. 6.

**Gerris**, 1846, pl. 10.

**Halys pulchra**, 1851, pl. 10.

**Hebrus pusillus**, D., 1834, pl. 6.

**Helopeltis Antonii**, 1858, pl. 12.

**Henestaris**, 1845, pl. 19.

**Heterogaster**, 1845, pl. 9.

**Heteronotus flavolineatus**, D., *inermis*, D., *nigricans*, D., *spinosus*, D., 1832, pl. 3.

**Hiracia Coquerelii**, D., 1860, pl. 5.

**Holotrichus Cyrilli**, *denudatus*, D.; 1841, pl. 6.

**Hydrometra**, 1846, pl. 10.

**Hylophila nemorum**, D., 1834, pl. 6.

**Hypotmetus**, 1847, pl. 2.

**Iracon**, 1845, pl. 9.

**Issus**, 1847, pl. 2. — *grylloides*, ♂, ♀, 1839, pl. 17.

**Laricethus**, D., 1847, pl. 7.

**Leptolobus Murrayi**, ♂, ♀, 1855, pl. 7.

**Leptopus littoralis**, D., 1833, pl. 6, et 1834, pl. 6. — *lanosus*, 1834, pl. 5.

**Livia**, 1847, pl. 7.

**Lophops Servillei**, D., 1839, pl. 10.

**Lygæus**, 1845, pl. 9. — *discoidalis*, 1860, pl. 14.

**Lystra punctata**, 1850, pl. 2.

**Mecosoma Coquerelii**, 1860, pl. 13.

**Megarhynchus vittatus**, 1851, pl. 10.

**MEMBRACIDES**, 1846, pl. 3, 4, 5, 6 et 7, expl. p. 529.

**Metubla**, 1845, pl. 9.

**Microphysa pselaphiformis**, D., 1834, pl. 6.

**Micropus agilis**, *collaris*, *falicus*, *fulvipes*, *Genei*, *leucopterus*, *sabuleti*,  
*Sallei*, *Spinolæ*, *variegatus*, 1857, pl. 2.

**Microvella pulchella**, D., 1834, pl. 6.

**Mictis**, 1845, pl. 9. — *cinctus*, D., 1850, pl. 4.

**Miris**, 1845, pl. 9.

**Monopsalis tabida**, D., 1839, pl. 10.

**Mormidea**, ♂, ♀, 1845, pl. 8.

**Mothachrus**, 1846, pl. 10.

**Nematopus**, 1845, pl. 9.

**Nepa**, 1846, pl. 10.

**Noptera**, 1846, pl. 10.

**Notonecta**, 1846, pl. 10.

**Odontoptera Careñoi**, D., 1849, pl. 6. — *spectabilis*, 1841, pl. 5.

**Odontoscelis**, 1845, pl. 8.

**Odontotarsus**, 1845, pl. 8. — *Coquerelii*, 1860, pl. 13.

**Ophthalmicus dispar**, ♂, ♀, D., 1839, pl. 18.

**Oxypristis Leroyi**, 1860, pl. 14.

**Pachycoris hirta**, 1841, pl. 6.

**Pachymerus parallelus**, D., 1841, pl. 6.

**Pachytoma minor**, 1841, pl. 6.

**Pattes** de quelques espèces, 1837, pl. 9, expl. p. 262.

**Pediopsis**, 1847, pl. 7.

**Pelogonus**, 1846, pl. 10.

**Peltagopus flavo-marginatus**, 1860, pl. 13.

**Pemphigus**, 1847, pl. 7.

**Pentalonia nigronervosa**, D., 1859, pl. 6.

**Petascelis dilatatus**, D., 1850. pl. 4. — *remipes*, D., 1847, pl. 3, et  
1850, pl. 4. — *spinosus*, 1851, pl. 4.

**Phlegmatoptera prasina**, D., 1839, pl. 14.

**Phlocaria uniannulata**, 1852, pl. 16.



- Phricodes histrix**, D., 1849, pl. 9.  
**Phyllocephala**, 1845, pl. 8.  
**Phyllomorpha madagascariensis**, 1848, pl. 7.  
**Phylloxera quercus**, D., 1834, pl. 1.  
**Phymata**, 1846, pl. 10.  
**Physancalus**, 1845, pl. 9.  
**Phytocerus flavomarginatus**, 1841, pl. 6.  
**Phytocoris**, 1845, pl. 9.  
**Piezodera rubra**, 1860, pl. 14.  
**Pirates**, 1846, pl. 10.  
**Platyleura guttulata**, 1860, pl. 4.  
**Plectoderes collaris**, 1839, pl. 15.  
**Plœaria**, 1846, pl. 10. — *uniannulata*, 1852, pl. 16.  
**Pocharica ocellata**, D., 1860, pl. 5.  
**Pochazoides maculatus**, D., 1860, pl. 5.  
**Podops**, 1845; pl. 8. — *siculus*, 1841, pl. 6.  
**Pœcilopectera truncaticornis**, D., 1839, pl. 16. — *ricanioides*, 1839, pl. 15.  
**Polocera Luczoti**, D., 1832, pl. 6.  
**Polyacanthus**, 1845, pl. 9.  
**Postemma brachelytrum**, D., 1834, pl. 5.  
**Pseudophana**, D., 1847, pl. 2.  
**Psyllus**, 1847, pl. 7.  
**Pterygia Macquarti**, D., 1832, pl. 6.  
**Pyrops Servillei**, 1839, pl. 11.  
  
**Ranatra**, 1846, pl. 10.  
**Reduvia**, D., 1846, pl. 10.  
**Rhopigaster**, 1845, pl. 8.  
**RHYNCHOTES**, méthode mononymique, 1845, pl. 8 et 9; 1846, pl. 10; 1847, pl. 2 à 7.  
**Rhyparochromus brachiidens**, D., 1851, pl. 11. — *proderus*, D., 1852, pl. 16.

- Riansia longirostrum**, D., 1860, pl. 4.  
**Ricania pæcilopteroides**, D., 1839, pl. 15.
- Schizia Servillei**, D., 1832, pl. 6.  
**Schyzoneura**, D., 1847, pl. 7. — *rotundiventris*, ♂, ♀, 1860, pl. 4.  
**Scutellera**, D., 1845, pl. 8.  
**Selenocephalus**, 1847, pl. 7.  
**Sepina urolaboides**, D., 1860, pl. 13.  
**Stenolemus spiniventris**, D., 1858, pl. 6.  
**Steriopoda**, 1846; pl. 10.  
**Strachia madagascariensis**, 1860, pl. 13. — *quadripunctata, radiata*, 1851, pl. 10.  
**Syromastes**, 1845, pl. 9.
- Tetratoma senegalensis**, D., 1851, pl. 10.  
**Tettigometra**, 1847, pl. 2.  
**Tettigonia**, D., 1847, pl. 7.  
**TETTIGONIDES**, D., 1853, pl. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22; 1854 pl. 1, 2, 11, 12, 17, 21; 1855, pl. 6, 12, 21, 23, 24.  
**Trienopa flavida**, 1860, pl. 5.  
**Triopsis fasciata**, D., 1860, pl. 5.  
**Tritomocera aphanoides**, D., 1841; pl. 6.  
**Tropidocephala brunneipennis**, D., 1860, pl. 5.
- Vacuna**, 1847, pl. 7.  
**Vella**, 1846, pl. 10. — *pygmaea*, D., 1833, pl. 6.  
**Verluria**, 1845, pl. 9.
- Xylocoris ater**, D., 1833, pl. 6. — *rufipennis*, D., 1834, pl. 6.
-

## NÉVROPTÈRES.

—

**Æshna** *affinis*, ♂, ♀, D., 1838, pl. 4. — *formosa*, 1838, pl. 6. — *Irene*, *rufescens*, 1838, pl. 6. — *vernalis*, 1838, pl. 5.

**Æshnes**, leur préparation, D., 1840, pl. 12.

**Agrion**, D., 1838, pl. 13. — *Aglæ*, ♂, ♀, *aurantiaca*, 1838, pl. 15. — *barbara*, 1838, pl. 13. — *cærulescens*, 1838, pl. 15. — *elegans*, *fusca*, 1838, pl. 14. — *hæmorrhoidalis*, *Picteti*, 1838, pl. 13. — *platypoda*, *puella*, ♂, ♀, D., *pulchella*, ♂, ♀, 1838, pl. 14. — *rubella*, ♂, ♀, *sanguinea*, 1838, pl. 15. — *viridis*, 1838 pl. 13.

**Hemerobius** *trimaculatus*, D., 1859, pl. 5.

**Libellule**, D., 1837, pl. 5. — *brunnea*, ♂, ♀, 1837, pl. 6. — *cærulescens*, ♂, ♀, *nitens*, ♀, 1837, pl. 5. — *Olympia*, ♂, ♀, 1837, pl. 6.

**Libelluline**, bouche, 1833, pl. 13.

—

## HYMÉNOPTÈRES.

—

**Agathis** *crudelis*, D., 1856, pl. 15.

**Alysia** *truncator*, 1851, pl. 5, expl. p. 169. — *picta*, 1851, pl. 7, expl. p. 176.

**Aphidius** *rujus*, 1851, pl. 6, expl. p. 173.

**Arpactus** *lævis*, D., 1832, pl. 1.

**Aulacomenus** *Buquetii*, D., 1840, pl. 7.

**Aulacus** *Patrati*, D., 1833, pl. 15.

**Biacus** *florus*, 1851, pl. 5, expl. p. 169.

**Bombus** *agrorum*, antenne anormale, 1834, pl. 1.

**Bracon** *barynoti*, D., 1834, pl. 4. — *urinator*, D., 1845, pl. 2, expl. p. 102.

**Brachigaster** *velutina*, D., 1841, pl. 3.

**Camptobrium** *Leprieurii*, D., 1840, pl. 7.

**Celonitis** *dispar*, D., 1851, pl. 3.

**Ceramius** *Fonscolombei*, D., 1835, pl. 10.

**Ceratina** *albilabris*, *cærulea*, D., 1840, pl. 2, expl. p. 51.

**Ceratitis** *citripeda*, tête, *hispanica*, ♂, ♀, D., 1842, pl. 7.

**Cereeris** *binodis*, D., 1841, pl. 3.

**Chalcis** *Fonscolombei*, D., 1841, pl. 1.

**Chrysantheda** *appendiculata*, D., 1849, pl. 7.

**Chrysis** *indigotea*, *obtusidens*, cocon, 1840, pl. 3, expl. p. 53.

**Cirrophilus** *cyanops*, 1851, pl. 6, expl. p. 173.

**Cladlus** *difformis*, D., 1832, pl. 11.

**Clavella** *pompiliformis*, D., 1852, pl. 8.

**Cœlinius** *festus*, 1851, pl. 6, expl. p. 173.

**Cyrtosoma** *papaveris*, D., 1840, pl. 6, expl. p. 99.

**Cryptus** *bombyci*, D., 1836, pl. 8. — *myrmeleonidum*, D., 1834, pl. 4.

**Cynips** sur une branche de chêne, 1846, pl. 2. — *flava*, 1851, pl. 7, expl. p. 176. — *papaveris*, D., 1840, pl. 6. — *urticæ*, larve, 1840, pl. 11, expl. p. 406.

**Daenusa** *flavipes*, 1851, pl. 5, expl. p. 169.

**Diplolepis** *papaveris*, D., 1840, pl. 6, expl. p. 99.

**Ells** *bicolor*, *variegata*, *vespiformis*, 1858, pl. 5.

**Entedon** *coponices*, *cyrinus*, 1851, pl. 6, expl. p. 172. — *gracilis*, 1851, pl. 7, expl. p. 174. — *gratus*, *Latreillei*, 1851, pl. 5. — *lepidus*, 1851, pl. 5, expl. p. 170. — *palustris*, 1851, pl. 5, expl. p. 169.

**Epomidiopteron Julii**, D., 1835, pl. 20.

**Eulophus** vivant dans la larve du *Phytonomus runicis*, D., 1844, pl. 2. — *crinicornis*, antenne, ♂, 1840, pl. 11, fig. 9. — *ulicis*, D., 1840, pl. 6, expl. p. 99.

**Eumenes coarctata**, D., 1839, pl. 18, expl. p. 531. — *infundibuliformis*, D., 1849, pl. 7, expl. p. 194.

**Eurytoma verticillata**, D., 1845, pl. 2, expl. p. 102.

**Euspongius laticinctus**, D., 1832, pl. 1.

**Formica truncata**, 1840, pl. 3, expl. p. 53.

**Formilla Chevrolatii**, 1848, pl. 2.

**Gorytes campestris, mystaceus**, D., 1832, pl. 1.

**Hedychrum minimum**, cocon, 1840, pl. 3, expl. p. 53.

**Hoplisus cinctus**, D., 1832, pl. 1.

**HYMÉNOPTÈRES** des tiges sèches de la ronce, D., 1840, pl. 1, 2, 3.

**Ichneumon** du *Callidium sanguineum*, D., 1843, pl. 4. — *grator*, larve, 1840, pl. 3, expl. p. 53.

**Ichneumon** parasite de la *Grapholitha succedana*, D., 1847, pl. 3.

**Ischnogaster Mellyi**, D., 1852, pl. 2.

**Lestiphorus bicinctus**, D., 1832, pl. 1.

**Lithurgus chrysurus**, ♂, ♀, *cornutus*, ♀, 1834, pl. 1.

**Masaris vespiformis**, ♂, ♀, D., 1853, pl. 20.

**Megilla labiata**, D., 1838, pl. 9.

**Merismus obscurus**, D., 1846, pl. 11.

**Microgaster globatus**, D., 1845, pl. 7.

**Micromyrma pygmæa**, D., 1857, pl. 4.

**Mutilla singularis**, 1841, pl. 3.

**Nematus laticrus, latipes, varus**, D., 1832, pl. 11.

**Nysson marginatus**, 1841, pl. 3.

**Omphale stigma**, 1851, pl. 6, expl. p. 173.

**Ophion dositheæ**, D., 1834, pl. 9.

**Opius ambirius**, 1851, pl. 6, expl. p. 174.

**Osmia acuticornis**, *parvula*, *ruborum*, *tridentata*, 1840, pl. 1; expl. p. 51.

**Paxilloma Cremieri**, D., 1838, pl. 12, expl. p. 435.

**Philanthus petiolatus**, 1841, pl. 3.

**Phyllocera quercus**, D., 1834, pl. 1.

**Phytodictus grandis**, D., 1852, pl. 8

**Pimpla Fairmairei**, *métam.*, D., 1858, pl. 17, expl. p. 816.

**Polycyrtus histrio**, *quadrisulcatus*, D., 1840, pl. 7.

**Pompile** ? D., 1839, pl. 18, p. 535.

**Priomerus insidiosus**, D., 1856, pl. 15.

**Psammæclus punctulatus**, D., 1832, pl. 1.

**Scatophaga Audouini**, ♂, ♀, D., 1835, pl. 4.

**Schlzocerus Peletieri**, D., 1832, pl. 11.

**Scolia carnifex**, D., 1855, pl. 10. — *insignis*, *jucunda*, 1858, pl. 5. — *oryctophaga*, D., 1855, pl. 10. — *sexmaculata*, hermaphrodite, D., 1835, pl. 4. — *splendida*, 1858, pl. 5.

**Semiotus apionis**, D., 1847, pl. 3, expl. p. 253. — *diversus*, D., 1845, pl. 2, expl. p. 102.

**Solenius lapidarius**, larve, 1840, pl. 11, expl. p. 412. — *rupicola*, 1840, pl. 2, expl. p. 52.

**Stelis minuta**, larve, 1840, pl. 3, expl. p. 52.

**Stizus nigricornis**, *Perrisii*, D., 1838, pl. 9.

**Synœca cyanea**, *ultramarina*, D., 1852, pl. 11.

**Systasis celer**, 1851, pl. 6, expl. p. 173.

**Syzygonia cyanoptera**, D., 1833, pl. 16.

**Trypoxylon figulus**, larve, D., 1840, pl. 3, expl. p. 52.

**Xiphura Villaretiana**, D., 1832, pl. 4.

**Zethus globicollis**, 1841, pl. 3.

---

## LÉPIDOPTÈRES.

—

**Acidalia** *bassaria*, 1835, pl. 1. — *elongaria, obsoletaria*, 1833, pl. 2.

**Acentla** *Graellsii*, 1837, pl. 12.

**Agla** *Tau*, 1858, pl. 14.

**Agrotis** *celsicola*, 1859, pl. 5. — *Desilii*, ♂, ♀, 1839, pl. 8. — *gita*, 1837, pl. 18. — *Graslinii*, ♂, ♀, 1848, pl. 1. — *hastifera*, 1847, pl. 8. — *Honoratina*, ♂, ♀, 1837, pl. 18. — *incurva*, ♀, 1859, pl. 5. — *occidentalis*, ♂, ♀, 1860, pl. 12. — *telifera*, 1837, pl. 18. — *Villiersii*, ♂, ♀, 1837, pl. 8.

**Anaitis** *lithoxylata*, 1839, pl. 5. — *Magdalenaria*, ♂, ♀, 1856, pl. 1.

**Anarta** *algida, amissa*, ♂, ♀, 1836, pl. 10.

**Angerona** *prunaria*, hermaphrodite, 1835, pl. 1.

**Anthocharis** *cardamines*, hermaphrodite, 1852, pl. 4. — *Charltonia*, 1842, pl. 8. — *Damone*, 1837, pl. 12. — *Doñei*, ♂, ♀, 1836, pl. 9. — *Levaillantii*, 1850, pl. 2.

**Anthophila** *obliterata*, 1833, pl. 2.

**Apamea** *aquila*, 1837, pl. 18. — *Hamorthii*, var. ♂, ♀, 1848, pl. 1. — *oculca*, 1858, pl. 14. — *rubeuncula*, ♂, ♀, 1838, pl. 12.

**Apocheima** *flabellaria*, ♂ et chenille, 1860, pl. 12.

**Arge**, var. *plesaura*, ♂, ♀, 1860, pl. 12.

**Argus** *Abenceragus*, 1837, pl. 1. — *Alexis*, hermaphrodite, 1835, pl. 1.

**Argynnis** *Niobe*, 1858, pl. 14. — *Pales*, var. ♂, ♀, 1859, pl. 5. — *Selenis*, 1837, pl. 1.

**Argyresthia** *cyancomarmorella*, 1834, pl. 3.

**Boarmia** *Solieraria*, 1834, pl. 8.

**Bombyx** *callunæ*, D., 1856, pl. 10. — *castrensis*, var. *taraxoides*, 1851, pl. 4. — *iberica*, 1858, pl. 10. — *Paphia*, cocon, 1852, pl. 15. — *philopalus*, 1842, pl. 8. — *pityocampa*, D., 1832, pl. 6. — *psidii*, et chenille, 1857, pl. 1. — *quercus, serrula*, 1858, pl. 10.

**Brephos** *Parthenias*, 1858, pl. 14.

**Briophila** *Germainii*, 1835, pl. 4.

**Cabera** *Craellsiaria*, 1835, pl. 1.

**Callimorpha** *donna*, variétés, 1842, pl. 9.

**Caradrina** *aspersa*, 1834, pl. 8. — *fuscicornis*, 1832, pl. 9. — *laciniosa*, 1847, pl. 8. — *pygmæa*, 1834, pl. 8. — *respersa*, chenille; 1844, pl. 6.

**Catocala** *electa*, 1855, pl. 11.

**Catoptria** *carduana*, D., 1845, pl. 2, expl. p. 102.

**Cephalispheira** *æreinitidella*, 1854, pl. 3.

**Cerocala** *speciosa*, 1850, pl. 2.

**Charaxes** *Delphis*, 1843, pl. 7. — *Eudamippus*, 1843, pl. 8. — *Polux*, 1850, pl. 9.

**Chauliodus** *ochreomaculella*, 1854, pl. 3.

**Chelonia** *hemigena*, ♂, ♀, 1850, pl. 10. — *Latreillei*, D., 1843, pl. 12. — *purpurea*, 1858, pl. 14. — *villica*. var. ♂, 1860, pl. 12. — *Zoraida*, 1836, pl. 17.

**Chesias** *geneata*, 1835, pl. 1. — *ulicata*, 1834, pl. 8.

**Chilo** *phragmitellus*, chenille, D., 1844, pl. 6.

**Chimæra** *funnebris*, 1833, pl. 9.

**Choreutes** *dolosana*, ♂, ♀, D., 1856, pl. 1.

**Chrysia** *leucochrysella*, 1854, pl. 3.

**Cidaria** *malvata*, 1833, pl. 2.

**Cigaritis** *Massinissa*, 1850, pl. 2. — *Zohra*, 1847, pl. 8.

**Cleophana** *Cyclopea*, 1836, pl. 17. — *Ferriarii*, 1857, pl. 1. — *serrata*, 1837, pl. 12.

**Cochylis**, *hilarana*, D., 1856, pl. 1.

**Coleophora**, D., 1859, pl. 10, 11.

**Collas** *Hecla*, ♂, ♀, 1836, pl. 9.

**Coremia** *Pontissalaria*, 1846, pl. 8.

**Crocallis** *Dardoinaria*, ♂, ♀, 1840, pl. 4. — *lentiscaria*, 1837, pl. 1.

**Cucullia** *caninæ*, *lychnitis*, 1833, pl. 1. — *santholinæ*, D., 1834, pl. 8. — *scrophulariæ*, *scrophularifaga*, *thapsiphaga*, *verbasci*, et leurs chenilles, D. 1833, pl. 1.



**Cillo** *sepulta*, 1840, pl. 8, et D., 1851, pl. 3.

**Dianthecia** *luteago*, D., 1842, pl. 13.

**Dicranura**, hybride de *vinula* et de *erminea*, 1856, pl. 1.

**Dicrorampha** *ulicana*, D., 1847, pl. 10, expl. p. 253.

**Diorina** *Laonome*, 1833, pl. 14.

**Dosithea** *attenuaria*, *infirmaria*, 1833, pl. 2. — *scutularia*, D., 1833, pl. 9.

**Elachista** *Treitskiella*, D., 1855, pl. 11.

**Episema** *Pierreti*, 1837, pl. 16. — *unicolor*, 1835, pl. 4.

**Erastria** *clychrysi*, *scitula*, 1833, pl. 2.

**Erebia** *Arete*, ♂, ♀, 1858, pl. 11. — *Sthennio*, ♂, ♀, 1850, pl. 10.

**Eriopus** *pteridis*, chenilles, 1842, pl. 4.

**Erycina** *Licarsis*, *Thia*, 1837, pl. 14.

**Eubolla** *larentiaria*, var. *lactaria*, 1853, pl. 11. — *proximaria*, *scitularia*, 1833, pl. 2.

**Eudorca** *borealis*, 1836, pl. 10.

**Euriphena** *gambiæ*, 1850, pl. 9.

**Fidonia** *assimilaria*, D., 1833, pl. 2.

**Gelechia** *carlinella*, métamorphoses, 1858, pl. 7, expl. p. 276.

**Gnophos** *obscuraria*, 1853, pl. 13. — *variegata*, D., 1843, pl. 10.

**Godarta** *madagascariensis*, D., 1842, pl. 12.

**Gortyna** *Borellii*, 1837, pl. 16.

**Grapholitha** *succedana*, D., 1847, pl. 3, expl. p. 253.

**Hadena** *crulis*, 1836, pl. 10. — *Festhamelii*, 1833, pl. 14. — *gelata* *implicata*, 1836, pl. 10. — *Latenæi*, 1837, pl. 8. — *sociabilis* 1850, pl. 10. — *Sommeri*, 1836, pl. 10, fig. 1.

**Hastula** *hyerana*, D., 1857, pl. 14.

**Heliconia** *Leprieuri*, 1835, pl. 18.

**Heliopsis** *dipsacea*, D., 1855, pl. 7. — *Friwaldskyi* D., 1835, pl. 11. *maritima*, D., 1855, pl. 7.

**Hemlthea** *corticaria*, 1833, pl. 2.

**Hepialus pyrenaicus**, ♂, ♀, 1838, pl. 12.

**Hesperia Therapne**, D., 1832, pl. 7.

**Heterogynis erotica**, ♂, ♀, D., 1850, pl. 10. — *paradoxa*, D., 1836, pl. 17.

**Hœmillus pastinacella**, chenille, D., 1844, pl. 6.

**Hyponomeuta padella**, D., 1847, pl. 3.

**Incurvaria Psychidella**, 1853, pl. 3.

**Larentia Brullei**, 1836, pl. 10. — *dissimilata*, *ericeata*, 1833, pl. 2. — *ligustigata*, 1838, pl. 12. — *melanoparia*, 1848, pl. 1. — *Millierata*, 1858, pl. 11. — *muscosata*, 1837, pl. 18. — *oxycedrata*, 1833, pl. 2. — *phæniceata*, 1854, pl. 8. — *scopariata*, 1833, pl. 2.

**Leptalis fortunata** 1854, pl. 3.

**Leucania amnicola**, 1832, pl. 9. — *albivena*, 1852, pl. 8. — *amnicola*, 1832, pl. 8. — *fascilinea*, 1852, pl. 8. — *riparia*, 1832, pl. 9.

**Ligia caliginearia**, D., 1833, pl. 2.

**Liparis dispar**, anomalie, 1849, pl. 6.

**Lithosia bifasciata**, *rufecola*, 1832, pl. 8.

**Mamestra chenopodiphaga**, 1832, pl. 9.

**Megasoma repandum**, ♂, ♀, D., 1832, pl. 13.

**Melanthia breviculata**, 1837, pl. 18.

**Melithœa Cinxia**, variétés, 1856, pl. 16.

**Nephoteryx angustella**, D., 1847, pl. 3.

**Noctua batis**, *derasa*, 1849, pl. 2, 1850, pl. 3, 1851, pl. 3. — *dipsacea*, D., 1851, pl. 3. — *catalcûca*, *helvetina*, 1833, pl. 14. — *jaspidea* et chenille, 1841, pl. 4.

**Nonagria paludicola**, D., 1833, pl. 16.

**Numeria agaritharia**, ♂, ♀, 1842, pl. 8.

**Nyssia pomonaria**, ♂, ♀, 1835, pl. 4.

**Ophiusia nubilaris**, 1836, pl. 17. — *syriaca*, 1837, pl. 16.

**Orgya aurolimbata**, 1835, pl. 18, et chenille, 1850, pl. 10. — *dubia*,

D., 1836, pl. 17. — *rupestris*, ♂, ♀, D., 1832, pl. 8. — *triglyphas*, D., 1834, pl. 1.

**Orthosia** *amicta*, 1847, pl. 8. — *gothica*, variétés, 1855, pl. 11.

**Papilio** *Duponchelii*, 1839, pl. 8.

**Pieris** *napi*, 1858, pl. 14. — *Tagis*, D., 1832, pl. 7.

**Plusia** *uralensis* D., 1859, pl. 5.

**Polia** *asphodeli*, *corsica*, 1832, pl. 9. — *dumosa*, 1837, pl. 18. — *felicina*, chenille, 1844, pl. 6. — *luteocincta*, 1834, pl. 8. — *tephroleuca*, 1833, pl. 14.

**Polyommatus** *Xanthe*, variété ♀, 1859, pl. 5.

**Psyche** *albida*, 1843, pl. 4. — *Erksteiniella*, D., 1858, pl. 11. — *febretta*, ♂, ♀, D., 1835, pl. 1. — *Gruneriella*, D., *maritimella*, D., *Pontbriantella*, *Sicheliella*, D., *surientella*, D., 1858, pl. 11.

**Ptérographie** des Lépidoptères, 1842, pl. 1, 2, 3, expl. p. 27.

**Pterophorus** *brunneo-dactylus*, D., 1854, pl. 3.

**Rhamphomya** *marginata*, D., 1851, pl. 4.

**Saturnia** *Isabellæ*, D., 1850, pl. 8.

**Satyrus** *Abd-el-Kader*, 1837, pl. 1. — *arcanioides*, 1837, pl. 12. — *Arge*, *Clotho*, *Darcet*, *Galathæa*, D., *Ines*, *Lachesis*, D., *Larisa*, 1832, pl. 2. — *Prieuri*, 1837, pl. 12. — *Psyche*, 1832, pl. 2.

**Sericoris** *antiquana*, D., 1851, pl. 11.

**Sesia** *anthraciformis*, 1832, pl. 7. — *hymenopteriformis*, ♂, ♀, 1860, pl. 12. — *mutillæformis*, *nomadæformis*, D., 1846, pl. 8.

**Smerinthus** *abyssinicus*, 1857, pl. 13.

**Solenobia** *clathrella*, chenille, D., 1844, pl. 6.

**Sphinx** du tithymale, chenille, 1858, pl. 11.

**Spœlotis** *nyctimera*, chenille, 1844, pl. 6.

**Stilbia** *philopalis*, 1852, pl. 8. — *stagnicola*, ♂, ♀, D., 1842, pl. 13.

**Strenia** *clathraria*, 1859, pl. 14.

**Syntomis** *Mestralii*, 1837, pl. 16.

**Tanaos** *Cervantes*, 1836, pl. 17.

**Tarses** de quelques espèces, 1837, pl. 9, expl. p. 264.

**Thecla** *W-album*, 1858, pl. 14.

**Tinea** *Aglaella*, 1840, pl. 4. — *decuriella*, D., 1832, pl. 10. — *oleella*, *olivella*, 1837, pl. 8.

**Trichosema** *atlanticum*, 1853, pl. 13. — *bæticum*, 1836, pl. 17. — *corsicum*, ♂, ♀, D., 1832, pl. 8. — *pudens*, 1853, pl. 13.

**Thyatyra** *batis*, *derasa*, D., 1850, pl. 3.

**Uropus**, chenille, D., 1832, pl. 8.

**Vanessa** *Ichnusa*, 1832, pl. 7. — *urticæ*, 1858, pl. 14.

**Xylina** *australis*, 1832, pl. 9. — *Ivanii*, 1833, pl. 9. — *Lefebvrei*, 1837, pl. 16. — *Merckii*, 1832, pl. 9.

**Ypsolopha** *congressariella*, D., 1858, pl. 11.

**Zeonia** *Morissei*, 1837, pl. 14.

**Zethes** *insularis*, D., 1833, pl. 2.

**Zonilia** *Schimperi*, 1847, pl. 13.

**Zygæna** *balearica*, D., 1849, pl. 6. — *cedri*, 1846, pl. 8. — *corsica*, ♂, ♀, 1832, pl. 7. — *Valentini*, 1846, pl. 8. — *Zulema*, 1837 pl. 1.

---

## DIPTÈRES.

---

**Adapsilia** *coarctata*, ♂, ♀, D., 1842, pl. 11.

**Agromyza** *Macquarti*, 1851, pl. 5, expl. p. 169. — *nana*, *pusilla*, 1851, pl. 5, expl. p. 170.

**Amethysa** *calligyna*, D., 1857, pl. 7.

**Anabarhynchus** *variegatus*, D., 1859, pl. 12.

**Anglearia** *antennata*, D., 1835, pl. 20.

- Anthomyia** *platura* et ses parasites, D., 1849, pl. 8, expl. p. 86.
- Anthrax** *bombyciiformis* D., *fasciata*, D., 1850, pl. 5, expl. p. 181.  
 — *formosa*, 1852, pl. 1. — *Miegii*, 1850, pl. 5. — *nebula*, 1852, pl. 1. — *sinuata*, D., 1857, pl. 15. — *trinotata*, 1852, pl. 1.
- Aphria** *longirostris*, *Servillei*, D., 1845, pl. 6.
- Aricia** *cærulea*, D., 1859, pl. 13. — *pici*, D., 1853, pl. 20.
- Astomella** *curviventris*, D., 1850, pl. 5, expl. p. 153.
- Aulacigaster** *rufitarsis*, D., 1846, pl. 11.
- Blepharicera** *limbipennis*, 1843, pl. 3, 1844, pl. 2.
- Bombylius** *boghariensis*, D., *fumosus*, D., 1852, pl. 1. — *major*, et *tamorphoses*, D., 1858, pl. 13, expl. p. 511.
- Cecidomyia** de la galle du *Tamarix brachystilis*, D., 1846, pl. 4. — *papaveris*, *tritici*, 1857, pl. 12, expl. p. 584. — *urticæ*, D., 1840, pl. 11, expl. p. 406.
- Ceratopogon** *brunnipes*, D., 1847, pl. 9, expl. p. 568. — *flavifrons*, D., *geniculatus*, D., 1833, pl. 8. — *geniculatus*, D., 1845, pl. 8. — *lucorum*, D., 1847, pl. 9, expl. p. 569.
- Ceria** *conopsoides*, D., 1847, pl. 1, expl. p. 27.
- Chelosia** *aurantipes*, D., 1857, pl. 7.
- Chrysotoxum** *chrysopolita*, *cisalpinum*, *italicum*, *parmense*, 1855, pl. 3.
- Cœnura** *longicauda*, D., 1857, pl. 6.
- Copicerus** *Swartzii* ?, D., 1857, pl. 12.
- Cosmina** *cuprina*, D., 1859, pl. 13.
- Criorhina** *bombyformis*, D., 1839, pl. 6.
- Culex** *anxifer*, ♂, ♀, *insatiabilis*, 1859, pl. 2.
- Cuphocera** *ruficornis*, ♂, ♀, D., 1845, pl. 4.
- Cylindrotoma** *macroptera*, D., 1849, pl. 9, expl. p. 840.
- Cyllenia** *elegantula*, D., 1857, pl. 6.
- Cynips** *urticæ*, 1840, pl. 11.
- Cyrtophorus** *pictipennis*, D., 1857, pl. 7.
- Cyrtosia** *marginata*, D., 1839, pl. 7.

**Diectria chalcogastra**, D., *melas*, D., 1850, pl. 6, expl. p. 154. — *ochrocera*, 1852, pl. 1.

**DIPTÈRES** du chèvrefeuille des buissons, D., de l'iris des marais, D., et des feuilles de luzerne, D., 1846, pl. 8. — de l'*Helix conspurcata*, 1843, pl. 2.

**DIPTÈRES** mineurs des feuilles et leurs parasites, D., 1581, pl. 5, 6, 7.

**Dolichomerus nigritus**, D., 1859, pl. 12.

**Dolichopus**, système alaire, D., 1844, pl. 4, 5, expl. p. 184.

**Drosophila pallipes**, D., 1846, pl. 9.

**Echinomyia echinata**, *fera*, ♂, ♀, *ferox*, ♂, ♀, *fuscipennis*, *grossa*, *leucomma*, *lurida*, ♂, ♀, D., *pedemontana*, *prompta*, *pusilla*, *rusticeps*, *sphyricea*, ♂, ♀, D., 1845, pl. 4.

**Elassogaster metallicus**, D., 1859, pl. 13.

**Eristalis cupreus**, D., *sexvittatus*, 1859, pl. 12.

**Eulophus crinicornis**, 1840, pl. 11, du *Phyt. rumicis*, 1844, pl. 2.

**Eumerus** D., 1850, pl. 4, expl. p. 130.

**Euthlonevra myrtilli**, D., 1836, pl. 15.

**Exochostoma nitida**, D., 1842, pl. 4.

**Fallenia fasciata**, D., 1850, pl. 6, expl. p. 155.

**Gonia atra**, *bicincta*, *capitata*, ♂, ♀, *fasciata*, *hebes*, ♂, ♀, D., *melanura*, *tessellata*, *vacua*, *vittata*, 1845, pl. 5.

**Hebotomus minutus**, D., *papatasi*, D., 1843, pl. 10.

**Helomyza gibba**, D., 1839, pl. 6.

**Helophilus luctuosus**, D., 1857, pl. 7.

**Heterostomus curvipalpis**, D., 1857, pl. 6.

**Hirmonevra brevirostrata**, D., 1857, pl. 6.

**Hyalomyia dispar**, D., 1852, pl. 8.

**Illigera ruficeps**, 1845, pl. 5, 6.

**Jurinia callipyga**, D., 1857, pl. 7.

- Lampromyia funebris**, D., 1850, pl. 6, expl. p. 155.
- Lauxacanthls barbipes**, D., 1859, pl. 3.
- Leptis vermileo**, D., 1833, pl. 18.
- Limnophila dispar**, D., 1849, pl. 9, expl. p. 337.
- Lonchœa nigra**, D., 1849, pl. 3, expl. p. 65. — *parvicornis*, 1859, pl. 2, larve, pl. 3.
- Lucilia dispar**, D., 1845, pl. 3. — *hominivorax*, 1858, pl. 4, D., 1859, pl. 6.
- Lycomyia Germainii**, D., 1857, pl. 6.
- Medeterus oceanus**, D., 1838, pl. 11.
- Melanophora helicivora**, D., 1843, pl. 2.
- Micropalpus analis**, D., *fulgens*, *hæmorrhoidalis*, ♂, ♀, *longirostris*, D., *pictus*, *tessellatus*, *vulpinus*, ♂, ♀, D., 1845, pl. 5.
- Microstylum cilipes**, 1859, pl. 9.
- Miltogramma aurifrons**, D., 1850, pl. 6, expl. p. 154.
- Mycetobia pallipes**, D., 1849, pl. 7, expl. p. 210.
- Mycetophila lycogalæ**, D., 1839, pl. 5. — *scatophora*, D., 1849, pl. 3, expl. p. 61.
- Mydas lusitanicus**, D., 1850, pl. 6, expl. p. 154.
- Nemestrina Perezii**, ♂, ♀, D., 1850, pl. 5, expl. p. 153.
- Nemotelus angulatus**, D., *lateralis*, 1852, pl. 1.
- Notiphila flavcola**, 1851, pl. 7, expl. p. 175.
- Odontomyia limbifacies**, 1859, pl. 3.
- Oidemachilus Coquerelii**, D., 1859, pl. 13.
- Ortalis maculipennis**, D., 1850, pl. 6. — *sanctæ-mariæ*, D., 1859, p. 13.
- Oscinis Maquarti**, 1851, pl. 5, expl. p. 169.
- Pangonia**, D., 1837, pl. 15, expl. p. 438. — *conica*, D., 1857, pl. 6.
- Pegomyia atriplicis**, *minutis*, 1851, pl. 7, expl. p. 175 et 176. — *vittata*, D., 1857, pl. 7.
- Pelecocera lugubris**, D., 1839, pl. 6.

**Phalacromyia nigripes**, D., 1857, pl. 7.

**Phora camariana**, D., 1848, pl. 7, expl. p. 190.

**Physecrania obscura**, D., 1859, pl. 3.

**Phytomyza aprilina**, *aquifolii*, 1851, pl. 5, expl. p. 171. — *cinerella*, 1851, pl. 6, expl. p. 173. — *elegans*, 1851, pl. 5, expl. p. 170. — *flava*, *horticola*, 1851, pl. 6, expl. p. 172. — *lappæ*, *lateralis*, 1851, pl. 7, expl. p. 174. — *minuscula*, *nigra*, 1851, pl. 6, expl. p. 172. — *Robinaldi*, 1851, pl. 5, expl. p. 171. — *tropæoli*, métamorphoses, 1857, pl. 3.

**Ploas fuminervis**, D., *macroglossa*, D., 1852, pl. 1.

**Psolidomyia fucicola**, D., 1833, pl. 6.

**Rhomphomyia marginata**, D., 1851, pl. 4.

**Rhyncomyia columbina**, D., 1846, pl. 9.

**Rhyphus fenestralis**, D., 1849, pl. 7, expl. p. 209.

**Sapromyza 4-punctata**, D., 1852, pl. 15, expl. p. 601.

**Sarconesla chlorogaster**, D., *versicolor*, 1857, pl. 7.

**Sarcophaga tetripunctata**, D., 1850, pl. 6, expl. p. 154.

**Sargus australis**, 1859, pl. 9.

**Scathopse punctata**, D., 1847, pl. 1, expl. p. 48.

**Scatophaga Audouini**, ♂, ♀, D., 1835, pl. 4. — *marina*, D., *occana*, D., 1838, pl. 11. — *serotina*, D., 1839, pl. 5.

**Scenopinus fenestralis**, nymphe, 1850, pl. 16.

**Sciaphila unimaculata**, D., 1849, pl. 9, expl. p. 351.

**Sibystroma Dufourii**, D., 1838, pl. 11.

**Siphona granulata**, D., 1845, pl. 6.

**Siphonella nucis**, D., et larve, 1839, pl. 4.

**Solenius lapidarius**, D., 1840, pl. 11.

**Sphiximorpha Petronillæ**, D., 1850, pl. 7.

**Syrphus annulipes**, 1859, pl. 12.

**Tabanus albipectus**, D., *obscure-stigmatus*, D., 1859, pl. 9.

**TACHINAIRES**, D., 1845, pl. 4, 5, 6, expl. p. 295; D., 1848, pl. 3, 4, 5, 6, expl. p. 136; D., 1849, pl. 10, 11, 12, expl. p. 416; D.,



1850, pl. 12, 13, 14, 15, expl. p. 489; D., 1854, pl. 13, 14, 15, 16, expl. p. 444 et 753; 1855, pl. 1, 2, 3, 4, expl. p. 47 et 203.

**Tephrites fasciata**, métamorphoses, D., 1857, pl. 3. — *jaceæ*, métamorphoses, D., 1857, pl. 3, expl. p. 59.

**Tetanocera ferruginea**, D., 1849, pl. 3, expl. p. 78.

**Thryptocera albicollis**, *bicolor*, *crassicornis*, *exolcta*, D., *frontalis*, *laticornis*, *pilipennis*, *setipennis*, *silacea*, D., 1845, pl. 6.

**Tipula brunnea**, D., 1859, pl. 3.

**Trichocera annulata**, D., 1847, pl. 1, expl. p. 48.

**Urophora flexuosa**, 1857, pl. 7. — *cuspidata*, 1845, pl. 2, expl. p. 102. — *quadrifasciata*, 1857, pl. 3, expl. p. 59.

**Xestromyza chrysanthemi**, ♂, ♀, 1850, pl. 5, expl. p. 153.

**Xiphura Villaretiana**, D., 1832, pl. 4.

---

## APTÈRES.

---

**Achorutes biclancensis**, D., 1842, pl. 11. — *murorum*, 1847, pl. 6.

**Anurophorus ambulans**, *finctarius*, 1847, pl. 6.

**Anoura rosca**, 1847, pl. 6.

**Campodea staphylinus**, 1847, pl. 6.

**Cyphoderus curvicolis**, 1847, pl. 6.

**Degeeria nivalis**, 1847, pl. 6.

**Dicyrtoma Lucasii**, 1847, pl. 6.

**Hermatopinus bicolor**, *cervicapræ*, D., 1847, pl. 8. — *tuberculatus*, D., 1852, pl. 11.

**Isotoma** *Gervaisii*, 1847, pl. 6.

**Lepisma** *saccharina*, 1847, pl. 6.

**Machilis** *fasciola*, 1847, pl. 6.

**Nicoletia** *phytophila*, 1847, pl. 6.

**Orchesella** *flavescens*, 1847, pl. 6.

**Phlopterus** *brevis*, D., *Diomedæ*, ♂, ♀, D., *pederiformis*, D., 1835, pl. 21.

**Podura** *aquatica*, 1847, pl. 6.

**Podurella**, D., 1855, pl. 10.

**Praniza** *mauritanica*, D., *obesa*, 1839, pl. 15.

**Ricinus** *houbaræ*, 1836, pl. 20.

**Smyntharus** *Lusseri*, 1847, pl. 6.

**THYSANURES**, caractères génériques, D., 1847, pl. 4.

**Tomocerus** *plumbeus*, 1847, pl. 6.

---

## ARACHNIDES.

---

**Actinopus** *Audouinii*, *nigripes*, ♂, D., 1837, pl. 13. — *Pertyi*, D., 1845, pl. 1.

**Argyope** *aurantia*, D., 1833, pl. 5.

**Atypus** *bicolor*, D., 1836, pl. 5.

**Calammata**, D., 1837, pl. 13.

**Cratoscellis** *nigripes*, D., *rufipes*, D., 1847, pl. 7.

**Drassus segestriiformis**, D., 1858, pl. 6.

**Epelra thomisoides**, D., 1855, pl. 5.

**Galeodes barbara**, D., 1853, pl. 3. — *phalangista*, D., 1857, pl. 4.

**Gamasus halophilus**, *maritimus*, *salinus*, 1851, pl. 9.

**Hydrachna viridana**, D., 1851, pl. 9.

**Ixodes exilipes**, D., *flavomaculatus*, D., *gracilentus*, D., *ornithorhynchi*, D., *pulchellus*, D., 1846, pl. 1. — *ricinus*, appareil générateur, 1848, pl. 2, expl. p. 20. — *transversalis*, D., 1845, pl. 1.

**Latrodectus malmignatus**, 1842, pl. 10.

**Lycosa erythrognatha**, D., 1836, pl. 15.

**Megistopoda Pilatci**, D., 1852, pl. 4.

**Mygale luctuosa**, D., 1855, pl. 5. — *pionnière*, D., 1833, pl. 4. — *zebrata*, 1835, pl. 19.

**Pachiloseellus nigripes**, D., *rufipes*, D., 1834, pl. 7.

**Salticus aurantius**, *brasiliensis*, *limbatus*, D., *variegatus*, D., 1833, pl. 18.

**Sclerosoma bispinosum**, D., 1858, pl. 12.

**Scotolemon Lepricurii**, D., *Lespesii*, D., 1860, pl. 16.

**Seytodes longipes**, D., 1845, pl. 1.

**Theridion ardesiacum**, ♂, ♀, D., 1855, pl. 5. — *civicum*, ♂, ♀, D., 1849, pl. 6.

**Tyroglyphus Mericourti**, 1851, pl. 9.

---

## MYRIAPODES.

—

**Brachypus** *torvicollis*, D., 1842, pl. 11.

**Iulus** *albolineatus*, D., 1845, pl. 7. — *muscorum*, D., 1840, pl. 4.

**Platydesmus** *polydesmoides*, D., 1843, pl. 3.

—————

## CRUSTACÉS.

—

**Ancus** *vorax*, D., 1849, pl. 15.

**Amphion** *Reinaudi*, D., 1832, pl. 12.

**Astacus** *fluviatilis*, 1844, pl. 1. — *id.* *anormal*, D., 1848, pl. 13; D., 1859, pl. 4.

**Axia** *cylindrica*, 1849, pl. 5.

**Branchipus** *torvicornis*, D., 1842, pl. 11.

**Cancer** *fossulatus*, D., 1859, pl. 4.

**Carcinus** *mænas*, patte monstrueuse, 1844, pl. 1.

**Cydas** *fontinalis*, D., 1859, pl. 4.

**Galathea** *Lupizæ*, 1849, pl. 5.

**Gebia** *digitata*, D., *Masteri*, D., *Megeri*, 1849, pl. 15.

**Gervaisia** *costata*, 1857, pl. 14.

**Homarus** *Blainvillæ*, D., *Boscii*, *Cottaldi*, *Cuvieri*, *Desmarestii*, *Dorbigny*, D., *Edwardsii*, *Fabricii*, *Guerinii*, D., *Herbstii*, *Lamarkii*, D., *Latreillei*, D., *Linnei*, D., *Lucasii*, D., *Michelini*, *Sowerbii*, D., 1849, pl. 4 et 5. — *vulgaris*, patte monstrueuse, 1844, pl. 1.

**Isea** *elongata*, D., 1832, pl. 10.

**Ixa** *Edwardsii*, 1858, pl. 4.

**Leucippa** *pantagona*, D., 1833, pl. 18.

**Lupa** *dicantha*, patte monstrueuse, 1844, pl. 1.

**Macrophthalmus** *Desmarestii*, D., 1839, pl. 20.

**Mophrops** *Geoffroyi*, D., *salviensis*, D., 1849, pl. 5.

**Palæno** *Ræmeri*, 1849, pl. 5.

**Philoscla** *notata*, 1857, pl. 14.

**Platycarclnus** *Bervillei*, D., 1859, pl. 4.

**Solenocera** *Philippii*, D., 1850, pl. 7.

**Thalassina** *grandi-dactylus*, 1849, pl. 5.

**Thealia** *acanthophora*, D., 1839, pl. 21.

**Xanthe** *Agassizi*, D., 1849, pl. 5.

---

**ARTICLES GÉNÉRAUX ET OBJETS DIVERS.**

---

**Appareil** de M. Blisson, 1847, pl. 3. — Pour *Libellule*, 1840, pl. 12.

**Galle** du *Tamarix brachystylis*, 1856, pl. 4, expl. p. 172.

**Insecte** dont l'ordre est incertain, D., 1841, pl. 5.

**Stridulation** des Insectes, D., 1837, pl. 3 et 4.

*Les trois premières séries des Annales contiennent en outre :*

Une lithographie du Tombeau de Latreille au Père-Lachaise, 1835.

*Les Portraits suivants :*

Du comte Dejean, 1845 ;

D'Audinet-Serville, 1857 ;

Et de Duméril, 1860.

*Et des Autographes :*

De Cuvier, 1832 ;

De Latreille, 1834 ;

Et de Duméril, 1860.



# TABLE DES MATIÈRES

	pages.
Préface . . . . .	v
Liste alphabétique des souscripteurs aux Tables des Annales. . . .	xi
Abréviations principales employées dans les Tables . . . . .	xiii
Errata . . . . .	xv
I. Coléoptères. . . . .	1
II. Orthoptères. . . . .	269
III. Hémiptères. . . . .	283
IV. Névroptères. . . . .	339
V. Hyménoptères . . . . .	345
VI. Lépidoptères . . . . .	381
VII. Rhipiptères. . . . .	452
VIII. Diptères . . . . .	453
IX. Aptères. . . . .	487
X. Arachnides. . . . .	495
XI. Myriapodes. . . . .	505
XII. Anoploures . . . . .	509
XIII. Crustacés. . . . .	ibid.
XIV. Annélides. . . . .	514
XV. Vers . . . . .	ibid.
XVI. Infusoires. . . . .	ibid.
XVII. Articles généraux et Objets divers . . . . .	517
XVIII. Table par noms d'auteurs. . . . .	541
XIX. Table des planches. . . . .	689

LIBRARY  
1914

1914



1  
1  
1  
1

1

595.706 Société entomologique de France, Paris.  
56701 Annales: Tables Generales. 1832-60  
5.0

DATE NAME DATE

1832-60

